



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

HIPPOCRATIS COI MEDICORVM OMNIVM

LONGE PRINCIPIS, OPERA
quæ ad nos extant omnia.

PER IANVM CORNARIVM
MEDICVM PHYSICVM LATINA
lingua conscripta.

INDEX RERVM AD CALCEM OPERIS
uniuersi annexus est fecundissimus.



BASILLAE, M D XLVI

Cum gratia & privilegio Imp. Maiestatis ad annos V

AVGVSTISSIMIS AC PRVDENTISSI-

MIS, HONESTISSIMIS QVE VIRIS, SENATV POPV

loq; Imperialis urbis Augustæ Vindelicorum, Ianus

Cornarius Medicus Physicus, s. d.



ON alienum, nec ab re esse arbitror, Augustissime Augustæ
urbis Senatus, hoc in loco, hac instituta ad amplitudinē tuā,
in Hippocratis Cei medicinæ principis scriptorum, à me in
Latinam linguam translatorum editionem, præfatione, pau-
lo altius repetere, qualis fuerit nostro hoc æuo rei medicæ, &
simul etiam aliarū artium ac studiorum status: qualis factus
sit progressus: quantum accesserit incrementi: & quid de toto

hoc studiorum genere sit sperandum. Nam & necessariam esse Hippocratis li-
brorum editionem, lectionem, ac cognitionem, inde clare constabit: & me hæc
vel peractorum laborum gratia, meminisse iuuabit: & qui ista legent, non inuti-
lem cōsequenter huius narrationis cognitionē: & Amplitudo tua, spero, harū
rerū memoria iucunde afficietur, & si quid præsidij ac opis ad hæc studia cōser-
uanda opus fuerit, (sicut reuera uestram, urbium Imperialium opem desiderat
ac implorant) huic libenter incumbet, quo literæ unicum totius uitæ ornāmen-
tum durēt ac uigeant, in Germania nostra, ne si hæc corruant ac iaceant, uere neu-
tra uita uocari mereatur, haud secus q̄ neutrum corpus Medicis dicitur, quod
neq; sanum, neq; ægrotum appellari potest. Talis autem futura uita mihi uide-
tur, ut miti ac familiari nobis similitudine, res omnium tristissima, & perpetua
noctē obscurior adumbretur, si horum studiorum lux extingatur, si literarum
decus deturpetur, si robur illud, quod & pacem, & rerum publicarum ac priua-
tarum tranquillitatem retinet, elanguescat. Quum itaq; primū animum ad Me-
dicinæ studia adijcerem, magna erat bonorum et professorum, & librorum pes-
nuria: adeo ut Hippocrates & Galenus medicæ sectæ optimæ, rationalis illius,
principes, ne nominibus quidem suis iustis, in scholis satis noti essent, quum
uulgo Hippocras & Galienus à plerisq; omnibus appellaretur: itaq; quū essem
adolescens uiginti natus annos, ex Petri Mosellani, uiri & eruditi, & imprimis
sua uelo quæti facundia ornatu auditoribus: (Nam neq; hunc, neq; alium ullum
unquam priuatum præceptorem habui, post prima grammaticæ rudimēta) in
litteris utriusq; linguæ eo progressus, ut non modo grammaticæ docerem, sed
etiam Poetas ac Oratores Græcos publicè enarrarem, plurimū mox ab initio,
ab honestissimæ artis discendæ proposito decidebā. Auertebant enim me bar-
bari scholarum magistri, & non multo expositoribus suis potiores scriptores,
quibus tum medicorū scholæ pro optimis autoribus utebātur, Auicenna, Ra-
sis, Albucasis, Auenzoar, Mesuas, & alij non citra tædium nominandi, Arabi-
cum hominum genus. His accedebant practices scriptores superioris sæculi ac
illius quoq; gens per omnia inepta, sordida, ac impura, & tam spurcè latine lo-
quens, ac tam infeliciter id quod docere uult tradens, ut penitus desperarem ex
tam puridis libris fore posse, ut unquam ad medicinæ cognitionem perueni-
rem, tam uidelicet quam ex Hippocratis aliquot libellis, a phorismis dico, pro-

EPISTOLA

gnostico, et eo qui De uictis ratione in morbis acutis inscribitur, oſfeciffem: & quam mihi ex Galeni aliquot libellis latinè in eisdem extatibus delineaffem. Erant autem hi Leonicensi interpretatione, De febrium differentijs libri duo, & Copi uersione sex libri De locis affectis inscripti. Et his interpretibus tum extabant quoq; Hippocratici illi libelli. Ac in philosophia quidem eo tempore extabat sua lingua Plato, Aristoteles, Theophrastus, Xenophon, & Plutarchus, magno erga bona studia Aldi Manutij beneficio. Verum in medicina nihil Hippocratis ac Galeni ipsorū lingua habebatur, præter Hippocratis aphorismos, quos Philippus Melanchthon mihi communicauerat, & unam Galeni methodum, quam Romæ si recte memini, excusam, apud amicū quēdam uideram. Hic ego dum ambiguus quid facerem sæpe mecum cogitarem, tandem illud statui, quod præfens esset boni consulendum esse, donec aliquando dies meliora proferret. Proinde relictis magna ex parte Arabibus illis scriptoribus, & ex practicis quoq; paucis aliquot, melioribus ut fieri solet in malorum electione, assumptis: uidebantur autem tales esse, Bertrutius, Gatinaria, Guainerius: his ad prædictos libellos Hippocratis ac Galeni additis ac collatis, sed magno interposito interuallo, aliquot annis medicinae studia sectatus sum, donec cum his simul magister magnus artis uenter persuasit mihi, ut artis periculum facerem, quod iam per annos uiginti quinque facere pergo, ab eo tempore quo primum animum ad medicinae studia, uelut dixi, adieci. Quanto uero meo commodo hoc fecerim, aut etiam aliorū utilitate, non est quod multum iactem, Diligentiam meam & fidem, tum in docendo qualiacunq; didici, tum in curando qualia ars præstare potuit, multis cognitam esse scio. Opes uelut studiorū impedimenta, non anxie quæsiui, & eas quoq; quæ contingere potuissent, contempsi. Hoc nondum scio an commodum, aut potius incommodum dici debeat, quod totum istud studiorum priorum genus, per totos nouem annos à me tractatum, relinquere ac quasi dediscere coactus fuerim, quū iam magnam Europæ partem, rerum medicarum experiendarum gratia peruagatus, Basileam peruenissem. Et quod quidem incommodum hoc sit, tot horas male collocasse in studijs dediscendis, nemo non intelligit, etiam ex his quibus non desiscenda, sed amplectenda esse illa adhuc hodie uidentur. Quod uero commodum sit, totam barbarā medicinam à me esse relictam, & græcam assumptam, productam, & non parum per me etiam auctam, & ampliata, nondum persuasum esse scio plerisque, qui adhuc cum Gryllo grunnire malunt, & glandibus uesci frugibus optimis repertis. Profecto horum ingenia uelut inepitissima, & iudicia uelut nihil sani habentia auerfatus, tum mox toto pectore ad Hippocratem Græcum, ac Galenum, itemq; Paulum me contuli, paulo ante Venetijs ex Aldi itidem officina allatos: quibus etiam alienis ad tempus urebar, atq; in his ita uersabar, ut uel totum Hippocratem ad latinōs transcribere me posse non desperarem, si tam magni laboris præmiū alicunde affulsisset: nedum de Galeno ac Paulo ambigerem, quos faciliores esse, uel leuiter græca scientibus constat: si quis modo non penitus rudis eos autores aggredi conetur. Et extant libelli duo Hippocratis eo anno à me conuersi, alter de aere, aquis, & locis: alter de flatibus inscriptus, qui animum meum studiosis fati declararunt, quantum uoluerim

bona se factas.

N V N C V P A T O R I A

uoluerim medicinam illinc adiutā. Nec deerant nobis inhortatores ad rem tentatā strenue obeūdā, inter quos magno erga optima studia merito præcipue mihi nominādus est. Des. ERASMVVS Roterodamus, cuius etiā scripta ad me epistola extat, qua me ad cōstanter prosequendū id quod in Hippocratē medicinæ principē orsus essem inhortatur. Ad idem me institutū Frobenius ac Episcopus, qui prius etiam aliquot mihi cōmentationum fuere autores, tantum non cogebāt: digni profectio propter sua in doctos homines merita, ut ab omnibus bonis uiris aduersus *ἰσοχρῆσις* æmulos instar ignauorum fucorū insidiantes libris ipsorū sumptibus & industria in lucē editis, foueantur & tueantur. Quū igitur hæc mea tunc fuerit uoluntas, & nō omnino desperata etiam præstandi facultas, Cur, inquit aliquis ex illis, ad tot annos dilatum est, quod propter cōmunem utilitatē, si ita est ueluti ipse dicis, q̄ primū in uulgari oportuerat. Fartebor sanē hic quod res est. Primū quidem uoluntatē meam remorata est maxima operis difficultas. Nam ut glossas & uoces penitus obsoletas omittamus: ut dicēdi genus breue illud, & quo uelut per ænigmata, innuere magis q̄ significare sententiam uoluit, ne producamus: adeo ut ne Galenus quidē se ex omnibus extricare ualeat: ut nihil etiam dicamus de lectione uaria, ac subinde à plurimis prisca Hippocratis expositioibus mutata, & tēporis insuper iniuria corrupta: uel ipsa uetustatis reuerendi senis maiestas detertere posset, ne quis familiarius uersare doctissīma, & per omnia grauisissima scripta audeat. Quod uero tantæ grauitatis, maiestatisq̄ scriptor sit Hippocrates, idemq̄ optimus methodi doctor, etiam Plato testatum de ipso reliquit, cuius uerba ex Phædro adscribere non pigebit. Fieri ne posse putas, inquit Socrates, ut quis animæ naturam pro dignitate consideret, absq̄ uniuersi natura: Si quidē Hippocrati Asclepiædarum generis credere oportet, inquit Phædrus, necq̄ corporis, citra hanc methodum. Bene, inquit Socrates, amicitissime Phædre Hippocrates dicit. Oportet tamen insuper ad Hippocratē, etiam rationē expendere, & an cōsona est uideret. Ita sentio, respōdet Phædrus. Proinde de natura cōsiderare, inquit Socrates, quid tādē dicit Hippocrates, & ratio uera: Nonne hoc modo? De cuiuscunq̄ rei natura cōsiderare oportet, primū simplex ne sit, an multarum specierum, id in quo artifices esse uolumus, & alios ut tales sint facere. Deinde si simplex est, uim ipsius considerare, quam à natura habeat, ad hoc ut in aliud faciat quid, aut quam ut ab alio patiat. Si uero plures species habuerit, his enumeratis, id quod in una, hoc in singulis considerare, quid nam à natura facere solet, aut quid ab alio pati. Cōsequens, inquit Phædrus, hoc est o Socrates. Proinde methodus, ait Socrates, absq̄ his similis est itineri cæci. Hactenus Plato. Et nō sunt quidem hæc ita ad uerbum in Hippocrate, sed talis est omnino doctrinæ methodus libri De natura hominis inscripti, ut de nullo alio loqui hic uideatur Plato: quanquā similis methodus etiam in alijs huius uiri scriptis genuinis esse uideatur. Quare quum hactenus reperti sint, qui Platonē, qui Aristotelem, qui Theophrastum, qui reliquos Græciæ philosophos ac scriptores, ad Latinos cōuertente aggressi sint, & aliquid operæ precij præstiterint, in Hippocrate nemo hoc feliciter tentauit, ex toto, ut ne in minutissimis quidem libellis aliqui factis aptos artifices se declarauerint. Nō igitur nihil est quod et nos de difficultate

EPISTOLA

huius scriptoris queramur, qui hactenus omnes ex æquo à se auertit: etiam si nunquam ex toto à nobis desperatum sit, fore ut aliquādo omni difficultate superata, latinus à nobis factus Hippocrates legatur. Accessit ad hanc difficultatem alia remora ex temporum infelicitate. Quum enim per uiginti ferme iam annos medicina Græca reuiuiscere cœperit: reducti sint Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Dioscorides: & hi non sua solum lingua, sed latini etiam magna ex parte (uno Hippocrate hactenus saltem excepto) tum per doctos a liquor uiros, tum per nos quoque facti, tamen ea est sæculi infelicitas, ut nemo tantæ artis, quæ ipsam etiam uitâ, qua nihil homini preciosius esse potest, conseruat: pretium agnoscat. Vidimus ardens primum studium multorum circa linguas addiscendas: deferbuit hoc paulatim. Vidimus maximum studiosorum concursum ad discendam theologiam, quum primum in Germania sincerior pietatis doctrina illuisceret: Durauit hic aliquot annis. Transitum est ad studium iuris ciuilib: Nec puto ullo unquã tempore tot fuisse studiosos, qui leges Imperatorias sequerentur, aut doctorum titulis insignirentur. Sola Medicina ubiq; contempta iacet, frigent gymnasia, torpent professores, ars ipsa in *ἀπείχων* abiijt, & non nisi apud delyras aniculas, & recutitos Apellas, & eos qui multorum periculis de sua ignorantia experimenta faciunt, eius usus quaritur: paucis quibusdam bonis medicis non in usum publicum, sed in priuatum sibi thesaurum, uera medicinæ studia possidentibus. Quanquam ego quidem grauiorem adhuc, ac similem timeam optimæ arti ruinam, si continget ut altius aliquando euehatur, qualem uidelicet Christianæ religionis studium pertulit, & qualem iuris scientia minari uidetur. Sicut enim dum prius aliquot uiri euangelium Christi purum ac sincerum reducere conati sunt, factum est ut apud plebrosque Christus penitus fabula factus sit, & parum adhuc in paucorum cordibus hæreat: Ita ex magna iuris scientia eo peruenitur, ut ius sit in armis ac ui positum, ut sint qui quiduis sibi licere adstruant, adulterare, scortari, prædari, proferre, rapere, agere, capere, & cœlum ac terram miscere, modo apex sit in iure scripto, qui ut ipsorum cupiditatibus inferuiat cogi possit: quomodo summum ius summam iniuriam esse, iuxta uetus adeo uerbum, atque ita omnem optimarum legum doctrinam, usum ac necessitatem intercidere, nemo non sentit. Atque utinam non similis casus maneat rectissimæ medicinæ studium, si quando etiam hoc ad summum adductum fuerit: & ex scholæ umbra, ad publici exercitij theatrum productum. Sed quis prohibere potest malos, ut ne sui similes sint, in quocunq; studiorum genere peruertendo? & ea quæ ad multo rior salutem inuenta sunt, partim per ignorantiam, partim ex malitia, ad perniciem abutendo: Propter tales cessandum à nobis non est, ut non optima faciamus, doceamus, ac in lucem proferamus, & artem per se optimam ad summum statum euehamus. Nos certe ut quod possumus huc conferremus, & ut & ocij, & negocij nostri ratio publice omnibus constaret, sæpe in partialibus editis libellis promissum, sæpe repositum, sæpe repetitum Hippocratem nostrum latinum tandem etiam his infelicissimis temporibus, quibus præter ea quæ iam relata sunt, omnia perpetuo metu consternata grauantur, insidijs pertentantur, proditionibus obtinentur, bello expugnantur, incendijs consumuntur, edere uolumus

N V N C V P A T O R I A

tuimus, atq; hunc in æstimabilibus laboribus, & non leui sumptu ac rei familia-
 ris iactura, perpetuis quindecim annis absolutum. Non quod hos totos in hoc
 solum opus impenderit: hoc enim uere esset suo sibi iumento malum accer-
 fire: sed quod nunquam hanc curam reiecerimus huius quoque operis absol-
 uendi, dum illa partim de Græcis plurima translata, partim à nobis scripta ac
 commentata, in publicum emisimus, non omnino nulla nostra priuata utilita-
 te: Fatendum enim & prædicandum quoque hoc est, quò & magnorum prin-
 cipum, & præclararum urbium, magnificentiam ac liberalitatem sumus experi-
 ti, & ad hæc præstanda, quasi fomite quodam coalti, ac prouecti. Superauimus
 autem hanc operis difficultatem, tum sæpe repetita Hippocratis lectione, tum
 locorum subinde alibi ab ipso Hippocrate repetitorum collatione, tum per
 lecta denuo tota Galeni græca ac latina editione, eo studio ut totum aliquan-
 do editurus sim Galenum, aliqua parte ex mea translatione, & reliquis itidem
 uersionibus ad ueram Græcam lectionem correctis. Er profecto longum est
 set hic declarare, quibus rationibus inductus, multa ex lectione Aldini, plu-
 rima præter lectionem Frobeniani exemplaris, à nobis ad multa manuscripta
 exemplaria collati ac editi, in hac nostra latina Hippocratis conuersione mu-
 tauerimus. Statuimus autem huc impendere quinquennium plus minus, ut si
 deus uitam tam diu prorogari, totius nostræ conuersionis ratio, ac aliqua ex-
 positio extret, in diurnaliorum siue coniecturarum libris, tot à me scribendis, quot
 omnino existunt libri Hippocratis scriptorum. Interim tamen hunc præcipu-
 um nobis fuisse scopum, studiosos omnes non cælabimus, quem etiam pro ius-
 tissima lege Galenus agnoscit, dum sic scribit. Hæc, inquit, Lex mihi in ex-
 ponendo ac interpretandq; obseruatur, ut uniuersuiusque scripta ex illo ipso des-
 clarentur, & non uanis opinionibus, & pronuntiata citra demonstrationem
 sententia, quisque quicquid uelit deblateret. Hanc legem nobis in scopum, in
 Hippocratis libris latine conscribendis proposuimus, & omnes obscuros locos,
 collatione ad alios facta, ubi hoc fieri potuit, exposuimus, reddidimus ac
 expressimus, multis immutatis, non paucis reiectis, plurimis apposis, quæ
 nec in impressis, nec manu scriptis codicibus ita habentur: sed tamen ut alicui
 bi uestigia ueræ lectionis etiam ex illis odorati simus. Quorum omnium iusto
 opere à nobis ratio reddetur. Atque hæcenus suffecerit protulisse me studios-
 rum nostri aui statum, progressum ac augmentum, & præcipue rei medicæ, *z fac illiq; quod primifant in p*
 Cuius primum, summum ac maximum authorem, tandem ego latinis homi-
 nibus non minorem, sed aliquanto, nisi penitus fallor, meliorem quam græcis
 extat legendum produco, edo ac publico. At ne ego mihi tanti beneficij pu-
 blici gratiam expetere uidear, aut ne tanti autoris ac operis patronum præ-
 stare me posse, aliunde confidere puter: ad te augustissime Senatus Augusta-
 ne confugio. Tuæ amplitudini hanc autoritatem defero, Tuæ erga literas & li-
 teratos benignitati hanc gratiam deberi confiteor, quòd Hippocrates latinus
 noster publice extat, habetur, legitur: quòd rebus mortalium iuuandis opus
 expositum est, ultra duo milia annorum ab omnibus in latina lingua desideras *z fac illiq; quod primifant in p*
 tum. Nec uero uideri possum aut uelut ignotus, aut temere, ad tantorum uiros *z fac illiq; quod primifant in p*
 rum præsidium confugisse, dum in publice recepto illo more dedicandorum

EPISTOLA

ac consecrandorū librorum, ad uos uiri Augustenses me recipio. Nam quum uestra respub. per omnem non modo Europam, sed orbem terrarum celeberrima sit, à bonis legibus, à probatis ac grauib. moribus, à seuera in malos animaduersione, à clemēti erga bonos benignitate, à pientissimō religionis cultu, ab ingenti erga literas & bona studia fauore, à doctissimis cōsilioꝝ ac prudentia præstantissimis uiris, uideri nō debeo temere magis q̄ recto iudicio, ad tam augusti fenarus, ad tantorū uirorum tutelam, Hippocratis & pariter meū opus attulisse. Nec ignonus ego uobis esse possum, cuius scripta ac opera tot principes uiros, tot claras urbes fouere ac tueri nondum, quod sciam, p̄ceuit. Hic non referam quibus uiris semper respub. uestra floruerit. Non recensebo Fugagros, non Paungartneros, non Ilungos, non Vuelferos, non Herebrotios, non alias magnas familias principum opes adæquantes, & simul pietate, prudentia, fortitudine, magnificentiaꝝ ac summa liberalitate præstantes. Non dicam de Monopoliorum apud uos extantum utilitate, per quæ fit ut Germania ab hominibus sub polo Antartico habitantibus, & ab ipsis Antipodibus meritoria, in quotidiano usu habeat. Non dicam de plebis sedula opera, & laudatissimis operibus, unde linei generis, biliciorum, triliciorum, quadriliciorū uarijs texturis, multiplicibus tincturis, non modo Germania, sed omnes exterae etiam nationes redundant. Nec dicam de urbis magnitudine, splendidis extructionibus ac ædificijs, & populositate, quæ ut peculiare laudes urbium suut, ita & loci optimum situm, & terræ, ac nascētiū omnium copiam ac ubertatem coarguunt. Verū studium uestrū circa literas, bonas artes, pietatem ac rectam religionē conferuandam nō tacebo. Quū enim uideretis studiorū omnium fluctuationē, sursum deorsum omnia iactari, in præcipiti omnes linguas, artes, ac disciplinas consistere, nullo unquā tempore plures in omnibus scriptores extitisse, partim sua magnifice iactantes, partim aliorum & ueterum quoꝝ scripta damnantes: Vos optimos semper apud omnes recte sentiētes habitos autores Græcos, magna copia per occasionem nuper ad eō uobis oblatos non neglexistis, sed uelut rem reipub. imprimis utilem, eorum opera ac libros comparastis, coemistis, ac pro ingenti thesauro, uelut reuera est, reposuistis, habetis, possidetis: non tamen ut priuatam utilitatem hinc uobis quaeratis, sed ut publicum bonum iuuetis, ut si opus sit, inde rebus humanis subsidium afferatis. Neque enim quicquam ad respub. optime instituendas ac retinendas, utilius est bonorum uirorum bonis scriptis. Sicut cōtra mera pestis est, quæ ex malis malorum libris hauritur. Recte enim artes, boni mores, optima disciplina traduntur ac seruantur in bonis libris. At sine rectis artibus, sine bonis moribus, sine optimis disciplinis, & in summa, sine literis uita non est uita censenda, uelut supra ab initio dixi, & uetus illud chaos, rudis indigestaꝝ moles reducit. At uos sanè in illo librorum Græcorum thesauro uestro, non unius alicuius liberales artis aut disciplinæ autores habetis, sed ex tota philosophia, medicina, mathesi, ac Theologia oprimos, & eos neꝝ hætenus typis excusos, neꝝ multis ad eō adhuc uisos, immo ne nominibus quidem plerique omnibus notos, & fortassis nusquam alibi extantes, uelut ex indice cognoui, quem multarum rerum usu ac experientia clarus medicus apud uos Geryon Seilerus ad me misit.

immo

N V N C V P A T O R I A

Immo nō modo indicem hic amicus noster misit, sed quæ uestra est uiri Augusti, erga recta studia benignitas, de Vobis eorum librorum etiam usum mihi promisit, multa simul de uestra magnanimitate, ac magnifica uoluntate mecum loquutus, ac mihi pollicitus. Quāquam autem antea mihi uirtutum uestrarum gloria non ignota esset: (Qui enim ignota esse possit, quæ per totū orbem decantata est?) tamen eo referente plura cognoui, & propius intropexi, quæ antea ex auditu & aliorum scriptis intellexeram. Accessit ad huius narrationē uir excellenti iuris scientia, & eximia prudentia præditus Claudius Peuringerus, clariss. Iurisconsulti Cōradi Peuringeri filius, nō modo in paternis uirtutibus refulgens, sed in maximis etiam rebus ac negotijs, pro patria obeundis ac gerendis, non iam spem, sed ipsam rem præstans. Cum hoc uiro ante paucos annos mutua aliqua cognitio mihi intercessit, quæ sanè iudiciū de Vobis meum confirmauit, & in id consiliū me adduxit, & breuiter effecit, ut nō dubitauerim Hippocratem hunc latinum meum ad Vos deferre, Vobis inscribere ac dedicare. are ac libra uestrum facere. Cæterum erunt fortassis qui uel hoc nomine Hippocratem à nobis latine conscriptum impetent, quod præstiterat græcum legere, ac satis fuerat græcum extare. His sanè larga data est eius rei faciendæ etiam per me copia. Nam & Græcum exemplar per me editum ex Frobeniana officina, non paucis locis melius ac correctius est quam Venetū. Et si uere Hippocratis studiosi sunt illi, non poenitebit ipsos uel ambo coemere, habere, ac legere, immo etiam plura inquirere, quo tandem emendatissimus sua lingua loquens Hippocrates habeatur. Quin & ego semper ita sensi, melius esse quosuis scriptores in sua lingua, qua ipsi scripserunt legere, quàm optime etiam in aliam translatos. Sed quid facient hi qui Græcum non intelligunt? Antea ostendi huius auctoris difficultatem, breuitatē, & ænigmatis similem obscuritatem. Quando uero expectandum nobis est hoc sæculum, in quo medicinæ studiosi ex æquo omnes ad legendum ac intelligendum Hippocratem Græcum sufficiant? Esse autem Hippocratem talem rei medicæ autorem, ut sine ipso res medica integre consistere non possit, & sæpe aliàs dixi, & nunc non minus asseruerantissime affirmo. Totus enim Galenus omnem suam doctrinam, ad Hippocraticam methodum, uelut ad amulsim direxit. Idem fecerūt & ante, & post Galenum, optimi quique tum medici, tum philosophi, ut ineptissimos pariter ac indoctissimos se esse declarauerint, qui unquam ab Hippocrate desciscerunt, aut ipsius dogmata impetuerunt, quorum multos adeo in libris suis hinc inde, ex omni occasione Galenus reuellit, ac explodit. Demus autem hoc sæculum spem nobis injicere de futuris. Nam reuera nullum antea fuit, in quo per omnem fermè Europam pariter utriusq; linguæ cognitio in tantū aliquandiu floruisse. At quid uerat, aut quid adeo obfuerit, hanc etiam accessiōnem linguæ latinæ contingere, ut Hippocrates latinus pariter & Græcus legatur, maxime quum etiam Græcus ex nostra latina interpretatione clarior euadat, & expositionis Græci uicem latinus supplere possit. Verum mihi, uelut antea quoq; dixi, uidentur omnia nunc ingenia, omnes artes ac disciplinæ in summo ac præcipiti stare: atq; utinam sic retinerentur, non retro ut ruerent, & esset aliqua saltem spes in paucis, qui in posterum suis magistris discipuli euaderent

EPISTOLA

rent præstantiores. Ego profecto quum multis annis à scholis abfuerim, à docendi munere abhorruerim, studijs meis ad scribendum, & ad exercendam medicinam collatis: proximum fermè triennium rursus professor medicinæ contempsit, non omnino surdo ac muto auditorio, in Hæstorū ac Cattorum principis Academia Marpurgenfi. Sed ut uerum aperte fatear, longe infra meam spem, & inferiore successu quàm Illustris. Herois Philippi Hæstorum principis, uel erga me, uel erga studiosos, magnifica liberalitas deprecere uidetur. Non tamen desunt huius rei causæ. Pleriq; omnes fugimus immensum studiorum laborem, delicias ac uoluptatem in his consecramur. Itaq; uel quantum incundum est, uel minime molestum, didicisse satis esse putamus. Alij ad ea studia se conferunt, unde quàm breuissimo tēpore, ac minima impensa assequantur, quo uentri sit consultum, & πῶς τὰ ἄλλα respiciunt, nō cogitantes plerunq; quàm sint ad ea tractanda appositi. Medicina uero requirit naturam idoneam, à puero institutionem, doctrinam linguarum, literarum, philosophiæ, mathematicarum, & totius naturæ cognitionem: multam insuper industriam ac diligentiam, locum studijs commodum, & longissimum etiam tempus. Si non hæc sunt quæ studiosos à Medicina auertūt, libenter patiar alium potiores causas afferre. Ego Hippocrati in libro De lege hæc referenti accedo. Detineo Amplitudinem tuam Augustissime Senatus longius quàm proposueram: Vnum si adhuc retulero dimittam. Non conatus sum in hac mea translatione Ciceronianum uideri, nō quod omnino improbem hoc nouæ sectæ hominum genus, qui per omnia Ciceroni in dicendo similes fieri student: aut quod penitus negem fieri posse, ut omnes artes ac disciplinæ, Ciceronis dictione in imitationem assumpta ac seruata, tradantur. Sed ut simpliciter dicam, primum quia non placet. Deinde quod uideam magna ex parte longum & inutilem laborem, & postea etiam omnibus factis, conatum infelicem, ac successu carentem, quo pleriq; ex illis referunt Ciceronem, non aliter quàm Nero princeps Catonem, aut ut uicinius comparem, cuculus Iusciniam. Accedit his feruilitas & mācipatio, nullam linguæ, immo ne cogitandi quidem diuersum aliquid, libertatem relinquens. Et quando desinemus esse turpiculæ simiæ, pulcherrimum hominū genus creati: Sed oportuit hoc quoq; ad reliqua seculi incōmoda accedere, ut haberemus qui non solum loquendo ac scribendo, Ciceronis simiæ ut essent, se ex cruciarent, sed etiam græca omnis generis scripta in latinam linguam conuertendo, tanta sui mancipatione, ut si modo Ciceronis uerbis undiq; conquisitis loqui uideantur, etiam à sententia subinde excidere nec uereantur, nec animaduertant: quasi magni adeo referat Ciceronē ita exprimere, & quasi nemo alius bonus latinus scriptor extet, quæ sequi oporteat, ipso etiam Cicerone, si cognoscat, nifuro suos ὑπερβαίνω, præsertim si quomodo se ad Lælios, Scipiones, Terentios, atq; alios composuerit, in memoriā reuocet. Et tamen hic nihil dicam de his rebus quas medicus tractat, quas ne ipse quidē Cicero Ciceroniane eloqui possit, etiam si à Medico de his edoceretur: quum sanè aliās non multus sit rerum naturæ tractatione, nimirum intra moralis ac rationalis philosophiæ limites conclusus. At tum demum Simiā uere simiā est, quum etiam supra hominē præfatare quid molitur. Hoc itaq; agāt hi quibus istud placet, ac datum est

N V N C V P A T O R I A

est, ego neminem prohibeo. Sed sic sentio, Hippocratem istos fucatos ornatus auerſari, & amare ut ſicut in ſua, ita in omni lingua, breuis & uerbis, & ſententijs, & tamen plenus ac grauis, darus item ac dilucidus, quantum ad eius ætatem poſteris aſſequi datur, & quod poſiſimū eſt, rectus legatur. In hoc ſi quid præſtiti, quod uolui ſum aſſequutus: nec eſt quod uerear ullos naſos, uel *ſuoné* *ſuonés*, quantumuis in cornu exactus. Quo uero ſciant ſtudioſi aliquam huius operæ à nobis tranſactæ partem, Habent in hoc noſtro latino Hippocrate librum De aere, aquis, & locis, duplo auctum, & niſi fallor integrum: Habent libri De capitis uulneribus principium, quod in Græcis codicibus impreſſis deeſt: Habent librum uerum *μολύβδιον*, id eſt Veſtitiarium, eundemq; De oſſibus inſcriptum: quæ omnia in græcis exemplaribus partim deſiderantur, partim alieno loco poſita, iuſtis locis reſtituta ſunt. Quorum omnium gratiam ut uobis uiri Auguſtineſes, medicinæ ſtudioſos debere uolo, ita nec pudebit, nec pigebit uos, ſpero, ſummum medicum Hippocratem ueſtra autoritate tutum, ueſtro fauore commendatum, in publicam utilitatem, & mea erga

Auguſtiſſimum Senatam uoluntatis declarationem, uobis inſcriptum ac dedicatum prodidiſſe. Valete uiri magnifici.

Marpurgi Heiſſorum, Calend. Septembris. Anno Chriſti,

M. D. XLV.

INDEX LIBRORVM IN HOC

VOLVME. CONTENTORVM.

Hippocratis uita ex Sorano folio . . .	1	Liber tertius . . .	218
Hippocratis iusiurandum . . .	3	Liber quartus . . .	228
Lex Hippocratis . . .	4	De affectionibus . . .	245
De arte liber . . .	5	De internis affectionibus . . .	258
De ueteri medicina . . .	10	De uirginum morbis . . .	286
De medico . . .	20	De natura muliebri . . .	287
De decenti ornatu . . .	23	De morbis mulierū, liber primus . . .	309
Præceptiones . . .	27	Liber secundus . . .	350
De natura hominis . . .	30	Notha ad finem primi libri de morbis mulierum adiecta . . .	383
De salubri diæta, Polybi . . .	37	De sterilibus . . .	386
De genitura . . .	39	De morbis popularibus, lib. I . . .	397
De natura pueri seu fœtus . . .	43	Liber secundus . . .	410
De carnibus . . .	55	Liber tertius . . .	421
De septimestri partu . . .	61	Liber quartus . . .	434
De octimestri partu . . .	64	Liber quintus . . .	444
De superfœtatione . . .	66	Liber sextus . . .	455
De exfectione fœtus . . .	72	Liber septimus . . .	467
De dentitione . . .	74	De uictus ratione in morb. acutis . . .	489
De corporum refectione . . .	75	De iudicationibus . . .	510
De corde . . .	ibidem	De diebus iudicatorijs . . .	514
De glandulis . . .	78	Aphorismi . . .	517
De ossium natura . . .	81	Prænotiones . . .	533
De locis in homine . . .	88	Prædictionum, liber primus . . .	562
De aere, aquis, & locis . . .	104	Liber secundus . . .	549
De flatibus . . .	117	Coactæ prænotiones . . .	563
De medicamentis purgantibus . . .	125	De uulneribus capitis . . .	590
De diæta siue uictus ratione, lib. I . . .	124	Chirurgiæ officina . . .	598
Liber secundus . . .	136	De fracturis . . .	602
Liber tertius . . .	148	De articularibus . . .	621
De infomnijs . . .	156	De ulceribus . . .	648
De alimento . . .	161	De fistulis . . .	665
De humidorum usu . . .	164	De hæmorrhoidibus . . .	667
De humoribus . . .	167	De uisu . . .	669
De morbo sacro . . .	172	Hippocratis epistole . . .	671
De morbis, liber primus . . .	180		
Liber secundus . . .	194		

FINIS.

Legimus libri Hippocratis uita ex Sorano . . . Aphorismi . . .

De aere, aquis, & locis . . .

De morbis, liber primus . . .

De morbis, liber secundus . . .

De uictus ratione in morb. acutis . . .

De iudicationibus . . .

De diebus iudicatorijs . . .

Aphorismi . . .

Prænotiones . . .

Prædictionum, liber primus . . .

Liber secundus . . .

Coactæ prænotiones . . .

De uulneribus capitis . . .

Chirurgiæ officina . . .

De fracturis . . .

De articularibus . . .

De ulceribus . . .

De fistulis . . .

De hæmorrhoidibus . . .

De uisu . . .

Hippocratis epistole . . .

HIPPOCRATIS COI VITA

EX SORANO, IANO CORNARIO

Medico Phifico interprete.



HIPPOCRATES genere Coos fuit, Heraclidæ & Praxitheæ filia Phenaretis filius. Ad Herculem autē & Aesculapiū originem generis sui referebat, ab alteroq; se uigesimū, ab altero decimū nonum se numerabat. Eius autem genealogiæ Eratoſthenes mentionem facit, & Pherecydes, & Apollodorus, Arius item Tarſenſis. Cæterū parentis sui Heraclidæ discipulus fuit, deinde Herodici, & ut quidā tradunt, Gorgiā Leon

tinum rhetorem audiuit, & Democritū philosophum Abderiten. floruit temporibus Peloponnesiacis, natus (uelut Iſtomachus in primo de Hippocratis ſectā tradit) primo octogefime Olympiadis anno. Soranus uero Coos: qui Coos in bibliothecas perſcrutatus eſt, addit, ſub Abriadæ monarchia, Agriani menſis ſeptima & uiceſima die, in qua etiā uſq; in hūc diem Coos Hippocrati omnia ſacra facere tradit. Porro quū in arte medica totoq; disciplinarū orbe exercitatus eſſet, ſunctis uita parentibus, ex patria diſceſſit, ut quidē maligne de eo Andreas in eo quē de Medicinæ origine ſcripſit libro prodiit, propterea quōd publicam Cnidiorū bibliothecā igne cōcremaſſet. Alij autem eo propoſito eum patriam reliquiſſe dicūt, ut rei medicæ effectus & ſucceſſum per multos locos cognoſceret, & in his uarijs modis exercitaretur. Quemadmodū uero Soranus Coos narrat, Somnus deus eum per ſomniū admonuit, quo ſe ad Theſſalorum regionē inhabitandam conferret. Cæterum per omnē Græciam Medicinæ gloria omnib; admiratōi fuit, adeo ut etiā à Perdicca Macedonū rege, qui tunc laborare putabatur, uocatus publice ſit, ad ipſumq; unā cum Eurypſōre, qui ipſo ætate maior erat, peruenit, animiq; hūc regis affectū eſſe certis ſignis deprehendit. Poſt mortem enim Alexādrī parentis, unam ex pellicū eius numero Phylam nomine Perdiccas deperibat, ad quā quū rem ipſam Hippocrates denūciſſet, poſtea ex illius cōſpectu omnino illum mutari obſeruauit, atq; ita morbo depulſo regem cōſeruauit. Vocatus eſt & Abderam quo præſens ipſe Democritū ab inſania liberaret, atq; eo ſanato à tota urbe peſtem depelleret. Quin & in Illyricum plurimasq; barbaras terras peſte ingruente, & illarum gentiū regibus ipſum ad ſe uocantibus, quū à legatis ipſorū qui uenti in illis regionibus uigerēt, didiciſſet, ipſos re infecta dimiſit. At uero quum prudenti ratiocinatione peſtem in Atticam graſſaturā præuidiſſet, futurū id prædixit, & tum ciuitatū, tum diſcipulorū curam geſſit, intantūq; Græciæ amator fuit, ut quum ipſius nominis celebritas uſq; ad Perſas diuulgaretur, atq; ea gratia ab Artaxerxe per Hiſtānidem Helleſponti præfectū, magnis muneribus & precibus ut ad ipſum ueniret inuitaretur, ob honeſtatē, argentiq; cōtemptum, ac Græciæ amorē, regi id denegarit, quemadmodū & hoc ex epiſtola eius ad illum manifeſte oſtēditur. Propriam porro patriam liberauit, quū Athenienſes ei bellū illaturi eſſent, Theſſalis ad auxiliū ferendū rogatis. Quapropter ſplendidos honores apud Coos cōſequitur eſt: imō & apud Theſſalos Argiuoſq; & Athenienſes, qui cum Eleuſinijs ſacris ſecundū ab Hercule publice initiarūt,

*dicir plutarcoſ in uita plato
q; Hippo el plon inuena eodem
ipic et q; ipſe ploro fuit anſe a
ſentū q; quādingentū ſimo
ſimo uero. et inceperunt oia
piadō ſimūq; amū unū q;
ſomniū ſuſcit conceſſit
xante motuſ ſuo ut elicit in
uita ſomniū q; plutarcoſum*

HIPPOCRATIS VITA

& ciuē conscripserunt, atq; in Prytaneo alimēta tum ipsi, tum posteris eius de-
 derunt. Liberaliter autem & minime inuidiose studiosos artem edocuit, decen-
 ti iureiurādo prius adstrictos. Vita functus est apud Larissas, quādo & De-
 mocritus obiisse traditur, atq; alij quidē nonagesimo aetatis suae anno, alij octo-
 gesimo quinto, alij centesimo quarto, quidā uero cētesimo nono, decessisse tra-
 dunt. Sepulchrum autem est inter Gyrtōnē & Larissam, ubi usq; in hūc diem mo-
 numētū eius cernitur, in quo sanē ad multū tempus examen apum mellifican-
 tium erat, quo melle ad infantum oris ulcuscula iuxta tumulum illito, nutrices
 ea facile per sanabant. Porro in multis imaginib; uelato capite pingitur, ut qui-
 dam aiūt pileo, quod nobilitatis signū est: nam hoc modo etiam Vlysses Pile-
 tus cernitur: Alij autem pallio uelātū dicunt, atq; ex his aliqui decoris gratia id
 fieri afferunt, quādo quidem caluus erat: aliqui uero ob capitis imbecillitatē id
 fieri perhibēt, aliqui autē significanter id ab eo factū uolunt, nimirū quod prin-
 cipem rationalis animae sedem probe munitā & contactam esse oporteat. Alij
 signum peregrinationes amantis esse ferunt: alij uero rursus obscuritatem scri-
 ptorū ipsius per hoc significari cōtendunt. Alij postremū in testificationē id fie-
 ri uolūt, quod etiam sanitatis tēpore ea quae laedere possunt cauere debeamus:
 Quāquam quidam affirmunt, quod in administratione rerum gerendarū, ne-
 quid à circumfluo pallio manus ipsius impediretur, id ipsum complicatū in ca-
 put reijcere cōsueuerit. Ceterū de scriptis ipsius multa dissensio est, quare fit ut
 quum alia alij opinentur, nō facile sit de ipsis certum quid pronuntiare, ob mul-
 tas praesertim causas quae iudicij certitudinē obfuscant: uelut est primum qui-
 dem cognomen. Secundo quod dictionis characterē possibile sit seruare. Ter-
 tio quod unus & idem modo robustiore, modo remissiore dictione per aetate
 utatur: neq; defunt etiam aliae praeter has causas, si referre libeat. Pecuniarum
 autem penitus contemptor fuit, moribusq; sanctis, ac Graecorū amator, quare
 etiam gentiles suos summa diligentia curauit, adeo ut à peste omnes ipsorū ci-
 uitates liberarit, quemadmodū supra dixi. Vnde & splendoros honores nō a-
 pud Coos tantum, sed & apud Argiuos & Athenienses est cōsequu-
 tus. Filios à morte reliquit duos, Thessalum & Draconem,
 discipulorum uero magnū numerum. Cla-
 rissimi uero ipsius filij fuisse
 perhibentur.

HIPPOCRATIS COIIVSIV

RANDVM, IANO CORNARIO ME

dico Physico interprete.



POLLINEM medicum, & Aesculapiū, Hygeamq; ac Panaceam iuro, deosq; omnes iteq; deas testes facio, me hoc iusurandum, & hanc cōtestationem conscriptā pro uiribus & iudicio meo integrè seruaturū esse. Praeceptorem sanè qui me hanc edocuit artem, parentum loco habiturū, uitam cōmunicaturum, eaq; quibus opus habuerit impertiturū: eos item qui ex eo nati sunt pro fratribus masculis iudicaturū, artēq; hāc si discere uoluerint, absq; mercede & pacto edocturū: praecptionū, ac auditionū, reliquaq; totius disciplinae participes facturum, tum meos, tum praecptoris mei filios, imò & discipulos qui mihi scripto cauerint, & medico iure iurando addicti fuerint, alij uero praeter hos nulli. Caeterum quod ad aegros attinet sanandos, dietam ipsis cōstituiam pro facultate & iudicio meo cōmodam, omnēq; detrimentū & iniuriā ab eis prohibebo, Neq; uero ullius preces apud me adeo ualidae fuerint, ut cuiuspiam uenenū sim propinaturus, neq; etiā ad hāc rem cōsiliū dabo, Similiter autē neq; mulieri salum uuluae subditiciū, ad corruptum conceptū, uel foetum dabo. Porro praeterea & sanctē uitam & artem meam conferuabo. Nec uero calculo laborātes secabo, sed uiris chirurgiae operarijs eius rei faciendae locum dabo. In quascūq; autē domos ingrediar, ob utilitatem aegrotantium intrabo, ab omnīq; iniuria uoluntaria inferēda, & corruptione cum alia, tum praesertim operū uenereorum abstinebo, siue muliebria, siue uirilīa, liberorum ue hōminū aut seruorum corpora mihi cōtigerint curanda. Quaecūq; uero inter curandū uidero aut audiero, imò etiā ad medicandum non adhibitus, in cōmuni hominum uita cognouero, ea siquidem efferre non cōtulerit, tacebo: & tanquā arcana apud me cōtinebo: Hoc igitur iusurandum mihi integrè seruanti, & non confundenti, cōtingat & uita & arte feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum gloriam meam celebrari, Transgredienti autem & peieranti, his contraria eueniant.

HIPPOCRATIS COLLEX,

IANO CORNARIO MEDICO

Phyfico interprete.



MEDICINA omnium artium præclarissima est. Verum propter ignorantiam eorum qui eam exercet, & ob vulgi ruditatem, quod tales pro medicis iudicat & habet, iam eo res deuenit, ut omnium artium legè utilissima censeatur. At uero hoc peccatum ob hanc potissimum causam mihi committi uidetur. Soli namque Medicinæ nulla poena in rebus publicis statuta est, præterquam ignominia, uerum hæc ipsa non afficit, neque continet eos qui ex cõposito personam ipsius induerunt. Similimi enim huiusmodi Medici sunt personis quæ in tragœdijs introducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem & habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi autem uerè non sunt. Sic & Medicorum fama quidem & nomine multi, re autè & opere ualde pauci. Quisquis enim Medicinæ scientiam sibi uere cõparare uolet, eum his ductibus uoti sui cõpotem fieri oportet, Natura, Doctrina, Loco studijs apto, Institutione à puero, Industria, & Tempore. Primum quidem igitur omnium Natura opus est. Natura enim repugnante, irrita omnia fiunt. Si uero natura ad optima uiam demonstrat, artis Doctrina facile contingit, quam sanè cum prudentia sibi cõparare oportet, ita ut à puero institutio accedat, atque id in Loco à natura ad disciplinam apto. Amplius autè & Industriam adhibere oportet: eamque ad multum omnino tempus, quo disciplina ipsa in sita, feliciter & cum profectu fructus suos producat. Qualis enim eorum quæ terra producit cõsideratio est, eiusque modi etiam disciplina Medicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra, uelut ager est, dogmata præceptorum, uelut semina sunt. Institutioni à puero cum eo cõuenit, quod opportuno tempore semina in aruum cadere oportet. Locus autem in quo disciplina contingit, est uelut ambiens aer, à quo è terra nascèntibus nutrimentum accedit. Industria autè, cultura est. Tempus postremum hæc omnia corroborat, ut perfecte enutrientur. His igitur ad artem medicam allatis, & uera ipsius cognitione comparata, tandem per urbes obambulando, non sermone est & infelices opes his qui eam repositam habent, & in somnium, aut potius somnium diurnum, & maxime uerum, alicuius fiduciamque ac ueræ exultationis expers, timiditatisque & audaciæ nutritrix. Timiditas equidem impotentiam, Audacia uero ignorantiam artis significat. Duo enim sunt, Scientia & Opinio, quarum altera quidem scire facit, altera uero ignorare. Cæterum res sacras facris hominibus demonstrantur, prophætis id fas non est, prius quam scientiæ organum incendantur.

5

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE ARTE. IANO COR.

NARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE.



VNT quidam qui artē putant, reliquas artes turpiter
 incessendo dehonēstare, atq; id quidem ueluti putāt
 non trāsigunt, ut ego sanē assero, sed propriā cogni-
 tionē ac scientiam ambitiose ostētant. Mihi uero in-
 uenire aliquid eorū quæ nōdum inuēta sunt, quod is-
 psūm notum quā occultū esse præstet, scientiæ uo-
 tum ac opus esse uidetur, Similiterq; & semiperfecta
 ad finē perducere & absoluere. At uero uerborū in-
 honestorum arte ad ea quæ ab alijs inuenta sunt con-
 fundenda, promptū esse, nihil quidem corrigendo: eorū uero qui aliquid sciūt
 inuenta apud ignaros calumniando, non sanē scientiæ uorum aut opus esse ui-
 detur: sed proditio magis naturæ suæ, aut ignorātia artis. Solis enim artis igna-
 ris hoc ipsum factum cōuenit, qui cōtentiose quidem gestiunt ac conātur, ne-
 quaquā uero possunt maliciæ sufficere, ad hoc ut aliorum opera quæ quidē res-
 cta sunt, calūnientur, quæ uero nō recta sunt, reprehēdant. Eos quidem igitur
 qui in alias artes hoc modo irruunt, quibus hæc curæ sunt, quorūq; id interest,
 & præstare hoc possunt, prohibeant. Præfens uero sermo his qui medicinam
 eo modo inuadunt aduersabitur, confidens quidē & animatus propter uilita-
 tem eorū quos infectatur: copiosus uero ob artē, qua præstat & auxiliatur: po-
 tens autē ob sapientiā, qua est eruditus. In uniuersum itaq; nulla uidetur mihi
 ars esse quæ nō existat, absurdū enim est aliquid esse putare quod nō est, quo-
 niam eorū quæ nō sunt, quā nam substantia cōspecta aliquis denūciare possit
 quōd sint: Si enim nō existentia uidere non datur, quē admodū existētia, haud
 equidem scio quomodo quis mēte cōcipere queat ea quæ nō sunt, quemadmo-
 dum ea quæ sunt, quæ certe oculis uidere est, mēteq; intelligere quōd sunt, ue-
 rum ut ea nec uideas nec intelligas, nō similiter cōtingere potest. Sed existētia
 quidē semper uidentur ac cognoscuntur: nō existētia autem, neq; uidētur neq;
 cognoscuntur. Cognoscuntur itaq; demonstratis iam artibus, & nulla est ars quæ
 nō ex specie quadā rerū uideat, arbitrorq; sanē ego etiā nomina artib. ex specie-
 bus accipi & imponi. Absurdū enim est existimare ex nominibus species rerū
 germinare & prouenire, immo etiā impossibile existit. Nomina enim lege qua
 germina existūt, atq; hæc quidē si quis ex prædictis non ad plenū intelligat, in
 alijs sermonib. fortassis clarius edocebitur. De Medicina uero, utpote de qua
 hic institutus est sermo, claram demonstrationē faciam, & primū sanē definiā
 quod sentio, Medicinā esse morbos ab ægris in totū tollere, & morborū uehe-
 mentes impetus obtundere, & eorū qui à morbis uicti sunt curationē nō aggre-
 di, quum id in confesso sit, quōd Medicina tales sanare non possit. Quomodo
 igitur hæc Medicina faciat, & quali omnino facultate præstet, de hoc iam reli-
 quum

quum sermonem institutam. Cæterū in artis demonstracione simul etiā sermo-
 nes illorū qui eam dehonestare cōtendūt, quatenus quisq; eorū sibi quid trāse-
 gisse uisus est, reuellam. Principium itaq; sermonis hoc erit, cui omnes assensu
 ros scio. Quod quidem aliqui à medicina curati sanitati restituitur, cōstentur,
 Quod uero nō omnes, ob hoc iam ars ipsa uituperatur: autq; hi qui eam peius
 incessunt, q̄ hi qui à morbis apprehenduntur, eosq; euadūt, fortunæ ope eua-
 dant, & non auxilio ipsius artis. Ego uero non priuabo quidem ipse fortunam
 tanquam nihil operæ precij faciat, puto enim morbis qui male curatur ut pluri-
 mum infortuniū accedere: qui uero bene, eos bonā fortunā nasci. Postea ue-
 ro interrogo: quomodo possibile est sanatos aliud q̄ artē causari, siquidē eius
 usu & ministerio sunt sanati? Nudā enim fortunæ speciem eos respicere ac se-
 qui noluisse, ex hoc apparet, quod seipfos arti cōcrediderunt. quare à gratia for-
 tunæ referēda liberi sunt: ab ea uero quæ arti debetur minime se uēdicare possunt,
 quo minus ei sanitatē acceptū ferāt. In hoc enim quod se ei cōmiserunt ac
 cōcrediderunt, palām est ipsos speciem eius esse cōtemplatos. Vim uero eius pa-
 trato opere cognouerunt. Dicit sanē hic aduersarius, quod multi iam ægri etiā
 citra medicorum usum sint sanati: & ego id dicentibus credo. Videtur autem
 mihi omnino fieri posse, ut & qui medicis non uti sunt, in medicinā inciderint,
 non tamen ut scierint quod in ipsa rectū fuerit, & quod nō rectum: alioqui con-
 rigisset ut seipfos eodē penitus modo curassent, quo curati fuissent, si medicos
 adhibuissent. & hoc tandem magnū signum est substantiæ ipsius artis, Nempe
 Artem esse, & quidem magnā, quando sanē etiā hi qui eam esse non putant,
 per ipsam seruari apparent. Valde enim necessarium est nosse, eos qui medicis
 etiam nō sunt uti, si ægrotauerunt & cōualuerunt, quod aut facientes aliquid,
 aut nō facientes sanati sunt. Aut enim inedia, aut edacitate, aut uberiore portu,
 aut siti, aut balneis, aut illuuiē, aut laboribus, aut quiete, aut somnis, aut uigilia,
 aut his omnibus promiscue utentes, cōualuerunt. Et sanē propterea quod opem
 senserunt, ualde necessarium est ipsos nosse, quod fuerit aliquid quod opem
 tulerit. Et rursus si quid detrimenti acceperūt, necesse est & detrimentum
 nosse, & quod fuerit aliquid quod damnū dedit ac læsit. Non enim quiuis cog-
 noscere potest ea quæ cōmoditate & detrimento sunt disparata. Si igitur is
 qui ægrotauit, siue laudare siue uituperare nouerit quid ex diæta, per quā cō-
 ualuit, omnia hæc Medicinæ esse cōperiet, & sunt nihil minus ea quæ damno
 fuerit, quā ea quæ opem tulerunt, in testimoniū arti, quod Ars ipsa sit. Quæ
 enim profuerunt, ob rectum usum profuerūt, Quæ uero nocuerūt, ob id quod
 nō recte usurpata sunt, nocuerūt. Atqui ubi rectum, & non rectum, utrumq;
 suum finem habet, quomodo quis hoc artē esse neget? Hoc enim ego artis ex-
 pers esse dico, ubi neq; rectū neq; non rectum aliquid existit. Vbi uero utrumq;
 horum inest, quomodo hoc nō artis opus, sed potius inartificialitatis existat?
 Amplius autē si ex pharmacis purgātib; & alui sistētib; solū, tum Medici-
 cina, tum Medici sanationē facerēt, infirmus sanē sermo meus meritō iudicare
 tur. Nunc uero hi qui inter medicos maxime laudati sunt, & diæta, & alijs me-
 dicaminū formis sanant, quas ne idiora quidem artis ignarus si audiat, nedum
 Medicus, artis esse negare queat. Vbi igitur nihil neq; in ipsis bonis medicis,
 neq; in arte medica inutile est, Sed in plurimis eorum quæ ex terra nascuntur,
 &

& eorum etiã quæ sũt, species & formæ insunt medelarũ & pharmacorum: non est quod amplius aliquis eorũ qui sine medico cõualuerunt, casum spontaneũ uero sermone uehere possit tanquã causam suã sanationis. Spõtanẽum equidẽ nihil esse adparet ac deprehẽditur. Omne enim quod fit, propter quid fieri cõperitur, atq; etiã in singulis adeo propter quid fieri uidetur, Spontanẽum uero nullam substantiam habere cõperitur, sed nudum tantum nomen. Medicina autẽ tum ex his quæ propter quid de industria excogitata sunt, esse adparet, tum substantiam amplius habere conspicitur. Quare his quidem qui fortunæ sanitatem acceptum ferũt, atq; derogant, hæc quæ dixi respondere quis possit. Cæterum eos qui ob morientũ calamitatem, artem demoliri contendunt, miror quãnam memorabili ratione cõmoti, Intemperatiã quidem morientium causã mortis nõ statuunt, Scientiam uero eorum qui medicis nam exercent, accusant: tanquã sanẽ Medici quidem ea quæ non conueniant imperare possint, Aegri uero quæ imperata sunt transgredi nõ possint. Atqui longe magis rationi consentaneum est, ægros non posse facere quæ imperantur, quã medicos non cõuenientia iubere. Medici namq; sana mentẽ sanosq; corpore rem aggredientes, & præsentia cõsiderant, & de præteritis similiter iuxta præsentia ratiocinantur, intantũ etiã ut aliquando palã gloriari soleant ægri, se illorũ opera sanitati restitutos esse. Aegri uero neq; qua parte laborẽt, neq; ob quam causã laborẽt, neq; quid ex præsentibus futurũ sit, neq; quid ex horum similibus fieri scientes, medici imperio subiãcẽt, dolentes quidem ob præsentia, timẽtes autem futura: & pleni quidem morbo, inanes autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, q; quæ ad sanitatẽ faciunt assumere malũt, mori quidem nõ amantes, sed tolerare tamen nõ potentes. Hoc modo autem affectos, urũ uerisimilius est, hos à medicis imperata facere, an alia facere quæ medici nõ iusserũt: aut medicos tales quales superiori sermone declarauĩ, nõ conuenientia imperare: Nonne multo magis hos quidem quæ cõueniant iubere: illos autẽ temere & impotenter nolle obedire, atq; sic inobediẽtes in mortẽ incidere: Quæ sanẽ qui nõ recte cõsiderãt, causas ad hos qui inculpabiles sunt, referunt: eos uero qui maxime accusandi sunt, à culpa liberãt & defendũt. Porro sunt item quidam qui ob eos qui uictis à morbis curã adhibere nolunt, medicinã ipsã reprehendunt, dicũtq; quod morbi quos sanare aggrediuntur illi, per seipfos fuissent sanati. Qui uero auxilio opus habent, eos non contingunt. Oportebat autem inquirũt, siquidem ars erat, omnibus æquẽ morbis sanitatem afferre. Qui igitur hæc dicunt, si medicis indignarẽtur, quod ipsorum talia dicentũ, non ut delirantiũ curam habeant, merito sanẽ succenferunt magis, quã quod illa reprehẽdunt. Si quis enim ab arte potẽtiam in ea quæ non proficitur, aut à natura facultatẽ in ea ad quæ nata nõ est, exigat: is ignorãt saniam dementiæ potius quã ignorantia cõuenire. Quorũ enim instrumentũ siue naturæ, siue artium facultatẽ obtinemus, per ea sanẽ opifices esse possunt, per alia uero minime licet. quum igitur homo morbo afficitur qui uehemẽtior est quã medicinã instrumẽta, ne sperare quidem oportet ut à medicina exuperetur. Exẽpli enim gratia, Interea quæ in medicina urẽdi uim habet, ignis extreme urit, uerũ eo minus etiã alia multa. An uero ex eis præstãtiora leuiores morbos curare nõ possint nondũ satis cõstat, ualẽtissimos aut morbos

potentissima etiam instrumenta curare non posse, quomodo non sit manifestum. Quæ enim ignis non efficit, quomodo ea quæ ab illo non sunt domita non ostendant, quod alia arte opus habeat, & non ea in qua ignis instrumentum existit: Idem sentio & de alijs instrumentis quæcumque medicinæ opus adiuuant, quorum omnium singulatum successum si non assequitur Medicus, vim affectionis accusare oportet, mea quidem sententia, non ipsam artem. Qui igitur eos reprehendunt qui uictis à morbo manum adhibere reculant, hortantur etiam ut ea quæ non conueniunt attingant, non minus quam ea quæ contingere interest artis, quod quum faciunt, his quidem qui nomine medici sunt admirationi sunt, ab his uero qui arte præstant deridentur. Nec uero adeo desipientes huius artis experti sunt: neque uinum peratoribus neque laudatoribus indigent, sed ratione, ad quam sanæ actiones opificum absolutæ, plenæ sunt, & quæ ab ea destitutæ, mancæ. Amplius uero etiam defectus aliquos quidem opificibus imputare oportet, aliquos uero ipsis operibus. Quæ quidem igitur ad alias artes pertinent aliud tempus, aliumque sermonem requirunt, Quæ uero ad medicinam, qualia sunt, & quomodo iudicanda, partim quidem superiori sermone ostendimus, partim uero præsentis oratione docebimus. Sunt enim his qui hanc artem probe norunt, morbi partim non in obscuro positi, et non multi: partim non in manifesto loco hæretes, & multi sunt. Qui enim ad interna uertuntur, in obscuro siti sunt, Qui uero ad superficiem corporis erumpunt aut tumescunt, manifesti sunt. exhibent enim sese ut tum uisum, tum tactum, & soliditas & humiditas ipsorum percipiatur, & qui calidi sint quicquid frigidi sentiat, qui sanæ singulorum aut præsentia aut absentia tales existunt. atque horum quidem omnium in omnibus certas ac infallibiles medelas esse oportet, non ob id quod faciles sint, sed quod certo inuento consistant. Neque uero à qui busuis uolentibus inueniuntur, sed ab his qui uolunt itemque possunt. possunt autem quibus tum disciplina non eminus sed propè & largiter cõrigit, tum natura non infelix liberaliter accessit. Ad manifestos quidem igitur morbos hoc modo artem diuitem facultate præditam esse oportet, Neque uero ad minus manifestos eam inopem ac dubiam hæere conuenit. Sunt autem morbi minus aperti, quicquid ad os, quicquid ad uentriculum sunt conuersi. Habet autem corpus non unum uentriculum sed plures. Duo enim sunt qui cibum suscipiunt & demittunt, alijque præter hos plures, quos norunt hi quibus hæc res curæ fuit. Quæcumque enim membra carnem in orbem circumsitam habent, quam musculum adpellat, ea omnia uentriculum habent. Omne enim in cõcretum & quod non coaluit, siue pellicula siue carne cõtegatur, cauum est. Impletur autem dum sanum est flatu, dum ægrotat sanie. Habent itaque brachia talæ carnem, habent & femora, habent suras. Quin & in macilētis & excarnibus, partibus eiusmodi caro inest, similiter ut in carnosissimis esse demonstratum est. Nam & qui thorax appellatur, in quo hepar continetur, & capitis circulus, in quo cerebrum cõcluditur: ipsumque adeo dorsum, ad quod pulmo uertitur, horum membrorum nullum est quod non & ipsum uacuum sit, ac multis segmentis plenum ac quasi discriminatum existat, quæ parum abest ut uasa existant, quorum tamen aliqua habent lædunt, aliqua uero etiam profunt. Præter hæc autem & uenæ multæ, & nerui non in carne sublimes, sed ad ipsa ossa producti ligamentum sunt articularum: ipsi etiam articuli in quibus ossium quæ mouentur commissuræ inuoluuntur, & horum nullum est quod non subpulmosum sit, & circa se forulos habeat

beat, quos sanies prodit, quæ deductis ipsis, multa & magno multorū micore egreditur. Ex prædictis itaq; omnibus nullum est quod oculis conspiciendi uideri ac cognoscere cōtingit, quapropter etiam obscura mihi appellata sunt: & ab arte quoq; obscura esse iudicata sunt, non tamen quod obscura permaneat & nos uincant, sed quantum possibile est cognoscantur & superentur: possibile autem est quantum ægrorum naturæ ad considerandum conferunt, & quantum eorū qui perscrutaturi sunt naturæ ad perscrutandū aptæ sunt. Cum multo enim labore, & non modico tēpore præ oculis uidentur & cognoscuntur. Quæcūq; enim oculorum cōspectum effugiunt, ea mētis oculis obtinentur & superantur. Quæcūq; uero ob id quod nō statim cognoscantur ægri mala perpetiuntur, ea non ad medicos curātes ipsos, tanquā ad ipsorum autores referenda sunt, sed ad naturam ipsius ægri, in idemq; ipsius morbi. Medicus enim quum nō possit malum necq; uisu assequi, necq; audiendo ex aliorum narrationib. cognoscere, ratiocinatione ipsum persequitur. Etenim ipsi quoq; ægri qui obscuro morbo laborāt, si conentur medicis de morbis suis narrare, ex opinione magis q̄ scientia narrāt. Nā si sciuisent, in ipsos sanē medicos nō incidissent, quū eiusdē sciētiae sit morborū causas nosse, & morbos ipsos omnib. medicamētis quæ auferere morbū prohibēt, curare posse. Quādo igitur necq; ex ægri narrationib. ad infallibilē certitudinē peruenire possit, aliō certe respicere medicū necesse est. Quare huius tarditatis nō ars ipsa, sed corporū natura causa existit. Hac enim malū sentiēs, mederi magnopere gestit, cōsiderans tamen ne temeritate magis q̄ cōsilio, & ut facilitate magis q̄ uiolentia medeatur. Medicus uero si quidē suffecerit ad cognoscendū, sufficit etiam ad sanādum. Si uero is in quo morbus cognoscitur, iuperetur, ob id sanē quod serius medicum accessit, aut ob morbi celeritatē peribit. Si enim ex æquo procefferit morbus cum medicina, uelocior nō est. Si uero præoccupauerit, uelocior omnino existit. præoccupat autē tum propter corporum angustiam, in qua nō in conspicio inhabitant morbi, tum propter ægrorū negligentiam. Differunt enim & cunctantur, atq; ubi iam à morbis ipsis apprehensi sunt, tum demum curari uolunt ac expetunt. Quare artis potentiam magis ex merito admiremur, si quem ex clandestino morbo ægri restituar, quàm si impossibilibus & desperatis opem ferre moliamur. Nequaquā uero in ulla aliqua iam inuentarum artium tale quiddam inest, Sed quæ ex eis igne opificiū exercent, igne non præsentē, ociosæ sunt. Vbi uero illum contigerunt, operosæ. Quæ item tractabili rerum materia artem suā exercent, ueluti aliæ quidem lignis, aliæ corijs, aliæ sculpendo tum aere, tum ferro, alijsq; similibus rebus earum quàm plurimæ. Opera porro quæ ex hac materia, & cum huius materiæ instrumentis fiunt, tametsi facile retractari ac corrigi possint, tamen non magis uelocitate quàm uelut decer perficiuntur, necq; defunctorie transiliūtur, uerum si quod instrumentum desit, interim quiescūt, quanquā etiam illis cunctatio & tarditas ad opus commodius absoluedum impedimento sit, Attamen opus laudatur & præfertur. Medicina uero aliquibus quidem ex suppuratione thoracis, aliquibus uero iuxta hepar & rhenes, alijs autem per omnes corporis uentriculos ægrotantibus, eorum omnium inspiciendi potētia priuata est: quod ipsum apud omnes in confesso existit, alias tamen facultates coadiutricēs adinuenit, Vocis nimis

rum claritatē & tarditatē, itemq; fluxiones quæ singulis locis per quos exitus eis dantur, destillare cōsueverunt. quarū modo odores, modo colores, deinde etiam pōderatam tenuitatem ac crassitiem obseruat, ex eisq; signa tum eorum quæ ægri iam perpetuūtur, tum quæ perpeti possint, colligit. Quum uero hæc significationē de se præbeant, neq; ipsa natura uoluntaria dimittat, uires amplius ac necessitates medicina ipsa inuenit, quibus natura coacta indemnis tamē cōcedat. Natura autē stimulat & impulsat, artis peritis quæ faciendæ sunt demonstrat. Cogit autem partim coalitū in nobis calorem, pituitā per ciborum ac potuum acrimoniā diffundere, quo intelligat quid sibi uisum sit de illis, quæ ut uideretur ipsa machinata est: partim uero spiritū uelut delatorem, tum uis arduis, tū cursibus accusare ac prodere cogit. Quin & sudores per prædicta ducens ac excludens, humorum calidorum exhalationem perficit. Sunt præterea quæ per uesicam pergressa magis morbum ostendere possunt, q̄ quæ per carnem exhalant, Inuenit igitur & tales potiones itēq; cibos, qui calidiores aliās calefacientibus existentes, illaq; & eliquat, & profluere faciunt, quæ sanè nō profuissent si nō hoc modo tractata fuissent. Alia itaq; ex alijs, & alia per alia prodeunt, quæ corpus pergressa morbum ipsum produnt, ut nihil miri sit ipsis serius fidē haberi, & medendi conatus ac aggressiones tardiores esse, quū sic per peregrinas interpretationes ad medendi sciētiam ac cognitionem medici perueniant ac erudiatur. Quod igitur & rationes in se ipsa plenas & ad ferendū auxilium abundantes habeat medicina, & quod morbis qui corrigi nō possunt merito auxiliare manus negat, aut si forte opem ferre molita est, citra culpam eam exhibet, id ipsum tum iam habitus sermo manifestū facit, tum etiam artis peritorū demonstrationes palam documentū præbent, quas sanè ex operibus iucundius q̄ ex sermonibus ostendunt: utpote qui dicendo nō magnopere exercitata, multitudinē fidē sinceriorē ex his quæ uideat q̄ quæ audiat tacere malint.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VETERI MEDICINA, IANO CORNARIANO Medico Physico interprete.



VICVNQVE de medicina dicere aut scribere aggressi, dicendi scopum sibi ipsis ac fundamentum supposuerūt, calidū aut frigidū, aut humidū aut siccū, aut aliud quodcūq; uoluerint, rem in cōpendium cōtrahentes, principiū causæ, tum morborū, tum mortis, hominibus omnibus idem, unū aut duo proponentes, hi in multis quidem quæ dicūt manifestō errasse deprehēduntur. Iustior autem querela est de arte, qua omnes in maximis utuntur, & bonos artifices maxime colūt. Sūt autem opifices alij uiles, alij longe præstātes, qd̄ sanè si nō esset omnino medicina, neq; in ipsa obseruationes essent, neq; quicq; inuentorū, non utiq; extaret, sed omnes æqualiter eius ignari et inexperti essent, et per fortunā omnes ægrotorū res gubernaretur. Nunc uero res nō sic se habet, sed quemadmodū aliarū omnium artium opifices multū inter se differūt, tū manu, tū mente, sic etiā in medicina. Quapropter nō cetero ego ipsam inani fundamentō indigere, uelut obscura & dubia,

de quibus si quis dicere conetur, necesse est fundamentò mri. Velut si quis de sublimibus in aere rebus, aut de subterraneis dicat, & quomodo habeant sciat, tamen neq; dicenti, neq; audientibus manifestu satis fuerit uerane sint ansecus, Nec enim est ad quod quis se cõferat, cuiq; innitatur ut ueritatem cognoscat: Medicina autẽ iam ab antiquo existit, & principiũ & uia inuenta, per quam inuenta & multa & probe habentia cõperta sunt, per multũ ad eõ tempus, & res qua deinceps inueniẽtur, si quis sufficiens sit, & iam inuentorũ gnarus, ex his ad perquirendum procedat. Quicũq; uero his reiectis ac omnibus reprobatis, alia uia aliãq; forma inquirere conatur, & quid inuenisse gloriatur, falsus est & fallitur. Impossibile enim id est, uerũ ob quas necessitates impossibile fit, ego demonstrare conabor, do cens ac demõstrans quod ars existat. Ex hoc autẽ patẽt fiet, impossibile esse aliquo alio modo inueniri. Videtur autem mihi maxime, de hac arte dicturũ oportere uulgo ac plebeis hominib. nota dicere, Neq; enim de alio quopiã, neq; quare: neq; dicere cõuenit, q̃ de affectiõib. ex quibus illi ipsi aegrotant. Ipsos quidem igitur suas ipsorum affectiões cõdiscere, quomodo fiunt ac desinũt, & quibus occasionibus augetur ac deficit, quam idiotæ sint non est facile, uerũ ab alio inuẽtas ac proditas, proclue. Nihil enim libentius quisq; recordatur quàm quæ sibi ipsi accidisse audit. Si quis autẽ idiotarum sententiã desinuetur, & audientes non afficiet, ille etiam ueritatis cõposit non fiet, & propterea neq; fundamẽto neq; scopo opus habet. Etenim Ars medica neq; inuenta ab initio fuisset, neq; quaesita, Nihil enim ea opus erat aegrotis hominibus, si eadem diætã uterẽtur, & assumerẽt quæ sani edunt ac bibũt, imò etiã alterius diætæ usus eis profuisset, si non alia fuissent his meliora. Nũc autẽ ipsa necessitas homines coegit Medicinã inquirere ac inuenire. Quoniã aegrotis eadem in cibo assumẽtibus quæ sani solent, non fuit utile, uelut neq; nunc utile existit. Quin ut rem altius expendamus, neq; ipsam sanorũ diætã ac alimonã qua nunc utuntur, inuentã fuisse censeo, si suffecisset homini idem eibus ac potus, qui boui ac equo, & omnib. alijs præter hominẽ, ueluti sunt ex terra nascentiã, fructusq; ac herbæ & foenum. Ex his enim nutriuntur, & augetur, & illæsi degunt, non indigentes alia diætã. Quanquã ego sanẽ ab initio etiam hominẽ tali uictu usum esse putem. Quæ uero nũc inuenta sunt edulia, multa arte excogitata & multo tempore producta esse mihi uidentur, quũ multa & grauiã, ex forti ac ferino uictu homines paterentur, qui intemperatus, & magnas uires habens ingerebatur, qualia sanẽ etiam nunc ex ipso paterẽtur, doloribus uehementibus & morbis obnoxij, & breui etiam mortũ. Verisimile est autẽ hæc mala tunc minus perpeffos ipsos esse, propter consuetudinẽ: quanq; etiam tunc uehementer afflicti sint, & consentan eum est plurimos & debiliore natura præditos perijisse, eos uero qui uictum illum superare poterãt longiori tempore durasse ac restitisse. Quemadmodũ etiam nunc ex ualidis eduljã aliã qui facile liberãtur, aliqui cum multis doloribus ac malis. Ob hanc itaq; necessitatẽ etiam illi mihi uidẽtur quaesuisse uictũ naturæ cõuenientem, & inuenisse hunc, quo nũc utimur. Ex tritico igitur macerato, & à cortice purgato, molitiõq; ac cõbrato, & subactõ ac affato, panẽ fecerũt, Ex ordeo uero mazã, aliãq; multa ex hoc excogitãtes, coxerũt, & assarunt, & miscuerunt, fortiaq; & intemperata, debilionibus temperatũ, effingẽtes omnia iuxta hominis naturã ac uis

res, quæ quidem fortiora essent, ab ipsa natura non posse superari, si ingesta essent, existimantes: ab his ipsis quoque dolores & morbos ac mortes oriri iudicantes: contra ab his quæ natura domare possit, alimentum & augmentum & sanitatem. Porro inuento huic quod nam iustus aut magis conueniens nomen quis imposuerit quam medicina: quandoquidem ad hominis sanitatem alimentumque ac salutem inuenitur esse, in permutationem illius uictus ex quo dolores & morbi fiunt. Si uero ars ipsa esse non putatur, nihil absurdi est. Nam cuius nemo ignarus est, sed scientes omnes, ob usum & necessitatem, eius non conuenit aliquem artificem appellari. Atqui inuentum ipsum & magnam & multam artis ac considerationis existit, Quinetiam in hunc usque diem exercitiorum & reparandarum uirium curam gerentes, semper aliquid amplius adinueniunt, iuxta eandem uiam inueffigantes quod quis edens ac bibens maxime superet, ac seipso fortior euadat. Consideremus itaque & cõfessam ab omnibus medicinam, eam uidelicet quæ propter ægros inuenta est, an & nomen & artifices habeat, & ipsa dominari ipsis uelit, & unde tandem inuentum sumpsit. Mihi equidem, uelut in principio dixi, nemo ne quaesiuisset quidem Medicinam uideretur, si idem uictus & ægrotis & sanis cõuenisset. Itaque usque in hunc diem hi qui medicina non utuntur Barbari ac Græcis cõfines, eodem modo quo sani uicunt ad uoluptatem, & à nulla re quæ concupiscunt abstinere, neque quicquam deuitant. Cæterum qui Medicinam quaesiuerunt ac inuenerunt, eadem cum illis de quibus superiori sermone dictum est, sententiam habuerunt, & primum quidem ex his ipsis cibis copiam detraxerunt, & pro multis paucos statuerunt. Quum uero ipsis aliquando hoc ad aliquos ægros sufficeret, palamque fieret quod prodesset, non tamen omnibus, sed essent quidam ita habentes, ut neque modicos cibos superare possent, imbecilliore sanè quopiam tales indigere illis uisi sunt, forbitiõesque inueniunt, pauca ex fortibus multa ac qua permiscentes, & robur ipsum temperatura ac coctura detrahentes. Quod si qui neque forbitiões superare possent, his detraxerunt etiam ipsas, & ad portiones perueniunt, obseruantque ut & hæc tum usu, tum copia moderate haberent, & neque plures quam oportet, neque meraciores & intemperatiores, neque deficiuosiores offerentes. Probe autem nosse oportet quibus forbitiões in morbis non conducunt, Nam statim ubi hoc fecerint exacerbantur ipsis febres ac dolores, & manifestum fit, quod assumptum morbo quidem alimentum ac incrementum præbet, corpori uero tabes & infirmitas existit. Quicunque uero homines in hac affectione existentes siccum cibum assumunt, aut mazam, aut panem, etiam si ualde modicum, de cuplo magis & manifestius læduntur, quam si forbitiões uisi essent, ob nullam aliam causam quam fortitudinè edulij ad affectionem, in quo forbere conducit, edere autem non. Si enim plura comederit, plus utique lædatur: si uero pauca, dolebit tamen omnino. Omnes itaque dolores causæ ad idem reducuntur, nisi mirum fortissima edulia maxime & manifestissime hominem lædere, siue sanus sit, siue ægrotus. Quid igitur aliud cogitasse uideri queat hic appellatus Medicus, & confessus artifex, qui ægrotum diarram ac uictum adinuenit, quam ille qui ab initio omnibus hominibus uictum quo nunc utimur, ex agresti illo ac ferino reperit ac subornauit: Mihi equidem uidetur idem modus, & unum quoddam ac simile esse inuentum. Hic enim ea quæ natura humana sana superare non potuit incidentia & ingesta, propter feritatem intemperantiæque: ille uero qualicunque tan-

dem

dem unusquisque affectione teneretur, ut superare non posset, eadem detrudere quæ fuit ac inferit. Quid hoc ab illo differt, præterquam quod multiplicior & uarietior ac maioris negocij est hæc species. Verum principium fuit illa quæ prius est producta. Si uero quis consideret quæ sit ægrotorū diætā, cōparatione ad sanorū diætā factā, is inueniet hæc ægris nocentiorē quā eam quæ ferarum est & aliorū animalū sanis. Etenim uir laborans morbo neque difficili & intolerabili, neque rursus leui & despiciabili, si panem aut carnē, aut aliud quid ex his quæ sanī edentes iuuatur, comedere uolet, nō multum, sed multo minus quæ sanus poterat, contingat autē ut nec sit qui eū delinquere admoneat. Alius contra sanus naturam habens nō omnino debilem, neque rursus fortem, si comederit quid eorum quæ bos aut equus comedens iuuatur, & edat sanē eruiū aut ordeum, aut aliud quid huiuscemodi, non multum, sed multo minus quæ potest. Sanius utique qui hoc fecerit, minus & dolebit & periclitabitur quæ ægrotus ille, qui panē aut mazam intemptiue ingessit. Hæc itaque omnia signa sunt, quod ipsa ars medica uia ac methodo quæ sita inueniri possit. Si quidem igitur simplicitate, uelut aliqui putant, quæ fortiora sunt nocent, quæ debiliora prodesse & nutrirēt, tum ægrum, tum sanum, facilis sanæ res erat, Multum enim de securo detrudere oportebat ut ad debilissimū deduceretur. Nunc autē non minus delictum, nec minus lædit hominē, si pauciora & defectuosiora quæ satis est assumatur. Fames enim magnā potentiam in naturam hominis habet & sanādi & debilitandi & occidendi. Multa uero etiam alia mala, diuersa quidem ab his quæ ex repletione sunt, nō minus autem grauiā, uacuationis sunt, quapropter multo uarietior est, & maiorē diligentiam requirit. Oportet enim modum aliquem coniectare. Modum autem neque pōdus, neque numerum aliquem, ad quem res feras cognoscas: certitudinem enim exactam nō reperies aliam quā corporis sensum. Quapropter operosum est ita exacte cōdoscere, ut parum in alterutram partem delinquas: quanquā ego etiam eum medicum uehementer laudarim, qui parum delinquit. Certitudinē autem exactam raro uidere contingit. Quare plerique Medici eadem quæ mali gubernatores in se admittere mihi uidentur. Etenim illi quum in tranquillitate gubernantes delinquit, non sunt manifesti: quum uero deprehenderit ipsos uentus magnus & tempestas, palam iam cōspicui sunt omnibus hominibus, quod ignorantia & culpa erroris sui nauem perdidērunt. Sic sanē etiam mali & plurimi medici, quū curant homines nihil graue patientes, in quos si quis etiā maxime delinquit, nihil graue faciat. Sunt autem multi tales morbi, & multo sæpius quæ graues hominibus accidunt. In talibus sanē delinquentes, non sunt manifesti idiotis hominibus. Vbi uero obtrahitur magnus & fortis & periculofus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in cōspicuo sunt. Neque enim longe absunt singulorū pœnæ ac cruces, sed breui adfunt. Quod aut non minores afflictiones ab intemptiua uacuatione quā a repletione hominibus cōtingant, probe discemus si in sanis rem experierimus. Sunt itaque aliqui ipsorū quibus semel in die cibum capere cōducit, & hoc propter utilitatem sic obseruat. Alij etiam prandent, propter eandē necessitatem, sic enim ipsis cōducit: Sed & quidam nō propter utilitatem, sed aut ob uoluptatem, aut ob alium aliquē casum alterutrum faciunt. Plurimorū enim hominū nihil interest utrum tandem faciant, siue semel tantū edant, siue etiam pran-

deant, hac cōsuetudine uti. Sunt autē quidā qui nō possint extra utilitatē faciētes facile degere, sed cōtingit utriusq; ipsorū, per diē unū atq; eū nō ociose permutantibus, immēsa afflictio. Alteri enim si prāsi fuerint, idēq; eis nō cōducatur, statim graues & corpore segnes fiūt, itemq; mente pigri, hiatuq; ac oscitatione & dormitatioē & siti pleni, Si uero etiā insuper cenauerint, & flatus, et tormina, et aluus effringitur, et multis magni morbi principii hoc fuit, si eosdē cibos quos semel insumere cōsueuerunt, bis assumant, & nihil his amplius. Alteri uero si prandere cōsueuerunt, idēq; ipsis conducatur, & non prāsi fuerint, mox ubi tempus prāterierit, statim impotentia uehēmēs, tremor, animi deliquiū, postea oculi pallidi, urina crassa & calida, os amarū, & uiscera pendere ipsis uidentur, uertigo, iracundia, tristitia, hac autē omnia ubi cenare tentauerint. deinde autem pransuri cōsumere non possunt quā prius cenarūt. atq; hac ipsa cum tormine ac strepitu descēdentia aluum cōcludunt, ipsiq; āgre dormiūt, infomniāq; conturbata ac tumultuosa habent, plerisq; uero etiam horum hoc magni morbi principii fuit. Cōsiderare porrō oportet ob quas causas hac ipsis acciderunt. Et sanē puto his qui semel cibū sumere cōsueuerunt, quōd nō expectauerūt iustū tempus, donec ipsorū uenter pridie ingestos cibos perfecte cōsumpsisset & exuperasset, euacuatusq; esset ac quietisset, sed in seruētē adhuc & fermentatū nouos ingesserunt. Eiusmodi autem uentres multo tardius concoquunt, & maiori opus habēt cessatione ac quiete. His uero qui prandere assueti fuerunt, quōd nō ubi citissime alimēto corpus indigebat, & iam priora consumpta erant, nec habebat aliquā amplius fruitionē, statim ipsi nouum alimentum suppeditatū est. deficit autem & cōsumitur prae fame. Nam omnia quae tales homines perpeti dixi, fami impuro. Dico autē etiam alios omnes homines, qui duos aut tres dies in ediam pertulerint, eadē passuros esse, quae de imprāsi dixi. Ceterum tales naturas quae cito & fortiter eiusmodi delictis offenduntur, imbecilliores alijs esse censo, proximus est autē imbecillis languenti: uerū imbecillior est languens, & plus laborare cōtingit ipsum, ubi iustū tempus nō est assequutus. Quum itaq; eiusmodi exacta certitudo circa artem existat, difficile est temper quod rectissimū est assequi. Multae autem species in Medicina ad tantam certitudinem perueniunt, de quibus dicetur. Non censo itaq; propter hoc artem uelut nō existentem, neq; probe inuestigatam, ueterem oportere rejici, quōd non habeat circa omnia certitudinem exactam. Verum multo magis propterea quōd propinqua est recto, simulq; ratione possit ad ipsum peruenire, admirari oportere censo ea quae ex multa ignorātia sunt eruta et inuenta, quōd probe et recte adinuenta sunt, & non à fortuna aut casu. Porrō ad eos qui nouo modo artem ex scopis ac fundamentis suppositis quaerunt, sermōnem reducere uolo. Si enim calidū est aut frigidum, aut siccum, aut humidum, quod hominē laedit, & oportet recte medentem auxiliari, calido quidem in frigidū permutato, frigido uero in calidū, siccō in humidum, humido in siccum: cōtingat mihi homo non fortis naturae, sed ex debilionibus, hic autē triticum edat quod ex area sustulit crudum & non elaboratum, & carnes crudas, & bibat aquam. Hoc uictu utens satis scio quōd multa & graua perpetietur, Nam & doloribus uexabitur, & corpus debile euadet, & uenter corrūpetur, & multo tempore uiuere non poterit. Quod igitur auxiliū preparare oportet sic habenti

in uentris

et
de
his
m
et

et

haberi? calidū an frigidū, uel siccū, uel humidū? simplex enim est quodcūq;
 ex istis. Si enim id quod ipsum legit aliquid ex his est, cōtrario solūere oportet
 ac liberare, quemadmodū ipsorum sermo testatur. Atqui certissimū & manife-
 stissimū medicamentū est, uictū quo utebatur auferre, & pro tritico panē dare,
 pro crudis uero carnibus coctas, in supercū uinū propinare. His permutatis im-
 possibile est nō fieri sanum, nisi penitus fuerit tēpore ac uictū corruptus. Quid
 itaq; dicemus? Num quod ipsi à frigidō afflicto calida hæc oblata auxiliū uale-
 runt, aut contrā? Equidē opinor me multā hæsitatiōē interrogato præbiturū
 esse. Nam qui panē ex tritico parauit, calidū, aut frigidū, aut siccū, aut humidū
 abstulit; panis enim & in ignem & in aquā datur, & multis alijs elaboratus est,
 quorū singula propriam uim & naturā habent, & aliqua quidē à natura in ipso
 existentia abijcit, alijs autē temperatur ac permiscetur. Sed & hoc scio, q̄ in corpore
 pus hominis refert, panis purus, aut cui nihil fursurū decelsit, & ex tritico nō
 decorticato, aut decorticato, & multa aqua subactus, aut cōtrā, & superaffatus
 aut crudior, aliq; præterea infinita. Similiter etiā de maza, et singulorū adeo
 uires magnæ, alteraq; alteri nihil simile habet. Quicūq; autē hæc nō considerās
 nō nouit, haud scio quo modo ille affectiones in homine cognoscere possit; ab
 unoquoq; enim horū afficiunt & alteratur homo, uel hoc, uel alio modo, & ex
 his omnis uita & sano, & ex morbo cōualescētī, & ægroto. Nihil igitur utilius
 neq; magis necessariū q̄ hæc cognouisse: quod & probe & conuenienti ratio-
 cinatione in uelut gātes, iuxta hominis naturā hæc primi inuentores inuenerūt,
 iudicauerūtq; arte dignā quæ deo adscriberetur, quemadmodū etiā est rece-
 ptū. Nō enim siccū neq; humidū, neq; calidū, neq; frigidū, neq; aliud quicq; ex
 his putauerūt hominē lædere, neq; aliquo horū homini opus esse opinati sunt,
 sed quod in unoquoq; forte & humana natura potētius est, quodq; nō possit
 superare, hoc ipsum lædere duxerūt, & hoc auferre quæsiuerūt. fortissimū autē
 est inter dulcia, dulcissimū, inter amara, amarissimū, inter acida, acidissimū. &
 in omnibus adeo rebus uigor ipse ac summū. Hæc enim & in homine inesse ui-
 derūt, & hominē lædere. Inest enim in homine & amarū, & salum, & dulce, &
 acidū, et acerbū, & fluidū, & alia infinita, omnigenas facultates habētia copiāq;
 ac robur. Atq; hæc quidē iuxta ac inter se tēperata, neq; cōspicua sunt, neq; hō-
 minē lædūt. Vbi uero qd horū secretū fuerit, atq; ipsum in seipso fuerit, tūc &
 cōspiciū est, & hominē lædit. Quin & ex cibis quicūq; nobis incōmodi sunt,
 & ingesti hominē lædunt, horū unusquisq; aut amarus est & meracus ac intē-
 peratus, aut salus, aut acidus, aut alius quis intēperatus & fortis: & propterea
 turbamur ab ipsis, quemadmodū etiā ab his quæ ex corpore excernūtur. Om-
 nia autē quæ edit aut bibit homo, talia edulia palām est minime hoc intēpera-
 to, & disidente ac excedente succo participare, uelut sunt panis & maza & his
 similia, quibus aduersus est homo plurimis & semper uti: exceptis his quæ ad
 uoluptatem ac delicias cōdiuntur ac præparātur: & ab his plurimis in hominē
 ingestus turbatio ac secretio corporis facultatū minime contingit. Verū robur
 & augmentū, ac alimētum præferim, per nihil aliud contingit q̄ quod probe
 temperatū est, & nihil habet intemperatū, neq; forte, sed totum unum factū est
 & simplex & non forte. Et ualde sanē dubito ego, quonā modo hi qui talem ser-
 monem proferunt, & artem ex hac uia ad scopum abducūt, curaturū sint homi-

nes, quemadmodū proponunt. Non enim est ipſis, uelut ego opinor, inuērum quid, ipſum in ſeipſo calidū, aut frigidum, aut ſiccum, aut humidū, quod nulla alia ſpecie cōmunicaret. Verum arbitror eoſdem potus ac cibos ipſis eſſe, quibus omnes utimur. Apponūt autem alij quidem, quōd ſit calidus, alij frigidus, alij quōd ſiccus, alij humidus. Quoniā illud ſanē dubium eſt, imperare aegroto calidum quid aſſumere: ſtatim enim interrogabit quid ſit illud, ut nugae producere neceſſe ſit, aut ad aliquid eorum quae ſunt cōfugere. Si autem eſt calidum quoddam acerbum exiſtens, aliud uero calidū fluidum, aliud calidum tenue, ſunt enim & alia calida etiam alias uires ſubcōtrarias ſibi ipſis habentia, quod igitur ipſorum aſſumere oportebit: calidum & acerbū, an calidum & fluidum, aut ſimul frigidū & acerbū: Nam & hoc eſt, itemq; frigidū & fluidum. Etenim quod ego ſcio, totum cōtrarium ab utroq; ipſorū euenit, idq; nō ſolum in homine, ſed etiam in corio ac ligno, & alijs multis rebus quae magis ſtupidū ſenſum habent quā homo. Non enim calidū eſt quod magnam uim habet, ſed ipſum acerbum & fluidū, & alia quae a me relata ſunt, tum in homine, tum extra hominem, ſiue edantur, ſiue bibantur, ſiue forinſecus illinātur, aut quomodo docunq; formata adhibeantur. Frigiditatē autem & caliditatem ego omnium facultatum minime potētes eſſe in corpore exiſtimo, ob has ſanē cauſas. Quo equidem tempore ipſa inter ſe permixta ſimul frigidū ac calidum fuerint, non laedunt. Temperamentū enim & moderatio cōtingit frigidō a calido, & uicifim calido a frigidō. Vbi uero ſeorſim utrunq; ſecretum fuerit, tunc affligit. In hoc itaq; tempore quum frigidum intrus generatur, & cito hominē affligit, primum propter hoc ipſum aedeſt calidū inde adeo ex homine ipſo, nullo alio auxilio, neq; praeſparatione opus habens. atq; hoc & in ſanis hominibus & in aegrotis operatur. Itaq; ſi quis ſanus hyeme corpus perfrigerare uelit, aut frigidae lotionē, aut alio quopiam modo, quanto id amplius fecerit, ſi modo nō omnino corpus congeletur, ubi ueſtimēta acceperit, & ſub tegmen uenerit, magis & amplius corpore caleſcit. Rurſus ſi quis fortiter caſſieri uelit, aut calido lauacro, aut multo igne, inde uero eandem ueſtem habens in eodem loco conuerſari, in quo perfrigeratus, multo apparebit frigidior, & lōge horridior, quā alius qui prae aſtu uentilationem admittit, & ſibi ipſi frigus praeſparauit, atq; ſic ex hoc modo recreatus eſt. Nam qui hoc facit, decuplo maiorem aſtum ac ardorem percipit, quā is qui nihil tale facit. Verū ſunt adhuc teſtimonia multo maiora. Quicunq; per niuem aut aliud frigus iter facientes, excellenter frigeſcunt aut pedibus aut manibus aut capite, ubi ſe cōtinuerint in noctem, quum cooperiti fuerint & in tepore extiterint, ab aſtu & pruritu uexantur, quibusdam etiam bullae uelut ambuſtis ab igne exurgūt, neq; prius hoc patitur quā cal fiat: adeo prompte utrunq; ipſorū ad alterum accedit, poſſem & alia innumera recenſere. Carterū circa aegrotos, nōne quibus rigor contingit, his acutiſſima febris relucet: ſed non adeo fortiter, uerū pauco tempore quieſcēs, & aliās ſere innoxia, & quo tempore affuerit, percalida, & per tonū corpus penetrans, deſinens maxime in pedes, ubi ſanē rigor & frigus ualidiſſimū diutiſſime durauit. Rurſus quum ſudor prodierit & febris deceſſerit, multo magis frigeſcit aeger, quā ſi ne apprehendiſſet quidē ab initio. Cui igitur breui adeo contrarium accedit, cuiq; uis adimitur ſua ſponte, quid nam ab hoc magnū aut graue fiat

fiat: aut quid opus est multo ad hoc auxilio: Verum dixerit aliquis, Quis ardēti febre febricitant, itemq; peripneumonij, & alijs fortibus morbis, nō cito ex calore liberantur, neq; adeſt hic frigidū aduerſus calidum. Atqui ego hoc maximum ſignū eſſe puto, quōd nō propter calidum ſimpliciter homines febricitant, neq; hoc ſit ſimpliciter afflictionis cauſſa: ſed eſt & amarū ac calidū idem, & calidum ac acidum, & ſalfum ac calidū, & alia infinita, & rurfus frigidū cum alijs facultatibus cōiunctum. hæc itaq; ſunt quæ lædunt, ſimul adeſt autem & calidū robore participans, nimirū ducens & exacerbans & augens ſimul cum illis; verū nullam potētiam, maiorē quàm conuenit uidelicet, habens. Atq; hæc quidem ſic ſe habēt. Signa porro primū quidem maniſteſſima producemus, quorum omnes iam ſæpe experiētiam ſumpſimus. Itaq; quibuſcūq; noſtrum grauedo innacitur, & fluxus per nares mouetur, hic ut plurimum acrior eſt eo qui prius erat, & quotidie ex narib. prodibat, & tumefcere facit naſum, & exurit calentē & extreme ignitum. ſi uero manum admoueas, & diutius perſeuerā uerit, etiā exulceratur locus minime carnoſus & durus exiſtens. Sedatur autem aliquo modo ardor in naribus, nō quum fluxus prodit, & inſtāmatio conſiſt: ſed poſtq; fluxus craſſior & minus acris, cōcoctusq; & magis permixtus priore fuerit, tunc ſanē iam etiā ardor ceſſat. Rurfus aut alijs ex frigidityte ipſa ſola maniſte grauedo fit, nullo alio accedēte. Omnibus autē liberatio hæc eſt, ut ex frigidityte quidem affectū percalſiant, ex ardore uero perfrigerentur, atq; hæc breui accedunt, & cōcoctiōne nulla opus habent. Reliquæ autē omnes fluxiones quas propter humorū acrimonias & intēperantias ego fieri ſentio, reſtituuntur & curantur, ubi temperatæ fuerint & concoctæ. Rurfus quæcūq; fluxiones ad oculos uertūtur, ut fortes & omnigenas acrimonias habentes, exulcerant quidem palpebras, erodunt autem aliquorū genas, & ſub oculis partes, ad quaſcūq; tandem inſluxerint, rumpūt etiā & peredunt eam quæ oculum ambit tunicam. dolores autem & ardor, & inſtāmatio extrema adſunt aliquandiu, donec fluxiones fuerint cōcoctæ, & craſſiores redditæ, & lemæ ab ipſis exiterint. Fit autē concoctiō, ex permixtione, tēperaturaq; mutua, & quaſi coctura. Quinetiā fluxiones in fauces delabētes, ex quibus raucedines fiunt, angina, eryſipelata, peripneumonix: Omnes hæc primum quidem ſalæ et humidæ acresq; deſcendunt, & in talibus morbi firmantur. Vbi uero craſſiores & maturiores factæ fuerint, & ab omni acrimonia liberatæ, tūc iam & febres, & alia hominem lædentia ſoluūtur. Oportet autem uicq; cauſſas uniuſcuuſq; ea purare, quæ quum adſunt, talem modū fieri neceſſe eſt, quū permutantur in aliud temperamentū, ceſſare. Quando igitur ab ipſa caliditate ſincera, aut frigidityte fluxiones cōtingerint, & nulla alia facultate participauerint, ſic ſanē ſedabūtur, ubi ex frigido in calidum permutatæ fuerint, & ex calido in frigidum. Permutantur autem eo quē dixi modo. Amplius porro etiā alia quæcunq; mala homo patitur, omnia à facultatum potentijſ proficiſcuntur. Itaq; quū amaritudo quædam diſſuſa fuerit, quā bilem ſlauā appellare ſolemus, quales ſtatim anxietates & aſtus & impotētix occupā: Verū ubi liberati fuerimus ab illa & purgati, aut ſponte, aut per medicamētum, ſi modo tempeſtiuè quid ipſorum fiat, maniſte & à doloribus & à calore liberamur. Quanto autem tempore eadem eleuata fuerit, & cruda & meraca ac intemperata, nulla arte neq; dolores, neq;

*Phlegma ex caliditate
fluxione peripneumonix
hæc autem omnia
quæcunq; fluxiones
ad oculos uertūtur
inſtāmatio
concoctura*

calidus quid

febres sedare possis. Et quos quidem acuta acrisq; ac aeruginosa bilis affligit, quales mox rabies, & morsus uiscerum ac pectoris, & desperatio: Non sedantur autem hæc priusquam eadem expurgetur & prosternatur, & alijs permisceatur. Concoqui autem & permutari, attenuariq; ac crassescere in humorum speciem, per multas & omnigenas species contingit. Quapropter & iudicationes, & numeri temporum, in talibus multum possunt. Hæc uero omnia minime contingit calidum aut frigidum perpeti. neq; enim hoc putrescere neque crassescere poterit. Quid autem ipsum esse diceremus? & temperamentum ipsorum est, ueritamen inter ipsa mutuo uim habens, quoniam nulli alij permixtum calidum, desinit esse calidum, quam frigidum: sic rursus non permixtum alio frigidum quam calido. Reliqua omnia in homine, quanto pluribus miscentur, tanto mitiora ac meliora sunt. At uero homo omnium optime dispositus est, ubi concoquit & in quiete est, nullam peculiarem uim præ se ferens. De his igitur uideor mihi abunde demonstrationem fecisse. Porro Medici quidam itemq; Sophistæ dicunt, quod impossibile est medicinam cognoscere, eum qui non nouit quid sit homo, & quomodo primum factus & compactus sit. Ego uero ea quæ alicui Sophistæ aut Medico, de natura dicta sunt aut scripta, minus censeo medicæ arti conuenire quam pictoriæ. Iudico autem de natura aliquid manifestum ac euidens cognoscere, ex nulla parte aliunde contingere quam ex Medicina, atq; hoc tunc condiscere possibile est, ubi quis ipsam medicinam totam recte comprehenderit. Verum quatenus illi prodiderunt, multi mihi cognouisse uidentur. cognouisse autem dico, narrationem scilicet hanc, Quid est homo, & ob quas causas nascitur, & reliqua diligenter. Atqui mihi necessarium esse uideatur, ut omnis Medicus de natura sciat, & omni studio annitatur ut cognoscat, si modo aliquid eorum quæ fieri debent recte præstare uelit, Quid est homo ad ea quæ comeduntur ac bibuntur comparatus, & quid cuiq; ab unoquoq; continget ac accidet, & non simpliciter sic existimare, quod malum edulium est caseus. Dolorem enim affert repleto ex ipso. Sed quem dolorem, & propter quid, & cui parti intra hominem existenti incommodum existit. Nam & alia multa edulia ac pocula natura mala sunt, & afficiunt hominem non eodem modo. Proferatur autem mihi uerbi causa aliquid, uelut Vinum meracum multum potum hominem aliquo modo debilem reddit, & omnes qui uiderint hoc fatentur & cognoscunt, quod hæc est uis uini, & quod ipsum est causa, & in quas in homine partes maxime possit nouimus. Talem itaq; ueritatē etiam de alijs ostendere uolo. Etenim caseus: quandoquidem hunc in exemplum adsumpsi: non omnes homines lædit, sed sunt qui ex ipso repleti, ne tantillum quidem offenduntur, immo gracilibus mirabiliter etiam conferre proditur. Sunt autem qui difficulter summouentes ipsum ab eo liberantur. Horum uero naturæ differunt, differuntq; etiam iuxta hoc quod est in corpore caseo contrarium. Nam à caseo excitatur & commouetur, in his quibus eiusmodi humor multus in corpore existit, & quo magis hic potens est, eo magis uerisimile est ipsos male affigi. Si uero toti humanæ naturæ malus esset, omnes utiq; læderet. Hæc autem si quis nouisset, non incurreret ea neq; sanè pareretur. In refectionibus conualescentium ex morbis, insuperq; in longis ægritudinibus, multæ cōturbationes & præuaticationes fiunt, par-

tim sua sponte, partim à quibuslibet temere admisis. **Noti autē medicos multos** uelut idiotas, qui ubi illi die aliqua noui quippiā fecissent, uelut si lauisent, aut deambulassent, aut quid alienum comedissent, atq; hæc omnia melius esset adhibuisse quàm non, nihilominus tamen causam alicui ex his contribuebant, ueram quidem causam ignorantes, & fortassis id quod cōmodissimum erat damnantes. Quod ipsum certe facere nō oportet, sed scire quid balneum in tempestiue adhibitiū operetur, quid item fatigatio & lassitudo. Nunquam enim eadem afflictio ab his prouenit, neq; etiam ex repletione, neq; ex cibo tali uel tali. Quisquis igitur hæc nō cognoscet, quomodo singula se habeāt ad hominem comparata, is neq; cognoscere quæ ab ipsis fiunt potest, neq; recte uti. Caterum & hæc cognoscere oportere mihi uidetur, nimirum quæ affectiones homini ex facultatibus ac potentijs, quæ item ex figuris adueniunt. Quod autem dico tale est, Nempe facultatem quidem esse, humorum summas uires ac robur nosse. Figuras autem dico quæ in ipso homine insunt, Aliæ enim cauae sunt, & ex amplitudine in arcum coactæ, aliæ expansæ, aliæ solidæ & rotundæ, aliæ latæ & pensiles, aliæ extentæ, aliæ longæ, aliæ densæ, aliæ raræ & hiantes, aliæ spongiformes ac molles. Quæ igitur ex his trahere ad sese allicereq; humiditatē ex reliquo corpore maxime possunt. Num cauae & expansæ, an solidæ & rotundæ, aut cauae & in arcum ex amplitudine coactæ. Equidem puto tales esse, quæ ex cauitate & amplitudine in arcum sunt coactæ, Id quod ex manifestis forinsecus condiscere oportet, partim quidem quod ore hians nihil sanè humoris attraxeris, ubi uero labra foras produxeris, contra xerisque ac cōpresseris, iniusperçq; fistulam admoueris, facile sanè attraxeris quicquid uoueris. partim uero quod cucurbitæ quæ corpori adponi solent, ex amplitudine in angustiam arcuatae ad hoc factæ sunt, ad trahendum uidelicet & alliciendum ex carne. Sunt autem & alia multa eiusmodi. Verum intra hominem natura & figura talia, sunt uesica, & caput, & uterus in mulieribus: atq; hæc manifeste maxime trahūt, & semper plena sunt attractæ humiditatis. At uero cauae & expansæ figuræ, influentem quidem humorem maxime omnium susceperint, non autem similiter attraxerint. Solidæ autem & rotundæ, neq; attraxerint, neque susceperint: dilabitur enim & non habet sedem, in qua maneat. Spōgiformes uero & molles, uelut lien, pulmo, & mammae, ubi ad motæ maxime fuerint & adhæserint, ebibunt, duræque fiunt ac auerscent humore accedente, maxime pulmo. Non enim in uentriculo inest, in quo humorem extrinsecus contineat ipse uentriculus in quo est humor, ut quotidie exhauriatur: sed quū biberit & susceperit ipse in seipsum humorem, & uacua & rara ac parua penitus explentur, & pro raro ac molli, durus ac densus euadit, & neque concoquit, neq; dimittit. Atq; hæc patitur propter figuræ naturam. Quæcūq; autem statum & reuolutiones operantur in corpore, ea in causis ac amplis, ueluti uentre ac pectore, strepitum ac sonitum facere solent. Etenim quod non sic repleant ut sentent, sed habent transmutationes & motus, necesse est ut ab ipsis & strepitus & manifestæ commotiones fiant. Quæcūq; uero carnosa sunt & mollia, in talibus torpores & excessentia, uelut in truci datis fiunt. Caterum quum inciderit status in latum ac renitens, & aliquid ipsi resisterit, idq; natura fuerit neq; forte, ut aduersus uolentiam durare possit,

*Certe uires sunt
hæc, ut ex ratione
mea dicitur.*

& nihil mali pati: neq̄ molle & rarū, ut excipere ac cedere queat: uerū tenerum & floridum & sanguineū ac densum, uelut hepar, quod propter densitatē quādam ac latitudinem resistit ac nō cedit, flatus uero subiens augetur ac fortior euadit, & aduersum reluctans maxime imperū facit. propter teneritudinem autem & sanguinitatē, absq̄ doloribus esse non potest, & propter has causas, dolores acutissimi ac frequentissimi circa eum locum contingunt, suppurationesq̄ ac tubercula plurima. Fuit etiam circa septū trāuersum fortiter, sed multo minus. Distentio enim septi trāuersi lata est & renitēs, natura autem neruosi & robustior, quapropter minus dolore affligitur. fiunt tamen & dolores, & tubercula circa ipsum. Multa uero etiā alia & extra & intra corpus figurarum species sunt, quæ magnopere inter se differūt, quod ad affectiones pertinet, tum ægroto, tum sano. uelut capita parua aut magna, colla tenuia aut crassa, longa aut breuia, uentres longi aut rotundi, pectoris & costarum latitudines aut angustia, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet quatenus differant, quo causas singulorum cognitas probè obserues. De potentijis autem humorum perspectū habere oportet, quid singuli ipsorū in homine facere possint, quemadmodū etiam prius dictum est, quomodo cognationes inter se habeāt. Quod dico tale est, An uidelicet dulcis humor in aliam speciem mutetur, non à contemptamēto, sed ipse descendens & immutatus ab eo, qualis primū fuerat, amarus, aut salus, aut acerbus, aut acidus. Sit sanè acidus. Ergo acidus humor reliquos præcellens, maxime incommodus fuerit: si utiq̄ dulcis, omnium commodissimus existit. Id quod si quis forissecus quaerens cōsequi possit, is semper quod melius est ex omnibus eligere queat. Optimum autem est, quod longissimè ab incommodo abest.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE MEDICO, IANO CORNARIO MEDICO
Phyfico interprete.



Hic liber Medici gubernatio est, & præceptū quomodo officinam medicam instruere oportet. Medici equidē gubernationem esse putamus, ut uideat quo bono colore, & bona ac carnosā corporis habitudine præditus sit, iuxta existētem in ipso naturā. Vulgus enim existimat eos qui non sic bene dispositū corpus habent, neq̄ alijs bene prospicere posse. Deinde ut opinionē caperet apud ipsum uulgus uestitu decoro, & unguētis odoratis, non suspectū odorem ad omnia habētib. Inde enim ægrotos iucunde affici cōtingit. Postea animaduertere ipsum oportet ut animū habeat modestum, nō solum quod ad taciturnitatē atinet, sed etiam circa reliquam uitam probe cōpositum. Maxime enim ad opinionē ac autoritatē cōparandam cōducit, bonis ac honestis morib. præditū esse. Nam quū talis fuerit, omnib. uenerandus ac humanus iudicabitur. Prōptitudo enim temeraria, & facilitas cōtemnentur, etiā si ualde cōmoda existant. Scopū autē præfigere oportet potestātē facultatum suarū. Nam eadem ab iisdem nō abūdantib. boni cōsultur. Figurā faciei habeat meditatūdam ac subtristē, nō tamē amarulentē.

Contus

cōtumax enim esse uidebitur & homines odio habens. Qui uero in risum exolutus est, ac nimium hilaris, onerosus iudicatur. Hoc itaq; uitandū est uel maxime. Iustum autē ad omnem cōuersionem esse conuenit. Iustitia enim multum auxiliatur. Non exigua autem cōmercia agris cum medico sunt. Nam se ipsos medicis subditos faciunt, & omni hora uxoribus, uirginibus, & opibus maximi precij, illi occurrunt. continenter igitur ad omnia hæc se habere oportet. Animo itaq; ac corpore sic dispositū esse cōuenit. Porro præcepta ad artem medicam, per quæ artificiosus esse uidebitur, ab initio considerabimus ex quo primum homo discere incipit. Quæ igitur in officina medica curantur, ferē ad discentes pertinent. Primū quidem locum domus habere oportet, qui sanē talis sit, ut neq; uentus ad ipsum accedens molestus sit, neq; sol neq; splendor infestet. Lux enim splendida medentibus quidē non est molesta, non similiter autem agrotantibus. Itaq; talem splendore penitus fugere oportet, per quem oculos agrotare cōtingit. Tale igitur præceptū de luce obseruetur. Deinde ut nequaquam faciem aduersam splendori habeat. Infestat enim uisum debilem. Omnis autem occasio sufficiens est ad debiles oculos cōturbandos. Luce itaq; hoc modo utendū est. Sellæ autē æquales altitudine sint quantū eius fieri potest, ut in ipsis ægri collocentur. Aeramēto exceptis instrumētis, nullo utatur. Ornatus enim onerosus mihi esse uidetur, talibus uasis uti. Aqua exhibenda est agris portabilis & pura. Exterforijs utendū est puris ac mollibus, ad oculos quidem, linteis, ad uulnera uero, spōgijis. hæc enim per se probe auxiliari uidentur. Omnia autē rite fabricata ad usum esse oportet, magnitudine, grauitate, ac tenuitate. Quæ uero offeruntur omnia cōsiderare oportet ut conferant, maxime si agrotæ parti adhibebuntur. Talia autē sunt, ligamenta & medicamenta, & lintea circa uulnus, & cataplasmata. hæc enim longissimo tēpore circa agrotantes locos sunt. At uero ablatio horū, refrigeratioq; ac mūdificatio & aquarum affusio, pauco tempore absoluūtur. Diligenter autem considerare quid horum faciendum sit oportet, & ubi magis aut minus ea adhibere cōuenit. Vtrorūq; enim usus opportunus, itemq; negligētia, magnā differentiā habet. Est autem propria & genuina medicinæ deligatio, ex qua æger opem sentit. Maxime autem profunt duo hæc, quibus utendū est, comprimere uidelicet ubi oportet, & remisse deligare. Iuxta horæ uero tempus, quādo integere oporteat & non, uisandum est, ut neq; debili, neq; fortiore alterutro horum utaris. Concinnas autem deligationes ad spectaculum cōparatas, & nihil iuuantes, reprobare oportet. Onerosæ enim sunt & omnino petulantes, sæpe uero etiam damnū deducunt. Quærit autem æger non ornatum, sed auxiliū. Cæterū in chirurgijs quæ per sectionem aut unctionē fiunt, uelocitas ac tarditas æqualem laudem merentur. Est enim utriusq; usus. Nam in quibus per unicam sectionē chirurgia absoluitur, uelocem dissectionē facere oportet. quum enim contingat eos qui sentiant dolere, id quod dolorem affert, quāminimo tempore adesse cōuenit, quod ipsum cōtingit ueloci sectione facta. Vbi uero multas sectiones fieri necesse est, tarda chirurgia utendum est. Velox enim continuum & multum dolorem inducit. Tardus uero & intermittēs, requiem aliquam his qui curantur exhibet. Idem de instrumentis quoq; dici potest. Gladiolis enim acutis ac latis uti, non in omnibus similiter præcipimus. Nam partes quædā sunt corporis,

quæ celerem sanguinis fluxum habent, & non facile est eum sistere, Tales autem sunt varices, & quædam aliæ venæ. Itaq; in talibus angustas sectiones facere oportet, neq; enim possibile est ut fluxus in his sistatur. Conducit autem aliquando à talibus sanguinis detractione facere. At uero ad locos non periculosos, & circa quos non tenuis est sanguis, latioribus gladiolis utendum est: sic enim sanguis prodierit, aliter nequaquam, ualde autem turpe est non contingere à chirurgia quod uelis. Cucurbitarum porro duo modi commodi existunt. Quando enim fluxus procul ab apparente carne copactus fuerit, circulum ipsius breuem esse oportet, ipsamq; non uentrosam, sed prolixam parte ad manum uergente, non grauem. Quæ enim talis est, in directum trahet, & serofos humores separatos ac distantes probe ad carnem adtrahet. Maiore autem dolore per carnem disperso, in reliquis quidem cõsimilem cucurbitam esse oportet, sed circulum magnum. Sic enim ex plurimis partibus id quod dolore facit educere comperies, ad locum cõuenientem. Neq; enim magnũ esse circulum putant, si non ex pluribus locis caro cõprehendatur ac cõtrahatur. At si grauis sit, ad superios locos repit, inferne autem magis detractione facit, ut sæpe morbi relinquuntur. Latius itaq; circuli, unã cum incumbentibus fluxionibus, & longe distantibus à superioribus locis, multa simul adtrahunt de alia carne. Contingit igitur humiditate inde detracta, apponi collecto inferne sub cucurbita seroso humori, & quæ quidem infestant, relinquit: quæ uero nihil molestant, detrahi. Magnitudinem porro cucurbitæ quæ commoda sit, iuxta corporis partes quibus admouere oportuerit, coniectare oportet. Vbi uero scarificatione subter cucurbitam adhibere uelis, sanguinem scarificandorum locorum conspicuũ esse oportet, aliàs neq; circulum adtractum scarificare ac pertũdere oportet. Debilior enim est caro loci dolore affecti. Scalpris autem incuruis, in summo non ualde angustis utendum est. Aliis quando enim serofis ac saniosis humores uiscosi ac crassi ueniunt: periculum igitur est ne in fissuris subsitet, ubi arctæ fuerint incussa. Porro uenas in brachijs, funicularum apprehensionibus cõstringere oportet. Caro enim cõtegens in multis non probe coaptata est uenæ: ubi enim lubrica fuerit caro, non contingit sectiones utrorumq; iuxta se ipsas fieri. Nam uenã cõrectam insufflari cõtingit, & sanguinis fluxum impediri, multis uero etiam propter hoc pus congregatur. Quæ propter duo nocumeta talis chirurgia inducit, secto quidem dolorem, secanti uero multam ignominiam. Idem in omnibus uenis fieri præceptũ est. Hæc quidem igitur necessaria sunt in officina medica instrumeta, & circa quorum usum artificiosum esse oportet addiscetẽ. Volsellis autem tum dentium, tum uuarũ, quilibet uti potest, simplex enim usus ipsorum esse uidetur. Cæterum de tuberculis & ulceribus quæ maiorum morborum sunt, amplius uidentũ est. Tubercula enim quidem deprehendere & dissoluere posse, maxime artificiosum habetur, itemq; collectiones ipsorum impedire. Consequens est, ea in conspicuũ & breuissimum locũ contrahere, & copagem ipsam æqualem per totum tuberculum facere: ubi enim inæqualiter se habuerit, periculũ est ut rumpatur, & ulcus ægre curabile reddatur, ex æquare itaq; oportet, similiterq; totũ maturũ facere, & neq; prius diducere, neq; sinere ut sponte rumpatur. Quæ uero maturũ facere æqualiter possint, in alijs libris relata sunt. At uero ulcera quatuor uias habere uidentur. Vnam in profundum, hæc autem sunt fistulosa, & quæ sanie plena sunt,

ac intus excavaata. Alteram in altum, quæ uidelicet carne superexcrefcit. Tertia uia est in latitudine, atq; hæc sunt quæ appellantur serpiginoſa. Quarta uia est quæ ſola ſecundum naturam motus eſſe uidetur. Carnis itaq; calamitates hæc ſunt, omnes autem cõmunem rationem habent ad hoc quod ipſis cõducit; & ſigna quidem horum in alijs relata ſunt, itemq; qua utendum ſit curatione; per quæ autem concretũ diſſoluatur, ſimiliterq; id quod carne excreſcente repletum, aut cauum factum eſt, aut quod in latitudinem iter fecit, de his omnibus in alijs ſcriptis noſtris abũde dictum eſt. Amplius uero de Cataplaſmatis ſicres habet. Linteorũ quæ imponũtur ac induntur alicubi in morbo, uſus exactus eſſe uidetur, & eſt fanẽ ulceri cõueniens linteolorũ impoſitio. Verũ cataplaſmate per ambitũ ulcers utaris. Nam hic uſus cataplaſmatis & artiſcioſus eſt, & multũ prodeſſe poteſt. Videtur enim ulceri opitulari uis eorũ quæ circũ ponãtur. Linteũ autem cõterendũ eſt ac emolliendũ. Verũ partibus extra uulnus circũſiſtis cataplaſma pdeſt. Talem igitur ipſorũ uſum eſſe oportet. Porro de temporũ occaſionibus, quãdo ſingulis horũ utendum eſt, & quomodo præſcriptorũ uires cõdiſcere oporteat, in præſens relictu eſt. Talia enim lõge præſtãtiſſima in ſtudio Medicinæ ſunt, & procul in artem progrefſi exiſtũt. His cõſequeus eſt chirurgia uulnerũ in militia acceptorũ, circa extractionẽ telorũ. Nam in urbanis cõuerſationibus modicus horũ uſus exiſtit. Raro enim per omne tẽpus ciuiles ac hoſtiles expeditiones fiunt. huiuſmodi autẽ ſæpe ac frequẽtiſſime circa externas militiaſ fieri ſolent. Qui igitur hac chirurgia uti uolet, eum militare oportet, & externos exercitus ſequi. Sic enim exercitatus fieri poterit ad eiufmodi uſum ac neceſſitatẽ. Quod uero circa hæc artiſcioſiſſimũ eſſe mihi uidetur, referetur. Etenim ſigna exquirere ac inuenire telorũ in corpore exiſtentium, maxima artis & chirurgiæ huc pertinentis pars exiſtit. Vbi enim hoc cognitũ fuerit, nõ relinqui poteſt uulneratus ex ignorantia neglectus, quũ non cõuenienter tractetur. Solus autẽ iſ qui ſignorũ expertus eſt hanc chirurgiam rite aggredietur. Verũ de his omnibus in alijs ſcriptum habetur.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE DECENTI ORNATV, IANO CORNARIANO Medico Phyſico interprete.



Non ſine ratione faciunt, qui ſapientiam ad multa utilem eſſe prætendunt, eam uidelicet quæ inter homines exiſtit. Multæ enim ad ſuperfluam curioſitatẽ factæ apparent, dico autem eas quæ de nulla re utili diſſerũt. Aſſumi autẽ utiq; poſſunt etiam harum partes ad illas, uel propterea quod neq; oſioſitas eſt, neq; malicia. Ociũ enim & ignauia maliciam quærunt, & ad eam diſtrahũtur, uigilantia uero & mens ad aliquid intentata, trahunt ad ſe quid eorũ quæ ad uitæ honeſtatem pertinent, etiam ex diſputationibus nihil utile tractãtibũs. Gratioſior eſt enim ſapientia, & ab alijs quibuſdam in artem cõſtituta, artem uidelicet ad parandum honeſtum ornatum ac opinionem. Omnes enim nõ cum turpi lucro & turpitudinẽ conſiſtunt. Et illis methodus quãdam eſt artiſcialis quæ operatur: quod

si non innocenter fiat, raptores sunt. adoleſcētes enim in ipſos incidunt, uerum
 in uigore conſtituti, propter uerecūdiam, uidentes ipſos idiotas ducunt, Senes
 uero propter amarulentā, legiſlationē in ipſos cōſtituunt, ex ciuitatibus uide-
 licet expulſionē. Hi enim ſunt qui fora frequētant, ruditate ac inſcitia ſua impo-
 nentes, & in circulis ciuitatū uerſantes. Cognouerit autē quis ex ueſtitu & alijs
 lineamētis. Quāuis enim fuerint ſplendide ornatī, multo magis fugiendi ſunt,
 & à cōſpicientibus odio habendi. Qui uero cōtrario modo ſe gerunt, frugi ho-
 mines iudicandi ſunt, quibus nō eſt excogitatus apparatus, neq; ſuperflua cu-
 rioſitas. Ex ueſtitu enim cognofces, & decēti in ipſo ornatu ac frugalitate, non
 ad ſuperfluitatē parato, ſed magis ad bonam opinionē, & meditationem, ani-
 mumq; intra ſe cōpoſitum, & ad profectiōnē. Imò quocūq; ueſtitu ac ornatu,
 tales ſunt minime diſſuantes, non curioſi, amarulenti ad occurſus & obuiam
 itiones, appoſiti ad reſpōſiones, graues aduerſus reſiſtentes, ad ſui ſimiles ſoler-
 tes, & familiares, ac affabiles, tēperati ad omnes, ad ſeditiōnes taciturni, ad ta-
 cendum animo obfirmato & cōtinentes. ad tempus appoſiti, & ad occaſionē
 arripiendam accōmodati, ad uictum frugales & cōtenti, paciētes ad temporis
 expectatiōnē, ad ſermones expediti, omne demōſtratum proferentes, ſuauiſ-
 quentia utentes, gratijs affecti, & gloria horū omnium corroborati ac fortifica-
 ti, ad ueritatem ac demōſtrationem audentes ac cōſiſi. Principaliffimū quidem
 igitur horum omnium prædictorum eſt Natura. Nam ſi hæc aſſuerit his qui arti-
 bus animū applicant, per omnia prædicta penetrare poterunt. In cognita enim
 utilitas, tum in ſapientia, tum in arte adhibita, ad principiū capiendum edoce-
 ri poteſt. Natura autē deſiuit & cōfunditur cum ſapientia, ad cognofcēdum ea
 quæ ab ipſa natura facta ſunt. Etenim in utriſq; ſermonibus multi cōuidēti, nul-
 latenus utriſq; rebus uſi ſunt ad demōſtrationem. poſtquā igitur quiſpiā ipſo-
 rum expēderit ad ueritatē ea quæ retulimus, nullatenus naturæ bona ipſis pro-
 cedent. Cōperiuntur itaq; hi non conſimili cum illis uia progreſſi, quapropter
 denudati, omnem induūt maliciam ac ignominia. honeſtus eſt enim ex opere
 quod quis edocētus eſt ſermo. Quicquid enim artiſcioſe factum eſt, ex ratione
 prolatum eſt ac productū. Quicquid autē artiſcioſe dictū eſt, non aut factum,
methodi inartiſtialis demōſtratiuum exiſtit. Nam putare quidem non autem
 facere ignorantia & inartiſtialitatis ſignū eſt. Opinio enim maxime in Medi-
cina in crimē uertitur eā adhibētibus: his uero qui ea in ſe uſi ſunt, perniciē aſ-
ſert. Etenim ſi ſibiſpiſ in ſermonibus perſuaſerint, & opus ex diſciplina ſe ſcī-
 re putauerint, quemadmodū aurum adulterinū in igne iudicatū, tales ſe ipſos
 eſſe demonſtrant. quanquā talis prædictio nihil cōmouet ad prudentiam eos
 qui ſunt eiufdem generis. quod autē rectus ſit ſinis, cognitio manifeſtum facit.
 Tempus porro etiam artē facilem ac peruiam facit, aut in cōſimilem uiam inci-
 dentibus proceſſus manifeſtos facit. Quapropter ſingula prædicta ſuſcipere
 oportet, & ſapientiam transferre ad medicinā, & medicinā ad ſapientiam. Medi-
 cus enim philoſophus, eſt deo æqualis. Neq; enim multa eſt inter ipſas diſſe-
 rentia. Nam omnia quæ ad ſapientiam requiruntur, in ſunt in medicina: argenti
 cōtempus, reuerentia, uerecūdia, habitus ſubmiſſus, autoritas, iudiciū, quies,
 obuiam itio, mundicia, doctrina, cognitio ad uitam utilium ac neceſſariarū
 purificationū, alienitas à mercimonijs, alienitas à ſuperſtitione, præminētia diu-

na. Habent enim quæcunq; habent ad coercendam intemperantiã, inficiã, auaritiã, concupiscentiã, rapinasq; ac impudentiã. Hæc enim est cognitio accedens uñ, & usus eorũ quæ ad amicitia pertinet, & quomodo ad liberos, ac quascunq; res se gerere oporteat. quatenus igitur cū hac societate habet, sapientiã quædã est. Nam & plurima ex his etiã medicus habet. Etenim sciẽtia de dijs uel maxime animo ipsius implexa est. Etenim in alijs affectionibus, & in symptomatis accidentibus, Medicina erga deos ualde reuerẽter se habere cõperitur. Medici uero deis cõcedunt. Non enim est potẽtia in ipsa redundans. Nam & hi multa quidem aggrediuntur, multa uero etiã per seipsa ipsis superantur. Quæ uero nũc possidet Medicina, hinc exhibebit. Quæ enim uia ipsius sit in sapientiã, hæc tenus dictũ est. Nam & illis ipsis hoc modo se res habet. Quæ uero putant, & cõsistentur ac profitentur, sic habet. Quæ circa corpora adfunt & adueniunt, quæ sanè per omnẽ ipsam artem procedunt, dum illa transformatur aut transmutantur. Quæ item per chirurgiã sanant. Et quæ auxilijs & medelis aut uictu curantur. Quæ item per chirurgiã sanant. Et quæ auxilijs & medelis aut uictu curantur. Summa uero horũ omnium tendat ad horũ cognitionẽ. Quũ igitur relata omnia tali modo se habeant, cõuenit ut Medicus comitate quãdã sibi adiunctam habeat. Austeritas enim & sanis, & ægris, difficile accessum præbet. Maxime uero ad seruare ipsum seipsum cõuenit, ut ne multas corporis partes ostẽdat, neq; cū imperitis multa fabuletur, sed necessaria. Hoc enim uiolẽtia esse cõfuevit, ad curationis prouocacionẽ. Facere autẽ nihil horũ debet ualde curiose, neq; ex imaginatione. Hæc uero omnia cõsiderato, quo tibi præparata sint ad abundantia, prout opus fuerit. Sin minus, instante necessitate semper penuria fuerit. Procurare autẽ oportet hæc in medicina, cū omni submissiõẽ: de frictiõne, & illitiõne, & perfusiõne, ad manuũ cõcinnitate: de linamẽtis uullis, de splenis, de ligamẽtis, de his quæ pro tẽporis cõstitutiõne requiruntur, de medicamentis ad uulnera, & ocularia, et ex his ea quæ ad singula genera pertinent: quo tibi præparata sint & instrumẽta, & machinæ, & cõsequenter ferrũ. Nam in his penuria detrimẽtosa est, & artẽ mancã facit. Sit autẽ tibi alter apparatus simpliciter ad peregrinationes instructus, ad manus prõptus. Expediẽtissimus autẽ per methodi rationẽ. Neq; enim fieri potest ut medicus omnia percurrat. Firma itẽ memoria teneto medicamẽta, & simplices facultates, & descriptas, si modo tales extãt. Sint & in memoria tibi morborũ curationes, & harũ modi, quoru pluciter & quomodo in singulis se habet. Hoc enim principiũ est in Medicina, & mediũ, & finis. Præparata quoq; tibi sint malagmatũ genera ad singulos usus. Potiones quæ incidere possunt, ex descriptiõne præparata iuxta genera. In prõptu sint & quæ ad medicationẽ pertinet ad purgationes, sumpta de locis consurguis, & parata eo quo cõuenit modo, iuxta genera, & magnitudines, ad uetustate ferendã curata. Recẽtia uero iuxta tẽporis occasionẽ: & alia iuxta rationẽ. His autẽ tibi præparatis hoc cõmodi erit, ut ubi ad ægrotũ introieris, animo incertus nõ sis, quum appositẽ habeas singula ad id quod faciendũ est. Antea uero hoc cognitũ habeas quod facere oportet, q̃ ad ægrũ ingrediaris. Pleraq; enim neq; ratiõinatione, sed auxilio rerũ opus habet. Itaq; euentũ ex experiẽtia prius discernere oportet. Est enim hoc gloriosum, & facile cognosci potest. In ingressu uero meminisse cõuenit & lesionis, & habitus submissi, amictus cõpositi, auctoritatis, breuiloquẽtiã, ut nihil cū perturbatione facias, affectus,

diligentiæ, rēspōnsionis ad ea quæ occurrunt, & ad tumultus sientes contemp-
 scendos constantiæ apud teipsum, increpationis ad turbas castigandas, prom-
 ptitudinis ad ministeria. Et ad hæc memor sis primi apparatus. Sin minus, res-
 liqua citra errorem fiant, quæ ad prōptitudinem parandam præcipiuntur. In-
 gressu utere frequenter. uisita diligētius, his quæ à deceptis per errorem sunt occu-
 rrens, ut mutetur. Facilius enim cognosces, simulq; expeditior eris. Instabi-
 lia enim sunt quæ in humidis cōsistunt. Quapropter etiā facile & à natura, & à
 fortuna transmutātur. Neglecta enim ea quæ circa tēporis occasionem admini-
 strare oportebat, impetu suo progressa occupant ac perimunt. Non enim est
 quod opem ferat. Multa enim sunt quæ simul mali aliquid faciunt. Nam quod
 singulatim iuxta consequentiam fit, magis opportunū & frequentius est. Ob-
seruare autem oportet ægrotorum quoq; peccata, per quæ multi sæpe mentiti
 sunt, in affumendis his quæ ingerēda exhibētur, postquā exofas porciones non
 accipiētes, aut pharmacis datis, aut alia curatiōe adhibita, perēpti sunt. Et factū
 quidē hoc nō ad ipsorum confessionē uertitur, uerū Medico culpa imputatur.
 Cōsiderare uero oportet etiā decubitus, quosdā ex ipsis iuxta anni tēpus, quos-
 dā iuxta genera. Quidā enim in altis sedibus, quidā in subterraneis ac tenebro-
 sis decubunt. Strepitus quoq; & odores, maxime uini, deterior enim hic est: fu-
 gere ac trāsmutare oportet. Et omnia hæc facere placide, expedite, cū ministe-
 rio, ita ut plerq; ægrotō occultes, et hilari ac sereno uultu ipsū cōsoleris: quo
 à suis illū cupiditatib. auertas, simul cū amarulentia & cōtraria instantia incre-
 pando, simulq; cum cōmonefāctione ac dexteritate suscipiendo ac cōsolando,
 nō tamen ut quicquā futurorū aut præsentīū ipsis indices. Pleriq; enim ob hæc
 causam, in utralibet partē compulsi sunt, propter relatā uidelicet prædictiōnē
 præsentīū aut futurorū. Sit autē ex discipulis aliquis præfens, qui instet ut præ-
 ceptis nō amarulētē utatur, & quod mādātū est faciat. Deligito autē ex ipsis eos
 qui iam in arte progressum fecerūt, quo ea quæ utilia sunt addāt, aut secure ofe-
 ferant, ut & in interuallis nihil te lateat. At uero imperitis nunq̄ quicquā pro-
 randū committes. Sin minus, eius quod male factū est, uituperū in te recidet, si
 non ambigūe res habeat, ex quibus id quod recta methodo tractatū est, proce-
 det, & uinperationē tibi nō afferet. Sed & qd' factū fuerit, ad genus referetur.
 Proinde omnia hæc prædicito in his quæ sūt, his quibus ea cognouisse propo-
 sitū est. His igitur ita habētibus, ad bonā existimationē ac decentē ornatū, et in
 sapientiā, & in alijs artibus: oportet medicū distinctis partib. de
 quibus diximus, semper utriq; amictum, ea cōseruare ac custodire, & tradere
 ac facere. Quū enim apud omnes homines in clyta sint, cōseruantur. Et si quidam
 ipsa procedunt, celebres sunt à parentibus & liberis. Et si quidam
 ipsorum non multa cognitione præditi sint, ab ipsis
 tamen rebus ad intelligentiā deueniunt.

HIPPOCRATIS COI PRAE

CEPTIONES, IANO CORNARIO ME
dico Physico interprete.



TEMPVS est in quo occasio est. Occasio uero in qua tempus nō multū. Medela tempore, aliquādo etiā occasione cōtinuit. Hæc sanè nosse oportet, & nō ratiocinationi prius probabili intentū curā aggredi, sed exercitationi cū ratione. Ratiocinatio enim memoria quædam est, quæ cōponit ea quæ per sensum sunt percepta. Imaginatio enim cōcepta est euidenter. Sensus aut̄ perpeffus iam delegator est eorū quæ subiacēt ac obueniunt, ad ipsam cogitationē. Qui uero sensus sæpe mala perpeffus est, & suscepit, quibus, quādo, qualiter, laesus sit obseruās, & in seipsum reponens recordatur. Collaudo quidē igitur etiā ratiocinationē, si quidē ex fortuita occasiōe inuitū faciat, & delationē in morbū ex apparētib. persequatur. Si enim ex his quæ palām perficiūtur, ratiocinatio inuitū fecerit, in mentis potētia esse cōperitur, ita ut ipsa ab alijs singula assumat. Proinde statuēdū est, naturam à multis ac omnigenis rebus moueri ac doceri, ita ut uiolentia quædam subit. Mens autē ubi ab ipsa accepit, uelut dixi, postea ad ueritatē perducit. Si uero non ex euidentī aggressiōe, uerū ex probabili rationis signēto, sæpe grauem & molestā inuehit affectiōē. Tales aut̄ inuiam uiam arripiūt. Quid enim tandē erat mali, si mercedē auferrent hi qui medicinæ opera male administrāt? Nunc uero ægrotis qui extra culpam sunt, nō sufficiens esse apparet uiolentia morbi, nisi Medici quoq; imperitiā accedat. Et de his quidē hæc dicta satis sint. At his quæ ex sola ratione perficiūtur, frui nō datur: uerum his quæ ex operis indicatione. Fallax enim est & ad errorē procliuis affirmatio, quæ fit cū garrulitate. Quapropter in uniuersum his quæ sūt inhaerere oportet, & circa hæc uel maxime uersari, si quis facilem ac minime delinquentē habitū, quē sanè Medicinā appellamus, sibi cōparare uolet. Valde enim magnā utilitatem afferet, tum ægrotantibus, tum horū artificib. Nō tamen cunctandū est & ab idiotis inquirere, si quid cōferre uisum fuerit ad curationis occasiōē. Sic enim arbitror uniuersam artem cōmonstratam esse, eo quod ex unoquoq; sine obseruatio facta est, & cōsonantia in idem cōcurrerit. Anrēdere igitur oportet fortuitæ occasiōni, quæ plerūq; se offert, atq; hoc cū utilitate ac leni progressiōe potius, q̄ cū promisiōe, & excusatione ea quæ fit cū actione. Utiles est autē & uaria prædestinatio eorū quæ ægrotō offeruntur. Non enim asseuerare oportet, quod ali quid solū exhibitū proderit. Omnes enim affectiōes, propter multas casuum circūstantias ac mutatiōes, mora quadā diutiore adherēt. Et hoc sanè admonitiōe opus habuerit, ad diligētē consideratiōē faciendā. Si enim à mercede inceptis: cōducit enim hoc uniuerso negotio: ægrotō quidē huiusmodi cogitatiōē inducis, q̄ uidelicet nō ipso relicto abibis. Si uero non pacifceris, q̄ ipsum negliges, & de quibusdā in rem præsentem nō admonebis. Curare igitur oportet de cōstituenda mercede. Inuitē enim esse putamus eiusmodi ægrotō ipsius cogitatiōē, multo aut̄ magis in morbo acuto. Morbi autē celeritas temporis occasiōē nō præbens, ad reuertiōē, nō impellit bonū Medicū ad querendum

rendū suam cōmoditatē, sed ut magis existimationis suae rationē habeat. Itaq̄ tūc melius est ut seruanis exprobrēt, q̄ ut letaliter affectos praecōturbet. Quāq̄ aliqui aegroti id expetūt, hospitij ius, & faciem mali depulsionē producētes, digni quidem qui negligātur, non tamē qui affligātur. Quapropter his te meritō opponēs, cū bolidis iactu in maris turbati fluctibus iter faciētib. Qui enim bonus Medicus est, is per louē fide magis q̄ duricia medetur. Quare in principio totam affectionē indagare oportet, & quaedam suggerere conducentia ad curationē, curareq̄ aegrotū, & nō negligere. At uero remunerationis exigēda acerbitatē, absq̄ preparatē ad disciplinā cupiditate, horror ut ne ualde inducas, sed & ad opulentia & facultates respicias. Quādoq̄ uero etiam gratis cures, ita ut gratitudinis memoriā potiorem, q̄ praesentē existimationē auferas. Si uero occasio ferendae opis se obtulerit, & peregrino, & egeno, maxime talibus optuleris. Si enim affuerit erga homines amor, adest etiā amor erga artem. Quidā enim aegrotantes ubi perceperūt affectionē circa se non esse in tuto, per Medici probitatē ac mansuetudinē gloriantur sanitati restitutos se esse. Laudabile est autē, aegrotū quidem curam gerere, gratia fanitatis: sanorū uero curā suscipere, ea gratia ut sine morbis degant. Sed & sanorum cura habēda est, gratia boni ac decori ornatus. Qui igitur in profundo ignorantiae artis uersantur, praedicta minime perceperunt. Nam hi qui sunt nō initiati, miserabilesq̄ ac subito exaltati: fortunae tamē indigi, à diuitibus quibusdā, ex angustijs remissionē acquirūt, semperq̄ ob opera gloriantes, & in deterius dilabētes deliciantur, artis sinceritatem negligentes, ob quā bonus Medicus, qui ab artis cōiunctione socius artis appellatur, in uigore esse possit. Hic autē medelas circa delictū facile perficiens, nihil horū transilierit, nō praefacultatis inopia. Non enim infidus est uelut in iniustitia. Nam ad curationē hi nō accedunt, ubi affectionē perniciosam esse uident, uitates aliorū medicorū superinductionē, laudātes aegrotos propter praesui auxilij odiū. At aegrotates afflicti natant in utraq̄ improbitate, eo quod potiori in arte curationi seipos nō cōmiserūt ad finē usq̄. Remissio enim morbi alicuius magnū aegrotō refugij praebet. Quapropter sanā affectionē cupientes, eundem usum semper admittere nō uolunt, medici uarietati se assimilātes. Si aptum equidē opulentia aegroti carent, morū improbitate adorātes, & ingrati fientes. Quū autem cōsequi possunt ut ditentur, de mercede affeueranter affirmant, sani esse uolentes, quaestū nimirū ex usura, aut agricultura affiore producētes, & postea de ipsis quaestū facere negligentes. Et de huiusmodi quidē declaratione haec sufficiāt. Remissio enim & intētio aegrotatis, medicam administrationē requirunt. Nec uero indecore se ille geret medicus, qui in rei praesentis angustia circa aegrotū aliquem, & imperitia tenebras offundente, alios quoq̄ accersere iusserit, quo ex cōmuni cōsideratione, res circa aegrotū inquirantur ac cognoscantur, & illi cooperatores fiant ad auxilij ferēdi facultatem. Nam in afflictionis assiduitate, augescēte affectione, ob cōsilij inopiā, plurima ad rem praesentem effugiūt. In eiusmodi igitur tēporis occasione cōsiliendū est. Nam quā enim ego tale quid decerno, quod ars ipsa iudicat. Et de hoc nunq̄ contendere oportet affirmādo, ac mutuis inter se cōiunctis decertādo. Hoc enim iure iurādo affirmare possim, q̄ Medici ratiocinatio nunq̄ alteri inuidere poterit. Imbecillius enim hoc modo apparuerit. Sed haec magis expedite faciūt hi qui circa forē

fia negotia ac quaestus uersantur. Quanquā necq̄ falso hoc cognitū fertur, quod
 in omni copia, inopia inest. At uero cū his omnibus magnū signum substantiæ
 artis apparuerit, si quis recte medicans, ab eiusmodi cōpellatione nō desiterit,
 iubens ægrotos mente nō turbari, in eo quod ad salutis tempus peruenire ges-
 stūnt. Hoc enim nō inutile esse ducimus, & hoc sanē præcipiens nō peccabit.
 Ipsi enim ægroti propter dolorificam affectionē desperātes, seipsos uita exuūt.
 Qui uero agrū sibi cōmissum habet, si artis inuenta demōstrauerit, cōseruans
 nō mutans naturā, præsentē auferet remunerationē, aut contrā, fidem suam sta-
 tim amittet. Hominis enim bonus habitus natura quædam est, quæ motū non
 alienum ex natura acquisiuit, sed ualde cōgrua est, & spiritu, & calore, & humo-
 rum cōcoctione undiquaq̄, & uniuersa uictus ratione, & alijs omnibus cōpo-
 sita ac cōstructa: si nō aliquis ex natiuitate, aut ab initio defectus fuerit. Si uero
 etiā quis fuerit, is si exilis est, conandū est ut subiectæ naturæ assimiletur, præ-
 ter naturam enim est id quod imminutū est, etiā per tēpus. Porro fugiēda est
 & frictio per lintea sudaria, propter parandā medendi autoritatē, Itemq̄ odor
 curiosē ascitus. Propter multā enim peregrinitatē, in calūniā incidēs: propter
 modicā uero, decentem ornātū cōsequens. In parte enim dolor modicus: in to-
 to, multus. Gratiudinē autem qua hominibus cōplaceas, non tollo. Digna es-
 nim est medico præsidio. At uero appositionis per instrumēta, & indicationis
 eorum quæ significant, & eiusmodi rerum memoriā adesse oportet. Si uero eti-
 am uulgi gratia uelis dissertationē ad audiendū te facere, non ualde gloriose id
 captes: nō tamen cum testimonio ac ostētatione poetica. Imporētiam enim in-
 dustrii laboris ostendit. Auersor enim ad alium usum trāsferri industriam cum
 labore partā, quæ propterea in seipsa sola gratiosæ sectæ electionē habet. Con-
 sequeris enim instar fuci promptam cū comitatus deductione elationē. Optan-
 da est & eiusmodi dispositio quæ aliena sit ab eo quod quis grandis iam natu di-
 scat. Hoc enim præsentū quidē nihil perficit, absentū uero tolerabilis memo-
 ria existit. Fit itaq̄ omnia tentans infortuniū, cum recēti pernicie, quæ negligit
 decorum, & in præfinitis terminis, & in profensione, & in maximis iuramētis
 deorum gratia factis: dum Medicus præest morbo, cū assidua lectione, instrumē-
 tionēq̄ imperitorū fugitiuorū, ita ut sermones trāslatitios imiteretur, qui etiā
 antea q̄ in morbo incertus animo esset, collectū fuerunt. Talium igitur ubi etiā
 præfectus essem, nō sanē in collectiua curatione id facerē. Verū confidenter au-
 xilium peterem. Cognitionis enim decoræ scientia in his dispersa est. Quū igi-
 tur hi necessario sint in scij ac imprudētes, hortor eos ut cōmodam habeāt exer-
 citationē, post dogmatū cognitionis penuriā. Quis enim multifidam dogma-
 tum sectionē se uere cognoscere posse sperarit, citra exercitationis constantiā?
 Quapropter hoc admoneo, ut dicentibus quidē attendant, facientibus autem
 incūbant, & cōtractam uictus rationē non diu præscribant. Aegrotantis enim
 diuturnam cōcupiscentiā erigit indulgētia quocq̄, in morbo diuturno. Si quis
 cæco animū aduertat, uelut res magni timoris cauendus est, & gratia desperan-
 da, per quam unitas cōstat. Aëris repentina turbatio uitanda est. Vigor ætatis
 omnia habet gratiosā, Decrepta uero ætas, uice uersa. Obscuritas linguæ non
 satis clara sit, aut propter affectionē, aut propter aures, ita ut priusquam priora
 enūciarit, alia adijciat: aut priusquā id quod mēte cōcepit dicat, alia in super co-

gitet. & quæ quidem citra affectionem uisibilem appellatam, contingit linguæ obscuritas, his maxime qui artium studio tenentur accidit. Aetati etiã quum paruum est aliquando subiectum, ualde magna uis inest. In morbo tranquillitas, longiorum signum significat. Iudicatio uero est morbi exolutio. Parua causa medelis exsoluitur, nisi quid circa locum principalem affectum fuerit. Quandoquidem affectio per consensum à tristitia inducta uexat, quidam sanè ex alterius consensu uexantur. Vociferatio affligit. Fortis laboris studium subterfugendum est. Maritimus locus ad sanitatem commodus est.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE NATURA HOMINIS IANO CORNARIO

Medico Phisico interprete.



VICINQUE de natura humana amplius differentes audire cõsuevit, quæ eius ad medicinam pertinet, huic non est comòdum hunc meum sermonem audire. Neque enim omnino ex toto aerem dico hominem esse, neque ignem, neque aquam, neque terram, neque quicquam aliud, quia non manifestum est unum in homine esse, sed uolentibus tamè hæc dicere permitto. At uero talia dicentes mihi non recte rem cognoscere uidentur. Sententiam enim eandem omnes ineunt, uerum non eadem dicunt, sententiam tamè epilogum eundem faciunt. Aiunt enim unum quid esse, quodcumque tandem est, & id ipsum esse unum ac totum, iuxta nomina autè non consentiunt. Etenim alius ex ipsis aerem esse, hoc unum ac totum dicit, alius ignem, alius aquam, alius terram, & addit unusquisque ad sermonem suum testimonia ac signa, quæ nullius momenti existunt. Quia enim eadem sententia omnes utitur, dicunt autè non eadem, manifestum facit quod neque cognoscunt ipsa, quod ex eo uel maxime quis cognouerit, qui ipsorum disceptationibus inter consequenter idem homo uincit in eodem sermone, sed modo hic, modo alius superat, cuiuscumque fuerit lingua maxime fluida ac populo grata. At qui iustum erat, ut is qui de rebus se recte cognoscere pronunciat, semper sermonem suum uictorem staueret, siquidem uera cognosceret, ac recte sentiret ac iudicaret. Verum huiusmodi homines uidentur mihi seipsum oppugnare in uerbis sermonum suorum, præ stultitia, & Melisi sermonem approbare. De his igitur sufficit mihi quæ retuli. At uero ex Medicis quidam dicunt, quod homo sanguis solus est, alij ex ipsis bilem aiunt hominem esse, aliqui pituitam, epilogum autè & ipsi omnes eundem faciunt. Vnum enim quid esse dicunt, quodcumque cuiusque ipsorum nominare uisum est, & id ipsum unum existens, speciem ac uim transformare, coactum à calido ac frigido, sereno & dulci, & amaro, & albo, & nigro, & omnigenum quid aliud. Mihi uero neque hæc sic se habere uidentur. Plurimum quidem igitur talia quædam, & amplius his proxima pronunciant. Ego autè dico, si unum esset homo, nunquam sanè doleret. Neque enim esset unde doleret unum existens. Si uero etiã doleret, necesse esset & quocumque mederetur ac sanaret unum esse. Nunc uero plura sunt. Multa enim sunt in corpore existentia, quæ quum mutuo præter naturam calfunt & frigeunt, siccatumque & humectantur, morbos pariunt. Quare multæ quidem species morborum sunt, multa

taque

hic in libro
de libere

hic in libro
de libere

hic in libro
de libere

taq; etiā de la ipforū existit. Atq; ego sanē cenſeo eum qui hominē sanguinē
 ſolum eſſe dicit, & nihil aliud, demōſtrare debere, ipſum nō trāſmutare ſpeciē,
 neq; omnigenū fieri, uel ſaltē horam aliquā anni, aut hominis ætatē, in qua ſan-
 guis ſolus in homine in eſſe appareat. Veriſimile eſt enim unū aliquod eſſe tem-
 pus, in quo appareat ipſum in ſeipſo unū exiſtens. Eadē cenſeo etiam de eo qui
 pituitā ſolam eſſe dicit, & qui bilem. Ego enim demōſtrabo ea quæ hominem
 eſſe dixerō, & iuxta receptū morem, & iuxta naturā, quōd ſemper ea ipſa ſimi-
 lia ſint, & in iuvene, & in ſene, & tēpore frigido æque ac calido. Exhibebo in-
 ſuper ſigna, & neceſſitates oſtendam, per quas unūquodq; augelcit ac minui-
 tur in corpore. Primū quidem igitur, neceſſe eſt generationē fieri non ab uno,
 Quomodo enim unū exiſtens, aliud quid generat, ſi nō alicui miſceatur: De-
 inde neq; generant, ſi nō eiufdē generis exiſtentia miſceatur, & quæ eandem
 uim habeant, neq; ſanē nobis ſimilia perficerētur. Et ruruſus, Si nō calidū ac fri-
 gidū, & ſiccū ac humidū, moderate ac æqualiter inter ſe haberēt, ſed alterū alte-
 rum multū præcelleret, & fortius debiliore præſtaret, generatio fieri nō poſſet.
 Proinde quomodo uerſimile eſt, ab uno quid generari, quum neq; à pluribus
 generetur, niſi habuerint temperamētum inter ſe probe conueniens? Neceſſe
 itaq; eſt tali exiſtente natura, cum aliorum omnium, tum humana, non unum
 eſſe hominē, ſed ſingula quæ ad generationē eius conferunt, uim quandam in
 corpore habere, eam uidelicet quā contributorū. Et ruruſus neceſſe eſt ſecedere
 ſingula in ſuam ipſorū naturam, homine moriente, humidū nimirum ad humi-
 dum, ſiccum ad ſiccum, calidū ad calidum, frigidū ad frigidum. Talis autem &
 animalium eſt natura, & aliorū omnium, generaturq; ſimiliter omnia, & occi-
 dunt ſimiliter omnia. Coſtat enim natura ipſorū ex his prædictis omnibus, &
 deſinit iuxta prædicta, in id unūquodq; unde eſt cōpactum ſecedens. At ue-
 ro corpus hominis habet in ſeipſo ſanguinē, & pituitam, & bilem duplicem,
 flauam uidelicet & nigram. atq; hæc ſunt ipſi corporis natura, & per hæc & æ-
 grotat, & ſanus eſt. Sanus equidem maxime eſt, ubi temperamētum hæc inter
 ſe habuerint moderatū, tum facultate, tum copia, & ubi maxime fuerint per-
 mixta. Aegrotat autem qui horum quid minus aut amplius fuerit, aut ſepara-
 tur in corpore, & nō fuerit reliquis omnibus cōtemperatum. Neceſſe eſt enim
 quum quid horum ſecretū fuerit, & per ſe ſteterit, non ſolum eum locum unde
 ſecceſſit morbidum fieri, ſed etiam eum in quo ſtat, & in quem propter nimiam
 copiam diſſuſum eſt, dolore ac morbo uexari. Etenim quum quid horū extra
 corpus effluxerit amplius quā redūdat, euacuatio ipſa dolorem exhibet. Rur-
 ſus itaq; ſi idem intus fecerit euacuationē, & tranſitionem, ac ab alijs ſecretio-
 nem, geminatum dolorem exhibere neceſſe eſt, uelut dictum eſt, nempe & un-
 de ſecceſſit, & ubi receptū redundat. Dixi porro, quæcūq; hominem eſſe dix-
 ro, ſemper demōſtraturum me eſſe, quōd talia ſint & iuxta receptū morem ac
 opinionem, & iuxta naturā. Et dico ſanē eſſe ſanguinē, & pituitā, & bilem fla-
 uam ac nigram: & horum primū quidem iuxta receptam opinionē nomina di-
 ſtincta eſſe dico, & nulli ipſorū idem nomen eſſe. deinde ſpecies iuxta naturam
 ſeparatas eſſe, & neq; pituitam ſimilem eſſe ſanguini, neq; ſanguinem bilī, neq;
 bilem pituitæ. Quo enim modo hæc inter ſe ſimilia ſint, quorum neque colo-
 res ſimiles uidentibus apparēt, neq; ad manuū tactum ſimilitudo aliqua eſſe

deprehenditur: Necq̄ enim similiter calida sunt, necq̄ frigida, necq̄ sicca, neque humida. Quum itaq̄ intantū inter se discrepent, tū specie, tum facultate, necesse est ipsa non unū esse, quandoquidē necq̄ ignis & aqua idē sunt. Quod autem hæc omnia nō unum sunt, sed unumquodq̄ ipsoꝝ uim & naturam suam habet, uel hinc cognoscere licebit. Si enim homini alicui medicamētum dederis, quod pituitam ducit, pituitā tibi uomet, & si pharmacū dederis bilem ducens, bilem tibi uomet. Eadem ratione & bilem atrā purgabit, si medicamētum exhiberis quod bilem atram ducit. Quod si ipsi partem aliquā fauciaris, ut uulnus fiat, effluet ipsi sanguis, atq̄ hæc omnia faciet tibi totā diem ac noctem, & hæc me & æstate, donec spiritū in sese trahere potens fuerit, potens autē erit donec aliquo horum cōgenitorū fuerit priuatus. Cōgenita autē sunt prædicta. Quomodo enim non congenita essent? Primum etenim manifestum est hominem in seipso hæc omnia semper habere, donec uixerit. Deinde nata sunt ex homine hæc omnia habente. Postea nutrita sunt in homine hæc omnia habēte, quæ uidelicet ego nunc dico ac demōstro. Qui uero dicunt, quod unū est homo, uidentur mihi hoc cōsilio usi esse. Nimirum quum uiderint eos qui medicamēta hauserunt in superpurgationibus interijisse, alios quidem bilem uomētes, alios pituitam, unumquodq̄ horum hominē esse putauerūt, quod uidiissent his purgatum interijisse. Et qui sanguinē dicunt hominē esse, eodem consilio utuntur. Nam quū uident iugularis homines, & sanguinem ex corpore ipsoꝝ effluentem, hunc ipsum animā in homine esse putant. atq̄ his testimonijs sanē omnes utuntur in sermonib. suis. Atqui primū quidem in superpurgationibus, nemo unquā mortuus est bile sola purgatus. Verum quum quis pharmacum biberit, quod bilem deducit, primū bilem uomet, deinde pituitam, postea per uim etiā atram bilem, postremum moribūdus etiā sanguinem purum uomet. Eadem perpetiuntur à medicamētis pituitam ducētib. Primum enim pituitam uoment, deinde bilem flauam, postea atram, moriētes autem sanguinem purum, & in hoc mox uitam finiūt. Etenim pharmacū ubi corpus intrauerit, primum quidem ducit id quod ex omnibus in corpore existētib. sibi maxime secundum naturā familiare fuerit, deinde uero etiam alia trahit ac purgat. Quemadmodum ex terra nascētia & in ipsam plantata ac seminata, ubi in terram peruenerint, unūquodq̄ trahit id quod naturæ suæ familiare in terra existit. Inest autem in terra & acidum, & amarum, & dulce, & salum, & omnigenum. Primum itaq̄ plurimum eius trahit in seipsum, quod sibi ipsi iuxta naturam maxime familiare fuerit, deinde trahit etiā reliqua. Huiusmodi sanē quiddam etiam pharmaca in corpore faciunt. Quæcūq̄ enim bilem ducunt, primum meracissimam bilem purgant, postea uero mixtam. Et rursum pituitæ pharmaca, primum meracissimā pituitam ducūt, postea mixtam. Et iugularis primum quidem sanguis calidissimus & ruberrimus profluit, deinde pituitosior ac biliosior. Porro pituita in homine hyeme augetur. Hæc enim hyemi maxime secundum naturam cōuenit ex omnibus in corpore existētib. Frigidissima enim existit. Signa autē quod pituita frigidissima est hæc sunt. Si enim pituitam & bilem & sanguinem contingere liberit, pituitam sanē frigidissimam esse comperies, quamuis uis cosissima sit, et per uim maxime post bilem atram trahatur. quæ uero per uim trahuntur calidiora fiunt, à uiolentia coacta, sed tamē supra hæc

hæc omnia, frigidissima esse apparet pituita ex sua ipsius natura. Quod autem hyems corpus pituita repleat, inde cognoscere datur, quod homines pituitosissima & spuunt & emungunt hyeme, et tumores laxi albidissimi sunt maxime hoc tempore, itemque reliqui morbi pituitosi. Cæterum vere pituita quidem ad huc foras in corpore manet, sed sanguis augetur. Nam & frigora remittunt, & imbres superueniunt. Sanguis autem iuxta hæc augetur, ab imbris uidelicet & calidorum dierum tempore. Hæc enim anni pars maxime iuxta naturam ipsam conuenit, ut quæ calida & humida existat. Signa autem hinc colligere licet. Quod homines uere & æstate maxime dysenterijs corripiuntur, & sanguis ex naribus ipsis fluit, & calidissimi ac ruberrimi. At uero æstate sanguis adhuc uiget, & bilis in corpore eleuatur, & usque in autunnum porrigitur. In autumno uero sanguis modicus fit, contrarium enim eius naturæ id tempus existit. Bilis autem per æstatem ac autumnum corpus possidet, id quod inde cognoscere potes: quod homines tua ipso tempore hoc tempore bilem uomunt, & in medicamentorum potionibus, biliosiora purgantur. Manifestum fit & febribus, & hominum caloribus. Pituita autem æstate debilior seipsa est. Contrarium est enim naturæ eius id tempus, calidum enim est & siccum. Sanguis uero autumno paucissimus fit in homine, Siccus enim est autunus, & hominem iam frigefacere incipit. *Agra* porro bilis autumno et plurima & fortissima est. Postquam autem hyems apprehenderit, bilis flaua perfrigerata modica fit, & pituita rursus augetur, tum ob pluiarum copiam, tum propter longitudinem noctium. Corpus quidem igitur humanum hæc omnia semper habet, uerum pro temporis circustantia, aliquando plura seipsis sunt, aliquando pauciora, singula tum iuxta partem ac copiam, tum iuxta naturam. Quæadmodum enim annus omnium particeps est, & caliditatem & frigiditatem, & siccitatem ac humiditatem, Neque enim quicquam horum ne minime quidem tempore consisteret ac duraret, citra omnia ea quæ in hoc mundo insunt, uerum si unum aliquod deficeret, omnia sane abolerentur: ex eadem enim necessitate omnia consistunt & mutuo adiuntur: Sic etiam si quid ex homine deficeret ex his quæ ipsi conueniunt sunt, non sane uiuere posset homo. In anno autem aliquando quidem hyems maxime uiget, aliquando uero, modo æstas, modo autunus, Sic etiam in homine, aliquando pituita præualet, aliquando sanguis, aliquando bilis, primum quidem flaua, deinde etiam nigra appellata. Quorum omnium euidentissimum testimonium hinc habes. Si enim eidem homini idem pharmacum quater in anno dare uelis, uomet tibi hyeme quidem pituitosissima, uere autem humidissima, æstate biliosissima, autumno nigerrima. Itaque quæ sic se habeant, quicunque morbi hyeme augetur, æstate desinere solent, quicunque uero æstate augetur, hyeme finire conlueuerunt, nisi certo dierum circuitu discedant, de circuitu autem rursus dicam. Quicunque autem morbi uere sunt, ad autunnum eorum discessum fore expectare oportet, quicunque postremum autumnale morbi sunt, eorum discessum necesse est uere fieri. Quicunque uero morbus hæc tempora transgressus fuerit, eum annum fore scire oportet. Porro Medicum sic aduersus morbos instare oportet, prout unumquodque horum in corpore præualet, iuxta tempus si biphasi maxime natura conueniens existens.

Addititia sunt hæc, non genuina Hippocratis, ut ait Galenus.

Quin & hæc insuper ad illa nosse oportet, quod quoscunque morbos repletio parat, euacua

euacuatio sanat: & quicunq; ex euacuatione fiunt morbi, repletio sanat. quicunq; uero à labore fiunt, quies sanat, qui autem ab ocio gignuntur, labor sanat. In summa Medicum scire oportet, opponere se cōtrarium instantibus & morbis, & naturis, & temporibus, & ætatibus, & distenditiam soluere, & soluta distendere, Sic enim uel maxime morbum sedauerit, & mihi sanè hoc ipsum sanatio esse uidetur. Morbi partim ex diætis, partim ex spiritu, quem adtrahentes uiuimus, fiunt. Vtrorunq; cognitionē sic facere oportet. Quando ab uno morbo multi homines corripuntur eodem tempore, causam ad id quod communissimum est, & quo maxime omnes utimur, referre oportet. Est autem hoc spiritus & aer quem inspirando trahimus. Manifestum est enim iam, quod diætā unius cuiusq; nostrum, causā non est, quum morbus omnes cōsequenter contingat, & iuniores, & seniores, mulieresq; ac uiros, & tam uinolentos quā aquae potores, & tam mazam edentes, quā pane uescentes, & tam multū laborantes, quā parū. nequaquā igitur diætā causā fuerit, quum homines diuersa uictus ratione utentes ab eodem morbo corripuntur. Quū uero omnis generis morbi fiunt eodē tēpore, palam est uictus singulos singulis causas esse, & curam sanè facere oportet ex cōtrario instādo aduersus morbi causam, quemadmodum & alibi à me relatum est, & uictus rationem permutare. Conspicuum est enim diætā qua homo uti cōsueuit, non esse ipsi cōmodā, aut in totum, aut magna ex parte, aut unū saltem quoddā ex ipsa: quod ubi cognoueris transmutare oportet, habitaq; cōsideratiōe naturæ hominis, & ætatis, & speciei, horæq; anni & modi ipsius morbi, curationē facere, aliquādo detrahēdo, aliquando apponēdo, & quemadmodū iam dudū à me dictum est, ad singulas ætates, & horas, & species, ac morbos respiciēdo, tum in exhibēdis pharmacis, tum in cōstituenda diætā. At uero quū unius morbi popularis grassatio consistit, manifestum est diætā non esse culpabilem, sed quæ trahimus spiritū in causā esse: palamq; est in super eum ipsum spiritū siue aerem morbosā aliquā exhalationē habere. Eo itaq; tēpore homines in hūc modum cōmonefacere oportet, Nimirū ut diætā nō permutent, quia morbi causā nō existunt, uerū ut uideāt quo corpus habeāt q̄ minimā molis ac debilissimū: detrahēdi in super sunt cibi ac potus quibus uti cōsueuerunt, idq; paulatim facere oportet: Nam si quis cito diætā permutet, periculū est etiā a permutatione aliquid in corpore nauūiri. Quapropter uictū solito quidē utendū est, ubi hominē nihil lædere uidetur, prouidēdum uero ut q̄ paucissimus aeris influxus in corpus ingrediat, & ut ille ipse q̄ peregrinissimus existat. Regionum etiā locos in quibus morbus cōsistit, quantum eius fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare: sic enim minime multo ac densō spiritu homines opus habuerint. Porro quicunq; morbi à fortissima corporis parte fiunt, grauisimi existūt. Etenim si isthūc ubi initium sumpserint permanferint, necesse est fortissima parte laborante, totum corpus laborare. Et si à ualidissima ad quādam debiliorem transferint, difficulter soluantur. Quicunque à debilibus partibus ad fortiores transferint, commodius solui possunt. Nam influētia à ui ipsarum facile cōsumuntur. Venæ crassissimæ sic se habēt. Quatuor paria ipsarum sunt in corpore. & unum quidem à capite retro per ceruicem, forinsecus ab utraq; spinæ parte ad coxēdices & in crura progreditur, deinde per furas & malleolos forinsecus

DE GENITIVA NATURA Hominis

fecus ad pedes peruenit. Oportet igitur uenæ sectiones, in doloribus dorsi ac
 coxendicū, de poplitibus facere & de malleolis forinfecus. Alterum par prin-
 cipium ex capite iuxta aures habet per ceruicē, & sphagitides appellantur, hoc
 est iugulares. deferunturq; utrinq; iuxta spinam intrinsecus ad lumbos, in testes
 ac femora, & per poplites ex interna parte, deinde per furas ad malleolos in-
 trinsecus & in pedes. Quapropter in doloribus lumborū ac testium, uenæ sec-
 ctionem de poplitibus ac malleolis facere intrinsecus. Tertū par uenarum ex
 temporibus per ceruicem sub scapulas tendit, & ad pulmonem defertur, altera
 quidem à dextris ad sinistram partē, altera uero à sinistris ad dextram, & dextra
 quidem sub mammam abit & in splenem, & in rhenē, sinistra uero in dextram
 partem tendit à pulmone sub mammam & in hepar, & in rhenē. Vtraq; autem
 in rectum intestinū ac podicem definit. Quartū par à priore capitis parte & o-
 culis, sub ceruicem ad clauiculas deuenit, deinde super brachia superne in flexu
 ras, postea per cubitos in manuum iūcturas ac digitos, deinde à digitis rursus,
 per cubitos ac manus superne in flexuras, & per brachiorum infernam partem
 ad alas, unde superne à lateribus altera in lienē peruenit, altera in iecur, postea
 supra ventrem utraq; in pudendum definit. Et crassissimæ quidem uenæ sic se
 habent. Sunt autem & ex uentriculo uenæ per corpus multæ & omnigenæ, per
 quas corpori alimētum accedit. ferunt autem à crassissimæ uenis, in uentriculum ac
 reliquum corpus, & ab externis & ab internis, & inter se mutuo distribuūt in-
 ternæ extrinsecis, ac uicissim extrinsecæ internis. Venæ igitur sectiones iux-
 ta prædictum sermonem facere oportet. Enitendum est autem ut sectiones,
 quam longissime à locis faciamus, ubi dolores fieri, & sanguis colligi solet. Sic
 enim mutatio minime magna de repente fiet, & cōsuetudinem remouebit, ut
 non amplius in eundem locum colligatur. Quicūq; pus multum spuunt, citra
 febrem, & quibuscūq; in urina pus multum subsidit, citra dolorem, & quibus-
 cūq; alii recremēta cruenta, uelut in dysenterijs, & tarde ac diutine prodeun-
 tia, uelut in iuuenibus quinq; & triginta annorū, atq; etiam senioribus, his om-
 nibus ex eadē causā morbi fiunt. Necessē est enim hos labori deditos, ac exer-
 citatiōis studiosos, & corpore operarios in iuuetute fuisse, postea uero relictis
 laboribus, molli carne & multum à priore differente carnosos redditos esse, &
 corpus multum discrepans habere, ut id quod prius extitit, cum eo quod nunc
 adepti sunt, nulla parte cōsentiat. Quum igitur morbus aliquis corripuerit sic
 dispositos, euectigio quidem effugit, postea autē à morbo progressu tempo-
 ris corpus colliquefcit, & serosi ac saniosi humoris species per uenas, qua parte
 maxime amplæ fuerint, fluit. Si quidem igitur in inferiore uentriculum proces-
 serit, ferē qualis in corpore inest, tale etiam recremētum prodit. Quū enim des-
 cilius sit uia, non multo tempore hæret in intestino. Quibuscūq; autem in pes-
 ctus influxerit, suppurati fiunt. Nimirum purgatione acclui existēte, & multo
 tempore in pectore immorās putrefcit, & purulenta redditur. quibuscūq; uero
 eadē serosi humoris species in uelicā proruperit, à loci caliditate, calida & alba
 fit, & segregatur, & quod quidē rarissimū est, superstat, crassissimū uero infra
 mergitur, qd sanē pus appellatur. Fiūt autē & calculi pueris, propter huius loci
 caliditatē itemq; totius corporis. Viris autē calculi nō generātur, propter cor-
 poris frigiditatē. Nā id pbe nosse oportet, qd homo primis dieb. calidissimus
 est

*remouebit, sic bon
 ab affectu loci uenan
 habet*

est sui respectu, ultimis frigidissimus. Necessè est enim augetur & ad uim procedens corpus calidum esse. Vbi autem inceperit marcescere corpus, delabens in ocium, frigidissimum euadit. Et iuxta hanc rationem, quanto amplius primis diebus homo augetur, tanto calidior existit, & quanto plus ultimis diebus marcescit, tanto frigidior esse necesse est. Sani autem sunt sua sponte illi prædicto modo dispositi ac affectu, plurimi quidem ab hora qua liquefcere incipiunt, quinto & quadragesimo die. Qui uero hoc tempus transgressi fuerint, anno finito sua sponte conualescunt, nisi quid aliud mali grauioris hominem infestet. Quicunque morbi sensim ex modici temporis causa fiunt, & quorum causa cognita facilis sunt, securissimi appellari possunt. Curationem itaque ipsorum instituire oportet, ut causa morbi nos opponamus. Sic enim soluitur utique id quod morbum in corpore fecit. Quibuscumque arena aut tosi in urinis subsident, his initio tubercula circa crassam uenam enata sunt, & suppurata. Postea uero tuberculis non cito effectis, tosi ex pure coacti sunt, qui per uenam foras exprimuntur una cum urina. Quibuscumque uero cruenta urinae sunt, his uena laborant. Quibuscumque autem in urina crassa existente, carunculae paruae capilliformes simul procedunt, eas à rhenibus prodire nosse oportet, & ab arthriticis. Quibus uero pura urina est, & alias atque alias uelut furfures in urina innatant, horum uesica scabiosa existit. Febres plurimae à bile fiunt. Species ipsarum quatuor sunt, praeter eas quae ab oculis doloribus generantur. Nomina ipsarum sunt: Continens, Quotidiana, Tertiaria, Quartana. Continens itaque appellata, à plurima ac meracissima bile prouenit, & iudicationes quae breuissimo tempore facit. Corpus enim nullo tempore perfrigeratum cito colliquefcit, nimirum à multa caliditate calfactum. Quotidiana uero post continentem à plurima bile generatur, & praeter reliquis celerrime discedit, uerum longior est continente, quanto à pauciore bile prouenit, & propterea quae requiem habet in ipsa corpore. In continente uero non quiescit ullo tempore. Tertiaria autem longior est quae quotidiana, & à pauciore bile gignitur. Quanto uero longiori tempore in tertiaria corpore quiescit quae in quotidiana, tanto diuturnior haec febris est quam quotidiana. At uero quartanae reliquae iuxta eandem rationem habent, sed tertianis diuturniores sunt, quanto pauciore bilis parte participant, unde caliditas augetur, & propterea quod corpus in ipsis plus perfrigescit, id quod ab atra bile ipsis contingit superflue adeo ut aegre frigus depelli possit. Atra enim bilis inter omnes corporis humores uiscosissima est, & sedes diuturnissimas facit. Quod autem quartanae febres atrae bilis participes sint, uel hinc condiscere licet. Autumno enim maxime homines à quartanis corripiuntur, & in aetate à quinque & uiginti annis, usque ad quadragesimum quintum, haec autem aetas praeter omnibus alijs maxime à bile atra infestatur, & autumnus tempus omnium anni temporum ad eandem aptissimum est. Quicunque autem extra hoc tempus & aetate à quartana corripiuntur, pro certo scire oportet eam febrem non fore diuturnam, nisi quid aliud grauioris mali hominem infestauerit.

Continens
 Quotidiana
 Tertiaria
 Quartana

DE SALVBRI DIAETA LIBER

IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE.

*Ad dicitur est ad librum De natura hominis, Pobyi
Hippocratis discipuli, aut Galeni.*



IDIOTAS & priuatos homines hac diaeta uti oportet. Hye
me quidem comedere quam plurima, bibere autē quam pau-
cissime. Sit potus uinū quam meracissimū: cibi, panis, & ob-
sonia assata omnia. Oleribus quam paucissimis hoc tēpore
utendum est. Sic enim corpus maxime sicū ac calidum red-
detur. Vbi uero uer apprehēderit, tunc sanē potū amphiorē
assumere oportet, uinum dilutius & paulatim: cibis quoq̃

mollioribus ac paucioribus tum utendū est: & ablato pane, mazam exhibere,
& iuxta eandem rationem obsonia detrahare, & ex assatis omnia cocta facere.
Oleribus uero paucis tūc uti oportet, donec ad aetatem perueniat homo, cibis
mollioribus utēdo, & obsonijs coctis, & oleribus, tam crudis quam coctis, simili-
terq̃ potibus q̃ dilutissimis ac plurimis. ita tamē ut paulatim nō de repēte his
utatur, ne uidelicet magna mutatio fiat. At uero aetate maza molli nutriatur,
et potu aquoso ac multo, obsonijs omnib. coctis. Sic aut̃ his ubi aetas fuerit uti
oportet, ut frigidum sit corpus & molle. Tempus enim calidū est & sicū, & fa-
cit corpora aetiuosa ac squallida. Quapropter tali studio auxiliari oportet. Lux-
ta eandem uero rationem, quemadmodū ex hyeme ad uer, sic ex uere ad aesta-
tem deducendus est, cibo quidem detracto, potu uero aucto. Sic quoq̃ cōtra-
ria faciendo ex aestate ad hyemē perducatur. In autūno uero rursus cibi plures
exhibendi sunt & siccores, & obsonia iuxta eandem rationē, potus uero pau-
ciores & meraciores, quo etiā hyems bona fiat, & homo in ipsa utatur potibus
meraciorib. ac paucis, cibis uero quam plurimis ac siccissimis. Sic enim & ma-
xime sanus fuerit, & minime frigore impetetur. Nam tempus hoc ualde frigi-
dum ac humidum existit. Porro habitibus corporū carnis & mollibus ac ru-
bris, plurimo anni tēpore siccoribus diaetis uti conducit. Humida enim est ip-
sorum natura. Verū duros & graciles, fuluosq̃ ac nigros, humidiorē diaeta ma-
iore tēporis parte uiscitare oportet. Corpora enim talia sicca existunt. Sed & iu-
uenibus corporibus, mollioribus & humidiorib. diaetis uti cōfert. Nā aetas ip-
sorum sicca est, & corpora cōpacta sunt. Seniores autē siccores uictus modo, ma-
iori tēporis parte degere oportet. Corpora enim in hac aetate humida sunt, &
mollia ac frigida. Oportet igitur & ad aetate, & ad tempus anni, & ad corporū
species ac habitus, diaetas constitutere, ita ut cōsistentibus & caloribus, & frigo-
ribus nos opponamus. Sic enim maxime sani fuerint. Quin & ambulandum
hyeme quidem uelociter est, aestate autē leniter, nisi per solis aetum iter facien-
dum sit. Oportet autē & carnosos citius ambulare, graciles uero tardius. Bal-
neis quoq̃ multis aestate utendū est, hyeme paucioribus. Gracilibus autem ma-
gis expedit lauari, quam carnis. Vestes autē puras induere hyeme oportet:
oleo imbutas ac sordidas, aestate. Ceterū pingues, & qui graciles fieri uolunt,
omnes labores ieiuni facere debent, & cibos assumere anhelantes adhuc ex fa-

tigatione, & nō refrigerati, præpoto uino diluto, & non ualde frigido, & obso-
 niā preparata assumere ex sesamis, aut cōdimentis hortētibz, & alijs huiusce
 modi. Sint autem obsonia pingua quæ offeruntur, sic enim à quàm paucissi-
 mis impleri poterint. Sed & semel in die cibum sumere, & illorū manere, & fra-
 tum durum habere, & nudum deambulare oportet, quantum eius maxime fieri
 potest. Quicūq; uero graciles sunt, & pingues fieri uolunt, tum alia his quæ
 dixi contraria facere, tum ieiunos nullum laborem subire oportet. At uero uo-
 mitibus, & alui per infusa elotionibus hoc modo utendum est. Sex menses hy-
 bernos uomendū est. Hoc enim tempus pituitosius est æstiuo, & morbi circa
 caput fiunt, & regionem eam quæ est supra septū transuersum. Quum uero æs-
 tias ac calor fuerit, infusa utēdum est. Hora enim hæc æstiuosa est, & corpus bi-
 liosius, & lumbi ac genua grauantur, & calores oboriuntur, & in uentre tormi-
 na fiunt. Quapropter corpus refrigerare oportet, & quæ in sublime eleuantur,
 inferne subducere ex istis locis. Sint autem infusa pro crassioribus ac humi-
 dioribus saliosa & tenuiora, pro siccis uero & gracilibz ac debiliozibus, pins-
 guiora ac crassiora. Crassa autē & pingua infusa sunt quæ ex lacte fiūt, & cicerū
 decoctū, & alia huiusmodi. Tenuia uero & salia, sunt muria & aqua marina, &
 eiuscemodi. At uero uomitus sic facere oportet. Quicūq; homines crassi ac
 pingues sunt, & non graciles, ieiuni uomāt à cursu aut ambulatione cita, iuxta
 meridiem. Sit autē dimidia hemina hyssopi in aquæ congio cōtriti, atq; hoc ebi-
 bar affuso aceto & adiecto sale, quo iucundius euadat. Bibar autē primum sens-
 sim ac lentius, postea amplius & citius. Qui uero graciliores sunt ac debiliores,
 à cibis uomitum faciant hoc modo. Lotus calida præbibat meri heminā, dein-
 de cibos omnigenos edat, & neq; dum cibum sumit, neq; à cibo bibat, sed con-
 tineat se donec quatuor stadia quis percurrat, deinde uina tria permixta ipsi in
 potu offerantur, austerum, dulce, ac acidum, primū quidem meracius, & paula-
 tim, & per multū temporis spatium. deinde uero dilutius, & citius, & multum.
 Quicūq; autem bis in mēse uomere cōsueuit, huic melius est ut cōsequenter in
 duobus diebus uomat, q̄ per quintum & decimū. Verum aliqui penitus cōtra-
 rium faciunt. Quibuscūq; uero cōmodum est reuomere cibos, aut quibus alui
 non probum transitum habent, his omnibus cōducit sæpe in die comedere, &
 omnigenis edulsijs uti, & obsonijs uarijs modis preparatis, uinūq; bibere du-
 plex aut triplex. Qui uero reuomit cibos aut aluos habent humectas, his om-
 nibz cōtrarium huiusmodi facere cōducit. Cæterū puerulos infantes per mul-
 tum tempus in aqua calida madefacere oportet, & uinū bibendum dare aquos-
 sum, & non penitus frigidū. Dandum est & id uinum quod minime uentrem
 eleuet ac inflat. Hæc autē facere oportet, ut & cōuulsionibus minus corripiantur,
 & maiores fiant, ac meliorē calorem adipiscantur. Mulieres porro siccioris
 modi diæta uti oportet. Nam et cibi sicciores ad muliebriū carniū molliciem
 cōmodiores sunt, & meraciores potus præstabiliores sunt ad uteros ac foetū
 nutrimenta. Qui exercitijs utitur, hyeme currere ac luctari debent. Aestate ue-
 ro luctari quidem parum, currere autem minime, sed multū deambulare secun-
 dum uentum ac frigus. Quicūq; ex cursibus fatigati fuerint, eos luctari oportet.
 Qui uero ex lucta fatigati sunt, eos currere expedit. Sic enim laborans, fatigata
 corporis parte uel maxime callieri cōponitq; ac recreari queat. Quoscūq; exerci-
 tjs

trijshabentes alui profiuua corripit, & recrementa ciboru speciem referentia ac cruda habent, his exercitiorum non minus q̄ tertiam partē detrahē oportet, & ciborum dimidiū factem exhibere. Palam est enim quod uentriculus cōfouere nō potest, quo ciboru multitudine cōcoquatur. Sint aut̄ his cibi, panis quāmaxime affatus in uino intritus, & potus quāmaxime parcissimi ac meracissimi, & deambulationibus à cibo ne utantur. Oportet autē sub hoc tempus semel duntaxat in die cibum fumere. Sic enim q̄ maxime cōcalefcit uētriculus, & ea quæ ingesta sunt exsuperauerit. Fit hic profiuuij alui modus maxime his corporib. quæ densam carnem habent, quum ad carniū esum homo cogitur, natura eius modi existente. Venæ enim densatae cibos ingestos nō suscipiunt. Est aut̄ hæc natura acuta, & in utraq̄ partem uertitur, & ad modicum tempus uiget bona habitudine in talibus corporib. At uero rariores ac hirsutiores corporu species ac habitus, tum carniū esum suscipiunt, tum labores magis tolerant, & bonæ habitudines ipsis fiunt diuturniores. Quicūq̄ postredie cibos eructant, & præcordia ipsis eleuatur, utpote cibus crudis & incoctis existentibus, his longiori quidem tēpore dormire cōducit, uerū & alijs laboribus corpora ipsoru cogere oportet. Vinum autē meracius & amplius bibant, & cibus paucioribus sub id tempus utantur. Palam est enim quod uentriculus præ imbecillitate ac frigiditate, ciboru multitudinē concoquere nō potest. Quoscūq̄ uero litis corripuerit, his & cibi & labores detrahendi sunt, & uinū bibant aquosum & frigidissimum. Quibuscūq̄ autem dolores sūt ex uisceribus, siue ex exercitijs, siue ex aliquo alio labore, his quiescere cōducit cibus abstinentes, portione autē utatur, quæ quāmaxime parcissime in corpus assumpta, plurimā urinam ducat, quo uenæ uisceribus insitæ nō distendantur repletae. Ex talibus enim tubercula oboriuntur, ac febres. Quibuscūq̄ uero morbi à cerebro sunt, corporis primum caput occupat, & frequenter mingit æger, & reliqua uelut in urinæ stillicidio perpetitur, atq̄ hæc sanè ad dies nouem patitur. Et si quidem erumpat per nares aut aures aqua siue mucus, à morbo liberatur, & urinæ stillicidiū sedatur. Mingit autem multum, & citra dolorem, idq̄ album, donec uiginti præterierint dies, & capitis dolor hominē relinquit. Intendenti autē oculos splendor occultatur. Porro uirum prudētem id secum reputare oportet, quod res preciosissima est sanitas, & proinde scire ut ex suo ipsius consilio in morbis utilitatem percipiat.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE GENITVRA, IANO CORNARIO

Medico Phisico interprete.

Hic à Galeno Polybisse perhibetur.

LEX quidem omnia corroborat. Verū genitura uiri prouenit ab omni humido, quod in corpore existit, ita ut id quod robustissimū est fecernatur. Argumētum autem eius, q̄ robustissimū fecernitur, hoc est: q̄ à Veneris usu pauca adeo remissa, imbecilles reddimur. Habet autē res hoc modo. Venæ & nerui ab omni corpore in pudendum uergūt, quibus dum aliquantulū terūt, & calefcūt ac implentur, uelut pru-

ritus incidit, & ex hoc toto corpori uoluptas ac caliditas accedit. Quū uero pu-
 dendum teritur, & homo mouetur, humidū in corpore calefcit, ac diffunditur,
 & à motu cōquassatur, ac spumescit: quemadmodū etiam alij humores omnes
 cōquassati spumescūt. Sic autē in homine ab humido spumescente, id quod ro-
 bustissimū est ac pinguisimū fecernitur, & ad medullam spinalem uenit. Ten-
 dunt enim in hanc ex omni corpore uia, & diffundūt ex cerebro in lūbos, ac in
 totū corpus, & in medullā: & ex ipsa medulla procedūt uia, ut & ad ipsam hu-
 midum perferatur, & ex ipsa fecedat. Postquā autē ad hanc medullam genitura
 peruenerit, procedit ad rhenes, hac enim uia rēdit per uenas: et si rhenes fuerint
 exulcerati, aliquādo etiā sanguis simul defertur: à rhenibus autē trāsit per medi-
 os testes in pudēdū. Procedit autē nō quā urina, uerū alia ipsi uia est illi cōtigua.
 Et sanē qui somnia ueneria habent, propterea per somnum geniturā effundūt,
 quum humidū in corpore diffusum & calfactū fuerit, & siue ex labore, siue alia
 quapiam re spumuerit, dum ab ipso fecernitur, coitus imaginē repræsentat. Ha-
 bet enim humiditas hæc similiter ut in coeuntibus. Sed non est mihi de his qui
 per somnū semē emittūt, & de toto morbo quid est, & quæ operatur, & quare
 coitus locū expleat, sermo. atq; hæc quidē de hoc dicta sufficiūt. Cæterū euu-
chi propterea non coeūt, quia genituræ trāsitus ipsis sublatus est. Est enim per
 ipsos testes uia eius, & nerui tenues ac crebri ex testibus in pudendū tendunt,
 quibus & eleuatur, & demittitur: atq; hi nerui in exsectione dum castrātur, res-
 scindūtur, quapropter nō sunt utiles eunuchi. Nam neruis ipsorū extritis, ge-
nituræ uia obrurata est. Callus enim obducitur testibus, & nerui duri ac torpē-
 tes à callo facti, pudendum neq; rēdere, neq; laxare possunt. Quibuscūq; uero
 iuxta aures uenæ sc̄tæ sunt, hi coeunt quidem & geniturā emittunt, uerū mos-
 dicam & debilē ac infocūdā. Nam plurima genituræ pars à capite iuxta aus-
 res in spinalem medullam procedit. Ipse autē transitus, cicatrice sectioni indu-
 ctā, cōsolidatus est. At uero pueris uenulæ tenues & repletæ existētes, genitu-
 ræ transitū impediunt, & pruritus ipsis non similiter accedit, & propterea neq;
 conquassatur in corpore humidū, ad genituræ secretionē. Quin & uirginibus
 quousq; iuuenulæ fuerint, menses non procedunt, propter eandem causam.
 Postquam autem adoleuerint & uirgo & puer, uenæ in pudendum pueri ten-
 dentes, itemq; uirginis in uterū, amplæ fiunt præ augmento, & oscula ipsarum
 aperiuntur, & uia ac transitus per angustias contingit, & humidum tunc eti-
 am agitationem habet, Nam spatiositas ipsi tūc ab agitatione ac cōquassatio-
 ne contingit: & puero sanē procedit genitura ubi plene puber fuerit ob hanc
 causam, itemq; uirgini menses. Atq; hæc mihi sic demonstrata sunt. Porro ge-
niturā dico à toto corpore fecerni, & à solidis, & à mollibus partibus, & ab hu-
 mido omni in toto corpore. Sunt autem humidi species quatuor, Sanguis, Bi-
 lis, Aqua, & Pituita. Tor enim species cōgenitas homo in seipso habet, & ab
 his morbi fiūt, aut etiam ex morbis discretionēs. Et hæc quidē dicta sunt à me,
 de genitura, unde fiat, & quomodo, & quare, & quibus genitura nō est, & quare
 non est, & de mensibus uirginū, & quod mulieribus incoitu, dum confri-
 tur ac teritur pudendum, & uteri mouētur, uelut pruritus in ipsos incidat, et q;
 reliquo corpori uoluptas ac caliditas accedat. Emittit autē & mulier à corpore
genituram, aliquādo in ipsum uterum, qui sanē inde humidus euadit: aliquādo
 foras.

foras, si uterus magis q̄ opportunū est hiarit. Et delectatur mulier ubi coire inceperit per omne tēpus, donec uir semen emiserit. Et si quidem appetit uiro commiseri, prius q̄ uir emittit, & de cætero nō similiter delectatur. Si uero nō appetit, simul cum uiro delectari desinit. & habet res hoc modo, quemadmodū si quis in feruētē aquam, alteram frigidam infundat, illa feruere cessat. Sic genitura uiri in uterū illapsa, caliditatem & uoluptatē mulieris extinguit. Exiit autem uoluptas & caliditas simul cū genitura in uteros illabente, deinde desinit. quemadmodū si quis in flammam uinū infundat, primū quidē contingit flammam exilire, & per modicū tempus augeri, ad uini infusionē, deinde desinere. Ita etiā mulieri caliditas exiit ad genituram uiri: deinde desinit. Cæterū multo minus delectatur fœmina q̄ uir in coitu, & uir etiā tempore lōgiore. Propterea autē quod uir magis delectatur, secernitur ipsi de repēte ab humido, fortiori turbatione ac agitatione q̄ mulieri. Habet autē & hæc res hoc modo. Mulieres si cum uiris coeant, magis sanæ sunt: si nō, minus. Nam & uteri simul humidi fiunt in cōmixtione: qui enim sicci sunt magis q̄ conuenit, fortiter cōtrahuntur, ubi uero fortiter cōtrahuntur, dolorem corpori afferūt: & simul coitus sanguinem calfaciens ac humectans, uiam faciliōrē mēstribus facit. Mēstribus autem non procedentibus, corpora fœminarū morbosa fiunt. Quapropter autē morbosa fiunt, in muliebribus morbis referetur. Et de his quidē hæc tenus. Postquā autem coiuit mulier, si quidem conceptura nō est intra seipsam, pro more foras procedet genitura ab utrisq̄, ubi fœmina uolet. Si uero cōceptura est, nō procedit foras, sed manet in utero genitura. Nam uteri susceptam & cōclusam in sese continent, osculo nimirū ipsorū præ humiditate cōtracto ac concluso, simulq̄ permiscetur, tum quæ à uiro uenit, tum quæ à muliere emissa est. Quod si fœmina partus perita sit, & cognouerit quādo genitura non exciderit, sed intus māsērit, sciet qua die intra seipsam cōcepit. Habet autē & hoc sic. Quādoq̄ quidē fortius est semē à muliere emissum, aliquando uero debilius. Similiter etiā quod uir emisit. Et est tum in uiro fœminē uitemq̄ masculū semen, tū itidem in muliere. Fortior autē masculus fœmina est. necesse igitur est ipsum à fortiore semine generari, habetq̄ res hoc modo. Si ab utrisq̄ semē fortius pdierit, masculus erit partus: si uero debile, fœmina nascetur. Vtrum autē multitudine ac copia præualuerit, iuxta illud ipsum partus nascetur. Si enim multo plus fuerit debilis seminis q̄ fortioris, superatur forte, & debili permixtū, in fœminā transit. Si uero plus fuerit fortis seminis q̄ debilis, superatur debile, & in marem transit. Quemadmodū si quis ceram & adipē misceat, & de adipe tamē plus coniciat, eaq̄ ad ignem liquefaciat, Quādiu quidē liquida fuerint, nō apparet utrū tandem horū superet, ubi uero cōgelata fuerint, tunc iam cōspicuum est, quod adeps ceram copia exuperat. Sic habet etiā masculi ac fœminę genitura. Quod uero & in fœmina, & in uiro, genitura fœminea sit ac mascula, ex manifestis factis cōiectare licet. Multæ enim mulieres iam fœminas pepererūt ex proprijs uiris, uerū ad alios uiros transgressæ, masculos genuerunt. Et uiri illi ipsi apud quos mulieres fœminas pepererūt, ad aliarū mulierum mixturā progressi, masculos genuerūt. & quibus masculus sexus gignebatur, alijs fœminis permixti fœminæ sobolem genuerūt. Atq̄ hæc sanè ratio declarat tum uirū, tum fœminā, & fœminā, & masculam geniturā habere. Nam apud quos uiros, fœminas

IS LIBER

in à copia debilioris, & gignebatur fe-
dāt, superabatur debilius, & gigneban-
tē uiro genitura fortis, sed neq̄ semper
uere res habet, ut minime mirandū sit,
n masculā & foemineā producere. Ha-
c mascula ratio eodē modo. Et in ipsa
ulinū, ab omni corpore, & à debilibus
sic in partū distribui. Et ex quacūq̄ cor-
rā, q̄ mulieris, partus ille magis similis
ueris plus uenerit, magis assimilabitur
nna matri simile esse, & patri nihil: aut
tē: sed utriq̄q̄ necesse est in aliquo simi-
emen in partum procedit. Vter autem
& à pluribus corporis regionibus, illi
ut filia nata maiori ex parte, magis simi-

angustior altera
 is sani & integri
 mutilatum, nume
 o ipsorum acci
 umidi, quæ na
 biliores autem,
 am mutantur,
 dibo autem rur-

ita sunt, ut cognoscatur quod geni-
t. Simul autē & à matre spirante, ge-
frigidū attraxerit ex aere in se ipsam,
urpote in calido existēs, & tunc fa-
tura inflata pelliculam acquirit. Cir-
osam est, continuumq; euadit, urpo-
e dum torretur, tenue quiddam pel-
at. Calefcens enim panis & inflatus
icula: species excitatur et cōsistit. Ge-
icula forinsecus circūdat. Verum
extra ac intrō fit per pelliculā, & hac
paucissimū quid de genitura inest.
licula. Atqui geniturā quæ sex dies
se uidi, & qualis tū animo meo ob-
ram facio. Vt uero ego uiderim ge-

est, ex descēdente à matre
 nem umbilicus distat, per
 uero mulier quum uterum
 ler, quòd sanguis non con
 ed procedit senfim & mo
 inest intus in utero auge
 nel per mensem, quòd ge
 ut uires, tum ipsa, tum spi
 & sanguis modicus à ma
 magis sanguinē trahit, &
 stantibus, ubi menses non
 em sanguis in corpore sin

Arterio

ninent in carne, ac perforatur. & oca
conspicuū fit utrum tandem fit: & ut
partibus spirationem facit, tum ore,
ā inflata supernè, per umbilicū spiri-
ā uia fit à uentre ac intestinis foras, &
iritu coartculantur, Nam inflata dia-
rim si uelis fistulam uescicæ alligare, &
harenam, & plumbi tenuia ramenta,
rimū quidem illa aquæ permiscetur,
cedet, & abibit plumbum ad plum-
si quis ipsa areferi permittat, & dife-
ad simile progressum esse. Sic sanè es
quodq; in ipsa simile ad simile abit,
iam est puer, & ad hoc peruenit foe-
bus ut ipse sciret, qui est esse puer.

produxi ut ostenderem
igit, in foemella, in quadra
ento est purgatio à partu,
masculo in triginta, ut tar.
iisdem uerbis, maioris lu.
quod geniturae in utero
si foemineam geniturā ha
ticularunt puerorū mem
masculo rursus iuxta ra
am alterum testimonium
in uteros illapfa est, pau
piofior. Siem accuatiō

m pili posterius nascuntur, uelut in
Simul enim ut genitura prodit, etiã
r magis q̄ priori tẽpore. Nam dum
procedit per ipsas genitura, eadem
ia fit & geniture, & mens truis uirgi
n uirginis, rara nimirũ cuticula red
alimentum habet, & non pauciorẽ.
m fit cuticula, procedẽte in ipsam de
imulq; interiecto tẽpore, pilus mo
tunc maxime, quum tempus con
bitu, ad mentũ à pectore distans. Si
alæ partibus pili enascuntur: si quis
re, eamq; sanare, cutis densa reddita
uero Eunuchi dum pueri sunt fiũt,

quod ab uteris, pinguitudo
uenit, citius percipit eius
penuria si non aegrotent, ab
uter autem & mulier. Et a pin-
guitudine caliditate, quae ab utero
quoque parum uenit, per
uenulae haec, & cōsimiles
ululum fruitur, Mammae
mulier principio motus
in res habet. Dum mammae
sunt, ampliores autem
distribuant. Nam & uir si
in ducit. Habet autem

LIBER

tū habet, quæ uero pars supra ter
cōdenſans in inferna plantæ par
in partē erūpit, & ex ipſo radices
receptus fuerit, tūc iam ex radice
ſmittit: & tunc ſanè rurfus ſuper
i ex ui in plāta leue ineſt, id ipſum
n in ſupernā partem augmentum
tingit circa germinationē, in his
ueniūt. Ex ſemine enim prius fo
tem demittūtur. Verū arbor pri
rea q̄ in ſemine ipſo humoris co
ineſt primū folio ſufficiens, unde
non ſic fit. Non enim gignitur ex
ſed ipſe ramus eſt, & uelut arbor
Quare quū ſupra terrā exiſtat, hu

51
tat. pauciora aqua ex ipsa
tae omnia in hoc dicta a
hyeme, q̄ astate. Nunc
ra pars esse uidetur. Ter
nente, & ab ipsa humidis
aquam plus aut minus,
c. se habere, unde comie
nibus ac nebulis spiritus
ens & continua. Et tunc
aqua in decliue fluit, pro
exhalat. Qui uero exha
em terræ inducit, & ipsa
dū si quis aquam in utre

cōseruatio cōtingit. Quemadmo-
dum cōcoquuntur cāfaciūt, perfrige-
re cōtrariū rependi oportet, ex in-
ferna arbor & in supernam, & in infer-
nam & superna ipsi accedit. Et quan-
do fructum nō producit. Nō enim est
quod conferre possit. Progressu autem
massam influxionē ex terra in ipsam
facit utpote leuem existentē, in ex-
tra quidem humiditatē à fructu solauit
dulcat. At uero arbores nō fructife-
quantū eius in fructū est expenden-
tē solida facta fuerit, & ex inferna par-
te accipere definit. Quicunq; uero in-
ferna sunt, et arbores in arboribus enatae ui-

quæ de puero dicta sunt,
Atqui si quis nōdum uis
hæc sic habēt, & sic à me
ar, tūc puero se mouēt;
um internā rumpi contin
, & rumpitur primū qui
m autē ruptæ fuerint pel
procedit, Nec enim ant
s puerum continere poss
Cohærēt enim pelliculæ
ui ualida ac multa. Quan
i, utpote teneros existens
diert. Grauisimæ enim

LIBER

num uero cōtingit tales mulieres
tunt. Sicciores enim sunt, & dens
quod uidelicet deficiente alimento
io ipsi accidat, etiam hoc testimo
ur, hoc modo. Incubāte matre ouū
r, calefcens autem id quod in ouo
ere per ouū attrahit. Ouum enim
ficiētē ei quod intus est transmit
tur modo eodem ac cōsimili uelut
. Nascitur autem ex luteo ouū uos
ex albo, quod in ouo est. atq; hoc
um aduerterunt. Vbi autem defi
ciens unde uiuat, fortiter mouetur
ala circum dirūpuntur, & ubi ma
men ex calpēs ipsum excludit. atq;

& uolucres: *Ab itaque*
 & uteri geniturā *si*
tenit, segregata genitura
 modo quo unus foetus,
 oitu gemelli gignantur,
 ia, quae ab uno coitu pa-
 in sinu ac pellicula exi-
 ie ut plurimum pariunt:
 in sinu & pellicula est;
 it, & pellicula ipsius siue
 eneratur, hoc causae es-
 ingulis & debilior, & for-

LIBER

uit, id ipsum per multum tempus
ranū. Quae uero glutinosiora fue-
exuri nō potuerunt, neq; uero li-
lijs acceperunt, & nervi solidi fa-
erat. Verū uenae frigiditatis mul-
cū circa glutinosissimum erat, à ca-
o quod erat, à calido superatum,
eandem autem rationē etiam fau-
na in podicē usq; caua facta sunt.
ū eius circumcirca glutinosum es-
est. Quod uero intra frigidū erat,
nim erat in ipso neq; pingue, neq;
iam uesica. Multum frigidū quod
lissolurum est, & euasit in quidam,
esset: quod uero supererat, tunica

Sed & supra cor ad cere
caput aſcēdit, & in tem
ima uena dicit, Verum
m corpus fiſſa ſunt, ca
infra cor uſq; ad coxena
opterea ſpiritum cor ha
alidiſſimū exiſtar. Pro
or & uenæ cauæ ſemper
a ſpiritum cor trahit, ex
etiam aliter cognoſci. Si
inſpirat, flamma moue
ccenſa & ardens, eodem
illo mouente, quæ ſub

LIBER

utquam uero refrigeratus est, tum
a fit & membrana, & si quis hac pel-
liculam factam uidebit, si uero quis
gido generatur. Ceterum ea gratia
poris ad aerem conuersum, neces-
sariis imperentibus. At uero articuli sic
quidem ex ipsis pingua erant,
superius dictum est superiore sermone,
sum exuri non poterat, sed medio-
rum in ueruos, & saliuam ac mucum.
simum erat, hoc calfactum crassius.
salua facta est. uerum ex illo gluti-
bus & articulis semper liquidissis
ur, & a calido siccatum ac arefactum,
erius generantur ex hac causa. Ex

mentū uenit, utpote gusti
pinguitudinis nihil inest.
ter. Fortassis autē mirabi
libusdam in toto corpore
in corpore glutinosum est,
oramina aurium ad os du
psum os est cauitas antros
um resonat per durum. Pel
nei tela, & omniū pellicula
axime resonat, multa signa
us. Et sunt quidam qui de
sonū edit, hoc autem fieri
re fuerit in cū in f

T I S L I B E R

ut, occurrens in faucibus, obturāsc̄q; ac
ius facit. Si autem lingua semper occur
are differere, sed singula à natura unam
i ex natiuitate differere nō possunt, sed
nis spiritū efflans sermonē proferre co
nines ubi uoluerint magnā uocem ede
foras propellunt, & magnam uocem es
ox cōtabescit. Sed & citharædi, quum
tū quàm plurimum intrō trahētes pro
ac uocem magnā edunt, prout spiritus
nūt. Ex quibus manifestum est q̄ spiri
uosdam qui sibi ipsi manu illata guttur
dem, uerum nullam uocem edunt, nisi
nem proferūt. Manifestum uero & hoc
trahere intrō in cavitates non possunt,

ad dimidia, aut unius, in
& tertij generis in undecim
in duabus hebdomadis.
& dimidia hebdomadis. At
tūciani possit, quanto tēpore
etiam ulcera magna in capi
ūt, in septem autem inflam
deuiginti. Si quis autē dili
tēpore nō sedentur, homi
ri queat, q̄ septimebris puer
idem frequenter. Si quis autē
quæ parietibus adsunt, & ex
entem annis neceritis de

locis & pelliculis quæ ipsos aluerunt,
& tranſumunt etiam per matrem labo-
rabilis conuulſus, dolores matris in-
ſolitus, grauior redditur. Multæ uero
ſunt, quædam etiam pereunt unâ cum
ſunt ac inquinantur. Aiunt au-
tem, recte id dicentes. Eſt autem octa-
ua, accedit à ſeptimo meſe, & à nono,
neque dicunt, neque cognoscunt mulieres,
modo fiunt, ſed aliquando à ſeptimo
meſe, aliquando à nono. Tunc enim fieri ne-
que concipere, tum meſe, tum tempo-
re eſt, ſecundum hunc enim cõtingit, ut iu-
ſus etiam in undecimo meſe, menſis eſt,
mulieribus de partibus fidem derogare

peruenit, & in hoc men-
on minus hi quàm, septime
a crassitudine habet, quam
tolerauerunt, ut tenues eua-
tem mēsum fuerit in exitu.
bis, qui octimestribus acci-
cūtur, decimestres appella-
plurimū à uulgarium pue-
ta agrotantes diebus, cir-
dictionibus octimestrium,
nē enim temporis, etiā ma-
progreſsis, & nō uelut se-
ualā habentes, ut curitate

LIBER

enescat, propter corporum imbe-
narius est, in quo circa octauū men-
orū sermo institutus est. Tertius
si, si effugerint quadraginta dies,
& splendores clarius uident, & stre-
tanquā incrementum habeat hoc
ex corpore elucescentē. Peculiarem
est, in prima sanē die. Nam in som-
re uidentur. Vigilantes quoq; sua
quadraginta dies trāscant. Nō ridet
quā hoc ipsum tempus transeat. he-
s etiam per fatum sit forte designa-
a existētia quæ naturā ex hōdem ha-
habeant. Declaratur autem in fir-

83
in uentre liberati, & crassa
ex augmento, sed laxo tu
mor non refidat citius quam
cuiusdam alimenta ac respiratio
fit, per os & per nares in
ciunt, & ea etiam non super
praestant ingestorum copia,
est, alia quidem per os &
ferre transire, antea nul
ous, & humoribus ita co
c beniuolentiam habuisse,
, & minus mansuetis, ut
s: quandoquidem etiam uiris

COI LIBER

E IANO CORNA

interprete.

er, si primum puerū in medio uteri
abitur, à primo ac ueteri expulſa. Si
erfectionē habuerit, poſterius ipſa
talem, nimirum uitalitate ubi ute
fuerit exſoluta. Si uero non ſtatim
lores exhibet, & fluxum foetidum,
neſcit, tibiaeque ac pedes, & ſi pereat,
tant autē mulieres, quarum ſtoma
non clauditur ita ualde, idque appa
ſuperfectiones quae poſterius in

67
p̄tis lātera confringere;
cilius exeat nō tumidū
quidē ad fœtum appē
nerādo destinata, lasa
lla, uel simile quiddam,
trahat. Senfim aut̄ hoc fa
mmationē inducat. Sub
tas foeni oportet, quo
ros aqua plenos suppo
t, deinde utrunq; utrem
ē aqua, utres remittunt
atrahit, umbilicus ue
quiddā puerpera federe
Si uero adeo debilis est

sa appareat, & habeat aures albas, &
a ipsa mortuos gestat quos pariet, aut
ipote morbosos, aut prius peperit nō
terius est. Oportet igitur tali post par-
medere ipsam ac bibere odorata. & pri-
adit, ac colorem recipit. Si qua præ-
ones, eaq; edit, in capite pueri ubi na-
Mulierem id nosse expedit, utra mam-
Similiter autē & oculum cōsiderabit.
intra palpebram, etiā eius partis cus-
fitis in uulvam nō ualde fortibus, do-
uentiū corripit, & membris tendatur,
q; eam quæ nihil tale patiatur. Mu-
uis, & pituita repleta, nō concipit hoc

E 69
pharmacis appositis
libretur, deinde modicū
modico: fit aut̄ uelut di
line formata quantā ute
ri, & impellatur quo in
dicamētum, specillū ex
re potes, Similiterq; co
quā plurima, & sulphij
ositiūm pharmacū per
it, copia quātam uterus
postquā autem ex mole
pparitionē ubi sicca fue
aut post partum, aut ex
nica, uelut in tuberculo

T I S L I B E R

inhibito si suscipere potest, donec recte
in mollitorio quopiā diluto, aut etiā li
illa ipsa retro caua facienda sunt, deins
ipsis utendū. Cæterū hoc tēpore bibat
mo decoctam tædam q̄ pinguisimam,
cōtusum, & cumini Aethiopici semē,
opia quāta moderata esse uidebitur, tot
dat carulos coctos, & polypum in uino
& brasicā coctam, Vinū autem album
er diem lauet. A cibus autē hoc tempore
ocesserit per stomachum, & quid purga
ne bibēdum est unum atq; alterū diem,
dum ut uteri apposititijs medicamentis
to, ac magno & sano existēte, ac probe
rtet sito. mēses nō apparuerint ex toto,

alkia, styracē, adipem suil
Sic quidem igitur hians
s oportet, sandaracham
cydamini succum, Tha
quæ peplos appellatur,
sylvestrem, calaminthas
ernam partem.

io fortis purgatio fiat.
i, rosaceum, hæc trita ac
succum, acuinū dulce al
m, mel, fordida lana ex
thuris nucleos quinq;
uetq; bis per diem.
æ purgatione. Sive iā

IS LIBER

irum, cantharidas, adipem, sandarac
ine.
, multū & febricitat, & dolet, & sinit,
espiscit: uterus mouetur, & quū ad ui
ū accedit. ubi uero sedatur uterus, &
is, hepialon græci dicunt, tenet, Huic
re oportet, & suffitū facere in ipsa pu
ra collo desideat, & fumum admittat.
e faba, & thuris dupla portione, ame
ebet, & in ignem immittere maxime

subdititium.
a inuolutū subdat. Aliud. Artes
m, apponendam præbe.

tricitate sua elabatur. De
ta iuncturam eximē, post
nta. foetū uero ipsum in
uiculam adactō, quo flas
facilior exitus pateat. Ca
minus, confringe: atq; sic
oleo illitam decūbere ius
um dulce, album, mēraci
ixta, in potu præbeatūr.
elata sunt. Quum uero pa
l contingit dum uertitur
foetus impedit, & caput
s prominēt, quod ipsum
exerta est, ut plurimū uis
licum erigatur. uis ut

C O I L I B E R

IANO CORNAS

o interprete.

, non pro carnositate ratione etiam
& multum lactis trahentes, nō pro
ri fugētes si multum mingant, mini
us aluus multū profluit, & bene con
it. Quibus modice profluit, & uorae
ne similiter nutriūtur, morbosi. Qui
omitur, his aluus suppressitur. Qui
minus conuelluntur, q̄ quibus parū.
parū conuelluntur. Quicunq; den
urūtur, periculum est ne cōuulsione
quis similibus existētibus, melius li

ortum faciens, in summi
 posita confimilibus rotū
 tibus. Ipse autē pulmo
 cōuersus, quinque apices
 ocāt, cinereo colore præ
 s, naturaq̄ antrosus exci
 r fitū est, rotūdius ac ob
 l hepar multa chartilagi
 , per quā totū corpus nu
 bus alijs habet, uerū fan
 eme cor. 115.

IS LIBER

si latere pōssit per rimam illapsū. Oculi
siue minor lingua appellata, ne per
penetrare. Signum autem huius rei
ore, aut rubrica temperatā, sitienti uale
im pecus nō est. curiosum, neq; mūdi
guttur refecet, hoc colore ipsum tins
rurgiae aggressio. Nequaquā igitur fi
tōd homini in guttur uergat. Sed quo
ac rufissimā multam exhibet: propterea
Quod enim per rimam illabitur, tanq̄
instat, sed leuem ac lubricam quādam
humorē cor de pulmone unā cū acre
am celsis, necessario oportet retrō per
ū humorē partim in culeū ac uaginam
foras propellit. Quapropter etiam pa

per ipsos spiritum appre
 oruideas ex toto uentila
 ntrahi. Et propter hoc es
 in finistrum uentriculū,
 & incrementū capit. Os
 mina perfrigerari. Est es
 non acceperūt amplum
 entur. Restant dicēda
 e. Sunt enim & alia quæ
 tentæ, quæ undiquaque
 ferūt. Hæ mihi nerui ipsi
 e, est autem ipsarum par
 natae sunt, rotundæ in sum
 sunt admiratur, quomo

vide gale 6^o de ff 20
 ubi habet ag.

COI LIBER

NO CORNARIO

interprete.

tota natura sic habet. Natura ipsis est
arae & pingues, & neq; carnes sunt
neque aliud quid simile corpori, Sed
multas habent. Si uero diffece, fan-
ecie albus & uelut pituita. Tangenti
rent. Et si multa uel ipsas diginis com-
morem oleosum remittit, qui & ipse
Aegrotant autem non ualde, sed unà
io morbo aegrotant: nam parum etiā
tubercula sunt, & strumæ resultant,

scendere conatur, sed per
men, Violar autem & in
non finit. Glandulae
& pascitur humectate
ero ex uasis in omentum
tem in glandulas distri
Nam & hi multa humidi
aliae glandulae existunt.
erfluit infra in uescam.
Ise trahunt. Sed & a
on uolo hunc sermonem:
momēti sunt gratia, hoc
sum faciam, & dicam de
arte hinc et hinc glandu

S LIBER

im est cerebrum, & in amplo spa
& minores, & maiores, quàm alia
poris partes redundantiam ac fu
rò de capite usq; ad secretionē con
ulos, per nares, atq; hæ tres sunt, &
a peruenas in medullam spinalem,
o existunt, hæ fluxiones cerebri for
q; discesserint, morbus ipsi inde ob
rbi accedūt, si intro abierint ac dis
us turbatio multa oboritur, si hian
xionē cerebrum demittat, quæ in
od cerebro influit copiosum fuerit,
rudinē influentis exhauserit atq; sic
cipiens, ac semper in consumū itatu
acit. Ambo autem magno tædio ac

& agrotat cerebrū, & alia
us corporis hic contingit,
tur, & attollitur ac lac faci-
lac mulieres, uiri uero nō
ra, quemadmodū etiam re-
trahunt, in lac permutant.
ero cessurum est in alimen-
nētum, ad superas partes
gustia, & corporis in super-
ar. Mas enim plenus est, &
femina uero rara & laxa,
humiditatem nō remittit
is quid eius susceperit, quū
corpus ipsius corroborat,

LIBER

ta uero magno uerticulo, quod iu-
o ac neruofo adhaeret. Spina uero
a est, & uefica, & genitura, & recti
uero usq; quo ad septum transuer-
usculi lumbaris hac parte existunt.
supra supernas humeri partes est,
ur quam est. Nam posteriores of-
Cervicis autē articulus repāduus est.
sunt: ab externis autem cartilagi-
uero ipsorū in posteriore medullae
exortū acutum habent, qui appen-
ū propago prona fertur: quemad-
adnascuntur, costarū ac spinā me-
nations uerticulorū, neruo anne-
us. Ab anteriore autem parte, iuxta

neris de spina. Arteria
 fuerum, hepar, splenem,
 m. Altera autem ex corde
 iuxta aures, humeros, dor-
 sas ad cubitū, ad summam
 manū, ad coxendicē, in pu-
 brachia, partim in carnes,
 tribus in alios digitos. Alij
 do uero ad princeps inte-
 emur, partim infra ad ge-
 n. pedes. alius ad fibulam,
 arā maxime funditur, par-
 perforatæ sunt in rhenes.
 n ipsi uentriculos habent.

DE VITIS LIBER

infeūtes. At uero uenæ crassæ sic hæ :
um, iuxta pulmonē sub pectore, altera :
dextrā transit, & quæ quidem ex sinis :
lum descendit, Quæ uero ex dextra, in :
ofculū est ipsum pudendum. A dextra :
& in crus descendit, & rursus à sinistra :
ro uenam suscipit, itemq; testiculus. In :
tro. Crassissimæ porro uenæ in hūc :
at in corpore, & aliqua quidē ex ipsis, :
am ab utraq; parte ad coxendices per :
alleolorū partes externas, ac in pedes :
ones in doloribus in dorso, ac in coxer :
orinsecus. Alteræ uero uenæ ex ca :
id est iugulares appellatæ, intrinsecus :

85.
... ubi hepatitis eleuata est.
... fida fit, & altera pars hinc,
... uero recta à corde ad clauic
... modū & ea quæ iuxta lum
... tras, & extremitatē, partiat
... m trāuerfum. Septum au
... parari possit. Duplices au
... ectus ad pubē ac pectinem
... ro trāuerfum iuxta uertē
... rgit, Arteriæ uero ex rhenē
... Et hac parte in recurrente à
... ptum trāuerfum maximæ
... uisidæ aut per septum sunt.

S LIBER

apulas germina emittit sub mamas
inter se uenularū, & per humeralem
subter subattingens ad brachiū ten
tem ipsa finditur circa humerum, &
utrunq; penetrās, postea manus iun
num uarie uagans radices agit.
in sparsa, per dorsum, & iugulum, ac
magnā multorū osculorum in corde
um facit, quæ sanè arteria appellatur,
ac multi spiritus existēs. Propter spa
locis per pulmonē deriuatur, cætera
ter sanè etiā si quid in has uias pul
a, uel in spiritus ac sanguinis trāsitu,
re spongiformi, ac multū humorem

do, demissas ad spinam ue
ipfas coactas, omnia in su
poris partibus in hac, ue
illa hac colligitur. Volu
igitur soleat reliquo tem
& calfacta & femine deor
piricus autē in ipsa, existēs,
cōcitatio, nullationē in
n & iugulum iuxta spinam
per carnes alternatim con
ipsa autē iuxta coxē dicem
atibus uero iuxta acetabul
e femōri respīrationē exhi

S LIBER

crassitudine hepatis, ubi fel in fistulam
septum transversum itinere facto.
reliquis quidem iuxta eandem natu
Verū ex sinistris emergens in hepar
ta caput quod in crassitudine ipsius
subit, ipsasq; uenulis sanguinolentis
corus ex omento eleuatur, uenulis ex
Quæ uero à capite splenis ad spinam
ant. Inde uero sursum & dextra & si
ut sanguine plenæ sunt, sub ipsum &
anguinis & tenues à pulmone intrinse
utpote ab ipso emulctæ, in cor frenan
ternas diffuūt. Ingerunt aut & prio
s sitū est, uelut ex omni corpore habe

pernas. Et si quis minimā
corpus affectionē sentiet,
corporis pars omnia ha-
minima pars pertulerit, ad
bonū siue malū id. fue-
rima gēte, quia in minima
cula transferunt, & omnia
sermonis in arte medica,
acua circū circa aures, non
tē per membranā in cere-
tā foramē solum per mem-
ō inest foramen, uerū mol-
stantiam audit q̄ olfacit, *et sic huc de hō*

ias intus fertur ad malleolos. Hæ & :
ectæ, & in magnos digitos definūt. :
in finistrā manum, fertur autē subter :
le splen propagatur. per omentū, & :
iuxta septum, & cū humerali cōmit :
gratia fecatur. Alia etiam ad des :
itur. Cōmunicant autem omnes ues :
dem sibijpsis per se committūt ac :
extentas. Quæ autē carnes nutriunt, :
orbis à uenis oritur leuior est q̄ qui à :
uenis inest, & nō quiescit. Et natura :
t ficci sunt, & uentriculos siue cauita :
ima ex parte ab ossibus nutriuntur. :
ur inter ossa ac carnē medium habēt. :

FINIS
91
sis. intus in cubito comi-
ces uero hac parte teneri
ma autē & interna cū ossi-
os multos habent. Quae
s faciūt. Digni articu-
in medio unguis & nodo
parte etiā digitos confle-
At uero in coxedicibus ar-
a in hos inarticulata sunt.
ra intus, altera foris, & in
d os ad femur inferuntur.
di est huiuscemodi bicipi-
nmitate rotundū est acles

S L I B E R

cum quò tandem contigerit, donec. :
ter gracilitatē. Quum autem corpus :
sibi ipsi cōmunicans sit, etiā quum :
sicunq; humor tandē obrigerit: duce :
pore uacuo & non intumescēte, præ :
artes siccae fiunt, superna: uero humi- :
Venæ enim plures supra sunt quàm :
tē opus habent. Duci itaq; sicca cor- :
transitus magis ducenti patent, q̄ ei :
cci existentes, eam sibi lucrifaciūt, & :
ere solent, si uel modica quædā neces- :
septem sunt, in nares, in aures, in oca :
conspiciæ existunt. Postquā autem :
Magis autē in thoracem præ frigore

si fuerit, nō amplius dolo-
ratura calidū, tepidum fa-
rbita medica affigenda, si hinc longi sic for
m. nō autem scarificando hinc si contenti
si uero per hęc dolor non
medicamentū potandum
atem non, quādoquidem
st, et semper nō sanantem
malū, ad cōterarium te cor-
quæ adhibetur auferre os
uero iam in fistulam reda-
uolens sit, sic facere oportet
to imbue, & in aurem cō-

S L I B E R

oculi magis splendentes sunt, &
in uisum, in humorem purum cruen
intra oculū non rotundus esse appa
tus humor, id ipsum nō apparet. huic
ante oculos aliqua moueri ipsi uiden
um premētes exurere oportet, quæ ui
mpora cōsistunt; & ubi has obturaue
rbe, & lachrymā q̄ plurimā prolecta,
orbū facit, eluatur. Si uero oculus rū
tendū est, ut ulcus adftrictū in angu
adhuc humorib. plenus fuerit, lachry
a in thoracē fluxerit, & bilis fuerit, ex
dinē occupat, & clauiculam eiusdem
ballida ac uiridis fit, & excreat compa

NE 95
in enim id quod influit, &
ntim influit ac detinetur,
ore quum angusta fora
t, & talem spiritū habere
Et in pulmone uelut non
um uero multum de capi
ft quod in ipsum influit,
latis sunt, ubi corpus hu
um, ex suppuratis tabidi,
rudinē à principio dolor
similiter habet, & tussis
erupit pus, in lateris mol
Si uero horū nihil adfit,

S L I B E R

ere oportet, pluribus cibis & salis ac
& quā sic habet tussis inducenda.
qua attinet curabis, præterquā quod
onia nō plura cō cibaria frumētacea,
, ut ne calfaciat, & corpori debili exi
calfaciant in eodem tempore, & calī
porro per gulam fluxus in uentrem
ciam superne. Huic si quidē in uen
medicamento aut succo, deinde phar
subducentibus, donec dolor perseue
ib, utatur. Eodē modo ubi morbus
ilis fuerit, & præ imbecillitate hæc ofe
succo per clysterē infuso, alius eluen
ex adstringentiū numero. Quum

pituitofissima offerens
 tenuissimæ, & quæ maxima
 umbilicū, & unā in um
 bus periculosissimus fit, in
 es: sin minus, quod etiam
 n puero hydropem sic cus
 sunt i capello, & frequen
 tibus corporis partibus, &
 luxeris calfactorio medica
 ū pulmo ualde exsiccatu
 xistens, ubi amplius quid
 es redditus, & ad latus præ
 trigerit ipsum humidū exi
 tationem subfinit. T

ma hydrop.
plurimū vicia.

neq̄ euacuatiuū, neq̄ uo
me, aut superne, difficili
pori facta impellitur. Si
e uiolatur. Quū suce
itis enī euacuationē se
ebilis fuerit qui hęc pati
danguis quū morbū facit,
morbū si quis non cogno
leuior inde fiat, demōstra
ero nō leuior reddatur, sed
gracilem facere, tumidū fa
o utaris. Si quis in mor
bili autē morbo, tunc quis
utendū est. Nā etiā si quid

erfluente fluxū humectatur. At si
urito. Si uero non cesset, ad hæc su-
is fluxus auertatur. Diductum enim
eruatum. Doloris in capite gra-
non sedetur, & diuturnus sit, peru-
urgaueris, magis affliges. Medis
osterea quod impossibile est statam ac
gratia, Qui scribere didicit, iuxta us
& sciētes omnes similiter nouerunt,
& nunc, & non nunc, non potest fie-
st, & non opus habet occasione.

tem facit, & ad eundem cōtraria facit,
num alium subducentia non semper
ue faciunt. Fortassis autem nec sic se
ostentibus cōtraria. Resistens enim

antibus sedantur, & à sedan
bibendā dare uelit, eluen
lem per uomitū uomitus
ferne procedere ipsi fecit,
rarijs modis homo sanus
ta medicina effer. Ita alia
à qua causa fiant; alia uero
uius aut rei causa corporis
ualiter nutritur, à corpore
ipsum ingestū est, aut alia
t cibi. Et quū sanè supera
facit, & superat hæc simul
nec quidē corpus superat

quæ in calidis attenuantur, Veter enim
& quæcûq; ex talibus plurimū par
tibus, sed sistentia sunt, quæ flatum exhi
bent: & quæ adstringunt, & quæ à calo
re Omnia aut quæ foris extenuant, intra
ventrem autem & uentrē sistentia, & pi
tuita aluum subducūt ac extenuant, cū
etiam acida pituitosa sunt. Om
nia sunt, talia aluum subducūt, Item quæ
in nō aluum subducētia fuerint, calida
si assumpta, & cito secessum faciunt.
Ex his quæcûq; repletio
em uero plurima assumpta repletionem
faciunt: mihi iam tota inuenta esse uide

facti fuerint, coxæ dices cōp
guen, & uelut pilæ in uen
ofius parte, modo rotum,
unt. Si quidem descen
ueolentiū genere, aut ce
quo alio ex grauior et ma
adhibeto, neq; cibo neq;
ato. Si autē sursum ascen
ne olentibus, & quæ si
aut aliud quoddā odora
tris, fomentū autē ex infer
ci entibus uteris. Ex hoc
progreffa auerfa nō fue

COI LIBER

OCIS, IANO COR

co interprete.

edicā integre adsequi uelit, primū
i rationē habere debet, quantum po
ualeat: nō enim simile quicquam in
unt inuicē propter uarias quæ in eis
de uentorum calidorū & frigidō
omnibus hominibus sunt cōmunes,
& regione sunt indigenæ & proprij.
um facultates cognoscēdas exhibere
erūt, & pondere ac statione, sic quoq;
uis ad urbem sibi incognitam perue

ate quidem calida, hyeme
, & ad uentos, & aquis bo
iuntur. Quae uero aquis pa
ad uentos, & ad solem, ha
r morbi. Si uero pluuiofa
ccasione oboriri uerifimile
ita humida ac pituitosa ha
pituita à capite influente: &
ad edendū ac bibendū non
erint boni potores. Crapu
sunt. Primū quidem mulie
multa steriles sunt ex mor
acidū conuulsiones ac an
ur. Viris autē dyfenteria.

*2. hinc est 3
immo in 104*

S LIBER

fiunt. Præ uolentia enim ruptiones
es in testibus fiunt, quâdiu parui fue
tubescunt autē serò in hac ciuitate. Et
ibus ad hos sitis, hoc modo uelut di
rates sitæ sunt inter æstiuos ac hyber
urū, de his ita habet. Quæ quidem ad
alubriores his quæ ad septentrionem
os sitæ sunt, etiã si stadiū solum in
tas ac frigiditas. deinde aquas quæ ad
esse est, & odoratas, & molles, & ama
es ac illustrans ipsas castigat. Martius
per occupat. Et hominū formæ boni
lius morbus prohibeat. Et clara uoce
igentia præstantiores septentriona
meliora existit. Et ciuitas quæ hoc

hydropes plurimi ac letis
roflua incidit, & febres
uturas ad hydropas dedu
dyeme uero iuniorib. qui
uero, febres ardētes. pro
ūtur, & pituita alba, & uix
gnos ac tumidos. deinde
atio cōmoda post partum
nt, & uiris uarices, & ulce
eue fint, fed ante temporis
re putāt, & ubi partustem
oc autē contingit ex aqua,
dem aquas ad omnem tem
rum fontes è petris fcau

T I S L I B E R

pluvialibus autē, & quæ à niue fiunt,
pluviales leuissimæ & dulcissimæ, &
nimium enim sol quod tenuissimum ac leuissimum
clarum aut hoc, ipsum mare facit. Quod
inuidine ac grauitate, et fit mare. Quod
leuitate. Rapit autē tale non solum ab
aëre, & ex omnibus in quibus aliquid hu-
moris. Et ex ipsis hominibus tenuissimum
proximum signum inde sumere licet, ubi ho-
mo sederit. Quascūq; enim corporis pars
quicquid comparet sudoris sursum rasi-
tut sub aliqua alia re, hæc exudant. Edu-
catur autē ex tegmentis, ut ne disperda-
uerit, totum corpus similiter sudore pers-
udat. Propter etiā ex omnibus aquis hæc ci-

& de magnis fluminibus, in
multa ac omnis generis de-
tingo, & nō breui locorū in-
ta similibus sit alij. Sed alia: dul-
unt. Vbi uero haec simul in-
per superat. Præualet autē
ij quidē Boreas robur exhi-
Tribus igitur necesse est li-
entur, morbi prædicti fiunt.
Quorū quidem alius fatis
hus uesicæ ualde coarctat,
regatur. Quorū uero alius
m idem perpeti. Quū enim
ius inflammatur. Vbi uero

de uentis

dysenterias par est fieri & mulieribus,
cranis exortum accedat aqua ac tempe
onis, & ut autumnus salubris fiat. Sin
eres moriatur: Minime uero fenes: &
finat, & ex quartanis in hydropas. Si
lemens, uer autē boreale & siccum &
qua: uterum gestant, & partus ipsis ad
st. Quae uero etiam pepererint, impo
aut statim pereant, aut tenues & debi
mulieribus, reliquis uero dysenterias &
nes à capite in pulmonē. Pituitosis igi
mulieribus, pituita de cerebro defluente,
lippitudines ficcas, propter carnis ca
us defluxiones, propter raritatē ac eli
ē decedente pereant, aliqui uero femi

LOCIS

111

circa hæc quidem sicut dixi
quantum differant inter se
in unice simile habeat. Verum
ceret sermo, quare de maxi
quantum saltem mihi in ea re est
b Europa secundum naturas

enim pulchriora & maiora
multo maiuor, sunt etiam
uero horum est temporum ari
tu sita est ad aurora, à frigid
& benignitate inde pro
lens & cogēs uolenter, sed
ubiq; per omnē Asiam om

*res sic sim
sin qm*

s referā quomodo habeāt. Ac primū
 ino alia gens sit, quę similia capita ha
 fa fuit, ut tam lōgis capitibus essent.
 iravit, Si quidē generosissimū apud
 quū: cōsuetudinis autē hoc initū fuit.
 dhuc tenerū ac molle existēs q̄ celer
 ogunt in longitudinē augeri, quin &
 olligāt, quo rotūditas capitis phibe
 untū effecit ut eiusmodi natura capitū
 quocq; tales produxit, ut non esset ne
 im femē genitale ab omnib. corporis
 orbis morbosum, fiatq; ut ex caluis
 ū distortus distortū generet, eadēq; ra
 ret ut nō ex Macrocephalis Macroce

universum Asianorum genus
maximam enim Asia pars sub
iuribus, neque sui iuris sunt, sed
do se ad bellum adparent, imo
nimis eis non equalia instant,
cum morte oppetere pro domi
bus, ac reliquis amicis: atque si
de comoda accedunt, eorumque
laeta & caetera nihil demittitur.
ataque esse necesse est. Imo eam
iuribus. Ut enim quisque maxime
animus leges auerfatur: cui
quicunque in Asia Graeci itaque
hinc usque omnes labores hinc

sibi inter se gens similis existit quem
 ut fecunda ea gens est, regioq; ipsa mi
 ecie insignes. Sub ipsis enim Vrsis Ra
 irat, Solq; ipse supremo æstiuo solstio
 dē exiguo tēpore calefacit. Neq; uero
 regionē penetrant, nisi parūper & de
 nt illic perpetui frigidi, à niuibus, gla
 nōtibus decedūt, ut proptea etiā in ha
 nubilus cāpos occupat. Ipsi uero in hu
 is hyēs, æstas aut paucissimis diebus
 nities eminentiores, & nudæ, neq; ullis
 fis acclives. Neq; feræ nascuntur illic
 terra cōtegi. Prohibet enim hyems &
 oraculis caret, propter temporū anni
 smiles sempetualis.

uiri infœciliores puten
facit, præ quibus uter earū
rationes eis nō eueniūt que
ius rēpus. Ipsumq; ampli
emē suscipere. Sūt em̄ ocio
necessario sequitur nō mul
earū indicū exhibēt. Nam
otū cōtinent, ppter corpo
utē plurimi Scythæ Eunu
i omnia faciūt, & loquun
e causam ad deū referūt, eo
ne quid tale accidat. Mihi
qui omēs, neq; ullū aliq̄e

id genus est) semper habent, & pluri
 t necq; manu tractare pudenda liceat,
 ac iucunditatis coeūdi obliuiscatur,
 t euirati fiant. Hac tenus ergo de Scy
 Europa hominum genus ualde inter
 magnitudinem adtinet, tum quod ad
 ones cōtingit apud eos magnas & fre
 & hyemes fortes, pluuiaē multae, rur
 quibus multae et omnimodae sūt trā
 generationē has ipsas mutationes sen
 necq; ex eodē etiam eandē, æstatis pari
 ogigni. Ea q; causa est, cur purē Euro
 rum formas inter se discrepare, & ma
 urbibus prouenire. Plures enim cor

117
uentis expositam & a quo
Animi quoque eorum existunt
a loca tenent, & quae tempo-
neceffe est esse asperas et ue-
di sunt, peruinaces & com-
requetes, & plurimum inter-
is plurimum differetes. Tem-
am permutat. Deinde etiam
quae. Inuenias enim fere sem-
ares. Nam ubi terra pinguis
ur aestate calidae sunt, & hye-
oi & homines carnosus, arti-
ut plurimum maligni nascuntur

fit morborum, & quod principium ac quasi fons sit, ex quo corpori mala omnia scaturiat. Si quis enim causas corporis affecti probe cognouit, potes est ual de ea adferre, quæ corpori cōmodent, nimirū cōtraria corporibus morborum natura perfecta. Est em̄ maxime secundū naturā ipsa medicina. Quare statim ubi fames molestat, morbus fit. Quicquid enim homini molestiā ac tristitiam infert, hoc morbus uocatur. Quod ergo est famis remediū: hoc scilicet quod famem sedat, id autem facit cibus, eo ergo malum illud medicandū. Amplius aut ubi sitis urgeat, bibere cōpescit: & rursus, repletioni euacuatio, euacuationi repletio, labori quies succurrit, & quietis medelam ex labore reperias: atq; ut breuiter dicam, contraria contrariorum sunt medicamina. Medicina enim nihil aliud est nisi adpositio & ablatio. Ablatio quidem eorum quæ excedunt, adpositio uero eorū quæ deficiunt: qui autē istud optime facere potest, is optimus medicus censebitur, quantumq; quis ab hoc præstando deficit, tantum deficit quoq; ab ipsa arte. Atq; hæc quidē præter institutū futuri sermonis à me dicta sunt. Morborū autem omnium unus & idem modus est. Locus uero ipse eorum differentia facit. Quare uidentur quidē morbi inter se nihil simile habere, propter diuersitatem scilicet locorū, quū sit tamen una morborū omnium & species & causa quoq; eadem. Quæ autē hæc ipsa sit, in sermonis huius progressū manifestū facere conabor. Corpora enim omnia tum hominū, tum reliquorū quoq; animalium à triplici nutrimento sustentantur. Horū autem nutrimentorū nomina hæc sunt, cibus, potus, spiritus. Ac spiritus quidem qui in corporibus sunt, flatus uocantur: qui uero extra corpora existunt, aer. Qui sanē maximus est in omnibus quæ corpori accidunt & autor & dominus. Quare operæ precium est eius potentia diligētius perspicere. Ventus enim ipsius aeris fluctus & unda existit. Quādo igitur multus aer fortes fluctus facit, tum & arbores radicitus euellitur, & mare undis exæstuat, spiritū potētia ita cogēte, & naues onerarias etiā et ingētes in altum disiciēte. Talem itaq; uim in ista exercet, etiā oculis minime sit conspicuus, & tantū cōsideratione cognoscatur, & effectu suo fiat manifestus. Quid autē sine hoc sit tandem: aut cui rei nō adest: Omne enim quod inter cœlum & terrā est, spiritu repletū est. Hic & hyemis & æstatis causa est. In hyeme quidē frigidus & cōdensatus. In æstate autem mitis & trāquillus. Quin & solis & lunæ, & astrorū omnium cursus per spiritū procedunt. Et enim igni spiritus nutrimentū præbet, quo si ignis priuetur, uiuere non possit. Et foelis perpetuū cursum, aer perpetuus & tenuis conseruat. Verum neq; mare ipsum spiritus exors esse omnibus manifestum esse puto. Nō enim uiuere nantia animalia possent, si nō spiritu participarent: quomodo autē participarēt, si non per aquā & ex aqua spiritū adhaerent: Et Lunæ hic fundamentum est, & terræ uelliculū, neq; quicquā usquā est spiritu uacū. Atq; hæcenus quidē quātum aer alijs cōmodet diximus. Mortalibus autē uitæ, & morborū ægrotis, solus is est autor. Tātaq; omnibus corporib; spiritus necessitas extat, ut siquidē omnibus alijs abstineat homo, neq; cibū sumat, neq; potum, possit tamen dies duos uel tres & plures ducere, Si cui uero spiritus in corpus uitæ interceptū, in breui parte unius diei intereat, ut uel hinc quāto usui spiritus corpori sit liceat æstimare. Amplius aut ab omnib; operibus aliquādo immunes quiescūt homines: multæ em̄ sunt mutationes in uita, uerū ab hoc opere nulla omnib; mortalibus

119

n ex
ruo
e fit
idid
fute

ex

ior

nen

licu

aut

Exemplum in diebus...

Maria...

tere

T I S L I B E R

ificunt & carnes. Sunt autem quaedam
am uero exangues. Exangues itaq; pro
r cōmouentur quum calor ex eis defe
ter sanguinis multitudinē & tremūt, &
n fieri ut sanguinis multitudo conquie
s, siquidem multus aer coaceruatus, cus
ducit os, quū per hoc facillimus ei exis
is in lebetē feruētibus uapor multus ele
per os aer cōuolutus, & quadā uirum
ur ante febres, calefacti enim nerui didu
rit cumulatim plurimus sanguis, calefit
gidauit. Nimirū à calore multo uictus,
mne corpus calorem spargit, cooperan
t ergo quicquid ignea uis illa adtigerit,
orporis irruerit, sudores fiunt. Siquidē

...VS... 121
fauces ingreditur, ad pectus usq;
Quū autē spiritus ingrediēs in flu-
xū repellitur sursum pituita. Quia
& inflāmantur, adtrahūtq; calēs
alijs corporis partibus adtrahēs
sic manare, implentur meatus, &
pituita carnē penetrans, exulcerat ac
in alienos sibi locos ubi morā tra-
nsursū potest cōscendere, neq; in
mori ad ardua prodire, sicut neq;
intra grauitatē. Infra autē procedere
nō attingit fluxū aliqūē citra spiritū
neq; etiā propter dolores. Ac spōte

DE FLATIBVS

us cōmunis est, hæc cōfirmat somnus. |
sanguis frigeſcit. A natura enim somno :
uine, languidiores fiūt eius meatus : qđ
elinātur, Omnia enim graua natura ad
prudētia permutatur, opinionesq; pe
æ sanē inſomnia adpellātur. Quin & in
anguine percellitur animus, & in animo
obliuioſi, ac futurorū bonorū fœcēda
di cōgerere, in quibus ſanguinis permu
tant. Siquidē igitur penitus totus con
ia proſternitur. Affectus enim & cogni
utem à conſuetudine ſolita recedimus,
ſacrū morbum tum fieri, quū plurimus
guini fuerit permixtus : tū enim multæ
uenas, quūq; in craſſiores & pleniores

C O I L I B E R

PURGANTIBVS, . . .
 phyfico interprete.

purgantiū res nō ita se habet, quē
 eodē enim medicamento purgātur
 uero alia purgat q̄ que purgare so
 rgat. Aliquādo ea quæ debet facit.
 us medicamētis cōsilius, ea temere
 os alentes, medicamēta esse putan
 omnes enim qui his recte in cibo
 i uero modum excedunt, purgan
 ū minus & tardius q̄ à sinceris me
 icamenta existunt. At uero hī

HIPPOCRATIS COI DE DIAE

TA SIVE VICTVS RATIONE, LIBER I.

Iano Cornario Medico Physico interprete.



quis mihi ex prioribus, qui de diæta humana ad sanitatem conferente scripserunt, recte cognouisse ac omnia per totum, quantum humanæ menti possibile est, conscripisse uidentur: satis esset mihi aliorum laboribus, quos nossem recte habere, uti, prout singula utilia esse uiderentur. Nunc uero multi quidem iam scripserunt, nullus autem recte nouit, quid nam fuerit ipsis scribendum. Et alij quidem aliud assequuti sunt, Verum totum nullus adhuc ex prioribus, Immerito autem ullus aliquis ipsorum reprehendatur, propterea quod inuenire non potuerunt. Imò laudandi potius omnes quod inuestigare conati sunt. Itaque redarguere ea quæ non recte dicta sunt, minime institui, Verum his quæ sufficienter cognita sunt, testimoniū præbere animus est. Quæcūque quidem igitur recte à prioribus dicta sunt, ut non sit possibile me aliter describere, recte describā. Quæcūque uero non recte dixerunt, si quidem redarguā hæc quod non sic se habent, nihil perfecero. uerum exponedo qua de causa singula ipsorum recte mihi habere uidentur, declarare uolo. Propterea uero huc sermonem præpono, Quod multi homines ubi audierint aliquem prius de re aliqua exposuisse, cum qui de his posterius disserit non recipiunt, non cognoscunt res quod eiusdem intelligentiæ est, ea quæ recte dicta sunt posse iudicare. Ego igitur uelut dixi, recte quidem dictis testimoniū præbebo, quæ uero non recte dicta sunt ac cognita, qualia sint declarabo. Quæ autem nullus ex prioribus explanare tentauit, ea etiam ipsa qualia sint demonstrabo. Porro cum qui de uictu humano scripturus est, censeo primū quidem totius hominis naturam nosse ac discernere oportere. Nosse quidem ex quibus ab initio constitutus est, discernere uero quæ in ipso partes dominiū obtineant, Si enim constitutionem ab initio non cognosceret, & id quod in corpore dominatur, non poterit ea quæ homini conducunt ostendere. hæc igitur scriptorē cognoscere oportet. Deinde uero ciborum ac potuum quæ in ipso partes dominiū obtineant, quam tandem singula habent & secundum naturam, & secundum necessitatē ac artem humanam. Oportet enim scire quomodo fortium natura uim detrahere oporteat, & quomodo debilibus robur per artem addere oporteat, prout singulorum occasio se obtulerit. Et si relata iam esset cognouerit, nondum sufficiens est hominis curatio, propterea quod homo esse sanus esse non potest, nisi etiam laboret. Contrarias enim inter se uires habent cibi & labores. Verum inter se mixti conferunt ad sanitatē. Labores enim ea quæ in se sunt consumere solent, cibi autem & potus ea quæ euacuata sunt replent. Oportet autem uelut par est laborum uim perferere, tum naturalium, tum eorum qui per uim fiunt, & qui ex ipsis carnes in augmentum præparant, & qui in defectum. & non solum hæc, sed etiam mensuram ac proportionem laborum ad multitudinem ciborum, & hominis naturam, & corporum staturas ac ætates, & ad tempora anni, & ad mutationes uentorum, & ad situs regionum in quibus degunt, & ad anni constitutionem ac statum. Sed & Astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes et excessus ciborum ac potuum, & uentorum, & totius mundi, ex quibus sanæ morbi hominibus oriuntur

oriuntur, obseruare sciat. Quum autē hæc omnia cognouerit, nondum sufficiens inuentum est. Siquidem enim supra hæc inuēta fuerit ciborum mensura, & laborum ad unamquæq; naturā numerus, ita ut excessus neq; supra, neq; infra modum fiat, inuenta sanē exacte fuerit hominibus sanitas. Nūc uero prædicta quidem omnia inuēta sunt, qualia sint, hoc uero inuenire impossibile est. Si quidem igitur præfens quis sit, & inspiciat, cognouerit utiq; hominem exercuntem & in gymnasijs exercitantem, ut custodire sanum possit, alia detrahendo, alia apponendo. Verum nō præfenti impossibile est cibos ac labores exacte præscribere. Nam quantum possibile est inuenire à me iam relatū est. At enim etiam si ualde parum defectuosiora q̄ alia fiant, in multo tempore necesse est corpus ab excessu superari, & ad morbū peruenire. Alij itaq; hucusq; inquirere conati sunt, & neq; hæc dixerunt ac prodiderunt. A me uero hæc inuenta sunt priusquā homo ægrotet, ut ab excessu in utram tandem partem factus fuerit, prænotio contingat. Non enim derepente morbi hominibus accedunt, sed paulatim collecti, acruatim apparent. Priusquā igitur in homine sanitas à morbo superatur, quæ perpetuuntur homines à me inuentum est, & quomodo hæc in sanitatem restituere oportet. Hoc autem ubi accesserit ad ea quæ scripta sunt, ratiocinationū huius doctrinæ conatus perficitur. Cōstituuntur quidem igitur tum animātia alia omnia, tum homo ipse ex duobus differentibus quidem facultate, concordibus uero & commodis usu, igne inquam, & aqua. Hæc autem ambo simul sufficientia sunt, tum alijs omnibus, tum mutuo sibiipsis. Vtrumuis uero seorsum, neq; sibiipsis, neq; ulli alteri sufficiens est. Vim igitur ac facultatem utrūq; ipsorum talem habet. Ignis enim omnia per omnia mouere potest, Aqua uero omnia per omnia nutrire, Particulatim uero utrūq; superare & superatur, ad summum ac minimū, quantum eius fieri potest. Neutrum enim superare penitus potest, ob hanc sanē causam. Igni quidē ubi ad extremitatem aquę peruenit, deficit alimentū. auertitur igitur eo unde nutrirī potest. Aquæ uero ubi ad extremitatem ignis peruenit, deficit motus. Siftitur itaq; in hac, quum uero steterit, nō amplius potens est, sed ab illabente igne in alimentum cōsumitur. & propterea neutrum penitus superare potest. Si uero etiā alterutrum superetur, nihil sanē ex his quæ nūc sunt fuerit uelut nūc habet. Quum autem sic semper se habeant, erunt & eadem & neutra, & neq; simul deficient. Ignis igitur & aqua uelut à me dictum est, sufficientia sunt omnibus per omnia ad summum ac minimū similiter. Cæterū utrūq; horū hæc adsunt, Igni quidem caliditas & siccitas, aquæ uero frigiditas & humiditas. Habēt autē inter se mutuo, ignis ab aqua humiditas. Inest enim ab aqua humiditas. Aqua uero ab igne siccitate, Inest enim in aqua ab igne siccitas. Quum autē hæc sic habeāt, multas & omnigenas formas ac species, tum feminū, tum animalium, à se inuicem secernunt, quæ nihil inter se simile habēt, neq; usu, neq; facultate. Etenim quum nunquā simul in eodem consistant, sed semper alterētur, necessarium est etiam ea quæ ab ipsis secernūt ac producuntur dissimilia fieri. Equidem nullum omnino corpus perit, neq; fit quod prius nō erat, Verum permixta et discreta alterātur. Homines autem putant hoc quidem ex orco in lucem autem generari, illud uero ex luce in orcum imminutum perire ac corrūpi. Oculis autem magis credere oportet quā opinionibus. Ego uero hæc ex sententia ex-

ponā. Animalia enim sunt & illa & hæc, & neq̄ animal mori possibile est non cum omnibus, Vnde enim moriatur: neq̄ quod non est generari, quum nō sit unde generetur. Sed augentur omnia ac minuuntur, ad summū & ad minimū, quantum eius fieri potest. Quid uero dicam generari & perire, uulgi gratia interpretabor. hæc autē cōmisceri & discerni significare declaro. Habet autē res hoc modo. Generari & perire siue corrūpi, idem est. Idem est cōmisceri & fecerni. Generari idem est quod cōmisceri. Perire corrūp̄t̄ ac minui idem est quod fecerni. unūquodq̄ ad omnia, & omnia ad unūquodq̄ idem sunt. Cōsuetudo enim in his naturæ cōtraria est. Seorsim autē omnia & diuina & humana sursum ac deorsum uicisitudinē habent ac transeunt, dies & nox ad summum ac minimum, Sic & Luna ad summū ac minimū. Ignis accessus est & aquæ. Sol ad longissimū ac breuissimū. Rursus hæc, & non hæc. Lux loui, tenebræ orco. Lux orco, tenebræ loui. Accedunt & trāsmutentur illa huc, hæc illuc, Omni tempore trāfigunt illa res horum, hæc autē illorum, & quæ quidem faciūt, non sciunt, quæ uero faciunt, scire sibi uidentur, & quæ quidē uident, non cognoscūt, attamen omnia ipsis fiunt per diuinā necessitatē, & quæ uolunt, & quæ nō uolunt. Accedentibus autē illis huc, his uero illuc, & inter se permixtis, unūquodq̄ de finitū fatum explet, & ad maius, & ad minus. Corruptio autē omnibus mutuo inter se est, maiori à minore, & minori à maiore. Et augetur maius à minore. Reliqua autē omnia, & hominis anima, & corpus uelut anima, ornatur ac gubernatur. Irrepunt autē in hominē partes partū, tota totorū temperaturam habentia, ignis uidelicet & aquæ, partim acceptura, partim datura, & quæ quidem accipiūt, plus faciūt, quæ uero dant, minus. Secāt homines lignū per ierram, alter trahit, alter protrudit, Idem autē hoc faciūt, & minus faciētes, plus laborāt ac faciūt. Sic & hominis natura, aliud protrudit, aliud trahit, aliud dat, aliud accipit, & alij dat, ab alio accipit, & alij quidē tanto plus dat, ab alio uero nihil minus accipit. Locum autē unumquodq̄ suū seruat, & quæ quidē ad minus eūt, ad minorē locum fecernūtur, quæ uero ad maius uadūt, permixta in maiorem ordinem mutantur. Peregrina uero non eisdē mores habentia, ex aliena regione protruduntur. Semper autē anima & maiora, & minima habens, suas ipsius partes circūambulat, nō appositione, neq̄ detractione partū indigens, uerum augmento & decremento earū quæ iam sunt opus habēs. Locū uero unicuiq̄ perficit, ad quē perueniant, & allabentia suscipiant. Non enim potest id quod nō similes mores habet, in discordib, locis permanere. Oberrāt enim uelut ignota, permixta uero inter se cognoscūtur. Cōcors enim cōcordi adhæret ac assidet, discordia autē rebellant, & pugnat, atq̄ inter se disidet. Quapropter anima hominis, in homine augetur, in alio uero nullo, & aliorū magnorum animalū similiter. Quæcūq̄ uero aliter ab alijs per uim fecernūtur, de alijs quidē animalibus prætermittā, de homine uero declarabo. Irrepat in hominē anima, ignis & aquæ temperamentū habens, partē corporis humani. Formellæ autē & masculi, & multi & omnigeni nutriūtur. Nutriūtur autē & augetur per ciuitatē qua homo utitur. Necessē est autē omnia quæ ingrediūtur partes habere, Cuiuscūq̄ enim pars nō inerat à principio, augeti nō poterit, neq̄ multo, neq̄ modico alimento ingrediētē. Non enim habet quod augetere faciat. Id uero quod omnia habet, augetur, unūquodq̄ in suo loco. Alimēto autem ingrediente ab aqua & igne

igne, sicco & humido, alia quidē intro coguntur, alia uero foras protruduntur. Quemadmodum fabri lignarij lignū terra diffecāt, & alter quidem trahit, alter protrudit, idē sanē faciētes. & qui deorsum premit, superiorē trahit, neq; enim aliā admitteret deorsum ire. Si uero uiolenter cogant, toto opere aberrabunt. Similiter & circa hominis alimentū se res habet. aliud trahit, aliud protrudit. Intro autē coactū, foras repit. Si uero importune & uiolēter cogatur, omni successu priuabitur. Singula autē tāto tēpore eundē ordinē habēt, donec locus nō amplius suscipiat, neq; alimētū aquarū ac ignis sufficiēs ad summū habeat. Postea ad externā regionē transeunt & foemellæ & masculi, eodē modo præ uiolentiā & necessitate impulsī. Quæcūq; autē destinatū fatum expleuerint, ea primū secernūtur, ac simul cōmīcentur. Singula enim fecernūtur, omnia autē hæc cōmīcentur. Postq̄ uero regionē permutauerint, & nacti fuerint harmoniā recte habentē symphonias tres cōprehensim penetrātes per omnia, uiuunt & augescūt iisdem quibus etiā antea. Si uero harmoniā nō assequuti fuerint, neq; grauiā acutis cōsona fiāt, prima symphonia perit. Et si etiā secunda generetur, propterea quod unus per omnia corruptus est, omnis tonus uanus est. Nō enim cōcentū habuerit, sed trāsitiō fit ex maiore ad minus, ante destinatū fatū. qđ qui faciūt, nō sciunt quid faciāt. Cur autē utriq; tū masculus, tū foemina fiant, in sermone p̄gressu declarabo. Vter autē ipsorū harmoniā assequetur humidus existēs mouetur ab igne, motus autē uiuificatur, & alimentū attrahet ab ingredientib; in mulierē cibis ac spiritu, primū quidē undiquaq; similiter, donec recēter rarus est. à motu autē & ignis siccat ac cōsolidatur, cōsolidatus autē & firmatus circū circa dēfatur. Et ignis in clusus nō amplius sufficiēs alimentū attrahere potest, neq; spiritū expellit, ppter ambiētis corporis densitatē. Cōsumit enim humorē intus existentē. Quę igitur solida natura sunt in cōpacto ac sicco, ea nō cōsumuntur ab igne in alimentū: sed ualida ac robusta fiūt, & cōsistūt humore deficiēte, atq; hæc sanē ossa ac nerui nominantur. Ignis autē ex cōmixto ac moto humore corpus secundū naturā ordinat ac disponit, ppter talē necessitatē. Nā p̄ solidū & siccū nō potest diuinos trāsitus facere, quia alimentū nō habēt, per humida uero & mollia potest, hæc enim ipsius sunt alimentū. Inest autē & in his siccitas, quæ ab igne nō cōsumitur. Hæc autē inter se cōgregātur mutuo. Ignis igitur penitissime ad intima obturatus, et plurimus est, & maximū exitū facit. Plurimus enim humor in ea parte inest, quę uēter appellatur, et excidit inde ubi alimentū non habet foras, & exitū facit. Plurimus autē humor in uētre inest, tum ppter alimenti ingestione, tum propter concoctionē. Qui uero in reliquū corpus cōclusus est ignis, triplices circuitus facit. Eteim quod humidissimū est in igne, in his locis quæ uenę cauæ appellātur, existit. In media autē horū id quod reliquū est aquæ cōgregatum stabilitur, atq; ea uocātur carnes. In summa, ignis omnia quæ in corpore sunt, secundū suū ipsius modū exornauit, ad uniuersū imitationem, parua ad magna, & magna ad parua, Ventre quidem maximū, sicco et humido p̄optuarium, ut det omnibus, & accipiat ab omnibus, iuxta maris facultatē quod est animalū in ipso nutritorū ac nutriti solitorū alimētum, discordiū uero perniciēs. Circū hunc autē aquæ frigidæ & humidæ cōgregatio, trāsitus spiritus frigidi & calidi, ad terræ imitationē, omnia quę in ipsum incidūt alterātis. Et alia quidem cōsumens, alia uero augēs, aquæ tenuis ac ignis dispersionē

fecit, in superiōrē non obscuri & apparētis à compacto secretionē, in quo delata omnia in apertum perueniunt, singula iuxta destinatum fatum. In hoc uero triplices circuitus ignis fecit, inter se mutuo intro ac foras terminantes, alios quidem ad cauitates humorū lunæ facultate, alios uero ad externam circumferentiam, ad ambientē soliditatem astrorum facultate. Medij uero & intro & foras terminantes, calidissimum ac fortissimū ignem habent, qui sanè omnibus dominatur, omnia secundum naturā gubernans, sine strepitu, tum ad uisum, tum ad tactum. In hoc Anima, Mens, Prudentia, Augmētum, Motus, Imminutio, Permutatio, Somnus, Vigilia. Hic omnia per omnia gubernat, & hæc, & illa, nunquā quiescens. At uero homines ex manifestis obscura considerare non nouerunt. Quum enim artibus utantur similibus humanæ naturæ, id ipsum ignorant. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipsorū imitari, ita ut cognoscāt quæ faciunt, & non cognoscant quæ imitentur. Omnia enim similia sunt, dissimilia existentia, & omnia cōcordia, discordia existentia, quæ comprobamus, non comprobamus, æquitatē habentia, iniqua sunt. cōtrarius est modus singulorum ei quæ consentitur. Lex enim & natura, quibus omnia transigimus, non consentitur quæ consentitur. Legem enim posuerunt ac tulerunt homines ipsi sibi ipsis, non cognoscētes de quibus rulerunt. Naturam uero omnes dii exornauerunt. Quæ igitur homines sancierunt, nunquā eodē modo habent, neque recte, neque nō recte. Quæ uero dii sancierunt, semper recte habent. Et recta ac non recta in tantum differunt. Ego uero Artes hominis manifestas, affectionibus & manifestis, & obscuris, similes esse declarabo. Vaticinatio tale quid est. Ex manifestis quidē cognoscere obscura, ex obscuris uero manifesta, & ex presentibus futura, & ex mortuis uiuētia. Etea quæ intelligi non possunt, uates intelligunt, qui quidē doctus est, semper recte, qui uero non doctus est, aliā aliter. Naturam hominis etiā hæc quantum possibile est imitantur. Vir mulieri concumbens puerum facit, Hoc manifesto obscurū cognoscere datur, quod sic futurum est. Mens hominis obscura, cognoscens manifesta, ex puero in uerum transit, hoc præsentis futurū cognoscit. Non simile à morte ullum aliquod animal existit, neque mortuo animal uiuum. Venter quod intelligi nō potest nouit, per hunc enim intelligimus quod sitit aut esurit. Hæc artis uaticinandi & humanæ naturæ affectiones, cognoscētibus quidem semper recte habent, uerum nō cognoscētibus aliā alter. Artis fabrilis ferrariæ instrumenta ferum circumliquant, statu ignem fabri cogunt, & alimentum iam præfens auferunt, ubi uero rarefecerint, ferunt ac tundunt. Aquæ autē alimento ferrum rursus roboratur. Eadem patitur homo à pædotriba, præfens enim alimentum igne detrahitur, quum præ spiritu homo cogatur, rarefactus autē tunditur, atteritur, subuertitur. Aquæ autē aliunde accensione corroboratur ac fortis euadit. Et fullones idem transigunt, calcitrant, ferunt, destruentes, tundunt, trahunt destruentes, robustiora faciunt, deradētes supereminētia, & atexētes pulchriora reddunt. Eadē etiā homo perperitur. Sutores coriarū tota in partes dissectātes, scindētes et pungētes, marcida ac lacera, sana et integra, faciunt, Et homo idē patitur. Ex totis partes secantur, & ex partibus cōpositis tota fiunt. Punguntur & secantur à medicis marcida, sananturque ac uiuit homo. Medicina id quod molestat tollit, & id à quo homo ægrotat auferēs, sanū facit, Natura eadē sua spōte nouit

nouit. Desidens conatur resurgere, currens conatur requiescere, & alia eiusce-
 modi natura habet quæ medicinæ sunt. Fabri lignarij serra secantes, alter tra-
 hit, alter protrudit, Idem autē uterq; facit, & in utraq; partem tendit. Idem tere-
 brant, alter trahit, alter protrudit, & qui premit, superiorem deorsum trahit, &
 minus facientes plus faciunt, naturæq; hominis imitantur. Spiritus alter tra-
 hit, alter protrudit, Idem autem uterq; facit, & in utraq; partē tendit. Cibi par-
 tim deorsum premuntur, partim sursum uergunt. Ab una anima diuisa, plu-
 res & maiores, & minores & pauciores sunt. Aedificatores ex diuersa rebus
 unam cōcordem facientes, sicca quidem humectantes, humida uero siccantes,
 & tota diuidētes, diuisa uero cōponentes. Si enim non sic cōtingeret, nihil pri-
 uatim ac proprium cōstitui posset: diætā humanā in hoc imitantur. Nam &
 in hac sicca humectantes, & humida resiccantes, tota quidem diuidunt, diuisa
 uero componūt. Hæc omnia diuersa ac discordia existentia, cum natura cōcor-
 dant. Musices autem organū primum producere oportet, in quo harmonia
 quæ uult declarabit. Constructiones ex hsdem non eadem sunt, ex acuto, ex
 graui, nomine quidem similibus, sono autem nō similibus. Quæ plurimum di-
 uersa sunt, maxime concordant, & quæ minimum diuersa sunt, minime cōcor-
 dant. Si uero quis similia omnia faciāt, non inest delectatio. Plurimæ ac multi-
 formes transmutationes, maxime delectant. Coci obsonia hominibus pas-
 rant, omnis generis diuersa cōmiscētes, ex hsdem non eadem, ad hominum
 cibum ac potum. Quod si omnia similia facerēt, non haberent delectationem,
 & si in eodem etiam omnia cōstruerent, non utiq; recte haberent. Pulsantur to-
 ni in musica partim superne, partim inferne. Lingua musicam imitatur, cog-
 noscens quidem dulcedinē & acorem eorum quæ allabūtur, itemq; dissonan-
 tia, pulsāt autem sonos superne ac inferne, & neq; ea quæ superne pulsantur, si
 inferne pulsantur recte habent, neq; quæ inferne, si superne. Quum autem lin-
 gua probe fuerit attempata, symphonie delectatio cōtingit. Si uero discors fue-
 rit ac incōgrua, molestia. Pellium tinctores tendūt, terūt, pectināt, lauant. Eas-
 dem est puerorū curatio. Plicatores ac textores ducētes in orbem fila plicant,
 à principio in principiū desinunt. Idem circuitus in corpore est, unde incipit, in
 hoc desinit. Aurum operātes, tundunt, lauant, molli igne liquāt, forti aut nō
 conflatur, Vbi uero elaborarūt, ad omnia utuntur. Homo frumentū tundit,
 lauat, molit, & ubi igne coxit, uitur, & forti quidem igne in corpore non con-
 flatur, uerum molli ac lento. Staturarj imitationem corporis faciunt, anima
 excepta, mentem autem habentia non faciunt, ex aqua & terra humida siccans
 res, & sicca humectantes, ab his quæ superabūdant detrahūt, & ad ea quæ defi-
 ciunt apponūt, ex minimo ad maximū augentes. Eadem patitur homo, auge-
 scit à minimo ad maximū, ex superabūdantibus detrahens, & deficientibus ap-
 ponēs, sicca humectans & humida siccans. Figuli rotā uersant, & neq; retror-
 sum, neq; antroorsum procedit, sed simul in utraq; partē, Vniuersi hæc imita-
 trix circularis existit. In eadem aut quū iam circūfertur, omnis generis opera ef-
 ficūt, ut alterū altero in nulla re simile existat. Ex hsdē homines eadē patiūtur,
 itemq; reliqua animalia in eadem circūferentia omnia operātur, & ex hsdem ni-
 hil simile, hsdē instrumētis ex humidis sicca faciētes, & ex siccis humida. Gra-
 matica tale quid est, figurarū cōpositio, quæ signa ac notæ sunt humanæ uocis,
 facultas

facultas reuocandi in memoriā prāterita, & quā faciēda sunt declarandi. Per septem figuras noticiā cōtingit. Eadem omnia homo tranſigit, ſiue ſciens literas, ſiue literarū rudis. Per ſeptem figuras etiā ſenſus hominibus cōtingit. Auditus ſonorum, Viſus manifeſtorū, Naſus odoris, Lingua uoluptatis & in iucunditatis, Os ſermonis, Corpus tactus calidi aut frigidi, Spiritus tranſitus intro ac forās. Per hęc cognitio hominibus cōtingit. Paleſtra & pædotribæ tale quiddam docēt. præuaricari ſecundū leges, iniuriam facere iuſte, defraudare, furari, rapere, uiolare honeſtiſſima ac turpiſſima. Qui hęc non facit, malus. qui hęc facit, bonus eſt. Oſtentatio multorum ac uulgi eſt, deſipiētīæ hęc eſſe uident, & unum ex uniuerſis bonum iudicant, reliquos uero malos. Multi mirantur, pauci cognofcunt. Homines in forum progreſſi eadem perpetrant, defraudant uendentes & ementes, Qui plurimum defraudauit in admiratione eſt. Bibentes & inſanientes eadem perpetrāt, currūt, luſtantur, pugnāt, furantur, defraudant. Vnus ex omnib. præfertur. Simulatores & deceptores alia ad ſcientes dicunt, & alia ſentiūt, lidem ereptāt, & irrepunt nō iſdem. In eſt aut̄ homini, alia dicere, alia facere, & eundē non eſſe eundē, & nunc aliam habere mentem, nunc rurfus aliam. Sic quidē artes omnes cū humana natura cōmunicant.

Cæterum anima hominis, quemadmodū etiā antea à me dictū eſt, ignis & aquæ temperamentū habens, partes autē hominis, irrepit in omne animal quod ſanē ſpirat, itemq; in omnem hominē, & iuniore, & ſeniores. Non autē ſimiliter in omnibus augeſcit, ſed in iuuenibus corporibus, utpote celeri circū uolutione exiſtente, & corpore auctili, expaſſæ & attenuatæ partes illæ animæ, in corporis augmenū conſumuntur. In ſenioribus autē, utpote tardo exiſtente motu, & corpore frigido, in decrementū hominis conſumuntur. Quęcūq; autē corpora in uigore ſunt, & in ætate ſœcūda, eas nutrire & augere poſſunt.

Potentes aut̄ homines, ut quiſq; plurimos homines alere poteſt, ita fortis iudicatur ac potēs, ubi uero deſecerint quos alat, imbecillior cęſetur. Sic etiā circa ſingula corpora res ſe habet. Quęcūq; plurimas animas nutrire poſſunt, ea fortiora ſunt, ubi uero hæ diſceſſerint, imbecilliora. Quicquid igitur in aliud corpus ingreſſum fuerit, non augeſcit. Quicquid uero in ſœminam, augeſcit, ſi ea quæ ipſi congrua ſunt cōtingant. Discriminātur autem partes & augeſcunt ſimul omnes, & neq; prius alteræ alteris, neq; poſterioribus. Verum maiores natura priores apparent minoribus, quā non priores exiſtant. Non autē in æquali ſpatio omnes fœtus exornātur, ſed aliſj citius, aliſj tardius, prout ſinguli & ignē & alimētum fuerint naſti. aliqui itaq; in quadraginta ac tribus diebus ſcaturiunt ac formātur, aliqui in quatuor mēſibus. Similiter etiā uitales ſunt ac gignuntur, aliqui citius, ſeptimo mēſe perfectē, aliqui tardius, perfectē nono mēſe in lucē prodeunt, & oſtendunt ſe temperamentum habere, quod ſemper habebunt. Maſculi igitur & ſcemellæ hoc modo gignuntur, quantum eius fieri poteſt. Cæterum ſcemellæ ab aqua magis, & à frigidis ac humidis & molliſſimis augeſcunt tum cibus, tum potibus, itemq; ſtudijs ac exercitijs. Maſculi uero magis ab igne, à ſiccis uidelicet ac calidis cibus & reliqua diæta. Si igitur ſcemellam parere uelit, diæta ad aquā uergente utēdum eſt. Si uero maſculū, exercitijs ac uiciū ad ignē tendente utetur. Et non ſolum uirum hoc facere oportet, ſed etiā mulierē. Nō enim ſolum quod à uiro ſecernitur auctile eſt, ſed etiā quod

quod à muliere, ob hæc sanè caussam. Vtræquæ quidè pars sufficientem motû nō habet ad humoris multitudinē, ut quod influit cōsumat, & propter ignis debilitatē coagmētantur. Quū uero ambæ in idē coinciderint, mutuo inter se incurrunr & obuolūtur, ignis ad ignē, & aqua similiter. Si quidē igitur in sicco loco circūuoluitur ignis, coillapsum aquā superat, & ab hoc ignis augetur, ne ab illa bente unda extinguitur, aliūq; accedentē suscipiat ac sibi cōsociet. Si uero in humorē incident, statim ab initio extinguitur ab illabète unda, & in minorē ordinē dissoluitur. In una autē die uniuscuiusq; mēsis, cōsociare ac superare ea quæ accedūt potest, & hoc si coinciderint ab utrisq; in unū locum. Cōsistere autem possunt inter se & foemella & masculus, propterea q; anima quidē idē est in omnib. animatis. Corpus autē uniuscuiusq; differt. Anima quidē igitur semper similis, & in maiore, & in minore. Nō enim alteratur neq; per naturā, neq; per necessitatē. Corpus autē nunq̄ idem in ullo aliquo est, neq; secundū naturā, neq; ex necessitate, propterea q; partim fecernatur in omnia, partim permisceatur ad omnia. Si quidē igitur mascula corpora ab utrisq; secreta fuerint, augetur prore præfenti, & sūt hi uiri animis splēdidī, & corpore fortes, si nō à diætā postea detrimētum sentiāt. Si uero à uiro quidē masculū fecernatur, à muliere uero foemineū, & superauerit si ita cōtingat masculū, (Genitura em̄ ammiscetur ad fortiorē aut debiliorē, Nō enim habet ex præsentibus aliquid ad quod familiarius fecedere possit. Suscipit enim parua maiorē, & maior minorē. In cōmune autē super hæc quæ ad sunt dominiū exercent) corpus sanè masculū augetur, foemineū uero minuitur, et in aliam fortē fecernitur. Et hi quidē minus priorib. splēdidī fiunt, tamen quia masculum à uiro superauit, uiriles euadūt, & hoc nomen merito habēt. Si uero à muliere quidem masculum secretū fuerit, à uiro autē muliebri, superauerit aut masculum, augetur eodē modo sicut prius, foemineū uero minuitur. Et sūt hi Androgyni, id est uiri effoeminati, atq; sic recte appellantur. Tres quidē igitur hæc sunt generationes hominū, differētes in eo quod magis aut minus tales sint, propter partiū aque temperamentū, & alimenta, & institutiones, ac consuetudines. declarabo autē in progressu sermonis etiā de his.

Cætēnū foemella eodem modo gignitur. Si enim ab utrisq; foemineū secretū fuerit, foeminosisimè ac ingeniosisimè fiet. Si uero à muliere quidē foemineū, à uiro aut masculum, superauerit autē foemineum, audaciores quidē prioribus sient, ueruntamē ornatae ac moderate etiā ipsæ. Si uero à uiro quidē foemineū, à muliere uero masculum secretū fuerit, & foemineum superauerit, augetur eodem modo, & sūt hæc audaciores adhuc prioribus, & uiriles ac uiragines nominantur. Si autem quis non credat animā animæ ammisceri, demens est. Si quis enim carbones ardentés ad ardentés adijciat, fortes ad debiles, & alimentum ipsis præbuerit, simile corpus omnes exhibebunt, & alter præ altero non cognoscitur, sed in qualicunq; corpore ignē susceperint, tale in omnibus erit. Vbi uero præfens alimentum cōsumplerint, fecernuntur ac obscurātur. Idem hoc anima hominis patitur. At uero quomodo gemini nascātur, hoc sermone declarabo. Equidem natura uterorū in foeminis ut plurimum in causā est. Si enim similiter in utrāq; partem iuxta osculum dispositi à natura fuerint, et si militer hauerint, & à purgatione sicantur, alere possunt, si semen uiri cōcepserint ita ut statim discindatur. Sic enim necesse est dispergi in utrūq; uterum si

militer

militet. Si quidem igitur mustum semen ab utrisque & forte secretum fuerit, in utrisque locis augeri potest, dominium enim habet in alimentum quod accedit. Si uero aliter cōingat, gemini non fiunt. Quum itaque masculum ab utrisque secretum fuerit, necessarium est in utrisque masculos gigni, quum uero feminum ab utrisque, feminas fiunt, quum autem alterum foemineum, alterum masculum fuerit, utrum altero præualescet, id ipsum augetur pro ea ratione. Similes porro inter se fiunt gemelli, ob hanc causam. Primum quidem quod æquales sunt loci in quibus augetur. Deinde quod simul secreti sunt. Postea quod ipsidem alimentis augetur, uitalisque in lucem prodeunt. Ceterum superfectiones hoc modo fiunt. Quum uterum calidi & sicci natura fuerint, ipsaque mulier eiusmodi, & semen calidum ac siccissimum illatum fuerit, non fit amplius ulla aliqua humiditas in utero, quæ semen superfluum contineat. Quapropter consistit ab initio ac uiuit, perseverare autem non potest, sed etiam id quod iam adest in super corrumpit, quia non eadem utrisque conferunt. Etenim quod tenuissimum est in aqua, & quod rarissimum in igne, si in hominis corpore temperamentum acceperint, sanissimum habitum constituunt. Propterea quod neque in temporum anni maximis mutationibus, neque in regionum permutationibus, neque in ciborum ac potuum alterationibus, aqua densissima euadit in aquam impetuosam in cursum, neque ignis in ignis impetu. Possunt enim ambo & generationem & fatiorem plurimam suscipere. Aëres molissimum ac rarissimum, plurimum temperamentum suscipit, ac optimum euadit. Eodem modo etiam quod tenuissimum est in aqua, ac rarissimum in igne, ubi temperamentum acceperint. Qui igitur hanc naturam habent, sani perueniunt omni tempore usque ad quadagesimum annum, aliqui uero etiam usque ad extremam senectutem. Qui uero à quadagesimo anno, à morbo aliquo correpti fuerint, nunquam ferme euadunt. Quæcumque autem corpora ignis fortissimi, et aquæ densissimæ temperamentum acceperint, fortia & robusta fiunt, uerum multa custodia opus habent. Magnas enim transmutationes in utraque partem habent, & in aquam incursum in morbos incidunt, & in ignis cōsimiliter. Qui igitur eiusmodi naturam habent, eum uictu uti cōducibile est temporibus anni contrario. Et aquæ quidem incursum contingente, uti oportebit eum ab his quæ ab aqua sunt, paulatim pro tempore ratione discedendo. Porro ubi aquæ crassissima & ignis tenuissimum in corpore mixtura facta est, talia contingunt, ex quibus frigidam & humidam naturam cognoscere oportet. Talia enim corpora in hyeme morbosiora sunt, quam in æstate, & in uere quæ in autumno. Ceterum quod ad ætates attinet, Sanissimi ex talibus pueri fiunt. Deinde adolefcentes. Morbosissimi autem senes, & his uicini, & hæc natura cito senescunt. Talibus in uictu cōferunt quæ calfaciunt ac siccant, tum in cibis, tum in exercitijs, & externas corporis partes magis quæ internas exercere cōducit. Si uero humidissimum in igne, & densissimum in aqua, in corpore mixturam acceperint, ex his humidam ac calidam naturam cognoscere oportet. Laborat quidem ex morbis huiusmodi maxime in uere, minime in autumno, quia in uere excessus est humiditatis, in autumno uero symmetria & moderatio siccitatis. Ex ætate uero morbosissima sunt iuniores. Corpora autem cito augetur, & tales distillationibus obnoxij sunt. His cōducit exhibere quæcumque siccant ac frigefaciunt, & in cibo, & in potu ac laboribus. Verum labores intra corpus his facere maxime confert. Si uero mixturam acceperint fortissimi

mum in igne, et tenuissimū in aqua, sicca & calida est natura, et talibus morbus
 in ignis accessionibus contingit, sanitas uero in aqua. Et in ætatibus uicibus
 ad carnis bonam habitudinē, morbosissimi sunt, sanissimi autē senes. Ita etiam
 utriusq; proximi. Diætæ quæ frigefaciunt ac humectant, & ex laboribus qui mi-
 nime ex calfaciunt ac colliquant, plurimam frigiditatē exhibebunt. Huiusmodi
 naturæ uiuacissimæ ac sanissimæ existunt. Si autē mixturam acceperint cor-
 pora ignis rarissimi, & aqua siccissima, sicca & frigida talis natura est, morbo-
 sa quidē in autūno, sana uero in uere, & uicinis tēporib; . Similiter ætates ad an-
 nos quadraginta morbosæ, pueri sanissimi, Ita & utriusq; proximi. Diētæ his cō-
 ferunt quæ calidæ existentes humectant, & labores sensim adhibiti leniter calē-
 facientes, & nō multum ab his quæ adsunt auferētes. De naturæ igitur cogni-
 tione sic à prima cōstitutione cognoscere oportet. Cæterum ætates ipsæ ad
 seipsas hoc modo habent. Puer itaq; ex calidis & humidis tēperatus est, quia
 ex his cōstitutus est, et in his augmentū accepit. Humidissima igitur & calidis-
 sima sunt corpora proxima generationi, & augetur tēp plurimum, & quæ his
 proxima sunt eodem modo. Adolefcens autē calidus quidem est, quia ignis
 impetus aquæ dominatur. Siccus autē, quia humidū ex puero cōsumptum est,
 partim in augmentū corporis, partim in motū ignis, partim præ laboribus ac
 exercitijs. Vir quū steterit iam corpus, siccus est & frigidus, quia caliditatis im-
 petus non amplius dominatur, sed stat corpus ab augmento quiescens, ac perfri-
 geratum. Verum ex adolefcenti ætate siccitas inest. Ab insequēti autem ætate
 & aquæ accessu, humiditatē non habet, quapropter ex siccis & frigidis exupe-
 ratus est. Senes autem frigidi sunt & humidī, Quia ignis quidem recessus
 contigit, aquæ autē accessus, & siccorum quidē sublatio, humidiorū autem sta-
 tus. Ex omnibus autem masculi calidiores sunt & sicciores, fœminæ uero
 humidiores ac frigidiores. Propterea quòd ab initio utriusq; in talibus geniti
 sunt, & à talibus augetur. Vbi uero in lucem editi sunt masculi, uictu ac diætā
 laboriosiore utuntur, ut excalescāt ac resiccantur. Fœminæ uero humidioribus
 ac pigrioribus diætis utuntur, & caliditatis purgationem ex corpore singulis
 mensibus faciunt. Porro de animæ sapiētia ac desipientia, hoc modo serres
 habet. Quod humidissimū est in igne, & siccissimū in aqua, si in corpore tē-
 peramentum acceperint, sapiētissima sunt. Quia ignis quidem habet humiditatis
 tatem ab aqua, aqua autē siccitatē ab igne, uterq; autem sic sufficientissimus est.
 Neq; ignis alimentū indigētiorem multū procedit, neq; aqua motus indiga mul-
 tum leuis redditur. Sic itaq; utraq; & per se sufficientissima sunt, & inter se per
 mixta. Quod enim minime uicinis indiget, hoc maxime præsentibus obrepes-
 rat, uelut ignis qui minime mouetur, nō præ necessitate; & aqua quæ maxime,
 non præ uiolentia. Ex his autē anima temperata, sapiētissima est, & memoria
 ualentissima prædita. Si uero aliquo ascitamento utens, alterutrum horum au-
 getur ac contabescat, desipientissima redditur, propterea quòd quum sic ha-
 beant sufficientissima existunt. Si autem ignis sincerissimus, itemq; aqua tē-
 peramentum anima fortiat, sit autē ignis paulo inferior ac defectuosior quàm
 aqua, sapientes quidem sunt etiam hi, uerū defectuosiores quàm in priore tē-
 peramento: propterea quòd ignis ab aqua superatus, & tardiozem motum fa-
 ciens, segnius sensibus allabitur. cōstantes autem cum māsuetudine sunt eius-

modi animæ, ad quancūq; tandē rem animū applicuerint. Si uero recto uictu utantur, & sapiētiores & acutiores præter naturā fieri queant. Talibus confert uictu uti ad ignē magis tendente, et nō repletionibus, neq; ciborū, neq; potuum. Cursibus itaq; utendū est uelocibus, quo & corpus humore euacuetur, & humor amplius citius sistatur. Luctis autē & fricationibus & eiusmodi exercitijs uti nō cōducit, ut ne meatus cauiores redditi repleantur. A talibus enim animæ motū grauari necesse est. Cōfert & deambulationibus uti, tum à cœnatum mane, itēq; à cursibus. A cœna quidem, quo alimentū siccius anima suscipiat ab ingrediētibus ac ingestis. Mane uero, quo trāsitus humoris euacuetur, & meatus animæ nō obturentur. Ab exercitijs uero, ut ne in corpore relinquatur quod secretum est à cursu, neq; animæ cōmisceatur, neq; transitus obturet, neq; alimentū conturbet. Cōfert & uomitibus uti, quo corpus depurgetur, si quid defectuosius labores transegerunt. à uomitu aut paulatim adijciēdo cibus offerēdus est, minimū ad quatuor dies. At uero ungi cōducibilis est q̄ lauari. Coitu utendū est, aquæ accessibus cōtingentibus, frequentiore, in ignis autē impressiōibus, pauciore. Porro si in aliqua anima defectuosiorē uim ignis accipiat q̄ aqua, eam tardiorē esse necesse est. & appellantur tales stolidi. Nā ut tardiore existēte circuitu, sensus paulatim allabūtur, & qui acuti existūt parum cōmiscentur, propter circuitus tarditatē. Sensus enim animæ qui per uisum ac auditū contingunt acuti sunt, qui uero per tactum, tardiores & facilius percipiūtur. hos quidē igitur percipiūt etiam tales nihilominus, uelut sunt frigida & calida ac cōsimilia. Quæ uero per uisum aut auditū percipere oportet, quæ non prius sciunt, percipere nō possunt. Si enim non cōmota fuerit anima ab igne allabētē, nō percipere poterit quale quid tandē sit. Tales igitur animæ nō perpetiūtur hoc ob celeritatē, Si autē recta diæta utatur, etiā talis homo melior fieri possit. Cōferunt itaq; huic eadem quæ priori. Verū siccioribus ac paucioribus cibus utetur, laboribus autē pluribus & acutioribus ac uelocioribus. Confert & fomētis uti, & uomitibus à fomentis, & exhibitionibus ciborum à uomitibus ex longiori tēpore, si defectuosius cōtigerint uomitus. Et sanè hæc faciens, sanior ac sapiētior fuerit. Si uero amplius adhuc superetur ignis à præsentī aqua, hos iam alij desipiētes, alij attonitos siue stupidos appellant. Et hæc infaniæ quædam species tardior existit. hi plorant nemine molestante aut uerberātē, formidantq; nō formidanda, & tristantur in rebus nihil ad se pertinentibus, & sentiūt ea quæ nō conueniunt sapiētibus. Cōfert itaq; his, fomentis uti, & à fomētis ueratis expurgari, ac diæta uti quā prius dixi, in digetq; talis homo attenuatione pulmonis ac siccitate. Si autē aqua defectuosiorē uim accipiat q̄ ignis, quum aliās sincerū temperamentū habeant, sani sunt homines corporibus, & sapiētes. Talis aut anima cito percipit allabentia, & non sæpe ab una re ad aliam transit. Natura quidē igitur talis, animæ bonæ est. Melior aut reddetur rectæ diæte usu, & peior prauæ. Confert huic, diæte usus ad aquam magis uergentis, ita ut excessus uitet & ciborū, et potuum, & laborum. Vretur & cursibus curuis & rectis reuertētib; luctisq; ac reliquis exercitijs, ita ut in nullo excessum faciat. Si enim sanū fuerit corpus, & non ab aliquo alio perturbetur, animi temperamentū sapiens existit. Si uero amplius aquæ uis ab igne superetur, tali homini necesse est tanto acutiorē animam esse, quāto citius

tius mouetur, & ad sensus citius allabi, uerum minus constantem priore, propterea quod iudicat ea quæ obueniunt, & in pulmone procedit ob celeritatem.

Confert tali homini diæta uti magis ad aqua uergente, q̄ priori, & maza magis q̄ pane, & piscibus magis q̄ carnibus, & potu aquosiore; & Venere rarius utetur, et laboribus qui sunt maxime secundum naturam q̄ plurimis, uolentis autem uti non est necesse. Vtetur & uominibus paucioribus ex repletionibus, quod corpus quidem euacuetur, q̄ minime uero calecat, Conducit etiam talibus ad sapientiam, ut minime carnosii sint, Nam ad carnis bonam habitudinem, ardoris inflammationem fieri necesse est. Quum autem tale quid huiusmodi anima perpetitur, ad insaniam adigitur, ex superata aqua adacta. Talibus confert actiones obire ac transigere a cibo accepto magis q̄ ieiunis, Stabiliior enim redditur anima alimeto commixto, q̄ alimeti indiga. Si uero adhuc amplius superetur aqua ab igne, talis anima ualde acuta est, & tales necesse est fomina uidere, uocant autem ipsos subfuriosos. Nam res ualde propinqua insaniam est, Etenim a breui & incommoda inflammatione insanit, & in ebrietatibus, & carnis bona habitudine, & præ carni uesu. Verum talem oportet ab his omnibus abstinere, item q̄ a reliqua repletionem, ac exercitijs uolentis. In uictu utendum est Maza uino dulci non subacta, & olenibus coctis, sed non purgantibus, & pisciculis ex muria, & aqua bibere præstantissimum est, si fieri possit, sin minus, uinum molle et album quod aqua sit proximum. Deambulationibus quoque multis mane utendum, a cena uero satis est exurgere, quo cibi quidem non reficentur a deambulationibus post cenam, corpus autem euacuetur a maturinis. Lauare autem magis conducit aqua tepida circumaffusa, quam ungi. Confert & in æstate interdium somno uti breui non multo, ut ne corpus ab anni tempore reficetur. Conueniens est etiam uere ueratris purgare, fomentis antea præparatos, deinde sensim ad diætam inducere, & neque hunc ieiunium actiones obire oportet. Et ex hac sanè cura, huiusmodi anima sapientissima fuerit. Sapientis quidem igitur ac desipientis animæ hoc temperamentum causa est, quemadmodum a me scriptum est, potest q̄ ex diæta & melior, & deterior fieri. Cæterum cuius imperu igne præualefcere, impossibile forte fuerit aqua aliquid apponere, Similiter q̄ aqua præualente in temperamento, ignem augere. Ex his uero & sapientiores & desipientiores animæ sunt. At uero talium non amplius temperamentum est, qualis est, Iracundus, Segnis, Dolosus, Simplex, Infestus, Beneuolus. Taliu omnium natura meatuum per quos anima meat causa est, per qualia enim uasa secedit, & ad qualia allabitur, & qualibus ammisctur, talia sapiunt. Ob id itaque impossibile est talia ex diæta transmutare. Naturam enim obscuram transformare non est possibile. Similiter autem & uocis qualiscumq̄ tandem fuerit, meatus spiritus causa sunt, per qualescumq̄ enim aer mouetur, et ad qualescumq̄ allabitur, talem necesse est esse uocem: & hanc quidem tum deteriore, tum meliorem facere possibile est, quia leuiores ac breuius res meatus spiritus facere possibile est.

Verum illa ex diæta alterare impossibile existit.

HIPPOCRATIS COI DE DIAE

TA SIVE VICTVS RATIONE, LIBER II.

Iano Cornario Medico Physico interprete.



REGIONVM singularū situm & naturā hoc modo cognoscere oportet. Et in summa res hoc modo se habet. Regio ad meridiem sita calidior est, & siccior, quā ea quæ ad septentriones iacet, propterea quod soli propinquior est. Et in his regionibus necesse est & hominū genera, & nascētia ex terra, sicciora ac calidiora & fortiora esse, quā in contrarijs, uelut Libyca gens ad ponticā, & utriusque uicinā. Ipsa autem loca iuxta seipsa hoc modo habent. Alta & squalida & ad meridiem sita, sicciora sunt quā campestria & æqualiter sita, propterea quod pauciores humores habent, illa enim stationem pro aqua pluuia non habent, hæc habent. At uero lacustria ac palustria humectant & calfaciunt. Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdata, & non perflantur, humectant autem, quia nascētia ex terra quibus homines aluntur, humidiora sunt, & spiritus quem attrahimus crassior est, propter aquæ stationem ac immobilitatem. Verum caua loca & non aquosa, siccant & calfaciunt. Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdantur. Siccant autem, tum propter alimentī siccitatē, tum quod spiritus quem inspiramus siccus existens, humorem ex corporibus trahit in alimentū sibi ipsi, quom non habeat alium humorē ad quem allapsus nutriatur. Vbi autem regionibus montes adiacent ad austrum, in his squalidi austri & morbosī afflant. Vbi autem ab Aquilone montes adiacent, in his aquilones perturbant ac morbos faciunt. Vbi uero ab Aquilone caua loca urbibus adiacent, ab æstiuīs uentis calida & morbosa hæc regio existit, propterea quod nec aquilo perflans puram spiritus inductionem exhibet, nec ab æstiuīs uentis perfrigeratur. Cæterum insulæ propinquæ cōtinenti tempestuosiores sunt & ægre in ipsis hybernamus. Marinæ uero hyeme tepidiores sunt, propterea quod niues & glacies in cōtinenti stationes habent, & uentos frigidos in uicinas insulas mittunt. Verum insulæ intra pelagus positæ non habent in hyeme niuium stationem.

Porro de uentis quā naturam ac facultatē singuli habent, hoc modo cognoscere oportet. Naturam quidem habent omnes uenti humectandi ac refrigerandi, tum animalū corpora, tum nascētia ex terra, ob hanc causam. Necesse est omnes uentos spirare à niue, à glacie, & gelu uehementi, & fluminibus, & stagnis, terraque humectata ac perfrigerata. Et fortiores quidem uentos, à maioribus & fortioribus, debiliores uero à minoribus & debilioribus. Quemadmodum enim animalibus spiritus inest, sic etiā alijs omnibus, alijs quidem minor, alijs uero iuxta magnitudinē. Naturam quidem igitur habent humectandi ac refrigerandi omnes uenti, Verū propter situm regionū ac locorum, per quos uenti ad singulas regiones accedunt, diuersi inter se sunt, frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, salubriores, Singulorū autem causam sic cognoscere oportet. Boreas siue aquilo frigidus spirat ac humidus, quia progreditur à talibus regionibus, meatque per tales locos, ad quos non accedit sol ipse, nec aerem resiccans, humorem ebibit ac exhaurit, Quare ad terram

ram habitabilem accedit suam ipsius uim habens, ubi non per regionis situm corrumpitur. & his quidem qui proxime habitat frigidissimus est, qui uero remotissime, minime. Auster autem à similibus aquiloni natura regionibus spirat. Ab Australi enim polo spirans, & à niue multa glacię ac gelu fortis procedens, necessario his qui prope ipsum illic habitant talis spirat, qualis nobis est Aquilo. Verum omnem nõ item similis accedit regionem. Nam quũ per solis iter & in meridiem spiret, humiditas ipsius à sole ebibitur, & reficcatur rarefcit. quapropter necesse est ipsum calidum ac ficcũ huc accedere. In proximis igitur regionibus necesse est ipsum talem uim calidam ac ficcam exercere. & hoc sanè in Libya facit, Nam & terrę nascencia exarescunt, & homines lætenter reficcatur. Quum enim non habeat nec mare, nec fluiuium unde humiditatem accipiat, ex animantibus ac plantis humorem exhaurit. Vbi uero pelagus tranfit, tanquam calidus & rarus existens, multa humiditate regionẽ in quam illabitur implet, & necesse est ipsum calidum ac humidum esse, ubi non regionum situs alterius qualitatis causa existat. Eodẽ modo etiam aliorum uentorum facultates se habent. Cæterũ iuxta singulas regiones uenti hoc modo se habent. Venti ex mari in regiones illabentes, ficciores quodammodo sunt. Qui uero à niue aut glacie, aut stagnis aut fluminibus procedunt, omnes humectant ac frigefaciunt, tum plantas, tum animantia, & sanitatem corporibus exhibent qui non frigiditate superexcellunt. Hi enim lædunt, propterea quod magnas mutationes calidi ac frigidi in corporibus inducunt. Hęc autem perpetuantur hi qui in regionibus habitant palustribus ac calidis, prope flumina magna. Reliqui uero uenti qui à prædictis spirant utiles sunt, tum aerẽ purũ ac sincerum exhibentes, tum animæ calori humiditatem præbentes. Quicunq; uero uenti ex terra accedunt, eos necesse est ficciores esse, tum à sole, tum à terra reficcatur. Quum autem non habeant uenti unde alimentum trahant, à uiuentibus humorem trahentes, & plantas & animalia omnia lædunt. Et quicunq; uenti relictiis montibus ad urbes accedunt, non solum ficcant, sed etiam turbant spiritum quem inspiramus, & corpora hominum morbosa faciunt. Naturam quidem igitur & uim singulorum sic cognoscere oportet. Quomodo autẽ ad singulos se preparare oporteat, in sermone progressu declarabo. At uero ciborum ac potuum singulorum uim, tum eam quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artẽ accelsit, hoc modo cognoscere oportet. Quicunq; igitur in summa dicere aggressi sunt, aut de dulciũ, aut pinguium, aut salforum, aut alterius cuiusdam consimilis facultate, non recte iudicant. Non enim eandem uim habent, neq; dulcia inter se, neq; amara, neq; ulla aliqua eiusmodi. Multa enim ex talibus sunt quæ & aluũ emolliunt, & sistunt, ficcantq; & humectant, Similiter autẽ etiam in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itemq; aluum mouent, & urinã cient. Sunt quæ neutrum horum faciunt. Similiter & ex calfaciẽtibus ac reliquis omnibus, alia aliam facultatem habent. De omnibus quidem igitur impossibile est qualia nam sint declarare, Verum quam uim singulorum habeant, docebo. Ordeum natura quidem frigidum est & siccum. Inest & purgatoriuũ quiddam à succo palearum. Eius solum habebis si uoles ordeum non purgatum coquere, Purgat enim is succus fortiter, Si uero decorticatũ coxeris, pertrigerebit magis ac aluũ sistet. Quum

autē tostum fuerit, humor quidē purgatorius prae igne perit. Frigiditas autem & siccitas relinquitur. Quaecumq; uero perfrigerare ac siccare oportet, id ipsum polentae transigunt. Maza omnis generis sic utimur, facultate autem habet maza haec talem. farinae ex toto collatae alimentum quidem minus habet, uerum magis per aluum secedunt. Purae autē magis nutriunt, minus uero per aluum secedunt. Maza prius subacta, res per se, uino dulci non emollita, leuem facit, & per aluum secedit, ac frigefacit. Et frigefacit quidem, quia frigida aqua madefacta est, per aluum autem secedit, quia cito concoquitur. leuem uero facit, quia multum alimenti cum flatu foras excernitur. Quū enim transitus alimentum angustiores sint, aliud in super accedens non suscipiunt, & quod quidem cum flatu attenuatum est, foras excernitur, quod uero intus manet, flatum inducit, & partim superne eructatur, partim inferne secedit. Multum itaque alimenti à corpore diffiatur. Si uero uelis mazam statim ut subacta est exhibere, talis reficatoria est. Quum enim polenta sicca existat, & aqua sit madefacta, atq; sic praeparata in uentrem illabatur, humorem ex ipso trahit calidum existentem. Solet enim calidum attrahere frigidum, & rursus frigidum calidum. Consumpto autem humore ex uentre necesse est siccare. Aqua uero quae unā cum maza ingrefsa est, frigefacit. Quaecumq; igitur siccare oportet aut frigefacere, aut uentris profuuius diffusum, aut alia quapiam eiusmodi caliditate, maza efficax existit.

At uero sicca, uino dulci emollita ac trita maza, siccata quidem non similiter, propterea quod uehementer est adstricta, alimentum uero plurimum corpori praebet. Nam ut leniter liquefcentis alimentum transitus suscipiunt. Per aluum quidem igitur tarde secedit, flatum autem non inducit, neq; eructatur. Quae uero & aqua, & uino dulci emollita ac prius subacta est, nutrit quidem minus, per aluum autem secedit, & flatum magis inducit. Cyceon autem solum in aqua quidem frigefacit ac nutrit, in uino uero calfacit ac nutrit, & aluum sistit. In melle autem calfacit quidem minus ac nutrit, per aluum uero magis secedit, si non meracum mel fuerit: sin minus, non secedit, sed aluum sistit. In lacte uero bene alunt omnes Cyceones, hoc est farinae. Verūtamen ouillum aluum sistit, caprinum uero magis per aluum secedit. Bubulum uero minus.

Equinum autem & afininum magis secedunt. Triticum fortius est ordeo & magis nutrit, minus autē per aluum secedit, tum ipsum, tum succus.

Panis autem ex tota farina collata, siccata & per aluum secedit. Purus autem magis nutrit, minus uero secedit. Ex ipsis porro panibus, fermentatus quidem leuis est & secedit. Et leuis quidem est, quia à fermenti acore humiditas consumpta est, quae sanè alimentum existit, secedit autem, quia cito concoquitur. Non fermentatus secedit quidem minus, nutrit autem magis.

Qui succo subactus est, leuior est, & multum nutrit, ac per aluum secedit. Nutrit, quia purus est. leuis est, quia leuissimo subactus est, & fermentatus ac tostus ab eodem est. per aluum secedit, quia passus, & aluum mouente tritici parte, permixtus est. Ex ipsis autem panibus maximi maxime alunt, propterea quod minime exurit humidoritas ab igne. Et furnacei panes magis alunt quam focarii & ueruarij, propterea quod minus exuruntur ab igne. Clibano autem cocti & subinericij siccissimi sunt, hi quidem propter cinerem, illi uero per testam humore priuati. Similaginei omnium horum fortissimi sunt, Et ad huc

t. etiam hipp.
r. lib. d. dem.
r. 69. p. 5.
sal. in hoc.
tario

huc magis qui ex alica fiunt, ualdeq; nutriunt, uerum non familiariter fecedunt. Farina pura in aqua pota frigefacit, & lotura pollinis tritici. Furfurum fuccus coctus, leuis, per aluum fecedit. Verum farinae in lacte datae magis per aluum fecedunt, quam in aqua, propter serum, & maxime inter aluum mouentia numerantur. Quaecumq; uero farinae cum melle & oleo coquantur, aut affantur, omnes aestuosae sunt, & ructum cient. Et ructum quidem cient, quia probe alentes non fecedunt. Aestuosae autem sunt, quia pinguia, & dulcia, & inter se concordia, non eadem coctura indigentia, in eodem sunt. Similago & alica cocta, fortia sunt & alunt, non tamen per aluum fecedunt. Trygis, id est Tragus siue olyra, leuior est tritico, & quae ex ipsa fiunt similiter ut ea quae ex tritico parantur, & magis per aluum fecedunt. Avena comesta humefcat ac perfrigerat, iteq; in forbitione accepta. Polentae ac farinae recentes ficciores sunt uetustis, quia igni & preparationi propinquiores existunt. Vbi uero uetustae fiunt, calor exhalat, & frigiditas inducitur. Panes calidi ficcant, frigidi minus, gracilitatem autem quaedam inducunt. Fabae alunt, aluum sistunt, & inflant. Inflant, quia meatus aliud in super accedens alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam alimentum fecem habent. Pisi inflant quidem minus, per aluum autem magis fecedunt. Ochri siue eruihae, & dolichi siue phasoli ac siliquae, his magis per aluum fecedunt, minus inflant, & probe alunt. Cicer album per aluum fecedit, & per urinam ejicitur, & alit. Et alit quidem, carnosum in ipso. Per urinam uero ejicitur, dulce, per aluum autem fecedit, falfuginosum. Milij grana ac paleae siccant, & uentrem sistunt, & cum ficubus, fortibus doloribus coferunt. Ipsum autem Milium coctum alit, non tamen aluo fecedit. Lentae aestuosae sunt & turbatiuae, & neq; per aluum fecedunt, neq; ipsam sistunt. Eruum aluum sistit, & robustum est, & crassifacit, & explet, & boni coloris hominem facit. Lini semen comestum aluum sistit, habet & quiddam frigefactorium. Hormini semen consistit, lupini natura robusti sunt & calidi, uerum per preparationem leuiores ac frigidiores fiunt, & aluo fecedunt. Inio humefcat & aluo fecedit. Cucumeris semen per lotium magis abit q̄ secessum. Explet autem & crassifacit. Et fecedit quidem per aluum, propter palcam externam, explet autem & crassifacit, propter carnem. Lotum uero fecedit quidem, uerum minus, crassifacit autem & explet magis. humefcat autem & urit, propter pingue & oleosum. Cnicus aluum mouet. Papauer aluum sistit, magis aut nigrum hoc facit, sed & album idem agit, alit autem, & robustum est. Horum porro omnium succi carnis aluum mouent, oportet itaq; in preparatione id obseruare, ut quae ficcare uelis, ab his succis detrahas, & carne utaris. quae uero aluum mouere uelis, ut succo copiosiore, carne uero pauciore & succulentiore utaris.

Ceterum de animalibus quae in ciborum usum ueniunt, sic cognoscere oportet. Carnes Bubulae robustae sunt, & aluum sistunt, & aegre in uentre coquantur, propterea quod crassi ac multi sanguinis est hoc animal, & carnes graues, itemq; sanguis, ac lac. Quorum autem animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorum etiam carnes coesimiles sunt. Caprinae carnes his leuiores sunt, & magis aluo fecedunt. Suilla robur quidem magis q̄ haec corpori inducunt, multum autem aluo fecedunt, propterea quod tenues et modici sanguinis

uenas fues habent, carnem uero mustam. Aguinæ leuiiores sunt ouillis, & hedinæ caprinis, quia exanguiores sunt & humidiores. Quū enim sicca & robusta natura sint animalia, dum quidē teneræ sunt, aluo secedunt, ubi uero augmentum sumperint, nō similit̄. Et uitulinae carnes eodem modo se ad bubulas habent. Verum porcinae suillis grauiiores sunt. Quum enim animalis natura carnosum & exæque humiditatis excessum in tenella ætate habet. Quū igitur meatus superaccedens alimentū non suscipiant, intus manens calfacit ac perturbat uentrem. Asininae carnes aluo secedunt, & pullorum adhuc magis.

Equinae leuiiores sunt. Caninae calfaciūt ac siccant & robur inducunt, non tamen aluo secedunt. catulinae uero humectant & secedunt. Suis syluestris caro siccatur & robur exhibet, ac secedit. Cerui siccatur, minus autem secedit, magisq; urinam prolucit. Leporinae siccae sunt & aluum sistunt, urinæ autem citamentū quoddam faciūt. Vulpinae humidiores sunt & urinam cient, Et erinaceorū terrestrium carnes humidiores sunt ac urinā cient.

Porro de uolucrum generibus sic res se habet. Omnia ferme uolucrum genera sicciora sunt q̄ quadrupeda. Quæcunq; enim uescam nō habent, neq; mingunt, neq; sputum aut saliuam fundūt, omnino sicca sunt. Propter caliditatem enim uentris, humiditas ex corpore consumitur in alimētum caliditatis, quare neq; mingunt, neq; sputum aut saliuam fundunt. Cui autem tales humiditates non in sunt, id ipsum necessario siccatur. Siccissima igitur caro est palumbis, deinde colubæ. tertio loco perdicis, ac galli, & turturis. humidissima uero anseris. Seminales autē uolucres prædictis sicciores sunt. Verum anatis carnes, & reliquarum auicularū quæ in paludibus degunt, aut in aquis, omnes humidæ sunt.

At uero ex piscibus siccissimi sunt hi, scorpius, draco, callionymus, cuculus, glaucus, perca, thrissa. Leues autem sunt petrosi ferme omnes, uelut turdus, phuca, elephetis, gobio. Tales autem & prædicti itidem, leuiiores sunt erroribus. Nam hi ut quiescentes raram ac leuem carnē habent, Errones autem & undas uerberantes laboribus fracti, solidiorem carnem habent. Torpedines autem & squatinæ ac Rhombi, & huiusmodi, sunt leuiiores. Quicunq; uero pisces in lutos & aquosis locis alimenta habent, uelut capitones, mugiles, anguilla, & reliqui eiusmodi, grauiiores sunt, propterea quod ab aqua & luto, & in his nascentibus, alimenta habent, à quibus etiam spiritus in hominem ingreditur ipsum lædit ac grauatur. Fluiuatiles autem & palustres his adhuc grauiiores sunt, Polypi uero & sepia, & eiusmodi pisces, neq; leues uelut uidentur sunt, neq; per aluum secedunt. quapropter etiam oculos comesti grauatur, lusciam tamen horum aluum mouent.

Cæterum conchyliæ uelut sunt pinnae, purpuræ, patellæ, buccina, ostrea, ipsa quidem sicca sunt, succi autē ipsorum aluum mouent. Mituli uero & peccines ac tellinae magis aluo secedunt, Vriticæ autē & chartilaginiosi generis pisces, maxime humectant ac aluum mouent. Cæterū Erinaceorū oua, & locustarū humor, & musculi, & ursæ, ac cancri, magis quidem fluiuatiles, sed & marini, aluum mouent & urinam cient. Salfamentis siccant & attenuant, pleraq; etiam aluum leniter mouent. Ex salfamentis siccissima sunt marina, deinde fluiuatilia, Humidissima autem sunt palustria. Ex

ipsis autem salfamentis pisces percae appellati ualde sicci sunt. Animalium porro cicurum ea quæ in syluis & agris pascuntur, sicciora sunt his quæ intra

ædes nutriuntur, quia labore reficcantur, itemq; præ sole ac frigore, & spiritu ficcioe nutriuntur. Verum syluestria ficciora sunt mansuetis, & crudiuora ac sylvarum materie pasta, itemq; parū edacia, ficciora sunt edacibus. Et frugiouora herbiuoris ficciora sunt, Et frugiouora non frugiouoris, & paucibilibus multibilibus, & sanguine referta exanguibus ac paucum sanguinem habentibus, & quæ in uigore sunt uetustis ualde aciuuēculis, & mascula femineis, & castrata non castratis, & nigra albis, & hirta nudis. Contraria uero his humidiora sunt.

Ex ipsis autem animalibus carnes hæc fortiores sunt, quæ optime exercentur ac sanguinolentissimæ sunt, & in quibus recumbunt. Leuissimæ autem carnes sunt, quæ minime exercentur, & in umbra degunt, & in intimis animalibus partibus sitæ sunt. Exanguiuū autem partium robustissimæ sunt, cerebrum & medulla. Leuissimæ uero carniū partes sunt capitales, & sub uentre, musculi, pectines, pedes. Ex piscibus ficcissimæ sunt supernæ partes, leuissimæ sub uentre, Et capita ipsorum humidiora sunt, propter pinguedinē ac cerebrum. Oua uolucrum robustū quid habet, & alunt, & inflant. Robustum quid habent, quia generatio est animalis. Alunt, quia hoc est pulli lac. Inflant, quia ex parua mole in multam diffunduntur. Caseus robustus est & æstuosus & alit. Robustus quidem, quia proximus est generationi. Alit autem, quia carnosæ reliquæ sunt lactis. Aestuosus est, quia pinguis. Aluum autem sistit, quia succo & coagulo compactus est. Aqua frigefacit. Vinum calidū est & siccum, Habet & purgatoriuū quiddam à matena. Vina nigra & austera ficciora sunt, & aluum non mouent, neq; urinam cient, neq; saluā faciunt. Siccant autem & calfaciunt, humiditatem ex corpore cōsumentes. Mollia uero nigra humidiora sunt, & inflant atq; aluum magis mouēt, Dulcia nigra humidiora sunt, calfaciūt autem & inflant humiditatē inducentia. At uero alba & austera calfaciunt, magisq; urinam cient, q; aluum mouent. Noua uina aluum magis mouēt, quia propiora musto sunt, itemq; alunt, & odorata magis quàm inodorata eiusdem ætatis, quia magis concocta sunt, & crassa magis quàm tenuia. Verum tenuia dulcia magis urinā cient, & aluum mouēt, & humectant corpus, & sanguinem debilem faciunt, & aduersariū corporis sanguinem in corpore augment. Mustum inflat, & subducit, ac cōturbat feruens in uentre, & aluo secedit. Inflat quidem, quia calfacit, subducit autem ex corpore, quia purgat, conturbat aut, quia feruet in uentre, atq; ita aluo secedit. Vina acida frigefaciunt, attenuāt & humectant. Frigefaciunt quidem & attenuāt humiditatis euacuationem à corpore facientes. humectant autem per aquam tenuā cum uino ingrediētem. Acetum frigefacit, quia colliquans humiditatem in corpore consumit. Sistit autem magis quàm mouet aluum, quia non alit & acre est. Sapa calfacit & humectat ac subducit. Calfacit, quia uinosā est, humectat, quia alit, subducit, quia dulcis est. Vinum recens sub tormali expresum & nondum excolatum, humectat, subducit, & inflat, quia etiam mustum idem facit. Mel calidum est & siccum, si meracum sit, cū aqua autem humectat & aluum mouet biliosis, pituitosis uero sistit. Dulce uero uinum pituitosis magis aluo secedit. De oleribus porrò hoc modo res se hænt. Aliū calidū est, & aluū mouet & urinā cient corpori, oculis uero non est cōmodum, Multā enim corporis purgationē faciens, uisum hebetat, aluū autem

& urinam mouet, propter uim purgatoriam, coctū debilius est quam crudū, flatum autem inducit, propter spiritus intētionem. Cēpa uisui commoda est, corpori uero mala, quia calida & aestuosa est, & aluo secedit, & alimentum quidem nullum corpori præbet neq; utilitatem, calfaciēs autem siccatur propter succum. Porrum calfacit quidem minus, urinā uero ciet, & aluum mouet, habet & quid purgatorii, humectat autem & ructum acidum sedat. Præstat à reliquis cibis postremū ipsum edere. Raphanus siue radícula, humectat pituitam diffundēs sua acrimonia, folia minus profunt, præterq; ad articularem morbum. Radix uitisosa est, innatās ac ægre cōcoctilis. Nasturnū calidum est, & carnem liquat, sistit autē pituitam albam, quare urinæ stillicidiū inducit.

Sinapi calidum est & aluum mouet, sed & hoc urinæ difficultatem facit.

Quin & Eruca idem facit. Coriandrū calidum est, & aluum sistit, & ructum acidum sedat, & somnū conciliat, si postremū edatur. Lactuca frigidissima est, prius q̄ succum habeat, debilitatē autem quādam corpori inducit.

Anethum calidum est, & aluum sistit, & sternutamenta sedat olfactatum.

Apium magis urinam ciet q̄ aluū mouet, & radices magis q̄ ipsum, aluum mouent. Ocymum siccum est & calidū, & aluum sistit. Ruta urinam

magis q̄ aluū mouet, Habet & uim quandā condensandi, & ad medicamentā noxia cōmoda est præpotata. Asparagus siccus est & aluum sistit, Saluia sicca est & aluum sistit. Solanum frigefacit, & semen in somnis effundere non permittit. Portulaca fluuiatilis frigefacit, sale uero condita ac serua-

ta, calfacit & purgat. Calamintha calfacit & purgat. Mintha calfacit & urinam ciet, & uomitus sistit. Et si quis semen eius sæpe comedat, colliquefacit ut quis distuat, & arrigere prohibet, & corpus debile facit. Rumex cal-

facit ac aluum mouet. Atriplex humida est, nō tamē aluum mouet. Bisturtum calidum est, non mouens aluum. Brasica calfacit ac aluum mouet, & biliosa ducit. Betæ succus quidem aluum mouet, ipsum autē olus comestū

sistit. Radices uero magis aluum mouent. Cucurbita frigefacit & humectat, & aluum mouet. Rapum aestiuosum est, humectat autē & conturbat corpus, non tamen aluo secedit, & urinæ difficultatem inducit. Pulegium

calfacit & aluum mouet. Origanū calfacit, & biliosa subducit. Thym-

bra similia origano efficit. Thymum calidum est, per aluū secedit & mingitur, ducit & pituitosa. Hyssopum calidum est & pituita ducit. Por-

rō syluestria olera, quæ os calfaciunt, & odorata sunt, ea calfaciūt & minguntur magis q̄ per aluum secedunt. Quæ uero humidam habēt naturā frigidamq; ac fatuam, & odores graues, magis per aluum secedunt, q̄ per urinam. Quæ

autem acerba & austera sunt, aluum sistunt. Quæ acria & odorata sunt, urinam ciet. Quæ acria & sicca in ore sunt, ea omnia siccant. Quæ acida sunt, frige-

faciunt. Cæterum succi urinam cientes sunt, crethmi, apij, allij tremor, cythi, feniculi, porri, adianti, solani, qui & frigefacit. Item scolopendrium, min-

tha, feseii, caualides, hyperici, urtica. Aluum autem mouent & purgant, cicer, lentacula, ordeum, beta, brasica, mercurialis, sambucus, cnicus. Hęc om-

nia aluum magis mouēt quam urinam. At uero de pomis hoc modo seres habet. Quæ quidem seminibus referta sunt, ea magis aluum mouēt, Item uis-

idia magis q̄ sicca. Verum uis & facultas ipsorum referatur. Mora calfa-

cūnt & humectant ac aluo secedūt. Pira matura calfaciūt & humectant ac aluū mouent. Dura uero sistunt. Pira syluestria, hyberna, matura, aluū mouent ac purgant. Cruda uero sistunt. Mala dulcia aegre cōcoquuntur. Acida uero & matura, minus. Cydonia adstringunt, & nō mouent aluum. Succī autem malorum, uomitū sistunt, & urinā cient. et ante uomitū odores ipsorum idem praestant. Mala syluestria aluum sistunt. Cocta comesta magis aluum mouēt. Verum ad respiratiōē quae erecta ceruice fit, & succi ipsorum, & ipsa quoq; hausta profunt. Sorba, Mespila & Corna, & quaecūq; alia huius generis poma, aluum sistunt & acerba sunt. Mali punici dulcis succus aluū mouet. habet autē quid aëstuosum. Mala punica uinosa, minus aëstiosa sunt. Acida uero magis frigefactoria. Nuclei autem omnium aluum sistunt. Cucumeres crudi, frigidi sunt & aegre concoctiles. Maturi autem & pepones, minguntur. & per aluum secedunt, uerum flatuosi sunt. Botri uuarū calidi sunt & humidī ac aluum mouent, maxime albi. Dulces quidē igitur calfaciūt fortiter, propterea quod multum iam caliditatis habent. Immatura uero minus calfaciunt, magis autem purgant potati. Ficus & uuae passae aëstiosae sunt, sed aluum mouent. Ficus uiridis humectat & aluū mouet, ac calfacit, humectat, quia succo plena est. Calfacit, propter succum idem, aluū mouet, propter succi dulcorem. Primae ficus pessimae sunt, quia succulentissimae, optime autē sunt potestimae. Ficus aridae aëstiosae sunt, sed aluo secedunt. Amygdalae aëstiosae sunt, uerum probe nutriunt. Aëstiosae quidem sunt propter pinguitudinē, nutriunt autem propter carnositatē. Nuces rotundae similes his sunt. Latrae uero matura probe alunt, & aluum mouēt. Depuratae uero etiam flatum inducunt. Tunicae uero ipsarum aluum sistunt. Acyli ilicis glandes, & quercinae ac saginae glādes, aluū sistunt crudae & assatae, coctae uero minus. Pingues carnes aëstiosae sunt, sed aluum mouent. Carnes conditae ac asseruatae in uino quidem siccant & alunt, & siccant quidem propter uinum, alunt autem propter carnem. In aceto autem asseruatae calfaciunt quidē, uerum minus propter acetum, multum autē nutriunt. At uero sale seruatae minus quidem alunt, humiditate per sale m priuate, attenuant autē & siccant, ac sufficienter aluū mouent. Cæterum uires singulorū detrahare, & addere ac augere, hoc modo oportet. Ex igne & aqua omnia cōstituuntur, & animalia, & terra nascuntur, & ex his augetur, & in hæc feceruntur ac resoluuntur. Fortium quidem igitur eduliorum uim saepe coquendo ac frigefaciendo detrahare oportet, et uice uersa augere. Humidorū autem torredo ac assando humiditatē eximere. Siccorum uero rigādo ac madefaciendo. Salforū rigando & coquendo. Amaroꝝ & acriorū dulciū mixtura. Acerborū pinguiū temperamēto, & de reliquis omnibus ex praedictis iudicium facere oportet. Quaecūq; tosta aut assata sunt, aluū magis sistūt q̄ cruda, propterea quod humiditas itēq; pinguitudo per ignē ablata sunt. Quū itaq; in uentrē inciderint, humiditatē ex uentre trahunt, & oscula uenarū concludunt siccantq; ac calfaciūt, quare transitus humiditatis sistunt. Quae uero ex inaquosis ac siccis & aëstiosis locis ueniūt, ea omnia ficiora ac calidiora sunt, & robur amplius corpore exhibēt, propterea quod pari mole ac copia grauiora sunt & densiora, & maiore redditū tribuūt, si quae ex humidis et riguis ac frigidis. Hæc em̄ humidiora sunt et leuiora ac frigidiora. Nō

igitur

igitur solū ipsius cibi & potus, & animalū ipsorum uim nosse oportet, sed etiā patriæ unde sunt. Quū igitur forte alimentū corpori offerre uoles, & ex iisdem cibis, his quæ ex inaequalis locis ueniunt utēdum est, & cibus, & potibus, & animalibus. Vbi uero leuiore & humidiorē, his quæ ex riguis ueniunt uteris. Dulcia & acria, & falsa, & amara, & austera, & carnosā, calfacere solent. Item quæ sicca sunt, & quæ humida. Quæcūq; igitur de sicca parte plus in se habent, ea siccant & calfaciunt. Quæ uero humidæ partis plus habent, ea omnia calfacientia humectant, & aluum magis mouēt q̄ sicca. Nam ubi alimentum amplius corpori præbuerunt, reuulsiōē in uentre faciūt, & humectantia aluo secedunt. Quæ autē ex calfacientia siccant, tum edulia tum pocula, neq; saliuam, neq; urinam, neq; secessum facientia, corpus siccant, idq; ob hanc causam. Corpus calfactum humore uacuatur, & pars eius ab ipsis cibis, pars in alimentum caloris ipsius animæ consumitur. Pars etiā calfacta & attenuata per ipsum corpus expellitur. Dulcia & pingua ac oleosa replent, quia ex modica mole multum diffundūt. Calfacta autem & diffusa, caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt. At uero acida, & acria, & austera, & acetosa, & ex toto collata, & sicca, non replent: propterea quod oscula uenarum aperiant & expurgant, & partim siccantia, partim mordentia ac adstringentia, humiditatem carnis horrere ac considere & in modicam molem cōtrahi faciunt, atq; ita uacūū multum in corpore fit. Quum igitur uoles à modicis implere, aut à pluribus euacuare, talibus utaris. Recentia omnia maiorem q̄ alia fortitudinem habent, propterea quod propinquiora uiuo sunt. Verū antiqua & marida, magis q̄ recētia aluum mouēt, quia propiora putredini sunt. At uero cruda alunt & ructus cient, propterea quod quæ ignem coquere oportebat, ea uēter transigit, debilior q̄ ingesta sunt existens. Cæterum obsonia ex uarijs intritis præparata, æstuosa & humida sunt: propterea quod pingua, & tosta, & calida, & inæquales inter se uires habētia, in eodem coherant. Verum quæ in muria præparantur meliora sunt, & non æstuosa. Porro de balneis hoc modo habet. Aqua potabilis humectat & frigefacit, exhibet enim corpori humiditatem. Salfum autem balneū calfacit ac siccant. Quum enim natura calidum sit, trahit a corpore humiditatem. Calida autem balnea ieiunū attenuant ac frigefaciunt: per caliditatem enim humiditatem de corpore auferunt, euacuata autē de carne humiditate, corpus perfrigeratur, à cibo accepto eadem calfaciunt, ac humectant, ea quæ supereminet in corpore diffundentia in maiorē molem.

Balnea autē frigida uice uersa, uacuo quidē corpore præbent quandam caliditatem. Vbi autem cibus ingestus est, ab humido existente detrahūt, & frigidum existens siccitate replent. Illuues siccant quum humiditas cōsumatur. Si militer etiā unctiois neglectus. Vnctio uero calfacit, humectat, ac mollit. Sol & ignis siccant, propterea quod quæ calida sint & sicca, humiditatem ex corpore trahunt. Umbra & frigus moderate humectant, dant enim magis q̄ accipiunt. Sudores omnes abeuntes siccant & attenuant, humore ex corpore deficiente. Coitus attenuat, humectat & calfacit. Calfacit quidē propter laborem & excretionem frigiditatis. Attenuat autē propter euacuationem, humectat, propter colligationis reliquias in corpore præ labore. Vomitus attenuant propter cibi euacuationē, non tamen siccant, si quis postridie recte cū-

ret, sed humectant, propter repletionem & colliquationē carnis præ labore. Si uero quis sinat hæc postredie consumi in alimētum caliditati, & diætā sensim adhibeat, siccant. Ventrem autē compactum uomitus soluit, & egerentem magis quā oportet, sistit, illū quidem humectans, hunc uero siccans. Quum igitur aliuū quis sistere uolet, auide deuoratu cibum euomere oportet, priuquā humefcat & infra detrahatur: & magis acerbis & austeris edulsijs uti. Vbi uero soluere aliuū quis uelit, plurimo tēpore cibis immorari confert, & acerbis, ac salis, & pinguibus, ac dulcibus, tum cibis, tum potionibus uti. Somni ieiunum attenuat & frigefaciunt, si non longi fuerint, præsentem humiditatē euacuant. Qui uero magis calfaciūt, colliquant carnem, & corpus diffundentes exoluunt, ac debiles faciunt. à cibo uero sumpto calfacientes humectant, alimētum in corpus diffundentes. à matutinis autē deambulationibus somnus maxime siccatur. Vigilia in exfatiatis cibo noxia est, non permittens cibum liquari ac concoqui. Ieiunos autē attenuat quidem, uerū minus lædit. Sediticines ac ocium humefcat, & corpus debile facit. Anima enim quiescēs humiditatem ex corpore nō consumit. Labor siccatur, & corpus robustum facit. Semel in die cibum capere attenuat, & siccatur, & aliuū sistit, propterea quod per animæ caliditatem humiditas ex uētre & carne cōsumitur. Prandium contraria facit. Aquæ potus calidus attenuat, similiter & frigidus. At uero & spiritus, & cibus, & potus, humiditatē in corpore cōgelant, si excellenter frigida fuerint, & per cōgelationem ac frigiditatem aluos sistunt. Nam animæ humiditatem superant. Rursus autē etiā caliditatis excessus eandem cōgelant, in tantum ut diffundi nequeat. Quæcūq; uero calfacientia corpus, & alimētū non præbentia, carnem humiditate euacuant etiam excessum non facientia, ea frigiditatem homini exhibēt. Nam præsentem humiditate mora, flatu ab ipsa repletur ac perfrigeratur. Cæterum quam uim labores habeant nunc exponam. Sunt enim alij naturales, alij uiolēti. Naturales igitur sunt, uis labor, auditus, uocis, curarum. uis quidem igitur talis uis est. Anima in id quod uidetur intenta, mouetur & calefcit. Calfacta uero, euacuata humiditate siccatur. Per auditum uero allabente sono, anima cōcurritur & laborat, labrans autem calefcit & siccatur. Quæcūq; sunt hominibus in cura, anima etiam ab his calefcit ac siccatur, & humiditatē consumens laborat, & carnes attenuat, & hominem euacuat. Quicūq; labores uocis sunt, uelut sermo, aut lectio, aut cantus, omnes hi animam mouent, Mora autē siccatur & calefcit, & humiditatem in corpore consumit. At uero deambulationes etiam ipsæ maxime præ reliquis naturales sunt. Habent autē quid uiolentum. Vis ipsarum talis est. Deambulatio à cœna & aliuū, & corpus, & uentrē siccatur, ipsumq; amarum fieri non sinit, ob hanc causam. Quum mouetur homo, calefcit corpus, itemq; cibi. Attrahit igitur humiditatē caro, & aliuū amarā fieri non sinit. Corpus quidem igitur repletur, aluus uero attenuatur. Siccatur autem eadem, ob hanc causam. Quum corpus mouetur & calefcit, quod tenuissimum est alimētum consumitur, partim per insitum calorem, partim uero unā cū flatu foras excernitur, partim etiam per locium eijcitur. Quod uero siccissimū est de cibis relinquitur, Quare unā cum alio etiam caro resiccatur. Matutina deambulationes attenuant, & partes circa caput leues, & agiles, ac promptas reddunt,

& aluum soluunt. Attenuant quidem, quia motum corpus calefcit, & humiditas attenuatur ac purgatur, partim per spiritū ac flatum, partim uero emungitur & excreatur: sed & aliqua pars in alimentū caliditatis animæ consumitur. Aluum autem soluunt, quia quū calida sit, frigidus spiritu superne allabente, caliditas frigiditati cedit. Leues autem partes circa caput faciūt, ob hanc causam, Quū euacuata est aluus, ex reliquo corpore & capite humiditatem in seipsam attrahit, nimirū calida existens. Euacuato autem capite, & uisus & auditus depurgantur, & homines agiles fiunt. Deambulationes autem post exercitia, corpora pura reddunt, & attenuant, non permittentes carnis colliquationem fieri præ labore, sed ipsam depurgant. Cæterū cursus longi ac curui sensim facti, calfacientes carnem, concoquere ac diffundere possunt, & uim ciborū in carne concoquunt: uerū corpora tardiora ac crassiora reddūt quàm cursus circulares. Et multa comedentibus cōmodiores sunt, & hyeme magis quàm æstate. Qui uero in ueste fiunt, eandem uim habent, magis autem exalfaciūt, & corpora humidiora faciūt, & decoloratiora: quia sincerus spiritus allabens ipsa non depurgat, sed in eodem spiritu exercentur. Conferunt itaq; & siccis, & carnis qui carnem demoliri & abolere uolunt, itemq; senioribus, propter corporis frigiditatem. Cursus autem recti reuertētes, & equestres indefiniti, carnem minus diffundunt, attenuant autem magis, propterea quod externis animæ partibus hi labores sunt, & humiditatem ex carne reuellunt, & corpus attenuant ac siccant. Circulares uero cursus carnem minime diffundunt, attenuant autem & distendunt carnem & uentrē maxime, propterea quod acutissimo spiritu utentes, humiditatem in seipsos celerrime trahunt. At uero concusiones siccant quidem derepente, non sunt autem idoneæ, neq; commodæ: nam conuulsiones inducunt: quia exalfactū corpus, cutem quidem fortiter atenuat, carnem uero minus coagmentat q̄ cursus circulares, carnem autem humore euacuant. Cōmotiones & alleuationes carnem quidem minime exalfaciunt, corpus autem & animā irritant, & spiritu euacuant. Lucta & fricatio, externis corporis partibus magis laborem exhibent. calfaciūt aut carnem, & corroborant ac augeri faciunt, ob hanc causam. Quæ ex natura solida sunt, confricta confidunt ac coagmentantur, quæ uero caua sunt, augetur. Quod itaq; densum est in carne, id confrictū coagmentatur, caua uero augetur, itemq; uenæ. Nam carnes calfactæ ac siccatae, alimentū in seipsas per uenas trahūt, deinde augetur. Volutatio in puluere cōsimilia luctæ efficit. Magis autem siccatur propter puluerem, & minus in carnem. Micatio per summas manus atenuat, & carnes sursum trahit. Follis, & manuum ad rythmū motus, cōsimilia faciunt. Spiritus detentio, meatus disparare, & cutem attenuare, & humiditatem sub cutem extrudere potest. Exercitia in puluere & oleo in tantum differunt, quod puluis quidem est frigidus, oleum autē calidum. In hyeme igitur oleum corpus magis auget, propterea q̄ frigus prohibet à corpore quid auferre. In æstate uero caliditatis excessum faciēs, carnē liquat: quū et à tempore, & oleo, ac labore, corpus calefiat. At uero puluis qui inter exercendum accedit, in æstate quidē magis auget. Nam frige faciēs corpus, in excessum calferi nō permittit. In hyeme uero frigus & algore inducit. Morari in puluere post exercitia in æstate, modico tempore, cōfert frige faciēdo. Verū longior mora su

perreficat, & corpora dura ac lignofa efficit. Fricitio ex oleo & aqua molli, & nō uehemēter excalet fieri finit. Porro de lafsitudinibus quæ in corpore fiunt, hoc modo res fe habet. Homines in exercitati ab omni labore lafsantur. Nulla enim corporis pars exercitata eft ad ullum aliquē laborem. Corpora autē exercitata, ab inſuetis laboribus delafantur. Aliqua uero etiā à cōſuetis exercitijs lafsantur, ſi modū exceſſerint. Species quidem igitur lafsitudinum eiufmodi ſunt. Vis autē ipſarum ſic habet. Etenim in exercitati humidam carnem habentes, quum laborauerint corpore calefacto multā colliquationem remittunt. Quicquid igitur exſudauerit, aut cum corpore depurgatū fuerit, non exhibet magis laborē in corporis parte præter conſuetudinē euacuata. Quicquid uero ab excretionē intus remaſerit, non ſolū huic laborem exhibet, ſed etiā ei parti quæ humiditatē ſuſcepit. Non enim cōmoda eſt corpori, ſed infeſta. Et in carnes quidē corporū non ſimiliter cōgregatur. Verū in carnoſas partes, quare his laborē exhibet, donec exiuerit. Tanquā enim circuitū non habens, quieſcēs calefit tum ipſa, tum quæ allabūtur. Si igitur multū fuerit quod excretū eſt, etiā ſanum corpus exſuperat, ut totū concaleſcat, & febrē fortem inducit. Calefacto enim ſanguine & attracto, celerem circuitū faciunt ea quæ in corpore ſunt, & tum reliquū corpus præ ſpiritu purgatur, tum quod compactum eſt caleſcēs attenuatur, & ſimul ex carne foras ſub cutem extruditur, atq; hoc ſudor calidus uocatur. Hoc autē excreto, & ſanguis in naturalē ſtatum reſtituitur, & febris remittit, & lafsitudo ſedatur maxime tertia die. Cæterum eiufmodi lafsitudinem ſic curare oportet, ut fomētis & balneis calidis id quod cōpactum eſt diſſoluamus, & deambulationib. uehemētibus depurgemus, & modico cibo ac attenuationib. carnis euacuationē cogamus ac coagmētemus, & oleo ſenſim multo tēpore fricemus, ut ne uiolenter excaleſcat. Vnguētis etiā tum exudatorijs, tum mollētib. unguere ac mollire cōducit. At uero exercitatis, ab inſuetis laboribus propterea lafsitudo cōtingit. Quū corpus nō fuerit laboribus exercitatū, neceſſe eſt carnē humidā eſſe ad eum locū, ad quem nō eſt adſuetus ſe laboribus exercere, quemadmodū etiā ad ſingula exercitatioū genera. Carnē igitur neceſſe eſt colliquare, & excerni, cōſideretq; ac cōtrahi, uelut priori. Cōfert autē hoc modo curari. Exercitationibus utendū eſt cōſuetis, quo id quod cōpactum eſt caleſcēs extenuetur ac depurgetur, & reliquum corpus nō humeſcetur, neq; in exercitatu maneat. Vtile eſt & hunc balneis calidis uti, itemq; fricitione ſimiliter ut priorē. Verum fomētis nihil habet opus. Labores enim calfaciētes ſufficiētes ſunt attenuare & depurgare id quod compactū eſt. Laſitudo autē à cōſuetis exercitijs hoc modo fit. A moderato quidē labore laſitudo nō mouetur. Quū uero maior q̄ oportet labor fuerit, carnē ſuperreficcat, euacuata autē humore caro, caleſcit, & dolet, & horret, & ad febrē perducitur longiorē, ſi non quis recte curet. Oportet autē primū quidem ipſum balneo nō ualde multo, neq; nimis calido lauari. deinde exhibitō à balneo molli uino, in cena offerre plurima & omnigena edulia, et potū aquoſo, uino uero molli ac multo uti. Poſtea lōgo tēpore his immeretur, donec uenæ repletæ atq; tollantur. Deinde uero uomat, & poſt modicam ſtationem, molliter dormiat. Poſtea per dies ſex ſenſim ad cibos et labores conſuetos adhibeatur, atq; ita ad cōſuetum cibum ac potū perducatur. Vim autē habet hæc curatio talem. Reſe-

catum excellēter corpus, humectare potest citra excessum. Si quidē igitur possibile esset, laboris excessum nosse, quātus is esset, commodū foret ipsi per moderatū cibum mederi. Nunc uero illud impossibile est, hoc uero facile. Corpus enim resiccātū, ab ingestis omnigenis edulsijs id quod cōducibile sibi ipsi est sumit, unaquæq; pars de singulis cibis. repletū autē & humectātū, alio per uomitum euacuata, rursus excessum remittit. Aluus autē uacua existēs reuellit. Excedentē itaq; humiditatē caro eructat, moderatam uero nō remittit, nisi per uim, aut labores, aut medicamēta, aut aliam quādam reuulsionē. Qui autem additio ne cibi sensim crescente utitur, is corpori diætā placide constituit.

HIPPOCRATIS COI DE DIAE

TA SIVE VICTVS RATIONE, LIBER III.

Iano Cornario Medico Physico interprete.



De diætā humana exacte quid cōscribere, ur ad ciborum copiam, laborū cōmensuratō ac symmetria fiat, nō est possibile, quemadmodū etiā antea à me relatū est. Multa enim sunt impedimenta. Primū quidem hominū naturā, diuersā existētes. Nam & sicca ipsa ad seipsas, & ad alia collata magis ac minus sicca sunt & humida. Similiter etiā alia omnes. Deinde ætates nō ipsē indigētes. Insuper & regionū situs, & uentorum mutationes, & temporū alterationes, & anni cōstitutiones. Est & inter ipsos cibos multa differentia, Tritiçū enim à tritico differt, & uinū à uino, & reliqua omnia ex quibus uictū facimus diuersa existētia, impediūt quo minus possibile sit exacte de diætā cōscribere. At enim prænotiones inuētā sanā à me sunt eorū quæ in corpore dominātur, siue labores cibos, siue cibi labores superēt, & quomodo singulis mederi oporteat, prædicereq; sanas naturas, & ut nō accedat morbi, nisi quis ualde multū delinquat ac sæpe. hæc autē medicamentis iam opus habēt. Sūt autē quæ neq; per medicamēta sanari possunt. Quantū quidē igitur inueniri possibile est quæ maxime ad rem faciūt, à me inuentū est. Verū exacte à nullo. Primū igitur multis ac uulgo hominibus cōscribam, ex quibus maxime utilitatem capere possint, qui sanē cibis uulgaribus utūtur, ac laboribus necessarijs, profectiōibusq; necessarijs, ac operis marinis ad uitā tam degēdam reperitis: quicq; calefcunt plus q̄ expedit, perfrigerāturq; præter cōmoditatem, & reliqua diætā incōstanti utuntur. His itaq; ex præsentibus sic uictū facere conducit. Annū equidē in quatuor partes diuidunt, quas pleriq; omnes nouerūt, hyemē, uer, æstatem, autūnum. Et hyemē quidē à pleiadū occasu, usq; ad æquinoctiū uernum. Ver autē ab æquinoctio usq; ad pleiadū exortum. Æstatem uero à pleiadum ortu usq; ad Arcturi exortum. Autūnum ab arcturi ortu, usq; ad pleiadum occasum. In hyeme quidem igitur temporis frigido & cōpacto se opponēdo, hoc uictū uti cōducit. Primū quidem semel tantū in die cibum capere cōuenit, nisi quis ualde siccum uentrē habeat. Id uero si fieri non possit, modicum prandere. Victu autē utendum est sicco & austero, & calcfatorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane autē magis uti expedit, & obsonijs afflatis potius q̄ coctis. Et potioniibus nigris meracioribus ac paucioribus

bus. Oleribus minimū, præterq̄ calefacientibus & siccis. Succis item ac forbitionibus minime utendū est. Laboribus autē multis omnibus, curfibusq̄ curuis sensim crescēte accessione, & lucta in oleo longa, à leuibus ordiēdo ac sensim addendo. Et deambulationibus ab exercitijs, acutis ac celeribus. à cœna uero, tardis in tepore. Matutinis autē multis, leni initio factō, ac sensim crescēte accessione, ita ut placide rursus desinas. Utendū est & strato duriore, & nocturnis itinēribus, & funambulationibus, ac curfibus per funem uti cōfert. Omnia enim hæc attenuant ac calfaciūt. Utendum etiā nauigatione. Vbi autem quis lauari uelit, si quidem in palestra se exercuerit, frigida lauetur. Si uero alio quopiam exercitio usus fuerit, calida cōmodior existit. Utendū & uomitibus, si humidiores sint ter in mēse, sin sicciore, bis à cibus omnis generis. à uomitibus, sensim perueniendū est ad cōsuetum cibum per dies tres, eoq̄ tempore laboribus leuioribus ac paucioribus utēdum. à bubulis autē & porcinis carnibus, aut alijs, quicquid tandem modum excesserit, repletus uomat: & à caseosis & dulcibus ac pinguibus, eum qui non est aduerus repleri, uomere cōducit: & ab ebrietate, ac ciborū mutatione, & regionū alteratione uoendū est. Oportet autem frigori seipsum purum exhibere, præterq̄ à cibus ac exercitijs. Sed & in matutinis deambulationibus ubi corpus calefieri cœperit, itemq̄ in curfibus etiam in alio tēpore, excessum uitare oportet. Melius est enim corpori hyemem ferre, q̄ exerceri hoc tēpore. Nam neq̄ arbores quæ hyemem non pertulerunt hoc tēpore, fructū ferre possunt, neq̄ ipsæ sanæ esse. Utēdum est & laboribus hoc tēpore multis usq̄ ad excessum, nisi lassitudines succedāt. Signū autem docebo idiotas, ostendāq̄ quapropter hæc ita se habent. Tempore existente frigido ac compacto, cōsimilia patiuntur etiam animalia ipsa. Necessē igitur est corpora tarde calefieri à labore, & modicam quandam humiditatis præsentis partem excernere. Deinde modicū tempus cōcessum est quo laborēt, multum autem quo quiescāt. Dies enim breuis est, nox uero lōga, propterea igitur neq̄ tempus, neq̄ labor excessum habet. Ob hæc itaq̄ causam hoc tempore sic diætā instituire oportet, à pleiadum occasu usq̄ ad solstitium hybernū diebus quadraginta quatuor. Circa solstitium autē maxime in custodia ac tutela esse, & à solstitio alios totidem dies eadem diætā uti. Postquā autem tēpus adduxerit fauoniū, & mollius factū fuerit, oportet etiam cum tempore diætā sequi, diebus quindecim, quum arcturus oritur & hirundo uolat. Sequēs uero tēpus magis uarie transigere oportet usq̄ ad æquinoctium diebus triginta duobus. Oportet igitur etiam diætā uti hoc tēpore uarietate, molliorēq̄ ac leuiore, & cibo, & potu, & labore, atq̄ ita sensim ad uer perducere. Quum autē æquinoctiū iam factum fuerit mollius, & dies longiores, ac noctes breuiores, & tempus calidū ac siccum cōstitit, etiā præsens uictus probe nutriens ac meracius sit. Quemadmodū igitur arbores rationē non habentes, hoc tempore præparant sibi ad æstatis cōmoditatem, tum incrementum, tum umbram: Sic oportet hominē, quū sanè mente ac ratione præditus sit, carnis incrementū salubre sibi præparare. Oportet igitur ut ne derepente diætā trāsmutetur, tempus in sex partes diuidere, per octo dies. In prima itaq̄ parte, & labores detrahē oportet, & reliquis quoq̄ uelocioribus uti. Cibus autē mollioribus, & ponbus aquosioribus, ac albionibus, & lucta cū oleo in sole utendū est. In singulis autē temporibus fins

gulas diætas paulatim trāsmutare oportet, & deambulationes detrahere à cœna
 plures, matutinas pauciores: & mazā pro pane offerre, & olera coctā exhibere,
 & obsonia coctā affatis adæquare, & balneis uti, & parū prandere, & re uene-
 rea pauca uti, & uomitū. primū quidem quarto quoque die, deinde per longius
 tempus, quo & corpus pura carne incarnatū cōstituas, & diætā in hoc tempore
 mollem, usque ad pleiadum exortum. Et in hoc iam æstas adest, & ad hanc
 nunc diætā instituire oportet. Quum itaque pleias exorta fuerit, cibus mol-
 lioribus ac paucioribus uti oportet. Deinde maza magis quam pane, atque ea prius
 subacta, & uino dulci non emollita, potibus autē mollibus albis aquosis, prædio
 modico, & somnis à prædio breuibus, & repletionibus, ex cibus ac potibus quam mi-
 nimis. Potu inter edendū utendū est sufficere, per diem uero minime biben-
 dum, nisi necessaria aliqua siccitate corpus utatur. Utendum est & oleribus co-
 ctis, exceptis estuosis ac siccis. Utendū etiā crudis, exceptis calfacientibus ac sic-
 cis. Vomitibus, nisi si qua repletio cōstringat, utendū non est. Re autē uenera mini-
 me. Balneis autē tepidis uti licet. At uero poma fortiora sunt quam pro humana na-
 tura. Melius est igitur à pomis abstinere. Si uero quis cum cibus utatur, minime
 deliquerit. Laboribus quoque ac curibus circularibus exerceri oportet, & cur-
 sibus rectis reuertentibus, modicis multo tempore, & deambulationibus in umbra, lu-
 cia aut in puluere, quo quam minime excaleat. Verū uolutationes in puluere
 meliores sunt quam cursus circulares. Frigefaciunt enim corpus humore euacuantes,
 à cœna deambulandū non est, sed saltem surgendum. Mane uero deambulatio-
 nibus utendū. Soles uitādi sunt, itaque frigora, tum mane, tum uespere, quæ flus-
 mina, aut stagna, aut niues exhalant. Hanc aut diætā tolerare oportet usque
 ad solstitiū æstiuū, quo in hoc tempore adimas omnia quæ sicca sunt et calida et ni-
 gra ac meraca, itaque panes, præterquam si parū quod uoluptatis gratia cōcedere uelis.
 Dequenti uero tempore utetur mollibus & humidis & perfrigerantibus, ac albis, usque
 ad arcturi exortū ac æquinoctiū per dies nonaginta tres. Cæterū ab æquinoctio
 sic diætā instituire oportet, per autumnū ad hyemē adducendo, ita ut mu-
 tationes frigorū ac teporis uites uesitū crasso. Utendū aut hoc tempore motu in
 ueste, frictioneque ac lacta in oleo, ita ut sensim accessio crescat. Deambulationes
 quoque in tempore faciendæ sunt, & calidis lauacris utendū, & somni diurni detra-
 hendi. Cibus aut utendū est calidioribus, ac minus humidis, & puris, & potibus
 nigrioribus, uerū mollibus & non aquosis. Oleribus uero minus. Reliquā item
 diætā omnē sic cōsonam adhibere oportet, ut ab æstiuis detrahas, hybernis
 aut utaris non ad summū, quo hybernū uisū quam proxime constituas, in diebus
 duodequingenta, usque ad pleiadū occasum, ab æquinoctio. Hæc porro mul-
 titudinē communē dæ gratia ac uulgi hominū causa prodo, qui ex necessitate
 uitam temere transigunt, neque licet ipsis aliorū negligentes esse, ac suam ipsorū
 sanitatē curare. Quibus uero iam hoc certū ac percognitū est, quod neque diu-
 tiarū, neque corporis, neque ullius alterius rei ulla utilitas est, citra sanitatē, ad hos
 inuēta est a me diætā, quantū possibile est, ad ueritatē ac certitudinē possibilium
 rerum adducta. Hanc itaque in sermone progressu declarabo. Inuentū autē hoc
 honestum quidē mihi repertori, utile uero discentibus, nullus adhuc priorū ne
 attētauit quidē componere, quod ad omnia alia magni æstimandū duco. Est
 autē præcognitio antequam ægrotent cognitio, quid corpora perpetiantur, utrum
 cibus

cibus superat labores, aut labores cibos, aut moderate inter se habeant. Vtrum enim tandem superetur, morbi fiunt, ab æqualitate autē inter ipsa mutua, sanitas adest. Ad hæc sanè cōmemoranda accingor, & demonstrabo qualia fiunt hominibus qui sani sibi esse videntur, & iucūde comedunt, laborareq; possunt, & corporis ac caloris satis habēt. Nares citra causam apertam à cœna implētur, & repletæ esse videntur, emungunt autē nihil. Vbi autē deambulare mane incipiunt ac exerceri, tunc emungunt ac spuunt. & progressū tēporis etiam palpebras graues habent, & pruritus frontē occupat, & à cibis abstīnēt, & bibere minus possunt, & color fit decolor, & aut destillationes mouentur aut febres horridæ, iuxta quodcūq; tempus repletio fuerit mora. Quicquid autē eo tempore fecerit, in id ipsum culpā ac causam rejicit, quū id ipsum causā non sit. Huic enim cibi superant labores, & repletio paulatim collecta in morbum ipsum adduxit. Sed nō huc usq; differre oportet, uerū ubi prima signa cognouerit, scire quod cibi labores superat, & paulatim collecta repletio existit. Mucus enim & salina repletionis indices sunt ac signa, & quiescētē quidem corpore, meatus spiritus obturant, multa repletione existente, ubi uero calefactū est præ labore, attenuata excernuntur. Talem autē sic curare oportet. Exercitātū in cōsuetis exercitijs citra lassitudinem, calidatq; lotum, cibis omnigenis expleto, ac uomere facito. à uomitu uero os & fauces colluat uino austero, quo oscula uenarū cōstringantur, & nihil attrahant, uelut à uomitu fieri solet. deinde surgens modice deambulet in repore. Postridie uero deambulationib. quidē utendū est. exercitijs aut pauciorib. & leuionibus q̄ prius. & si æstas fuerit impransius degat, sin minus, parū comedat, & de cœna quam fumere solebat, dimidiū detrahat. Tertia autem die labores quidem obeat omnes cōsuetos ac deambulationes, uerum cibos sensim ingerat, quo quinta die à uomitu cōsuetum cibū assumat. Et si quidem ab hoc satis bene habuerit, de cætero cibis quidē paucioribus, laboribus aut pluribus curetur. Si uero signa repletionis nō quieuerint, interpositis duobus diebus ab ea qua cōsuetos cibos assumpsit, rursum uomat, & eodē modo sensim ad cōsuetos cibos redeat. Quod si nō successerit, etiam tertii eadem repete, donec à repletione liberetur. Sunt autē homines qui ubi labores superantur à cibis, talia patiuntur. Incipiente quidē repletione somni longi & dulces ipsis cōtingunt, & interdū etiā dormiunt. Somnus aut cōtingit carni, & sanguis funditur, & spiritus diffusus tranquillus est. Quum uero nō suscipiat amplius corpus repletionē, secretionē iam remittit intro, præ circuitus uiolentia, quæ sanè secretio cōtraria alimēto à cibis, animā perturbat. Quo tempore non amplius iucundi ipsis sunt somni, sed necesse est hominē perturbari, & uidetur sibi cum aliquo pugnā cōmittere. Qualiacūq; enim patitur corpus, talia uidet anima, uisum iam conuulso. Quū igitur ad hoc peruenit homo, prope iā est ut ægroret. Quod aut ueniet morbus, ualde manifestū est. Qualis em secretionis uenit, & quancūq; partē superauerit, eam ipsam morbo affligit. Verū nō oportet ita despicētē esse & huc usq; differre, sed statim ubi prima signa cognouit, curā cōtingere, & hūc uelut priorē curare. longiori autē tempore, ac fame opus habet. Sunt præterea etiā talia repletionis signa. Doler corpus aliquibus totū, aliquib. pars quadā, quæcūq; tandē. Dolor aut est uelut lassitudo, & de lassati esse sibi uidentur, significatq; ac repletione curantur donec ad febrē perueniant.

& adhuc nondū hoc cognoscūt, sed balneis ac cibis utētes, ad pulmonis inflā-
 mationē, peripneumoniā græcis dictam, morbū deducunt, & ad extremū peri-
 culū deueniunt. Verū oportet providere antequā ad morbos perueniāt, & hoc
 modo curare, ut maxime mollibus fomētis hominē foueamus, aut si id fieri ne-
 queat, multa calida lauemus, ac corpus dissoluamus, & à multis ingestis cibis,
 primū quidem acribus ac plurimis, deinde salis, probe uomere faciamus. quo
 factō exurgat ac modico tempore deambulet in tepore, deinde dormiat. Mane
 uero deambulationib. sensim crescētibus, utendū est, & exercitijs leuibus, & cibo
 rū exhibitioib. sensim crescētibus, uelut prius. Attenuatione aut plurima opus
 habet, itēq; deambulationib. Si uero prouidētia nō adhibita ad febrē peruene-
 rit, nihil aliud offerre oportet præter aquā per dies tres. Si quidē igitur ex hac
 sedetur, bene est: sin minus, p̄sanae succo curandus est, & aut quarta aut septi-
 ma die decedet febris, si exsudabit. Bonū autē est & unguētis exsudatorijs uti,
 sub iudicatiōes: exsudare enim cogūt. Quidā uero etiā talia à repletioe perpe-
 tiūt. Caput ipsi dolet ac grauatur, & palpebræ ipsi à cena concidunt, &
 in somnis turbantur, et calor inesse ipsis uidetur, & aluus aliquando sistitur. Et
 talis ubi uenere utitur, leuior statim esse sibi uidetur, postea uero magis graua-
 tur. His caput repletionē reueliens, et aluū sistit, & ipsum grauatur. Periculū au-
 tem subest, ut quō erūpat ipsa repletio id ipsum corrūpat. Verū providere hoc
 modo oportet. Si curā celerē facere uelit, ueratro purgādusest, deinde exhibēdi
 cibi leues ac molles ad dies decē, atq; hi aluū mouētes, quo uēter inferior supes-
 ret, et de capite reuellere ualeat. Utendū et cursib. tardis ac matutinis, et deamb-
 ulationib. multis. Item lucta in oleo, & prædio, & somno à prædio nō longo: à
 cena uero exurgere satis est, et partim balneis, partim unctiōe utendū, balneis
 uero tepidis, à uenere aut abstinendū. Hæc quidē uelocior cura est. Si uero mes-
 dicamētū bibere nolit, multa calida lotus, à cibus dulcib. ac salis uomat. à uomitū
 uero satis est ut exurgat: mane autē deambulationib. adhibēdus est, et exerci-
 tijs præscriptis ad dies sex. die septima repletionē corporis facta à similibus ci-
 bis uomitū faciat, et eodē modo cibi rursus sensim adhiēdo exhibeantur. atq;
 his hoc modo ad quatuor hebdomadas utatur. In tāto enim tēpore maxime se-
 datur. Deinde cibi exhibēdi quo corpus reficiatur, et diæta paulatim ad cōsue-
 tum morē redigenda est. Fiunt etiā talia à repletionē. Quibusdam uenter qui-
 dem cōcoquit cibū, carnes aut non suscipiunt. Alimentū autem intus manens
 flatum inducit. Vbi uero pransi fuerint sedatur. Nam à fortiore id quod leuius
 est expellitur, et uidentur sibi liberati esse. Verū malū multo maius postridie ac-
 cedit. Quū autē quotidie augetens fortius inualuerit, id quod prius inestus
 peringesta superat, & calfacit ac perturbat corpus, et profluuiū uētris facit. Sic
 enim nominatur q̄ diu ipsum solū alimentū putrefactū secedit. Vbi autē corpo-
 re calefacto purgatio acris fiat, tūc et intestinū raditur ac exulceratur, & sangui-
 nolenta egerūt. hoc aut dysenteria, à mala intestinorū affectiōe appellatur,
 morbus grauis et periculosus. Sed providere oportet, et prandiū detrahere, &
 cenæ tertiam partē. Cursibus aut pluribus, et luctis ac deambulationibus uti, tū ab
 exercitijs, tū mane. Quū uero dies decē præterierint, dimidiū cibi detrahi ap-
 ponere, ac uomitū uti, atq; sic ad dies quatuor cibū exhibere: ubi aut alij decē di-
 es præterierint, etiā reliquū cibū apponere, ac uomitū facere: atq; sic ad cōsuetū
 cibum

cibum reducens, & talem laboribus cōfidenter premens ac urgens, in hoc tempore sanum facies. Fit etiam talis repletio. Postridie cibum eructant crudum, citra ructum acidum. Alius autē egerit, pauciora quidem quā pro ratione ciborū, attamen multū. Dolor uero nullus intus est. His uentriculus frigidus existens, cibos in nocte cōcoquere nō potest. Quum igitur motus fuerit, cibū crudum eructat. Oportet itaque huic præparare uentriculi caliditatē, tum ex uictu, tum ex laboribus. Primū quidem igitur utendū est pane ex tota farina colalata, fermentato, diffracto in uinū nigrū, aut in iusculū suillæ carnis. piscibus uero coctis in muria acri. Utendū etiam carnosīs, uelut extremitatibus percoctis, & suillis carnis coctis pluribus, & porcinis nō multis, & catulorū, ac hædorum. Ex oleribus uero porro & allio cocto ac crudo, blitōque cocto & cucurbita. Potionibus uero meracioribus, somnisque longis citra prandīū prima die, itemque somnis ab exercitijs, cursibus autē curuis senlim accessione augetur, lucaque molli in oleo, balneisque modicis. Est & ficus cum cibus bona, & meracum uinum ab ipsa. Ex hac autē curatione alijs citius, alijs tardius repletio sedatur.

Alij porro quidam talia patiuntur. Faciem decolorē habent, & ubi comedere rīnt, paulo post eructant acida, & acor in nares proferpit. His corpora pura non sunt, & plus est quod de carne colliquatur præ labore, quā quod depurgatur præ circuitu. Et hoc sanē intus manēs alimēto contrariū est, ipsumque uiolat ac acidum facit. Alimētū quidem igitur eructatur, illud ipsum uero sub cutem expellitur, & hominē decolorē facit, et morbos similes aquæ inter cutem parit. Verum prouidere oportet hoc modo. Velocior quidem curatio est potio ueratro, exhibere cibos quemadmodū à me scriptū est. Verum tutior à diætā, hoc modo. Primum quidē calida lotus uomitū faciat, deinde septē à uomitū diebus cibum cōsuetum capiat, decima autē à uomitū die rursus uomat, & similiter cibū assumat, & tertium similiter faciat. Et cursibus quidē circularibus paucis ac uelocibus utatur, & motibus, ac fricōne, & mora lōga in gymnasio ac exercitio. Utatur & uoluatione in puluere, & deambulationibus multis ab exercitijs, sed & à cocna. Plurimis autē matutinis in puluere utatur. Quū autem lauare uult, calida lauetur, & eo tempore impransus degat. Et si quidem uno mense restituitur, de cætero cōuenientibus curetur. Si uero quid reliquū fuerit, medela utatur. Sunt autem quidam quibus postridie ructus acidi fiunt. His in nocte secretio præ repletionem fit. Quū igitur motū fuerit corpus ex somno denso spiritū usum, calidum ac acidum unā cum spiritu foras expellit, & ex hoc morbi fiunt, nisi quis prouidentia utatur. Conducit autem etiam his facere uelut priori. Verum laboribus pluribus hos uti oportet. Quibusdam etiam talia fiunt. In corporibus densā carne præditis, quum cibi concalescunt ac diffunduntur, & à primo somno, & præ cibus carne calefcente, secretio per somnū fit à carne multā humiditatis. Deinde caro densā existens alimētū non suscipit, id uero quod à carne secretum est alimēto cōtrarium ac foras protrusum, hominem suffocat ac calcificat, donec euomuerit. Postquā autem leuior factus est, dolor nullus in corpore manifestus inest, sed decoloratur. Progressu uero temporis, & dolores, & morbi fiunt. His cōsimilia patiuntur etiā qui in exercitatu derepente laborauerūt, & colliuationē carnis uiolentā ac multā fecerūt. Hos autē sic curare oportet. De cibo detrahēda est tertia pars. Utendū autē cibus

cibus

acribus, & siccis, & austeris, ac odoratis, & urinā cientibus. Curfibus uero plurimis curuis in uestitu, rectis aut reuertentibus & circularibus, exutis uestibus, frictione & lucta modica. Micatio per summas manus comodiore est quam follis. Utendum & deambulationibus ab exercitijs multis, itemque matutinis. A cena uero etiam uocis exercitatio ualde comoda est. humiditatis enim euacuatione facies rarefacit carnē. Cōducit & impransum degere. His autē cibus utendū est per dies decē, deinde dimidiū ablati apponēdum est ad dies sex, & uomitus faciendus. ab unoquoque uero uomitu, ad dies quatuor sensim adijciēdo exhibendus est cibus. Quū autē dies decem à uomitu trāserint, omnem detractionē cibum assumat, laboribusque ac deambulationibus deditus sit, & sanus euadet. Talis autem natura copiosiore labore quam cibo opus habet. Quidam etiā talia perpetiuntur. Secedit ipsi cibus per aluū liquidus inconcoctus, uelut ex intestinorum leuitate, & dolorem nullum exhibet, patiuntur autem hoc uentres maxime qui humidi ac frigidi sunt: & propter frigiditatem quidem non concoquunt, propter humiditatem uero secessus fit. Corpus igitur contabescit, alimentū conueniens ac debitū non accipiens. Ventresque corrumpuntur, & in morbos incidunt. uerum providere oportet. Confert huic de cibus tertiam partem auferre. Sint autem cibi, panes non fermentati ex tota farina collata, clibano cocti, aut subcinericij calidi, in uinū austerū tincti, & piscium partes ex dorso ac cauda. Verū capitales & sub uentre finendæ sunt uelut humidiores. & coctos quidem pisces in muria edere oportet, affatos aut in aceto. Utendū etiā carnibus sale & aceto inueteratis, & caninis affatis, et de palūbe ac reliquis eiusmodi uolucris, affatis ac coctis. Oleribus uero minime. Vino utendū est nigro, & deambulationibus à cena ac matutinis, à deambulatione autē dormiat. Curfibus uero curuis sensim accessione augete utatur. Sit & frictio multa, & lucta tarda, & in oleo, & in puluere, quo caro cocalescens reficetur, & humiditate ex uentre reuellat. Vn qui autē magis cōducit quam lauari, impransus uero degat. Quū autē dies septem transierint, dimidiū cibi apponatur, & ad quatuor dies exhibeatur, & uomat. Post alios uero septem dies, omnē cibū assumat, & uomitu rursus facto, cibus eodem modo exhibeatur. Quibusdā uero alijs talia fiunt. Secessus non putrefactus per aluū abit, et corpus contabescit cibus non fruens, hi uero progressu temporis in morbos incidunt. His uentres frigidi ac sicci sunt. Quū itaque nec conuenientibus cibus, nec exercitijs uentur, talia perpetiuntur. Cōducit autē sic affecto, panibus puris furnaceis uti, et piscibus coctis cum intritis, & carnibus coctis suillis, & extremitatibus percoctis, & plurimis affatis, et ex acrib, ac salis his quae humectat, et saluginosis. Vinis autē nigris mollibus, et inter cibos uuis ac ficibus impleri cōfert. Oportet et modicū prædere, & exercitatiōibus pluribus, uti, curfibusque curuis sensim crescentibus, postremū autē curfibus, circularibus, et post cursum lucta cum oleo: deambulationibus, uero non multis ab exercitijs, à cena uero satis est exurgere. Matutinis aut pluribus deambulationibus utatur. Lauetur calida, & utatur laboribus ac unctiōibus, somnoque longiori indulgeat, et molliter cubet. Oportet et uenere aliquo modo uti. Verū de cibus quarta pars detrahenda est, et post dies decē rursus ad cōsuetos cibos reducendus est. Sūt etiā quibus secessus liquidus ac putrefactus per aluū abit, et qui aliās sani sunt ac exercētur, nullū dolorem exhibet. Quibusdā uero excluduntur ea quae conueniebāt, progressusque temporis uenter

uenter per caliditatem carnes attrahit, & dolorem exhibet, & cibi excluduntur, & uenter exulceratur, & ipsum sistere iam operosum ac difficile est. Verū prius prouidere oportet, ac nosse uentrē calidū ac humidum magis q̄ debet esse, lae horūq̄ in cōmodorū excessum factū esse. Per diætā igitur frīgēfacere ac ficcare oportet, & primū quidem exercitia ex dimidia parte detrahēre, & de ceteris tertiam partem. Vtatur autē Maza antea subacta, ac uino dulci emollita, & piscibus siccissimis coctis, & neq̄ pinguib. neq̄ salis. Vtatur & carnis affatis uolucrū, coctis quidē, palumbis ac columbæ, affatis autē perdici & gallorum, citra condimēta. Leporinis uero coctis in aqua, itemq̄ ferinis omnibus. Ex olerib. autē quæ frīgēfactoria sunt, uelut beta cocta acida. Vno uero nigro aufero. Gymnastis autē, cursibus circularibus uelocibus, uerū frictio nō multā adhibeatur, sed modica, neq̄ lueta. Micatio per summas manus, & manū ad rythmū motus, & follis, & Volutatio in puluere, cōmoda sunt, sed nō multā. Deambulationibus ab exercitijs utatur sufficētib. iuxta laborē, & à ccena pluribus, iuxta cibum, & mane moderate, iuxta habitum. Lauet autē tepida, ac quiescat. Sic ubi in hac diætā transegit dies decem, apponatur cibi dimidiū, & laborū tertia pars, & uomitū faciat à cibus siccis & acerbis, & in cibo ne moretur, sed q̄ celerrime uomat. à uomitū ad dies quatuor & cibus, & labor partitus exhibeatur. Vbi autē dies decem præterierint, reliquū cibi apponatur, & uinum potabile, uerum labores pauciores, & ubi uomitum fecit, cibus uelut scriptum est exhibeatur. Hoc uero tempore semel tantū in die cibum capere conducit, donec malum sedetur. Alijs porro quibusdam siccus & perustus secessus fit, & os siccū, & progressu tēporis etiam amarū fit, & aluus sistitur, itēq̄ urina. Quum enim nō habeat intestinū humiditatē circa excrementū, intumescentes transitus obturat, & dolorem exhibet, & calor occupat, & quicquid biberit aut ederit homo, id ipsum reuomit. Postremū uero etiam steruus uomit. atq̄ hic nō superuiuet, quū ad hoc peruenerit. Verum prouidere oportet ac nosse, quod caliditas & siccitas in homine prædominatur. Viscum igitur ipsi constitare oportet ex maza prius subacta respersa, & pane ex tritico trimestri, fuceo surfurum fermētato. Oleribusq̄ utendū, exceptis acerbis & siccis, atq̄ illis coctis, & piscibus leuissimis coctis, & partibus capitalibus tum piscium, tum locustarum, & mitilis, & herinacis, & cancris, & conchyliorū succis, ipsiq̄ liquidiſsimis. Carnibus autē suillis, & extremitatibus anterioribus coctis, & hædorū et agnorū ac catulorū coctis. Piscium uero fluuiatilium ac in stagnis degentū coctis. Vno molli aquoso. Laboribus autē utendū est non multis, neq̄ uelocibus, sed omnibus quietis. Deambulationib. uero mane utatur, iuxta habitū sufficētib. et ab exercitijs laboribus, moderatis. à ccena uero ne deambulet. Balneis utatur et somnis mollibus, et prædicio, et somno à prandio nō longo. Pomis etiā humectantib. unā cū cibus utatur, et cicere uiridi, ac sicco in aqua macerato. De laboribus uero prioribus dimidiū detrahat etiā hic à principio, & uomitū faciat à dulcibus & pinguib. ac salis, hisq̄ plurimis. moretur autē plurimū tempus in cibus usq̄ ad uomitū. Deinde cibū exhibeat ad triduum, & non maneat impræſus. Qui uero dies decem præterierint, labores sensim adiaciēdo augeat. & si quidem repletio inierit à cibo, aut uentris uitio, uomat: sin minus, sic reliquo tempore curetur. Fiunt insuper etiam talia. Horrores à deambulationibus

deambulationibus matutinis accedunt, & caput grauatur. Huic plures sunt deambulationes quæ modus requirit. Corpus enim & caput humore euacuatū horret ac grauatur. Progressu uero temporis ad febrem perueniunt horrores. Sed non hucusque differre oportet, uerum prius curare hoc modo. Quæprimum aliqua signa apparuerint, unctus ac frictus modice prandiu amplius solito faciat, & uinum multu bibat molle, deinde somno utatur a prandio sufficienter. ad uesperam uero ubi exercitijs leuibus usus est, calidaque lotus, consueto more cœnet. deambulationibus autem a cœna ne utatur, uerum ad tempus differat. Post tria die in aqua lauetur, & somnis mollibus tempus transigat. Et per dies quinque paulatim ad consuetos cibos ac labores procedat. Sunt autem quidam qui horrent ex gymnasijs, & quum se exuunt donec decertent, ubi uero perfrigerati sunt, rursus horrent, & stridor dentium tremulus corpus occupat, somnoque talis grauatur. Vbi autem expergitur, sæpe oscitat, et a cœna palpebræ ipsi graues sunt. progressu uero temporis etiam febres malignæ accedunt. Verum cauere oportet, & non hucusque differre, sed prius curare hoc modo. Primum quidem ab omnibus exercitijs dimidiu auferatur. Cibis uero omnibus humidioribus ac frigidioribus, utatur, et potibus mollioribus ac dilutioribus. Vbi uero præterierint dies quinque, tertia pars laboru ablatoru apponatur, Cibis uero iisdem utatur. Post alios autem quinque dies, dimidiu reliquorum laboru apponatur. Et rursus post alios quinque, omnes labores & leuiore & pauciores reddito, ut ne rursus excessus fiat. Nam his qui hæc signa perpetuunt, labores maiores sunt quam cibi. Adæquare igitur hæc oportet. Quidam uero non hæc pariuntur, sed aliqua ex his, aliqua uero non. In omnibus autem his signis, labores superant cibos, & curatio eadem est. Et confert his calida lauare, ac molliter cubare, & semel atque iterum inebriari, uerum non usque ad excessum, & uenere uri, ubi excessus contigerit, & senem esse ad labores. Deambulationes autem in totum non sunt faciendæ.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE INSOMNIIS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



VIS VIS de his quæ in somnis obueniunt recte coniectat, is magnam habere uim ad omnia, ipsa reperiet. Anima enim uigilat, & quum quidam corpori inferuit, in multas partes distributa, non sui iuris est, sed partem aliquam singulis corporis partibus, siue sensibus distribuit, auditui, uisui, tactui, gressui, actioni, ac omni corporis facultati. Ipsa autem animæ cogitatio sui iuris non est. Quum autem corpus quiescit, anima in motu est, & corporis partes perceptas, domum suam gubernat, & omnes corporis actiones ipsa perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa uero uigilans cognoscit, ac uisibilia uidet, & audibilia audit, uadit, tangit, triftatur, anima uertit. In summa, quæcumque corporis aut animæ munia, ea omnia anima ipsa in somno obit. Quicumque igitur hæc recte iudicare nouit, magnam sapientiæ partem nouit. Quæcumque quidem igitur somnia diuina sunt, & quædam euentura significant, aut urbibus, aut populo priuato, siue bona, siue mala, non ob ipsorum delictum, de

de huiusmodi sunt qui iudicāt certā artem habētes. Quæcūq; aut corporis affectiones sunt, & anima per ipsas repletionis aut euacuationis rerū à natura in futurum excessum, aut consuetorū mutationē præmonstrat, de his quidē itidem iudicāt, & partim assequūtur, partim aberrāt, & de neutris recte sentiūt, cur nam fiant: neq; sciūt quando assequūtur, neq; quādo aberrant, cauere admonētes ne quid mali accidat. Atq; hi nō docent quomodo cauere oporteat, uerum dijs supplicare iubent. Et supplicare quidē decorum ac ualde bonū est. Oportet aut etiam ipsū opitulari, & deos inuocare. De his igitur res hoc modo se habet. Quæcūq; Insomnia mēs hominis in noctē per somnū offert de diurnis actionibus, & reddit quo modo facta sunt, ea quæ serā ac iusta in re per diē facta sunt, aut de quibus consiliū inīitū est: hæc homini bona sunt, sanitatē enim significāt propterea quod anima in diurnis cōsilijs perseverat, neq; repletionē, neq; euacuationē, neq; aliqua alia forinsecus allapsa re, uicta. Quū aut Insomnia diurnis actionib; aduersantur, & de ipsis pugna oboritur, quū sanē hoc contigerit, turbationē in corpore significat. Et si quidē fortis fuerit, forte est malū: si uero leuis, debilius. De actione quidē igitur, an auertēda sit, siue nō, nihil decerno. Verū corpus hominis curari cōsulo. Repletionē enim aliqua intus facta, secretio quædā cōrigit quæ animā perturbauit. Si igitur fortis fuerit contrarietas, uomitū facere cōducit, & cibos leues exhibere sensim adijciēdo aliquid ad dies quinq;, et deambulationib; multis ac uelocibus sensim auget cētibus, uti, & exercitijs exerceri moderatis, pro ciborū assumptorū ratione. Si uero debilior fuerit cōtrarietas, detractio uomitu, tertā cibi partē adime, atq; hanc sensim rursus ad dies quinq; adijce, & deambulationib; preme. Sed & uocis exercitijs utatur, & dijs supplicet, & turbatio ipsi sedabitur. At uero solē & lunā, & cælū ac stellas, pura atq; agilia solito more uidere, singula bona sunt. Sanitatē enim corpori significāt ab omnib; præsentib;. Verū talem habitū præsentī diætæ conseruare oportet. Si uero quid contrariū his fiat, morbū quendā corpori significat: à fortibus quidē, fortiorē: à debilibus uero, leuiorē. Et astrorū quidē exterior est in corpore circuitus, solis uero medius, lunæ aut ad cavitates, Quodcūq; igitur horū astrorū extingui, aut lædi, aut disparere, aut sisti à circuitu suo uideretur, iuxta illam ipsam partē morbū redundare significat: & si quidē ab aere, aut nebula, aliquod ex ipsis astris pati quid horū uideret, debiliorē: si uero ab aqua, aut grā dine, fortiorē. Significat aut secretionē in corpore humidam ac pituitosam factam esse, & in externā circūferentiā illapsam esse. Cōducit itaq; huic & curibus in omni uestitu uti multis, sensim auget cētibus, ut q; maxime exudet. Item deambulationib; ab exercitio multis citra prandiū uti, & detracta ciborū tertā parte, ad dies quinq; sensim adijciēdo rursus exhibere. Si uero fortius uideatur malum esse, etiā fomētis uti. nam per corporis cuticulā purgationē facere expediat, propterea quod in externa circūferentiā offensa ac læsio existit. Cibis uero utendū est siccis, acribus, austeris, meracis, & laborib; maxime siccatibus. Si uero quid horū luna pariat, reuulsionē intro facere cōducit, utiq; uomitu ab acribus, & saluginosis, ac mollibus cibis, curibus autē circularibus celeribus, & deambulationibus uelocibus. Utendū & uocis exercitijs, & prandiū auferēdum, cibiq; detractio, ac rursus appositio, eodē modo utendū est. Ob id aut intro reuellendū est, quia ad cavitates corporis offensa apparet. Si autē sol tale

quid pati uideatur, fortius iam malū est, & difficilius exigi potest. Oportet autē in utraq; partē reuulsiones facere, & rectis cursibus, & curuis, & circularib. uti, & deambulationibus, & alijs laboribus omnibus. Ciborū autē detractiōe, ac rursus appositione, eodē modo. deinde uomere, & rursus sensim cibos augere, ad dies quinque. Si uero serenitate existēte premātur hæc, & debilia esse uideantur, & præ siccitate à circuitu suo impediri, periculum significant delabendi in morbū. Verū oportet labores detrahēre, et diēta humectiore ac molli uti, & balneis ac ocio ampliori, & fomno lōgo ac multo, donec malū sedetur. Si autem igneū ac calidum esse uideatur quod se illis opponat, bilis secretionē significat. Si uero superata hæc dispareant ac euascent, periculū est ad mortē perueniendū ex morbo. Si uero uersa ac mutata hæc esse uideantur, præsentē statum in fugam uerti significant. Fugere autē ipsa celeriter, esseq; qui ea persequatur, periculum denūciant futurā in sania hominis, si nō curatus fuerit. Omnibus autē his cōducit, ut ueratro purgati, optimā uictus rationē instituant. sin minus, ut uictū ad aquā tendente utatur. uinum uero nō bibant, aut omnino albū, tenue, molle & aquosum. Abstineant autē ab acribus, reficcātibus, calfaciētib. ac saluuginosis. Laboribus secundū naturā plurimis utatur, & cursibus in uestitu plurimis. Frictio uero ne fiat, neq; lucta, neq; uolutatio in puluere. Somnis utatur mollibus, & in ocio degat, exceptis laboribus naturalibus, à cœna deambulet. Bonū est et fomētis uti, à fomētis uero uomere, per triginta uero dies nō repletur. Quū autē repletus fuerit, bis in mēse uomat à dulcibus & aquosis ac leuib. Quæcūq; autē ex his aliās aliō præ nulla necessitate errant, animæ turbationem quandā præ cura significāt. Confert autē huic ociū, & animū conuerti ad spectacula, maxime risum mouentia: quod si fieri nō possit, ad id ex quo ad biduū aut triduū maxime uoluptatē capiat, & sedabitur. Sin minus, periculū est delabēdi in morbū. Quæcūq; astra ex circūferētia excidere uidentur, suntq; pura & splēdidā, & ultra ac prorsum ferri uidentur, sanitatē significant. Quicquid em̄ in corpore parū ex circuitu excernitur secundū naturā, à uespera in aurora: id ipsū recte habet. Nā & quæ in uētre secernuntur, & quæ in carnē eruciantur, omnia ex circuitu ac circūferētia excidunt. Quæcūq; uero nigra & obscura sunt, & ad uesperā ac occasum ferri uidentur, aut in mare, aut in terrā, aut sursum, ea magis morbos significant. Et quæ quidē sursum feruntur, fluxū capitis significant. Quæ uero in mare, uētris morbos. Quæ in terrā, tubercula maxime significant ex carne enascētia. His cōducit tertū cibi partē detrahēre, & à uomitu, ad dies quinque eandē rursus sensim adijciēdo exhibere, in alijs autē quinque diebus cibos omnes assumere, & uomitu factō, rursus eodē modo cibis sensim auctis exhibeat. Quæcūq; uero ex his pura & candida in celo hærere uidebuntur, sanū esse significāt, quia quod in hominē descēdit ex æthere est. Tale autē uidet animā, quale sanē descēderit. Quæ autē nigra fuerint, & non pura, neq; conspicua, morbū significāt, nō propter repletionē, neq; euacuationē, sed forinsecus inductū. Huic cōfert cursib. circularib. uelocibus uti, quo q̄ minima corporis colliquo fiat, & spiritu q̄ densissimo utēs, id quod inductū est excernat à cursibus aut deambulatiōib. celeribus utendū est. Victus autē mollis & leuis ad dies quatuor offeratur. Quicquid porro à deo accipere quis sibi uideatur purum, bonū est ad sanitatem. Significat enim ea quæ in corpus ingesta sunt pura esse.

Quicquid

Quicquid uero huic contrariū uidere quis putat, nō est bonū. Morbū enim in corpus uenisse significat. Oportet igitur uel priorē etiā hūc curari. Si quis se cōplui putet demēti cōelo, aqua molli, et nō ualde madesieri, neq; uehementē tempestatē ingruere, bonū est. significat enim moderatū ac purū spiritum ex aere ingressum esse. Si uero uice uersa, ualde cōplui quis sibi uideatur, & tēpestatem ac turbinē esse, idq; aqua non pura, morbū designat à spiritu qui in ipso est. Verū oportet etiā hunc simili diætā uti, & omnes hos pauco cibo ali. De significatiōib, quidē igitur astrorū sic iudicare oportet, prouiderēq; ac diētā statuere, & dñs supplicare, in secūdis quidē rebus Soli, Ioui cōlesti, Ioui possessori, Mineruæ opulētæ, Mercurio, Apollini. In cōtrarijs uero, dñs malorū auerforibus, & terræ, & heroibus, quo mala ac grauia omnia auertāt. Cæterū & hæc sanitatē præsignāt. Nimirū ea quæ in terra hūc, ac uide, & audire, et secure iter facere, & secure ac citra timorē currere, & uidere terrā leuē ac probe cultā, & arbores florētes, fructuosasq; ac satius, & flumina solito more fluētia, & aqua pura, neq; copiosiore, neq; pauciore q̄ cōueniens est. Itē fontes et puteos eodē modo. Hæc omnia sic uisā, sanitatē hominī designāt, & corpus recte habere, omnesq; circuitus, & exhibitiones ciborū, ac secretiones, integras esse. Si uero quid his contrariū uideatur, detrimentū aliquod in corpore significat. Et uisus quidē ac auditus lēfus, morbū circa caput significat. Itaq; matutinis deambulationibus, itēq; à cœna pluribus utendū est, ad superiorē diætā. Cruribus uero læsis, uomiōibus reuellendū est, & lucta: ampliore utendū, ultra superiorē diætā. Terra autē aspera, carnē non purā significat. quare deambulationib, ab exercitijs pluribus utendū est. Arborū uero sterilitas, feminis humani corruptionē indicat. Si igitur folia arborib, decidant, ab humidis ac frigidis corpus læditur. Si uero floridæ sint arbores, uerū infructuose, à calidis & ficcis, hæc igitur per diætā frigefacere ac humectare oportet, illa uero siccare ac calfacere. Flumina autē nō solito more fluentia, sanguinis circuitū significant, & auctiora quidē fluentia, excessum: imminuta uero, defectū. Oportet itaq; per diætā hunc quidē augere, illū uero imminuere. Nō pura autē fluentia, turbationē significāt, quæ à curtib, circularib, & deambulationibus, corpore per densum spiritū moto, purgatur. Fontes uero & putei cōmoti cōspectū, flatu circa uescam significāt, quos medicamentis urinā cientibus expurgare oportet. Mare perturbatū, uentris morbū significat, sed oportet aliuū mouētibus, leuib, & ac mollibus expurgare. Terrā autē domū moueri uidere, sano quidē uiro debilitatē significat, ægrotati uero sanitatē, & ex præsentī statu transmotionē. Sano itaq; transmutare diætā conducit, Itaq; primū uomat, & rursus, ubi paulatim cibum assumpsit, à præsentī enim diætā totū corpus mouetur, debili uero eadem diætā uti cōducit. Nam corpus ex præsentī statu trāsit. Terrā ab aqua aliqua aut mari inūdatam uidere, morbū significat, humiditate multa in corpore existente. Verū oportet uomitibus, & prædiñ detractione, et laborib, & sicco uictu uti, deinde sensim ad ieiēdo, ac modico cibo renutrire. Sed neq; nigrā, neq; combustā terrā uidere bonū est, sed periculum est de labēdi in fortē ac lethalem morbū. Sic citatis enim excessum in carne esse significat. Verū oportet & labores detrahēre, & cibos qui sicci & calidi, & acres ac urinā cientes sunt: nutrireq; p̄ sanā succo decocto, & omnib, mollibus ac leuib, modicis: & potu uti aquo-

fo, albo, copiofiore: et balneis multis calidis, sed ieiunus ne lauet, molliter cubet ac dormiat, & in ocio degat. frigus & solē uitet. Supplicet autē terra, & Mercurio, & Heroibus. Si uero in stagno, aut in mari, aut in fluminibus natate quis sibi uideatur, nō est bonū, humiditatis em̄ excessum significat. Cōfert autē huic & diæta sicca, & laboribus uti. febricitāti uero id bonū est, extinguitur enim caliditas ab humorib. Quicquid porro quis circa seipsum uidet solito more fieri, ad naturā suūp̄sius, neq; maius, neq; minus, bonū est ad sanitatē. Et uestitum albū indutū esse, & calciamentū pulcherrimū, bonū est. Quicquid uero mēbris maius fuerit, bonū non est. sed neq; quodcūq; tandem fuerit minus: & oportet hoc quidē per diætā augere, illud uero minuere. Nigra autē morbosiōra sunt, & periculosa. Mollire itaq; oportet & humectare. Noua quoq; transmutationem significāt. Mortuos uidere puros in uestibus albis, bonū est, et accipere aliquid ab ipsis purū, bonū est. Sanitatē enim significat corporū, & salubritatē ingestorum. à mortuis enim nutrimenta, & incremeta, ac femina fiunt. Hæc autē pura in corpus irrepere, sanitatē significat. Si uero contra quis uideat ipsos nudos, aut nigris uestibus indutos, aut nō puros, aut aliquid accipiētes, aut ex domo portates, nō est cōmodum. Morbū enim significat, quæ enim in corpus ingerūt nocua sunt. Verū oportet cursib. circularibus & deambulatōib. depurgari, & alimēto molli ac leui à uomitu sensim nutriri. Quæcūq; uero formæ peregrinæ corpora in somnis apparēt, & hominē perterrēt, ciborū in consuetorū repletione, & secretionē, & bilis superne ac inferne eruptionē, & morbū periculosum significāt. Verū oportet uomitū facere, et ad dies quinq; cibos quæuissimos nō multos, neq; acres, neq; siccos, neq; calidos sensim adiciēdo accipere, & laboribus naturalibus maxime uti, exceptis deambulatōib. à cœna. Utendū etiā balneis ac calidis lauacris, & ocio, Solē uero & frigus uitet. Si uero quis per somnum edere aut bibere cōsuetos cibos ac potus sibi uideatur, inopiā alimentī significat, & animæ tristitiā. Et si carnes robustissimas quis edere se putet, maximum alimēti excessum designat. Si uero debilissimas, minorē. Quemadmodū enim id quod editur bonū est, Sic etiā id quod uidetur. Cibos igitur detrahere cōducit. Nam alimēti excessum hoc significat. Sed & panes ex caseo ac melle facti per somnū comesti, similiter significāt. Aquā autē purā bibere bonū est, reliqua omnia nocua sunt. Quæcūq; homo ex cōsuetis ac familiarib. se uidere putat, ea animæ concupiscentiā significāt. Quæcūq; uero fugit perterrefactus, sanguinē sisti ac præ siccitate coerceri significant. Cōfert itaq; frige facere ac humectare. Quū uero quis pugnat, aut pugitur, aut ab alio ligatur, secretionem circuitui cōtrariam corpori cōgisse significat. Cōducit igitur uomere, & attenuare ac deambulare, & cibus leuib. uti, & à uomitu ad dies quinq; sensim renutrire. Quin & oberrationes & ascēsus in somnis uisi, grauiā significant. Fluminum trāsitiones, & hostes armati, mōstra formæ peregrinæ, morbū aut infāniā significāt. Cōfert itaq; his qui talibus in somnijs uexantur, cibus modicus uti leuib. q; ac mollibus, itēq; uomitibus, atq; sic sensim rursus ad dies quinq; cibū exhibere. Utendū & laboribus naturalibus multis, præterq; à cœna, Calida lauacra, & ociū, frigusq; ac solē uitent. Qui igitur his quemadmodū confici pra sunt utetur, uitam sanus deget, & inuēta est sanē à me hæc ipsa diætā, quantum possibile est humano ingenio excogitare, dijs auxiliantibus.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE ALIMENTO, IANO CORNARIO

Medico Phifico interprete.

Hunc librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non alicuius plebei ac vulgaris hominis esse dicit, ex fortassis ipsius Theffali. Quidam Herophilum autorem putant.



ALIMENTVM & alimenti species, unum & multa, unū quidem, quatenus unum genus est. Species uero humiditate ac siccitate finitur. & in his formæ, ac quãtitas est, & ad quædã, & ad tot. Auger autem, & corroborat, & incarnat, & assimilat, & dissimilia facit quæ in singulis sunt, iuxta uniuersiusq; naturam ac facultatē quæ ab initio adest. Assimilat autē pro uiribus, quū id quod superingeritur superatur, id uero quod prius inest superat. Exile autē fit aliquãdo quidem prius, in tempore dissolutū aut in super appositum, aliquãdo uero posterius, in tempore dissolutum aut appositum. Destruit autē utrunq; in tēpore & post tempus, id quod extrinsecus alsiduo superingestum est, & per multum tempus omnibus membris solide implicatum est, & propriam quidē formam producit, priorē uero, aliquando autē & priores, destruit. Facultas porro alimenti peruenit & ad ossa, & ad omnes partes, & in neruum, & in uenā, & in arteriam, et in musculū, & in pelliculam, & carnem, & pinguedinē, & sanguinē, & pituitam, & medullam, & cerebrū, & medullam spinalem, & interanea, omnesq; ipsorum partes, & sanē etiã in caliditatē, & spiritū, & humiditatē. Alimenti uero & id quod hoc nutrit, alimentū est, & quod uelut nutrimentū est, & quod nutrimentū futurum est: Principium autē omnium unū est, & finis omnium unus. & idem finis est atq; principium: & quæ particulatim in alimento probe & male distribuuntur. Probe quidem, quæ prædicta sunt. Male uero, quæ contrariū his ordinem habent. Succu uarij, & coloribus, & uiribus, & in detrimentū, & in utilitatem, & neq; lædentes, neq; cōmodantes, & multitudine, & excessu, et defectu, & implicatione, aliquorū quidem, aliquorū uero non. Et omnium caliditatem lædunt ac iuuant, et frigiditatē lædunt ac iuuant, & facultatē lædunt ac iuuant.

Facultatis autē uariæ naturę sunt. Succu corrūpentes & totum, & partem, & forinsecus ac intrinsecus, spontanei et nō spontanei, Nobis quidē spontanei, causæ uero nō spontanei. Rursus autē causæ, aliæ manifestæ, aliæ obscuræ, & alię possibiles, aliæ impossibiles. Natura omnibus subuenit. Ad hanc uero forinsecus quidem cataplasma, Illitio, Vnguentū, Nuditas & totius & partitis. Caliditas & frigiditas, iuxta eandē rationem & Adstrictio, & ulceratio, & morsus, & corrosio. Intrinsecus uero & quædã ex prædictis, & supra hæc causæ obscura, & parti & toti, & alicui et nō alicui, excretiones uentris secundū naturam, item urinarū, sudoris, saliuæ, muci, uteri, iuxta hæmorrhoidas, uerrucā, lepram, tuberculū, carcinoma, ex naribus, ex pulmone, ex uentre, ex sede, ex colle, secundū naturam, et præter naturā, discrimina horū alijs iuxta aliã rationē, aliquando etiã aliter. Vna natura sunt hæc omnia, & nō una. Multæ naturæ

sunt hæc omnia, & nō una. Medicina sursum & deorsum, & neq; sursum, neq; deorsum. In alimento medicina, optimū. In alimento medicina malum. Malum & optimum ad aliquid. Vicus, crusta, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, ulcera capitis manantia, impetigo, vitiligo, lentigo, aliquādo lædit, aliquādo prodest. aliquando neq; lædit, neq; prodest. Alimentū, non alimentū. Si nutrire nō potest, nomen est alimentū, non opus. Opus & res est alimentū, non nomen. In pilos alimentum, & in unguis, & in extremam superficiem intrinsecus peruenit. Forinsecus alimentū ex extrema superficie, ad intima peruenit. Cōfluxio una, conspiratio una, Consentientia omnia. Iuxta totius quidē corporis naturā omnia, iuxta partem uero, partes in unaquaq; parte ad opus. Principiū magnū ad extremā partē peruenit. Ex extrema parte ad magnū principiū peruenit. Vna natura, esse, & nō esse. Morborum differentia, in alimento, in spiritu, in calore, in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus, in carne, in pinguedine, in uena, in arteria, in neruo, musculo, pellicula, osse cerebro, medulla spinali, ore, lingua, stomacho, siue gula, uentre, intestinis, septo transuerso, peritonæo membrana aluum ac intestina amplectente, hepate, splene, renibus, uesica, utero, cute. Hæc omnia & singularim & particulatim. Magnitudo ipsorū magna, & non magna. Signa, titillatio, dolor, ruptura, mens, sudor, urinarū subsidētia, quies, iactatio, uisus, imaginationes, morbus arquatus, singultus, morbus comitialis, sanguis integer, somnus. & ex his, & ex alijs naturalibus, & quæcūq; alia huiusmodi ad detrimentū & utilitatem procedūt. Labores totius & partis. Et magnitudinis signa, alterius ad maius, alterius ad minus, & ab utriq; ad maius, & ab utriq; ad minus. Dulce nō dulce, dulce ad potentiam, uelut aqua. Dulce ad gustū, uelut mel. Signa utrorūq; ulcera, oculi, & gustus. & in his magis & minus. Dulce ad uisum, & in coloribus, & in alijs mixturis. Dulce magis & minus. Raritas corporis ad perspirationem, quibus amplius aufertur, saniores sunt. Densitas corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbidiores. Qui probe perspirant, debiliores & saniores sunt, & à morbis facile reconualescunt. Qui male perspirant, priusquam ægroret, fortiores sunt. Vbi autem ægrotarunt, difficilius à morbis reconualescūt. Hæc autem & toti & parti.

Pulmo contrariū corpori alimentū trahit, reliqua uero omnia idem. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur, pulmo, & reliqua respiratio. Principium alimenti & humidum & sicci, os, gula, uēter. Verum antiquius & priorum diale alimentum, per abdomen umbilicus. Radicatio uenarum hepar. Radicatio arteriarū cor. ex his aberrant in omnia sanguis & spiritus, et calor per hæc meat. Vis una & nō una, qua omnia hæc & alia gubernantur, alia quidē ad uitam totius & partis, alia ad sensum totius & partis. Lac nutrimentum, quibus uidelicet secundum naturam alimentū est, alijs uero non. Alijs autem uinū alimentum est, & quibusdam non alimentū. Et carnes, & alia multæ alimenti species, & iuxta regionem et iuxta cōsuetudinem alunt, partim ad augmentum, et ad esse, partim ad esse solum, uelut in fenibus. Quaedam uero supra hæc, etiam ad robur. Dispositio Athletica non est à natura. Habitus sanus melior in omnibus. Magna res est quantitas ad uires solerti ratiocinatione adoptata.

Lac & sanguis alimenti sunt redūdantia. Circuitus ad multa consoni sunt, ad foetum eiusq; alimentum. Rursus autem sursum repit in lac, & in alimentū, &

& ad infantem. Viuificantur non animalia, uiuificantur animalia. Viuificantur partes animalium. Naturæ omnium nullo doctore usæ sunt. Sanguis alienus utilis. Sanguis proprius utilis. Sanguis alienus nocius. Sanguis proprius nocius. Humores proprii nociui. Humores alieni nociui. Humores alieni cõducibiles. Humores proprii conducibiles. Consonans dissonans est. Dissonans consonans est. Lac alienum bonum. Lac proprium nociuum. Lac alienum nociuum. Lac proprium cõmodum. Cibus iuuenibus facile ac leuiter putrefactus. Senibus uero ad summũ transmutatus. His qui in uigore ætatis cõstitunt impermutabilis. Ad figurationẽ, soles triginta quinç. Ad Motum, septuaginta. Ad perfectionem, ducenti & decem. Alij tradunt. Ad formam, quadraginta quinç. ad motum, septuaginta sex. ad exitum, ducenti & decem. Alij sic. Ad formam, quinquaginta. ad primũ saltum, centum. ad perfectionem, trecenti. Alij sic. Ad discriminationẽ, quadraginta. ad trãsitũ, octoginta. ad elapsũ, ducenti quadraginta. Non est, & est. Gignuntur autem in his & plures & pauciores, secundum totum, & secundum partes. Non multo autem plures aut pauciores. pauciores uero tot, & quæcũq; alia his similia.

Ossium alimentũ ex contractione. Naso bis quinç. Maxilla & clauiculæ, & costis duplicia. cubito triplicia. Tibiæ et brachio quadruplicia. scemori quintriplicia. Et si quod in his plus aut minus potest. Sanguis humidus & sanguis solidus. Sanguis humidus bonus. Sanguis solidus malus. Ad aliquid omnia mala & bona sunt. Via sursum deorsum una. Potentia alimenti melior est moles. Moles alimenti melior quàm potentia. Et in humidis & in ficcis detrahit & apponit idem. & alteri quidẽ auferit, alteri uero apponit idem. Venarũ pulsationes, & respiratio spiritus, iuxta ætatẽ, & consonantia & dissonantia sunt, & morbi & sanitatis signa. et sanitatis magis est morbi, & morbi, magis quàm sanitatis. Alimentum enim etiam spiritus est. Humidum alimentum magis facile transmutatur quàm siccum. Siccum alimentum facilius transmutatur quàm humidum. Alimentũ quod ægre alteratur, egre cõsumitur. Quod facile apponitur, facile consumitur. Et quicũq; ueloci appositione opus habet, his humidum ad reficiendas uires medicamen optimum. Quicũq; uero adhuc uelociori indigent, per olfactum. Qui autem tardiore appositione opus habet, solido alimento utantur. Musculi solidiores ægre magis est alia colliquecunt, excepto osse & neruo. Quæ denudata sunt ægre transmutantur, & secundum genus ipsa seipsis fortiora sunt quàm pro re ipsa: propterea ipsa seipsis ægrius colliquecunt. Pus ex carne, purulentum ex sanguine, & ex alia humiditate. Pus ulceris alimentum. Pus alimentũ uenæ, arteriæ. Medulla alimentum ossis, propterea callo obducuntur. Facultas & potentia omnia auget & nutrit, & germinare facit. Humiditas alimentũ uehiculum est.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE HUMIDORVM SIVE LIQVIDORVM VSV,

Iano Cornario Medico Physico interprete.



AQUA potabilis, saluginosa, mare, potabilis quidem in officina medica optima. Nam & ferramentis & aramentis optima, & medicamentis plurimis inueteratis cōmunissima. Verum ad corpus nosse oportet, quòd hæc aut madefacit, aut frigefacit, aut calfacit. Aliter uero nulli cōmodat, aut detrimento est potata. Vbi modica potabili in spōgia uteris, optimū oculis est. Cutis ipsa

superne exulceratur calidæ asperione. Fomentū corporis rotius aut partis. Cutis duræ mollitio, distentæ laxatio, neruorum, carnū, humorum sub cutem effusio, sudoris secretio. Humectare proluetione, uelut nares, uesticam, flatus. Incarnare, attenuare, liquefacere, minuere, colorem reuocare, colorem dispergere. Somniferum & in caput, & in alia. cōuulsionum, tensionū, mitigantiū dolores stupefacit auris, oclorū, & quæcūq; talia. frigida calfacere, uelut pix ulceribus, præterquā à quibus sanguis erūpit, aut erupturus est, fractis, luxatis, reliquis quibus linteola sunt medicus, Capitis grauitati. Moderatio in uno quoq; ne ultra torqueamus. uelut calida corpori, ex excessu in utrāq; partem, ut ab utraq; non aberret, coniectatione ex detrimento, aut inutili facta, uelut in tepida. Oportet enim detrimētis aut utilitatibus etiā si sint uni, usq; quo iuuet, aut donec lædant. Madefactio itaq; & humectatio, debile quid est. Frigefactio uero & calfactio, forte: uelut ex sole. Verum frigida calida existens, uelut potabilis aqua, debile quid est. Calida aut ne ulterius pergat, ut urat. Iudicat autem de his ipse ægrotus, exceptis mutis, aut leuiter syderatis, aut stupefactis, aut uelut in uulnerib. perfrigeratis, aut nimio dolore uexatis, his enim hæc sensu non percipiuntur. Nam nō sentiunt hi perusti. Itemq; profundæ ac magnæ luxationes. Iam uero etiam pedes deciderūt perfrigerati, ex calidæ perfusione. Sed his corpus perfusi iudex est, similiter etiam frigidæ. Harum aut utrarūq; paucitas, debile quid est. Multitudo uero, forte. ueruntamen finire oportet, donec fiat id cuius gratia fiunt, antea uero q̄ postremū fiat, cessandum est.

Harum porrò utraq; lædit, & calida quidē amplius ea utentibus has læsiones inducit, carnium effeminationē, neruorum debilitatē, mentis stuporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia hæc ad mortē. Frigida uero cōuulsionēs, tensiones, nigrores, rigores febriles. Mediocritas quidē extra noxam est. Reliqua uero lædunt ac profunt, uelut relatum est. Voluptatibus, & iucunditatibus, & doloribus ac molestijs, prout singula ex ipsis cōueniunt, ita sani apparent. Corpus regi ac uelari aduerum, quicquid insuetū est, quicquid lōgissimi me à familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimū, id ipsum auersatur: & propterea sanē calida gaudet, & ferre potest. Cerebrū et quæ ab hoc oriūtur, frigida quidē tristantur, calida uero gaudēt, si sanē frigidius et solidius à natura fuerit. Propterea os sibus, dentibus, neruis frigida inimica, calida uero amica, quia ab illa conuulsionēs, tensiones, rigores febriles, quæ sanē frigida facit, calida uero sedat. Ob id etiam à calida uoluptates, et illecebræ, à frigida uero dolores et auersationes. Ideoq; spina, pectus, dorsum, præcordia, magis frigida

gida aggrauantē. calida uero gaudēt, & ferre ipsam possunt, ppter ea sanē spina, pectus, dorsum, præcordia, cōtraria ppeffa sunt, q̄a sunt cōtraria. Propterea sanē in hoc loco anxietatē ex calida obortā, frigida sedat, ppter ea sanē frigida potu gaudet. ppter ea sanē cibis calidis delectatur, propterea sanē & in animi deliquis frigida extremis partib. affundere, pdest. Quod autē posteriores partes calida magis sufferit q̄ anteriores, quæ relata sunt in causa sunt. Quod uero etiā frigida, recte habet. Nā & extremæ partes anteriores sunt, & regi nō adueta: uelut etiā interna pars se habet ad externā. Cogitādū autē q̄ utraq̄ in unoquoq̄ corpore potior est externa cute, quæ & sibi ipsi, & neruo sanguineo cōtinua ac coharens, eo q̄ extra propriū calorē, in externo frigore est, ab utriq̄ frequēter supatur, et utriq̄ frequēter opus habet, frequētius autē calida ad uoluptatē. Perpetiuntur autē & extremæ partes tale quid, quare cito multa percipiūt, tarde autē primū atollūtur. Et uenæ quoq̄ alia: prius, alia: posterius. Atq̄ sic omnia apparet, & ubi frigesūt extreme partes, & ubi calefiūt, in ualorū euacuationibus, in animi deliquis. Et iuxta rationē merito etiā uenas sequūtur, ea quæ ab his eueniūt. Et calefacit primū calida, uelut in manibus, internas partes. At ulcera calida gaudēt ex cōfesso, quia regi adueta sunt. Merito itaq̄ altera grauatur. Merito igitur & ipse uenę, quia sunt in calido. Merito etiā ipse thorax, & uētriculus ipse à frigida superatus, moleste fert, & mortē minatur, quia maxime defestus est. Verū plurimū abest ab eo ut patiatur: propinquissima autē inter se sunt, egeret, et pati. Merito igitur frigida potu delectatur. Et sic cōsentiant inter se omnia hæc. Quod uero omnia desquamata & ambugta in superficie, nō ualde regi adueta, maxime frigida moleste ferūt, par est. Citissime enim superātur. Et profundissima si superētur, maxime utiq̄ grauētur, deinde etiā natura neruosa participāt. Quoniā imus uēter calida delectari uidetur, cōsiderandus locus est, et postea extremæ partes, & uelica, & genitales partes, et uirilīs mēbri glans natura frigidior est, q̄ quis putat. Sursum enim nō deorsum exilit caliditas: & propterea calida delectatur. Cōsiderandum etiā, quod post calidā frigescit corpus magis perfrigeratū: post frigidā uero recalcet magis cōtrariū: uelut etiā aquæ frige faciēdæ & calefaciēdæ sunt, propter tenuitatē. Et q̄ post calidam durefcit corpus magis rescicatū, uelut oculi post frigidā. Altera enim similis est aeri ambiētī, altera nō. Mare pruriginosis, & qui ab acribus humoribus uellicatur prodest, ut & lauet, & foueāt ex calido. Qui uero nō adueta sunt, aliquantū laeduntur. Verū ad ulcera, & ambugta, ac desquamata, & quæcūq̄ talia, contrariū est. Aprū est autē puris. Bonū est & ad attenuādū, & ad piscatorū ulcera. Hæc enim neq̄ suppuratū, si nō uellices: & ad ulcera cuniculosa, & depascētia proserpendo sedata consistit, uelut sal, saltugo, nitrū. Omnia autem hæc si quis parum utatur, irritant: si excellenter, bona sunt. Melius autē est calidū ad plurima. Accētum ad corpus & articulos, simile est mari, & potentius, ad perfundendum & ad fomentum: & ad ulcera recens uulneratis, & ad sanguinis grumos, ubi nigredines sunt in pudendis. collutio est ad aures, & ad dentes. Calido autē hæc sunt, & alia, sed & ex tempore coniecturam facere oportet. Eliquat uelut sal, & ut alia quæ impetigini, lepris ac uiriliginibus cōducunt, affusum ad calidū solē, maxime uero conducit unguibus leprosis. Superat enim post tempus. uerrucas fornicarias attenuat, & fordes in auribus sanat. Mollit autem & corpus, & multos

multos alios locos, si non odor offenderet, & maxime mulieres. Valuerit & ad podagram, si non corpus uulneretur. Eadem etiam fex aceti facit. Vinum dulce ad diurna uulnera commodum est alsidue utenti. Sed & ad medicamentorum potionem. Austerum autem & album, & nigrum uinum, frigidum ad ulcera commodum est, frigidum propter caliditatem. Lanæ quæ frigiditatis gratia, aut perfunduntur, aut induntur, aut intinguntur, aqua frigidissimam postulant. Quæ uero ad strictionis gratia, uinum nigrum etiam lanas aspergere potest, uelut etiam betarum folia, aut linteola intinguntur, in plurima quibus adstrictio inest, uelut sunt hederæ albæ folia, & quæ acerbiora sunt, aut friabiliora, uelut hederæ & rubus, rhus coriarius, saluia: & in ea quæ mollire oportet, uelut farina cocta.

Aqua frigida prodest papulis rubicundis, quales alia atque alia parte sublata erumpunt, quales per splenia attractoria emergunt. In carnosis uero & tenera carne prædixis subrubicundæ sunt: in nigris aut rotundæ, dothienes hoc est furunculi appellatæ, & quales in ipsis calidis laucris oboriuntur, & mulieribus, ex mensum sub cutem recurru sunt, & ab irritamentis cutis, aut insolita uestimentorum asperorum gestatione, & ex sudoris exitu, aut ubi quis ex frigore, de repente ad ignem, aut calida lauacra accessit. Nam si hæc posterius fecerit, nequaquam amplius erumpunt. Alioqui quæ ex frigore sunt, aut quæ exasperantur in star miliis, deinde exulcerantur, eas frigida lædit. Calida uero prodest. Tumores in articulis, & dolores sine ulcere, ac podagricos, & conuulsas, plurima ex his frigida multa affusa leuat ac extenuat, & dolorem torpescit. Torpor autem moderatus, dolorem soluit. Sed & calida aqua attenuat ac mollit. Podagricis, resolutis, ante ac retro distentis, conuulsis, talia accedunt, distentiones, tremores, leues siderationes: Talibus laxatis, claudicationes, torpores, uocis interceptiones, ad talia, excretiones per infernas partes suppressæ. Cauendum autem est in frigida usu, ne modum excedamus. Articulos induratos, aut ab inflammatione aliquando oborta, aut a distortionem, opere precium est sanare, aqua calida in utriculum infusa. Manum deligare, et oculos, lachrymas lenit, ita ut ad acres, stillamentum lene infundat, ut ne falluginosa contactu lædat. Et fossulis ulceribus, oculorum elorio prodest, & repletio ad naturam reducens. Calida oculis conuenit, doloribus, suppurationibus, lachrymis mordacibus, siccis omnibus. Frigida doloris exortibus, ualde rubicundis, & qui collectiones tuberculorum iuxta uenas habere solent, qualia sunt ulcuscula capitis mania, circa thoracem, & alia dura. Verum podici & utero, non ualde commoda est, neque sanguinem in frigore mingentibus. Ulceribus quidem frigida mordax, cutem obdurat, dolorosa non suppurari facit, liuefacit, nigrefacit, rigores febriles facit, conuulsiones, ante ac retro distentiones. Quoadque uero in hac distentione, sine ulcere, iuueni carnosum, media ætate, multæ frigida aquæ effusio, caloris reuocationem facit. Calor autem hæc soluit. Calida suppuratoria est, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem, cutem mollit, attenuat, dolorem eximit, rigores, conuulsiones, ante ac retro distentiones lenit, capitis grauitatem soluit, plurimum autem conducit ossium fracturis, magis autem denudatis, & ex his maxime his qui in capite ulcera habent, & quæ cunctis præ frigore, aut moriuntur, aut ulcerantur: itemque in ulcerationibus uoluntariis ac inuoluntariis, qualia sunt desquamata: herpetibus serpendo adedentibus, denigratis aut in gingiuis, aut in aure, aut in fede, aut utero. His omnibus calida amica est

est ac iudicatoria. Frigida uero inimica & occidens, præterquam in quibus sanguinem fluxurum esse timor est. Atq; hoc modo utendum est liquidorū perfusionibus, in unguentis illitionibus, foliorū impositionibus, aut linteolorū cataplasmatis, quæ cunq; aut frigiditate, aut caliditate profunt, aut nocent.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE HUMORIBVS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

*Geminum Hippocratis librum hunc esse Galenus dicit,
Verum quedam insunt ad extremam dictionis breuitatem
contracta: quedam rursus ultra modum extensa.*



HUMIDITAS & ferocitas humorū, ubi nō reciprocatio humorum est, uelut florum, ducendus est quā repit per cōuenientes ac cōmodas regiones, exceptis his quorū maturitas tempore contingit. Maturaciones extra aut intro repunt, aut aliō quō oportet. Cautio, infinita magnitudo, experiendi difficultas, pilorū nuditas, uiscerum uacuitas, infernis repletio, supernis alimentū, mutatio sursum, mutatio deorsum. Spontanea sursum & deorsum. quæ profunt & lædūt. Cognata species, regio, mos, ætas, tempus, constitutio morbi, excessus, defectus. Quibus quantum deficit, aut non, medela, declinatio, deriuatio, in caput, in obliqua, quā maxime repit. aut reuulso, in supernis deorsum, in infernis sursum. aut ficcare, aut aliquibus inferna. aut aliquibus superna, aut eluitur, aut quibusdam mitigabitur. humores effusi ne intro reuellātur, sed secretiones siccantur. Turbatio, infusio per sedem, pelluiū, quibus abscedit ad sedem, unde exoluitur aut medicamentum, aut ulcus, aut humor aliquis cōpactus, aut eruptio pustulosa, aut flatus, aut cibus, aut animalculū, aut æstus, aut alia quædam affectio. Consideranda hæc, spontanea desinentia, aut uelut ab exultione excitatæ bullæ, in quibus qualia lædunt aut profunt. Figuræ, motus, eleuatio, & rursus subsidentiā, somnus, uigilia. Quæ faciendi, aut impediendi, cito assequi. Castigatio per uomitū, inferne per exitum, aut sputum, mucū, tussim, ructum, singulrū, flatum, urinam, sterutationem, lachrymas, pruritus, euulsiones, contactus, sitim, famem, repletionem, somnos, labores, ocium, corpus, mentē, disciplinam, memoriā, uocem, si lentium, uteri purgationem. Quæ superne erumpunt ac torquent, pinguis, in temperata ac meraca, spumosa, calida, mordacia, æruginosa, uaria, ramēosa, feculenta, cruenta, flatus expertia, cruda, cocta, siccā. Quæ cūq; circumfluunt, ferendi facilitatem cōtemplari oportet, itemq; difficultatē, prius quā periculū ueniat. Item quæ sedare nō oportet. maturatio, descēsus eorū quæ infra sunt, resdundantia & fluctuatio eorū quæ supra. & quæ ex uteris, & in auribus sordes, concitatio ac permixtio, apertio, euacuatio, calfactio, perfrigeratio, intrinsecus, forinsecus. horum quidem, horum uero non. Quū infra umbilicum fuerit id quod torquet, tardum & molle est tormen. Vice uersa, contrā. Quæ per alium egeruntur quæ repunt, non spumosa, matura, cruda, frigida, foetida, siccā

ficca, humida. Quæ olfactum male afficiunt. Sitis quæ prius nõ adfuit, neq̃ æstus, neq̃ alia caufa. Vrina, nafi humectatio, lactationē, Siccitatē, & non esse contractum ac arefactum, & spiritū turbulentiū, præcordia, extremitates, oculos male affectos, coloris trāsmutatio. Pulsus, frigiditas, palpitationes, cutis duricies, neruorum, articularum, uocis, mentis, figura uoluntaria, pili, ungues, facile ferre, aut nõ, qualia oportet. Signa hæc. Odores corporis, oris, secessus, auris, flatus, urinæ, ulceris, sudoris, sputi, nafi. Corpus falfuginosum, aut sputū, aut mafus, aut lachryma, aut alij humores. Penitus similia, iuuantia, lædentia.

Infomnia qualia uideat, & in somnis qualia faciat, an acute audiat, & obedire paratus sit animo, an magis fortia sint ac plura quæ cōmoda sunt ac feruant, q̃ alia, an sentiant omnia omnibus sensibus, & ferant, ueluti odores, sermones, uelutis, figuras, & huiusmodi patienter, quæ sanè & sua sponte cōparentia profunt, & quando etiā talia iudicationē inducunt. Item tot, & talia, ueluti sunt flatus, urinæ, qualis, & quanta, & quādo. Quæ uero cōtraria sunt, auertere, ipsisq̃ aduersari. Quæ propinqua & cōmunia sunt affectionibus, prima & maxime affliguntur. Confitutionē autem ex primis incipiētibus, quicquid tandē excrementur ex urinis, quales nā fuerint, & qualis sit corporis collapsio, coloris immutatio, spiritus imminutio, & reliquæ cum his uictus rationes. Scire etiā oportet an similia sint quæ decedūt, transitus, urinæ, per uteros, spuræ, per nares, oculi, sudor, ex tuberculis, ex uulnibus, ex pustulis, quæ sua sponte, quæ arte. Quod similia sunt inter se omnia quæ iudicāt, & quæ profunt, & quæ nocent, & quæ perimunt, quo hæc quidem fugiens auertat, illa uero acceriat, & ducat, ac suscipiat. Sed & alia eodem modo, cutis, extremarū partium, præcordiorū, articularū, oculorum, oris, figurarum, somniorū, qualia iudicant, & quando, talia machinari. Insuperq̃ qui tales abscessus sūt. Qualia profunt cibis, potibus, odoribus, uisu, auditu, cogitatu, secretionibus, humoribus, calefactiōe, frigefactione, siccitatibus, humectando, siccādo, unguētis, illitionibus, cataplastatis, emplastris, insperisionibus, denicis & epithematis quæ imponūtur. Figuræ, de frictio, curatio, labor, ocium, somnus, uigilia: spiritibus superne, inferne, cōmunibus, proprijs, arte paratis. In exacerbationibus neq̃ præsentibus, neq̃ futuris, neq̃ pedum frigiditate, sed in declinante deorsum morbo. In exacerbationibus per circuitus sientibus, ciborū oblationes dandæ non sunt, neq̃ cogere oportet, sed auferre de appositionibus ante iudicationes. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neq̃ mouere oportet, neq̃ nouare, neq̃ medicamētis, neq̃ alijs irritamentis, sed sinere. Concocta medicamētis aggredi oportet, & mouere non cruda, neq̃ in principijs, si non turgent. Multa uero nõ turgent. Quæ ducere oportet, quò maxime repunt per cōuenientes locos, eò ducere oportet. Quæ prodeunt non multitudine æsumare oportet, sed quādiu prodeant qualia oportet, et facile æger ferat. Vbi uero opus est, debilitare etiā, aut animi deliquium inducere oportet, donec hoc feceris, cuius gratia hoc fit, interim aliò uertere, aut siccare, aut humectare, aut reuellere, si sufficit æger, id quod ex his coniectabis. Sicca quidem calida erunt, humida uero frigida. Quæ uero aluum mouent, plerunq̃ contraria. Hæc imparibus diebus, sursum, si et circuitus, et constitutio talis sit ex exacerbationibus. Fiunt autē plurima paribus diebus, deorsum: sic enim & sua sponte profunt: si non circuitus faciant exacerbationes in paribus

paribus. In talibus autem, in paribus sursum: in imparibus deorsum. Tales autem pauci sunt. Et tales cōstitutiones etiam difficilius iudicantur. Quin & ulterius tempore progressa sic fieri necesse est, uelut ad decimātertiam, ac decimāquartam diem. Decimatertia quidē deorsum, decimaquarta uero sursum. Ita enim ad iudicationē conducit. Et quæ ad uigēsimam. Cæterū quæ infra prodeūt, multum purgare oportet, & hæc nō prope iudicationē, sed longius ab ea. Raro autem in acutis, multa ducere oportet, in delassatis, totum. In febris ad articulos, & circa maxillas maxime abscessus fiunt, prope sanē dolores uniuersū cuiuscūq; ad superiā partem magis & in totum. Si uero lentus fuerit morbus & deorsum tendens, inferne etiam abscessus fiunt. Maxime autē pedes calidi, infirme significāt: frigidi superne. Quibus uero ex morbis se erigētib; statim in manibus aut pedibus dolores fiunt, in his abscessus contingunt. Sed & si quid doluerit quis antea quā egrotet, ad eas partes firmatur. Quæ admodū etiam tussientibus & anginosis in Perintho. Faciunt enim tusses abscessus, uelut etiam febres. Iuxta eandē rationem contingit ab humorū aut corporis colliquatione & frigiditate. Proinde nosse expedit, in quibus temporibus humores florent, & quales in singulis morbos faciunt, & quales in unoquoque morbo affectiōnes: & reliquum corpus ad quem morbum maxime natura repit: & quale quid splen intumescens facit. Horū sanē & natura, & ferme colores deteriores sunt, et corpora tumēt. Et si quid aliud est, in his exercere se prodest, uelut est Animi intemperantia circa cibos ac potus, somnū, uigilias, aut ob amores quosdā, uelut esserariū, aut propter artes, aut propter necessitates: tolerantia laborū, & quorum ordinata est, aut inordinata: Mutatiōes ex qualibus ad qualia: ex moribus animæ industria, aut quærēns, aut meditans, aut uidens, aut dicens, aut aliud quid, uelut tristitiæ, iracundiæ, cupiditates, quæ ex casu cōtingunt. Molestiæ animi aut per oculos, aut per auditum, uelut etiam corporum, Molis quidem ad seipsas attritis, dentes stupefcunt: Ambulanti uero circa cauum locum, crura tremunt: quum autem quis manibus ea quibus opus habet leuat, hæc tremunt: Serpens derepente cōspectus pallorem cū uirore inducit. Timores, pudor, mæror, uoluptas, ira, aliæque huiusmodi quomodo obediunt. Vnicuique autem pars corporis ad actionē pertinens, in his obedit. Sudores, cordis palpitatione, & eiusmodi potentiæ. Quæ extrinsecus profunt aut nocent, unctio, perfusio, illitio, cataplasmatū usus, deligatio lanarum & talium rerū: & internæ partes talibus obediunt, non solum externæ his quæ intro assumuntur: Sed & quæ in lanis ab ouili succidis adhibēt, & quod à rege nomen habet cuminum, uidentibus & olfacientibus. Quæ de capite ducunt, turbāt, sermones, uox, & huiusmodi, mamma, genitura, uterus, & quæ signa in ætatibus, & in suffocationibus, & tussi, & quæ ad testiculos. Quemadmodū arboribus terra, ita animalibus uentriculus: & nutrit, & calefacit, & frigefacit. Frigefacit, dū euacuatur, calefacit, dū impletur. Quemadmodū terra stercoreata hyeme calida est, ita etiam uentriculus. Arbore corricē tenuem sicciū habēt, intrinsecus aut carne sicca, sanæ, nō putridæ, diuturnæ. Ita & ex animalibus, testudines, & quicquid eiusmodi est. Aetatis, temporibus, annis, similia animalia, nō deteruntur si moderate melioribus utantur. Quemadmodū hydria quod recens est trāsmittit, quod in uetere raturam retinet, Sic & uentriculus trāsmittit alimentū, & fecem retinet, uelut uā

sculum. Modi morborum hi sunt, partim quidē cognati sunt, de quibus in
 interrogādo discere oportet: partim à regione, familiares enim sunt per multas,
 & multi ipsos noscunt: partim ex corpore, & uictus ratione, ac temperiei cōsti-
 tutione, aut à temporibus. At regiones ad tēpora male dispositæ, tales morbos
 pariunt, quali tempori similes fuerint, Verbi gratia, Inæqualis calor aut frigus
 eadem die, quū talia fuerint, morbos autumnales faciūt. Et in alijs temporibus
 secundum rationē, alijs ab odoribus cœnosis aut palustribus: alijs ab aquis, calcu-
 losi, splenici: alijs à uentis bonis & malis incipiunt. Qualia uero sunt tempora,
 tales erunt etiā morbi, & constitutiones ex ipsis. Si tempora tēpestiue, & ordi-
 nate se habuerint, morbos iudicatu faciles faciunt. Vernaculi autē temporum
 morbi iudicant mutationes, & prout euariauerit tempus, similes aut dissimiles
 erunt morbi, qui in hoc tempore oriūtur. Si uero similiter procedat, eiusmodi
 quocq; fuerint morbi, & ad talem modū tracti, ueluti est morbus regius autūna-
 lis. Frigora enim ex caloribus, & calor ex frigore. Et si æstas biliosa fiat, & bilis
 aucta intus relinquatur, etiam aliquantū splenici fiunt. Quum igitur & Ver sic
 processerit, etiam uere fit morbus regius. Proximus est enim hic motus tēpori,
 iuxta hanc speciem. Quū uero æstas fiat ueri similis, sudores in febribus, & fe-
 bres faciles, & nō peracutæ, neq; linguæ obaridæ fiunt. Si uero hybernium fiat
 uer, & postremū hyemis tempus, hybernī etiam morbi, & tusses, & peripneus-
 moniæ, & anginæ. Et autūnus si non in tempore ac derepente hybernarit, non
 assidue, tales morbos facit, eo quod nō in tempore inceptit, sed inæqualiter fit.
 Quapropter etiam tēpora à iudicatione aliena ac incōstantia fiunt: quemadmo-
 dum etiā morbi, si præerūpant, aut præexcernātur, aut intus relinquātur. Recia-
 dias enim etiam tempora faciunt, quemadmodū & morbos ita inducūt. Itaq;
 insuper considerandū est, quomodo habētia se corpora tēpora suscipiant. Aus-
 stri auditū grauant, caliginē inducunt, caput grauant, torpidi sunt, dissolunt.
 Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur, ulcera glabra, maxime os, pu-
 dendum, & alia partes. Si uero aquilo, tusses, faucium affectiones, uentres dur-
 riores, urinæ difficultates, horrores, dolores laterū ac pectoris. Quū hic domi-
 natur, tales morbos magis expectare oportet. Si magis redundauerit, ad squa-
 liores sequuntur febres, itemq; ad pluias, ex qualibus tandē redundantię trās-
 mutata fuerint, & quomocūcūq; habentia se corpora ex alio tēpore susceper-
 rint, & quocūq; tandem humore in corpore domināte. Caterum siccitates
 & austrinæ sunt, & Aquilonares. Differunt enim & alia hoc modo. Magnum
 enim & hoc est. Nam alius in alio tempore ac regione magnus est. Veluti Æs-
 tas bilem parit, Ver sanguinē, reliqua prout singula. Mutationes maxime pari-
 rūt morbos, & præsertim maximæ: & in tēporibus magnæ mutationes, & in
 alijs. Quædam sensim fiente progressu fiunt. Tempora huiusmodi sunt tēs-
 curissima, uelut etiam diætæ, & frigus, et calor maxime sensim facti progressu.
 Et ætates sic trāsmutantur. Naturæ quantum ad tempora atinet, aliæ ad æstas
 tem, aliæ ad hyemem, bene aut male dispositæ sunt. Quantū uero ad regiones,
 & ætates, & uictus rationē, & alias morborum constitutiones, aliæ ad alias bene
 aut male se habent. Et ætates ad tempora, & regiones, & uictus rationem, &
 morborum cōstitutiones. Et in tēporibus, uictus, & cibi, & potus, qualitatem
 suam requirūt. Nam hyems ab operibus ocii habet, & quæ in corpore ingerun-
 tur

tur matura ac simplicia postulat. Magnum enim & hoc est. Autumnus autem laboribus deditus. Sub insolationibus potus frequentes sunt, cibi inconstantes, uina, arborum fructus. Quemadmodum autem ex temporibus morbos coniectare datur, ita quandoque etiam ex morbis aquas, & uentos, & siccitates praenoscere licet, & aquilonares, & austrinas. Licet autem ei qui probe ac recte didicit, unde sint haec consideranda, uelut & lepra quaedam, & circa articulos dolores. Aquae ubi futurae sunt, pruriginosi sunt, & alia huiusmodi. Et quae pluuiae alternis, aut singulis diebus, aut per alios circuitus, aut assiduae fiunt. Et ueni aliqui per multos dies flant, & contrario inter se modo flant, alij per pauciores. Et ijdem per circuitum. Haec habent cum temporum constitutionibus similitudines. Verum breuius talia. Si uero annus diutius talis fuerit, qualem constitutione fecerit, tales etiam morbi diutius erunt. Et si magis fortes fuerint, maximi quoque morbi sic fiunt, & communissimi, & ad plurimum tempus. Ex primis aquis, ubi post multam siccitate, aqua futura est, de aqua inter cutem praedicere licet: & ubi talia parua signa apparuerint in uentorum quiete, in transmutatione. Colligenda igitur sunt, quae in qualibus aquis aut uentis morbi significant, & audiendus est si quis nouit, quod tali hyeme praegressa, tale uer aut aestas erit. Colores non sunt similes in temporibus, neque in aquilonaribus, neque in austrinis, neque in aetatibus, neque in unoquoque ad seipsum, neque in alio ad alium. Considerandum autem est ex his quae praesentia ac quiescentia nouimus de coloribus, & quae aetates temporibus similes sunt, & colore, & mutatione. Qui haemorrhoidas habent, neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedaena, neque furunculis, neque tuberculis terebinthi figuram habentibus corripuntur. Fortassis autem neque lepris, fortassis neque uiriliginibus. Multi tamen in tepestiu curati, non tarde correpti sunt, & sic perniciosa fuerunt. Et quicumque alij abscessus, uelut fistulae, aliorum medela sunt. Quae ubi in super coparent sedare solent, ea prius sentia impedienda ab his liberant. Alterius loci morbos loca excipientia, aut dolore, aut grauitate, aut ob aliud quiddam liberant, aut quod alijs sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognitionem talia spuiunt. conuenit quibusdam sanguinem detrahare tepestiu in talibus, in alijs autem, uelut in his, non hoc conuenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni, pleuritis, bilis. Tubercula circa aure quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparibus recidua fit, & pro ratione reciduarum, recidua fiunt, rursus intumescent, & permanet, quemadmodum febrium reciduae, in simili circuitu: in his spes est ad articulos abscedere. Urina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febribus, quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si uero ultra hoc, etiam sanguis e naribus large eruperit, etiam ualde. Cui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est, quietior erat. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE MORBO SACRO, IANO CORNAS

rio Medico Physico interprete.

*Non genuinū Hippocratis, sed memorabilis tamen uiri, hunc librū Gale-
nus esse dicit, tum quod ad dictionē, tum quod ad sententiā attinet. Hippo-
cratis autem neq; docendi modum, neq; sententiarum acumen, in ipso esse.*



Le morbo sacro appellato sic ferēs habet. Nulla re uidetur mi-
hi alijs diuiniore esse morbis, neq; sacrator. Verū naturā ha-
bet quam etiam reliqui morbi, unde fit. Homines uero natu-
ram & causam eius diuinā esse putauerunt, præ in experientia
& admiratione, propterea quod reliquis morbis nulla re si-
milis est. & per inopiam quidē quod nō cognoscunt, diuini-
tas ipsi cōseruatur. Per abundantia uero & parabilem modū
fanationis medentur. Exoluūtur enim aut expiationibus aut incantamētis. Si
uero propter admirationē diuinus cēsetur, multi morbi facti erūt, & nō unus:
quemadmodū ego demōstrabo etiam alios nihil minus admirabiles, neq; mi-
nus mōstrosos, quos nemo sacros esse cēset. Primū etenim febres quotidianā,
& tertianā, & quartanā, nihil minus mihi facti esse uidentur, nec minus à deo
fieri q̄ hic morbus, etiāsi nihil admirabile habeāt. Deinde uideo insanos homi-
nes & delirātes à nulla manifesta causā, & multa & simul importuna facere, uis-
dīq; multos in somno plorare ac uociferari, alios uero suffocari, alios exilire &
foras fugere, atq; ita delirare donec expergiscūtur. postea autē etiam sanos esse
ac sapientes uelut prius, effēq; ipsos pallidos ac debiles. atq; hæc non semel, sed
sæpe, aliq; multi sunt ac omnigeni morbi, in quibus singulis recēsendis in lon-
gum sermo extenderetur. Cæterum qui primi hunc morbū sacrum esse pro-
nunciauērunt, tales homines mihi fuisse uidentur, quales etiam nūc sunt magi
& expiatores & circulatores, & quidā arrogantes, qui se uehementer pios esse
simulant, & amplius quid scire. Hi itaq; cōsilij ac mentis inopie obuelantes ac
prætexentes diuinitatē, quum nihil haberent quod exhibitum prodesset, ut ne
manifesta fieret ipsorū ignorantia, sacram hanc affectionē esse pronunciarunt.
& rationibus idoneis collectis, curationē constituerunt sibi ipsi securā, expia-
menta offerentes & incantamēta, & à balneis abstinere iubētes, & à cibis mul-
tis ac ineptis ad hominū ægrotorū esum, uelut ex marinis quidē à mullo, & me-
lanuro, mugilīq; ac anguilla, hi enim pisces opportune haberi possunt. Ex car-
nibus uero à caprina, ceruina, suilla, ac canina. Hæc enim carnes maxime aluum
turbant. Ex uolucris autē, à gallo & turture ac onide. insuperq; ab his quæ
robustissimæ esse cēsentur. Ex olenibus à mentha, alio, ac cepa. Nihil enim acre
infirmo conducit. Palliū præterea nigrum habendū non esse præcepere. Niger
enim color mortalis est. Neq; in caprina pelle decumbēdum esse, neq; eandem
gestare oportere. neq; pedem supra pedem habendū esse, neq; manū supra ma-
num. Hæc enim omnia curationis impedimenta esse. Omnia autē hæc diuinita-
tis gratia apponūt, uelut amplius quid scientes, & alios prætextus proferētes,
quo si sanus æger euadat, ipsis gloria & dexteritas adscribatur. sin moriatur, in

ante positæ sint ipsorum excusationes, habeantq; prætextū quod non ipsi sint
 in causâ, sed dei. Neq; enim medicamentum aliquod edendū aut bibēdum exhi-
 buerunt, neq; balineis incoxerunt, ut ipsi in causâ esse uideri possint. Mihi au-
 tem uidetur nullum ex his qui mediterranea Africæ inhabitant sanū esse pos-
 se, propterea quod caprinis pellibus ac carnibus utuntur, quū neq; stratū, neq;
 pallium, neq; calcamentū habeant, quod non sit caprinū. Non enim alia ulla in-
 spis sunt pecora, præter capras & boues. Si autē hæc admota & comesta mor-
 bum augent, & non comesta sanant, non est sanē deus alicuius autor aut causā,
 neq; profunt expiamēta, sed edulia sunt quæ & sanant & lædunt. Numinis
 uero uis dissipatur. Sic igitur mihi uidentur hi qui hoc modo hos morbos cu-
 rare aggrediuntur, neq; sacros ipsos putare, neq; diuinos. Vbi enim præ tali-
 bus expiamētis ac tali curatione transmutantur, quid uetat etiam præ alijs ar-
 tibus similibus illis, & discedere ab hominibus & accedere? Quare nō deus au-
 tor est, sed aliquid humanum. Quisquis enim lustrationibus & magicis incan-
 tamentis talem affectionem abducere potens est, is etiam alijs artibus abduxerit,
 & ex hac ratione diuinitatis opinio penitus pessum it. Talia itaq; dicen-
 tes ac excogitantes, amplius quid se scire simulant, & homines decipiunt, pro-
 ponentes his lustrationes ac purificationes, quū uerba ipsorum magna ex par-
 te se ad deum ac dæmonium extendant. Atqui mihi sanē non de pietate uerba fa-
 cere uidentur, uelut ipsi putant, sed potius de impietate, & quod dei non sunt,
 pietasq; ac diuinitas ipsorum impia est ac scelestā, uelut ego docebo. Si enim &
 lunam abolere, & solem obscurare, tempestatemq; ac serenitatē facere, pluuias
 item ac siccitates, & mare sterile itemq; terram, & alia huiuscemodi omnia, se sci-
 re profitentur, siue ex sacrorum mysterijs, siue ex alia quadam professione aut
 meditatione, hanc potentiam iactent, qui talia studio habent, impij sanē mihi
 esse uidentur, & deos non esse putare, neq; si sint, aliquid posse, neq; ullum ali-
 quod etiam extremum malum prohibere. Quod quum faciant, quomodo non
 ipsis infestū sint? Si enim homo incantamentis ac sacrificijs utēs, & lunam abo-
 lebit, & solem obscurabit, & tempestatem ac serenitatem faciet, non utiq; ego
 horum aliquid diuinum esse putauerim, sed humanū, si sanē diuinitatis potentia
 ab humana uolūtate superatur, & in seruitutem redacta est: fortassis autem
 hæc nō hoc se modo habēt, sed homines uictus indigi multa & omnigena mor-
 biuntur & euariant, tum in alia omnia, tum in hunc morbum, in singulis affe-
 ctionis speciebus causam deo adscribētes. Non enim semel, sed sæpius eorundem
 mentionem faciunt. Siquidem enim capras imitētur, & si balatum edant,
 & fremdant, & si dextris partibus conuellantur, Matrem deorum causam esse
 aiunt. Si uero acutiorem & concitatiorem sonum emittant, equo assimilant, &
 Neptunum autorem esse dicūt. Si uero etiam aliquid stercoreis emittant, quod
 sæpe quibusdam contingit præ morbo coactis, Hecates enodiæ appellatio ad-
 ditur. Si autem tenuiorem & densiorem uocem edant, uelut auicula, Apollo
 Nomius, id est pastor, si uero spumam ex ore remittant, ac pedibus calcitent,
 Mars causam habet. Quicumq; porro pauores noctu ingruūt, timoresq;
 ac deliria, & exaltationes electo, terroresq; ac fugæ foras, Hecates infidias esse
 dicunt, & heroum insultus, expiamētisq; utuntur ac incantamentis, & sceles-
 tissimum ac impijssimū, meo sanē iudicio, faciunt numen, Expiant enim mor-

bo correptos sanguine, itemq̄ alijs sceleribus inquinatos, aut iniustos, aut ab hominibus intoxicatos, aut qui scelestum aliquod facinus perpetrarunt, quos cōtraria his facere oportebat, sacrificare nimirum ac precari, & ad templa progreffos dijs supplicare. Nunc uero horū quidem nihil faciunt, uerum expiant, & alia expiamenta terra occultant, alia in mare projiciunt, alia ad montes deferunt, ubi nemo attingat, necq̄ conculcet. Oportebat autem ea ad templa deferre ac deo contribuere, si quidem deus est autor, Non tamen ego puto hominis corpus à deo inquinari, fordidissimū scilicet à purissimo. Verum etiam si contingat ab alio inquinari, aut quid perpeti, cupierit utiq̄ à deo purgari ac purificari magis quàm inquinari. Deus itaq̄ est qui maxima ac sceleratissima peccata purgat ac purificat, et liberatio nostra existit, ipsiq̄ terminos templorū ac delubrorum dñs designamus, ut nullus qui non purus sit eos transcendat, & in gressi respersimur, nō uelut qui inquinemur, sed si quod etiam prius scelus habemus purificemur. Et de expiationibus quidem sic se res habere mihi uidetur.

Hic uero morbus nulla re diuiniore reliquis mihi esse uidetur. Sed naturā habet, quam etiam alij morbi, & causā unde singuli gignūtur. Naturam autem & causā, ab eodem deū fieri, à quo etiam alia omnia. Et sanabilis esse mihi uidetur nihilo minus q̄ alij, nisi iam præ temporis longitudine inualuerit, ut fortior sit medicamentis quæ adhibentur. Incipit autem uelut etiam alij morbi secundum genus. Si enim ex pituitoso pituitosus, ex bilioso biliosus gignitur, & ex tabido tabidus, & ex splenico siue lienoso lienosus: quid prohibet ut cuius pater & mater hoc morbo correpti fuerint, etiam posterorū ac neporū aliquis eo corripatur? Semen enim genitale ab omnibus corporis partibus procedit, à sanis sanū, à morbidis morbosum. Aliud porro signū magnū est, q̄ nihilo diuiniore reliquis sit morbis: pituitosis enim natura oboritur, biliosis uero nō accidit. Atqui si diuiniore est reliquis, similiter omnibus morbū hunc fieri oportebat, & non discrimen facere inter biliosos ac pituitosos. Sed enim ipse cerebrū autor est & causā huius affectionis, uelut etiam aliorū maximorū morborum. Quo uero modo, & ex qua causā fiat, ego manifeste docebo. Cerebrū hominis duplex est, quemadmodū etiam alijs omnibus animalibus. Mediū autē ipse diuidit mēbrana tenuis. Quapropter non semper eandē carnis partē dolet, sed particulatim utramuis, aliquādo uero totum. Sed & uenæ in ipsum tendunt ex uniuerso corpore, multæ & tenues, duæ uero crassæ, altera ab hepate, altera de liene. Et quæ quidē ab hepate uenit, hoc modo se habet. Altera quidem uenæ pars deorsum tendit, per partes ad dextrā, iuxta ipsum rhēnē ac lumbum, ad internam femoris partem, & descendit in pedem, & uocatur uena caua. Altera uero sursum tendit per uenas dextras ac pulmonem. Finditur autem & in cor, & in brachium dextrum. Reliquū uero sursum fertur per clauiculam in dextram ceruicis partē, ad ipsam cutem, ut conspicua fiat. Iuxta aurem uero occultatur. Atq̄ hic finditur, & crassissima quidem ac maxima & caussima ipsius pars, in cerebrum definit, alia uero pars in aurem dextram, quæ sanè uenula tenuis est, alia autem in oculum dextrū, alia in ipsum nāsū. Atq̄ sic quidem uenæ ab hepate habent. Tendit autem & à liene uena in sinistra sursum ac deorsum, uelut ab hepate, uerum tenuior & imbecillior. Cæterū in has uenas etiam spiritus copiam inducimus. Hæ enim corporis nostri respiraciones sunt,

acrem

aerem in se ipsas trahentes, & in reliquum corpus ac uenulas deriuantes, refrigerantque ac rursus dimittunt. Non enim possibile est spiritum stare, sed procedit sursum ac deorsum. Si enim alicubi confiterit ac interceptus fuerit, impotens redditur illa pars ubi confiterit. Cuius rei signum hoc est. Quum enim descendenti aut decumbenti uenulae compressae fuerint, ut spiritus a uena non discurrat, statim torpor occupat. Et de uenis quidem reliquis sic habet. At uero morbus ipse fit in pituitosis, in biliosis uero non. Incipit autem fieri in foetu adhuc in utero existente. Purgatur enim & florescit cerebrum, uelut etiam aliae partes prius quam gignantur. In hac autem purgatione, si quidem probe ac moderate purgatum fuerit, & neque plus neque minus quam oportet defluerit, hic foetus sanissimum caput habebit. Si autem amplior colliquatio a toto cerebro facta fuerit, morbosum caput augetur foetus habebit, & sonitu plenum, & neque solem, neque frigus tolerabit. Si uero ab una aliqua parte colliquatio contigerit, aut ab oculo, aut ab aure, aut uena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic afficitur qualiter sane colliquatio contigerit. Si uero purgatio non contingat, sed in cerebro spiffetur ac cogatur, sic necesse est foetus pituitosus esse. Et quibus cunctis quidem pueris existentibus erumpunt ulcera in caput, & in aures, ac in reliquum corpus, & qui saluosi fiunt ac mucosi, hi ipsi progressu aetatis facillime degunt: hic enim abicit purgatur pituita, quam in utero purgari oportebat, & qui sic purgati fuerint, comitali siue sacro morbo ferè non apprehenduntur. Qui uero mundi sunt, & neque ulcus ullum, neque mucus, neque saliuua ulla prodit, neque in uteris purgationem fecerunt, talibus periculum imminet, ut ab hoc morbo corripiantur. Si porro ad cor progressum fecerit defluxus, tremor apprehendit & anhelationes, & pectora corrumpuntur, aliqui uero etiam incurui fiunt. Quum enim descenderit pituita frigida ad pulmonem aut ad cor, refrigeratur sanguis. Venae autem uolenter refrigeratae, ad pulmonem & cor assiliunt, & cor tremore concutitur, ut praeter hac necessitate anhelationes incidat, & spiratio ceruice erecta. Non enim spiritum suscipere potest, donec id quod influxit a sanguine fuerit superatum, & calefactum in uenas fuerit diffusum. Deinde & tremor & anhelatio sedatur, sedatur autem prout copia eius fuerit, si enim amplius influxerit, tardius, sin minus, citius. Et si quidem densiores ac crebriores fuerint defluxus, crebrius comitali morbo corripitur, sin minus, rarius.

Hac itaque perpetitur homo si ad pulmonem ac cor fluxus processerit. Si uero in uentrem, profuua alui apprehendunt. Si uero ab his uisus exclusus fuerit, & in uenas quas dixi defluxus fecerit, mutus fit & suffocatur, & spuma ex ore effluit, & dentes constringuntur, & manus concuellantur, & oculi distorquentur, & nihil sapiunt, aliquibus etiam sterces inferne secedit. Atque haec sunt aliquando in sinistra, aliquando in dextra, aliquando utrinque. Quomodo uero singula haec perpetiatur ego narrabo. Mutus quidem est, quum pituita repente in uenas delapsa, aerem excluderit, & non admiserit neque in cerebrum, neque in uenas cauas neque in uentriculos, sed occuparit respirationem. Quum enim accipit homo per os & nares spiritum, primum quidem ad cerebrum uenit, deinde uero in uentriculum magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad uenas. Ex his uero ad reliquas partes in uenas dispergitur, & quantum quidem eius ad uentriculum uenit, refrigerat, & nihil aliud confert. Idem praestat & quod ad pulmonem

L I B E R

cōfert ad uentriculos ingressus
membris exhibet. Quare ubi fue-
susceperint, mutum ac desipien-
tentes fiunt ac cōuelluntur, san-
guis ut solebat. Oculi quoq; distor-
tione uero ex ore prodit ex pul-
satione ipsam, spumescit & ebullit ue-
stris suffocatur. Suffocatur autem,
si irruētibus, & stomacho uentris
in os non ingreditur quantū so-
let membrum conclusus fuerit, & foras
transiens per sanguinē sursum ac deorsum
interea sanè calcitrat. Porro om-

stuitā superare, quum
latur, ut impotētes si
extras autē magis de
n sinistris. Ab hepate
maxime, quibus sanē
n derepente in horruē
nim per calorē ac cere
sic defluit. Et quibus
oi derepēte post aquis
erebrum derepēte sol
uit in super & ex igno
nter plorandum spiri
nter contingere solet.

§ LIBER

in autē saepius à morbo corripit̃atur,
ut ad aliū maxime notū, præ timore
veri nōdum sciūt. Cæterū in mu-
ri tripi cēseo, maxime quidē auftrinis,
reliquis uētis, hi autē sunt qui fortissi-
mè in rebus cōtrarijsimi. Etenim aquilo
ternit, et illustriorē ac pellucidū facit.
In alijs aquis proficiscētes. Ex omnib.
in opacitate ac tenebrositate excernūt.
In aquilo existit. Aufter autē cōtraria
in opacitū liquare ac diffundere, quæ
in primū lentus ac lenis est, quoniā ae-
r in us est & cōpactus, sed tēporis pro-
prietate in terrā operatur et in mare, fluuiosq̃

ū facientes. Si quidem
rores ac timores accer
autē dum calefcit. cale
ore per uenas hæmati
ec rursus redierit in ue
quietudine multa iacta
fuetudinē cōpingitur.
obliuiofus euadit. No
calefiat. hoc aut perpe
multus ad cerebrū per
ū cōtingit ut homo u
uigilet, tūc magis facies
ur aliquid mali operari,

T I S D E

in propterea primum sentit, quia eti
maximi, ac præcipue lethales, & qui
tos. Hic uero morbus facer appel
a reliqui, ab accedentibus nimiru ac
e & transmutantur, & nunq̄ quies
quã hunc morbū ab alijs discrimina
outare, sed omnes diuinos omnesq̄
bet & uim in seipso, & nullus nec au
tis curantur, à quibus etiam nascun
, alterius uero pernicijs ac afflictio.
poris occasioē in singulis pernolce
oluet & augebit, alterum uero detra
cho, tum in reliquis omnibus, nõ au
us, id quod aduersissimū est morbo
A familiari enim & consueto floret

si fieri necesse est. Hac
quantū quis ab his delin-
at. Et an quæ multa sunt,
differat. Et quicquid sanè
oportet, & in cōtradictio-
ne fiunt ex his quidē quæ
uero, à laboribus et uul-
nere ac superfrigefaciēte, &
ante. Et bilis quidē ac pi-
lore aut plus, aut minus.
rtim à calido supercalafa-
talia habēt, ut fiant hac
i crassos neruos faucia-

erit, febrem necesse est superuenire
tem fideratam fieri ac perire. Si
Et si sanguis ex uulnere aut uena
t ipsum in pus conuerti. Tem
n, multae sunt & uarię in arte, quę
rum curationes. Maxime uero res
pitulari oportet, & qui neq; urinã
ur, & si mulierem parientē aut fau
odi. Et hęc quidem occasiones res
t. Pleriq; enim paulo posterius pe
peniatur homo, & quis antequam
one opitulatur. Est quidem igitur
orbis. Semper enim in quocunq;
opitulatur. Quicunq; uero mor
temporarij sunt ac periculosi, dolo

ni, quicq̄ parui. & dum
cur curatu sunt impos
quantum possibile est
oportet, recte ne an fe
ut si crassificare oport
quæ attenuare oportet,
cere, non calfaciat. quæ
tionem. Talia au
bona, tum mala. Febris
usa uero ac dispersa sub
nti, diffusa autem ac dis
um. Aluus turbata in
Febrienti aut uulne

S D E

um accusant. Si uero optulerur,
perpeti putant, ulceraq; inflam
portere, neq; tales esse ut ne fiant.
neq; uesica, neq; aliquid ex tenuis
is genæ pars, neq; pudendi pelli
stratum quidem non est, quod fa
tuum aliquid, neq; mediū, neq;
aliquando operantes, & defini
sermonibus incipimus, neq; si de
operantes iuxta eandem rationem,
idem definimus. At uero fa
secās aut urens, neq; neruum fe
onsequatur. Et si fecet, eodem mo
ars corporis ex natura excidat, ut
hædæ fortiter eo cum oportet. &

perit quemadmodum
ne factio, aut uentre in-
atus. Quum uenula ui-
ribus: & ubi rupta fug-
sin tenuior, minus, &
n uero nisi uena adtrin-
putrefactus fuerit pus-
liquando pus subcruen-
na, ipsam sanguinis co-
ab accessoria & intus
o, priusquam uena fan-
etur, & in lecto decum-
uari, superstes ab hoc

S D E

guis, sed in carne acutus tractus
ditatem modicam traxerit, & sub
s nō percipit præ robore ac bona
se putat. Hic ubi deprehenderit,
aut aliqua alia re correptus, fue
subcalefcit, & humiditatem in se
t. Vbi autē attraxerit, in tumescit
tussim raram & siccam primum.
orem inducit uehementiorem, &
ubpurulentum spuit. Aliquando
agis tempus progreditur, ampli
rne quantū ab initio liuidum erat,
em, & tussim multam ac frequen
Si uero pus in uētre moram tra
uāsiūm nōm. Celsen

ificationem præbuerit & ex-
truperint, pereunt. At uero
o dictum est, generari haud
icis & in tuberculis in nasci-
icile est. Neq; enim ex cons-
xime ex dolore ubi fuerit, &
oposueris, breui id resiccat.
fuerit nimium resiccatus, id
e, ac in temperie. Et quum su-
m trahit, maxime quidem &
ima sunt, ac ipsi incumbunt.
ilissimum trahit. Postquam
& repletio in pectoribus, &
ibus, maxima circa sine re-

uerit, maturatum autem multa sua
atim quidem melius habere sibi uis
m totū per sputum reiecerit, & uen
tur, sanus euadit. Si uero & tempus
per sputū reijcere nequeat, sed uisus
m & sic melius habere sibi uidetur,
(dem quæ prius relata sunt. Por
ile, eadem ratione qua in pulmone.
qua tracta rupta fuerit, nō tamen pe
sa factus sit. Siquidem igitur rupta
cit & suppuratur. Si uero acutus tra
m exhibet ac pulsāt, progressu uero
nem, atque hic in carne putrescens,
n magis doluerit, & sanguinis plus

plaga, & si quis onus maius
Quicumq; uero à uulne
ut iaculo, intro fauciati fue
m foras, per antiquum uul
calidum à seipso hac parte es
purgatur. Et si quidem & in
enitus homo euadit. Si uero
ppuratus fit. Et si etiam sana
m intus debilis fiat, & aspera
is fit. Rursus exulceratur
erit, & si pituita aut bilis ad
tenuatus fuerit. Vbi uero ul
pars priusq; interna coaluit,

S D E

pos, præ bona corporis habitu-
& si patiantur, debiles ipsas perpe-
remittunt magis ipsis, & affectio-
initio omnino minus seniori quàm
es sunt, iuniori uehementiores. Et
uigorem & siccitatē, & carnem den-
ute circum ipsam circūtentā: quum
erepente, cōuulsiones uehementes
narum ac carniū. Et horum aliqua
pore cōparent. At senioribus
diffuūt, & cutis circum carnes: &
pati possit similiter senior ueluti iu-
statim manifestū redditur. Atq; in-
iuniores senioribus difficilius libe-

frigidissima ex natura. Calidior
est bilis sanguine. Quum igitur
transiit ad sanguinem, ipsum con-
solidat. Sicut et homo, si sanguis densior
est sanguine, necesse est
quod si huiusmodi quid factum fuerit, ri-
gor est vehementior est etiam tremor.
Sicut et congelato, corpus & con-
solidato sanguinis coactio fiat, hoc
est rigor. Quod autem post
rigorem, sic habet. Quum san-
guis in naturam redierit, concale-
scit. Sanguis ipse seipso multipli-

splenitis appellatur, tēdit à splene
am manū. Hepatitis autem ad dex
a latere pars à rigore contracta fue
auiculam ac humerum concedit, &
& loci circa dorsum, ab affixo ad
& quandoq; dolorem locis infra la
es conuertatur, dolorem per uenas
eger mingit. Arbitratur autem hu
sse. Peripneumonia fit quum
rae caliditate traxerit in seipsum de
ercalfacit quidem totum corpus ac
tis, & humeris, ac spinæ: nimirum
itatem, & superescantur hæ par
traxit in seipsum, & tum bilis, tum
scit ac suppuratur. Et si quidē in die

uritur: & si ipsas contingere
qui à febre ardente corripit
externis autem frigidi sunt.
exasperantur & arescunt.
bilis, quod quidem in uenis
nero in primis diebus uomit
de causa. Quum supernus uen
& fit uomitus. Et ob hoc ip
ipneumoniam maxime mor
supercalefactus fuerit, trahit
a: & plerumque pereunt, nimis
super generato, dies trāfige
quatur. Verum ut plurimum
t quibus in uescam confluit

S DE

oritur. At ex phrenitide ita pe-
n sanguine corrupto, & ex confue-
orum quæ ipsis exhibentur accipi-
n uero progressum fuerit tempus,
& febre, tum quod nihil alantur. Et
ac perfrigerantur. Deinde ipsis pro-
principium hoc habet. Quæ fan-
uita, transmutatur & cœuellituras
ro omnia perfrigerantur, & moritur,

O I DE MOR-

O CORNARIO

terprete.

publi conut animi in calueris Li que

nō est uerisimile. Nam à bo
m fiat. Neq; rursus bonum
ur, quū ad uenas bilis aut pi
e, & dolor per totum caput
unt. Et sonitum quidē perci
nc enim sonitus est in capi
u ac sonitu, partim quū cere
m caliditate, uacuā circa au
is aeris copia nō infit, uelut
quæ dicūtur non æqualiter
Hic si quidem erumpat ipsi
non erumpat, septima die
id quod ab ipsō fit quæ &

is.
esse corripit. Temporis autē pro
diffcedit. Talia uero patitur is cui
essiccata fuerit. Hac enim parte r
quia aridum est, cutis ab ipso di
morbus. Si sideratus fiat, an
qualiter uidet, & soporatur, & ue
impotentia. Hic patitur hæc;
factæ pituitâ in seipias traxerint.
eriores uero capitis partem ideo
cerebrū ad anteriore capitis partē
deo non uidet, procubente eò ce
prpus occupant. Postquam uenæ
bituitæ frigiditate, sanguinem ma
um pro dem autem sanguis non

ad uiginti dies. Et dolor ca-
sur, & dimidiatas rerum faci-
nus euadit. Multis uero qua-
no. Et capitis cutis ipsi crasse
ne coloratus apparet, & no-
eris in principio morbi, pri-
it ipsum dolor: de raso capi-
t, aqua plenum calidissima,
ermittere, & ubi perfrigeras
desistere: ac tēpore interpo-
us non egerat, infusum per
latis, aquam mulsam aquos
ne foueatur. Sorbeat autem

etur. Inungat autem caput baccis
argenti flore, adipēq; fuillo ac oleo
autem tempus uomitibus utatur
si his adhibitis, ex reliquo quidem
pite ipsi ulcera adhuc fiant, rursus
rgans postea bibendū dato. Dein
anguis effluerit confricato. Post
& postquā exolueris, spongia de
cupressum inspergito. Lancis au
Alius morbus. . . Dolor caput
mit. Quandoq; etiam urinam diffi
doq; moritur: & nona quoq; ac un
rit per nares aut aures. Si uero eru
einde temporis progressu putrefa

ignem ne accedat. Et si quis
re ubi ipsum prius purgaris
um infundito, & pauco tem
ehicito. Postea inciso capite
uti sectionem ac perforatio
r, & febris per caput, maxi
orum regiones dolet, & su
detinet, & si quis ipsum mo
torpent, & stupor ipsos tes
i potest quietus esse, sed an
nares aut aures eruperit, a
nus, plerunque in septē die
lipyria, quum liberatus à fe

S D E

cessarit, apij succum in .nares in
Et forbeat milium tenue modico
subeat, brasicas edat & succum
o. Er postquā tempestiuū tibi esse
es ipsi exhibero. Et si depulso fluo
cūbat, & in naso mucus crassus ac
origano ipsi adhibito, deinde cali
apponito. Atq; his factis plerūq;
lis. Alius morbus. Si ces
uo ad spinam tendit, & ad cor frī
est, & per nares sanguis fluit, Vo
ero septē dies trāsgrediatur: plerūq;
nat, aut è naribus fundat, neq; calis
Verum acetū album aquosum bi

maxime anteriorem capitis par
& febris, & rigor apprehen
tumuit, & perpurcato osse,
leinde uelut fracturā curare.

Corripit ipsum os, et progres
so fractura. Et si hanc resecue
ulum. Quibusdam uero eti
affectū incideris, si quidem
q̄ celerrime curare. Si uero
q̄ laminam rasum, uelut pre
s quis fiat, & anteriorem cas

na. Febris & dolor capitis cor
e, & salivam deglutire non potest,
loquitur. Quum ita habuerit, pri
nti supra diximus. Deinde spongi
as adhibeto. Aquam autem mul
tifanæ forbere cogito. Si uero ipsi
uelut in priore fomentum adhibe
o, aut ad collum, betas aut cucurbi
trimpomat, & frigidam aquam bis
tem ad pectus extumuerit, pleriq;
atis, morbus ad pulmonē conuert
or, & ut plurimū moritur, ubi hoc
suppuratus fit, si non ipsum statim
eatiōe depurgatus, sanus fit. Huic

II 205
argulionem autē florem æris
ortensium decoctum, uelut à
te tumor est, ordeaceam fari-
ate apponito. Postq̄ uero tu-
contactum, scilicet ipse per

12.
atū, fiat, lingua intumescit, &
aliam deglutire nō potest.
n apponito, & ordeaceam fa-
nponito. Gargariset ficū de-
tum fuerit, secato. Aliquando
uero foras suppurauerit, peru-

I S D E

rcum polypū obducito ac adapta
nsmittito, & arreptā ipsam trahito,
to supposito sub gurgulionē ac re
o uelut superiorē. Alius polypus.
durū quid nascitur, & uidetur quā
ū edit uelut lapis. Quum sic ha
deinde inurito. Atq; hoc factō na
entū melle illitum indens, & ubi cō
at autem curatio plūbeis māsis itie
ntur ex obliquo cartilaginis in sum
porter, & post unctionem ueratrum
aris flore cū melle expurgare. Cu

niger.

siā porco uelut in umbra occulta

uerum ad iunum uentri tor-
um dato, & postea lac asini
fuerit, per clysterem subitus
s febricitans, danda est ipsi aqua
aquam frigidam quantum bis
succum, aut milium tenue for-
bibat. Si uero febris necque nos-
as partes habeat calidas, uen-
tic medicamentum ne dederis,
succum bis in die frigidum for-
lum. Reliquo uero tempore
die exudarit, et febris ipsum
eruntque moritur.

I S D E

multis utatur. Altera uero ex acer
pfi intexeris, donec exudet, statim
line, & trifolij drachmam, & succi
meraco bibat. Et si uomitiones
purgatū. Cibus aut utatur q̄ mol
ipsum inuaserit, ieiunus medica

r tenet, & dolor per spinam ad pe
& salua alba ac subbiliofa, & non
est, & cruentam urinam mingit.
die remiserit, sanus euadit Si uero
aut decimū quartum diem. Et sanē
quartum trāsgrediatur, euadit. Quū
at autē mel, & quali acero affuso co

S. D. E.

ostius teneat, tu uero humerū con-
tum edar: optandum autem esset
nus enim lethalis est. Si uero præ
ipsum cognoscere possis, (nam
t ac magis doluerit, hoc in fine se
puris exitus facilem fluxionē ha-
rimū cutem, deinde scalpello acu-
ostius pars, ad unguis magni digi-
Ostea emisso pure quantum uisum
ro foras propendente filo, conclu-
autem decimus affuerit dies, om-
einde uinū & oleum tepesacta per
solitus derepente resiccetur. Emit-
ad uesperā: quod uespera, mane.

em uomat, ab ipſo lenticulae
acutę tenuerint, carnibus oſ
lũ autem ne forbeat, neq; ad
ginei generis coctis. Calidũ
Nec; oleribus acribus utatur,
.Si uero ſine febre ſit, calores
pinguiſſimos. et pinguiã, et
atur, neq; in uẽto, neq; in fo
t calida lauet, capite excepto.
mazam edere ſoliti ſunt, Ma
rbus appellatus Tabes.
uandoq; facile ruſiẽdo rej
itis cõteritur, durum et male

em maxime recētes sponfos, & ue-
ne cibum capiunt, ac cōsumunt.
erne de capite in spinam uelut for-
entrem exonerat, prodit ipsi geni-
in utero non manet, & in somnis
e non. Et quum iter fecerit aut cus-
inhelatio ac debilitas ipsum corri-
temporis progressu ubi febres for-
e. Quū ita habuerit, si ab initio cus-
is adhibito, medicamentū sursum
purgato. Deinde deorsum purgās
te curationē aggrediamur. Postea
b. Cæterum bubulum lac per qua-

II 211
dorsum, ac latus: & si se uer
calefactoria apponito, & cen
teto affuso, præforbenda da
præforbeat, & uinum aquo
erit, saluiam tusam ac cribra
gula paribus portionibus, in
to. At si ieiunus non sit, legu
calor fuerit, cibus utatur mol
be se habuerit corpus, & in
uisis emergit, & salua crassa
sub scapulas, ac latus: & ar
ur, & pruritū habet, & nō sus
ficitur, ac uiribus deficit. Sic

DE

Dolor sub scapulas, cucurbitā affigito,
utatur nō fallis, neq; pinguibus.
Utatur & deambulationib. Hæc fi
per plurimū tempus morbus pro
beneficentes relinquit. Si uero iunio
ibi ipsū purgaris, pectus & dor
dorsalis.

uitas corripit, & saluam spuit cum
uentā: & dolet maxime dorsum &
am mingit, et moritur septima die.
euadit: effugit autem nō ita ualde.
ia feruefactā ac perfrigeratā, et apij
Dato & ptisanæ succū bis in die, &
Qua uero parte dolor cōfiterit, cale

erec̄tæ ceruicis spiratio, &
s & dorsum emergit, & in
ore incubere uidetur, & do
& spirationē cohibet, & ad
m ad sanum: uerum ueluti
pectus trāspirare se putat.
n ipsi bibendam dato. Post
, & dauci ac centaurij semi
Et infusam aquam calidam
uito, & fascia pectori alliga
dū prębeto, & uinum aquo
suppurato lecto (fieri enim

I S D E

nū parce emittas. Et si quidem in līa
q̄ euadit. Sin minus, ubi aquam ex

ruptum.

ores tenent pectus ac dorsum perpe-
tiliuam subcruentā tussiendo rejicit,
rit. Atq; hæc maxime patitur, si ma-
m inscenderit. Hūc ante & retro uri
lit. Cæterum per annum à labore se
pori studeat.

a aspera, & nigra, & cum uirore palli
& oculi cū uirore pallidi sunt, & ex-
ore pallidū, talem quoq; urinā min-
uadit in p̄cipuo q̄. & dicitur

I S D E

dis, abstinēs ab acribus & falsis: uies
Ceterū hic morbus ut plurimū cum
ructuosus.

enter, & ipse seipsum iactat, & uoci
uclauit, melius habere sibi uidetur.
Si parui mensura: & dolor corripit à
ollitudinem, & ubi hoc factum fue
tur, ac durus fit, & strepit, & flatus
habuerit, multa calida lauato, et ca
e dolor ac flatus fuerit, clysterem ad
sanæ succū ammisceto, ac forbendū
bendum. Cibū autem ne exhibeas,
rum retrimenta dulcia, per noctem
s bibat. Si uero uuarū expressarum

11 217
erro. Origanū uero & fatureiā
cibum iter faciat. At si à medi
ambulationibus, & illuic pre
. Verum sursum purgans nō
enderint. Quod si extenuato
bibendum dato, & caput pur
hic maxime à nullo discedit.

e, & anxietas ipsum corripit,
timor inuadit, & septū transe
uescit, & terriculamenta ac so
Et morbus hic fere plurimos
caput purgato, & post capitis
at, postea uero lacriminū hie

IS DE

medicamentis sursum ac deorsum
endum præbere. Cibus autē utatur
, & cartilaginei generis, & betis, &
um, uinosum, aquosius. Labore &
, et à sole abstinere. Atq; hæc sanè fa
m est, non autem consenscit.

orius.

tur. Verum grumos bilis cōcretos
stquā cibos excreuit. Cæterum eas
elata sunt, & clysterem adhibere.

COI DE MOR-

NO CORNARIO

nterprete.

tingit, & maxime sibi ipsi ignem, fumum, acrium odore ratione uti, Sit autem alius

rum multa immundicia vitio
capitis pars primum dolorem
nobis oculis, aliqui altero, &
, & febris tenuis habet, & cor
ur, & ad septem non deuenit.
urare uoles, capiti fomēta ad
Si uero dolor tenuerit, etiam
leuibus ac odoratis, infernā
eat, & pitifanæ succo uratur.

icationes præterierint, & linguæ fœ
entū dederis, neq; ad purgationem
n iudicationes prætereant.

æ calore.
ore repletus, tussis tenet fortis & du
ntim respirat, & frequenter anhelat,
as ex cursu, & linguā frequenter exe
s in ipso inesse. Quapropter hanc ca
impotens fit, & dolor acutus emers
ibus punguntur: & ardent hæ par
es exoriantur ad pectus & dorsum,
angustia, ut neq; stare, neq; federe,
operatis rebus anxius iactat seipsum,
ne quarta aut septima die, quas si esse
rnam aluum q̄ citissime clysteri ad

trahit, & oculi affecti sunt ac
s uider, & ipsos conuertere
acies & fauces ardent, immò
etur, & uiderac audit obru
dicat, neque quid audiat, aut
c talia faciens. Hic quinta,

pellata.

orem morbū significat, quem
oportet, maxime sub mam
ritus calidus. Oportet quoq;
Fistulas item detrudere con
monem trahatur. Et facien
at, Et suffitus fiat per hyffo

Opisthoronos.

Quum autem distētio in posteriores partes, opisthoronos appellata tenues
 neltur, & uociferatur aliquando, & dolores emergunt uehementes, & crura
 interdum contrahere non permittit, neq; manus extendere. Sunt enim cubiti
 incuruati, & digiti in pugnum contracti, & pollicem plerunq; alijs digitis con
 tinet, & clamat, & nugas garrit quādoq; & non potest seipsum continere, sed
 aliquando exilit, ubi dolor premit, quum uero dolor remittit, quietem habet.
 Aliquando etiā uox interceptur simul ut morbo corripiuntur, aut infani &
 atra bile perciti fiunt. Hi tertia die moriuntur uoce soluta, & reuomunt per na
 res. Si uero effugerint decimumquartum diem, sani fiunt. Curandus hic est ue
 lut superior. Quod si uoles, etiā sic facies. Aquā frigidam plurimam superfun
 dito, & postea uestimenta tenuia, pura, ac calida superintegito. Ignem aut tunc
 non adhibeto. Hoc auxilium & ad tetanos, & ad opisthoronos adhibere oportet.

Voluuli.

Voluuli fiunt quum supernus uentriculus calescit, infernus uero frigescit.
 Resiccatur enim simul intestinum, & præ inflammationis caliditate obtru
 ratur, ut neq; flatus, neq; cibi pertranseat, sed uenter durus sit, & quādoq; uo
 mat, primum pituitosa, deinde biliosa, postremum stercus. Et æger sitim habet
 ac dolorem, maxime circa præcordia. Verum & totum uentrem dolet, & infla
 tus est, & anxius est, & febres corripiunt, & fiunt maxime septima die. Hos sic
 curare oportet. Supernū uentriculum quā citissime purgato, & sanguinem
 de capite ac cubitis detrahito, ut superna aluus calescere desinat, & partes supra
 septum transuersum frigefacito, excepto corde. Infernas autem calesfacito, ho
 mine in solio aquæ calidæ collocato, ac semper oleo illito. Calefactoria quoque
 humida apponito. Et glandulam de melle solum decem digitorū longitudinis
 facito, & ex iumma anteriori parte sel taurinum oblitino, atq; sic bis ac ter sub
 dito, quo omnia combusta stercora circa rectum ac princeps intestinum cōten
 ta educas. Et si quidem sic obediērit, postea clysterem adhibeto. Sin minus, fol
 lem fabrilē indito, & in uentrem flatum immittito, à quo & uentrem, & intre
 stini contractionem distendas. Deinde extracto folle, clysterem adhibeto. Sit
 autem infusum per clysterem iniiciendum paratum non ex ualde calefactorijs,
 sed ex his quæ stercora dissolunt ac colliquant. Postea obturata per spongi
 am sede, in aqua calida desideat continens clysteris infusum. Et si hoc infusum
 susceperit, & rursus dimiserit, sanus euadit. Cæterum priore tempore mel
 optimum delingat, & uinum splendidum uernaculum hibat. Quod si uoluus
 lo amoto, febris ipsum corripiat, desperatus est. Fortassis enim & inferna al
 uus soluta ipsum occiderit.

Peripneumonia.

Peripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, & spiritum frequentem ac ca
 lidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & iactatio, & dolor sub sca
 pulas, & ad clauiculam, & ad māmam, & grauitas in pectore, quandoq; etiā
 delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint. Verū hic
 morbus diuturnior ac difficilius illo est. Saliuā tenuem, ac spumofam primum
 spuit. Lingua flaua est. Verum progressu tēporis nigrescit. Si igitur in princi
 pio

pio nigrescat, citius morbus finitur. Sin posterius, tardius. Tandē uero etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas, inhaeret. At liberationem à morbo significat lingua, similiter uelut in pleuritide. Hæc autem patitur homo, minimum diebus quatuordecim, ad summum una & uiginti, & per hoc tempus tussit uehementer, & unā cum tussi purgatur, primum saliuua multa & spumosa. Septima uero & octaua die ubi febris in uigore fuerit, si humida sit peripneumonia, crassior prodierit: sin minus, non. Nona uero & decima, cum uisore pallida ac subruenta. Duodecima autem usq; decimam quartam, multa & purulenta. Atq; hoc in his contingit, quorum naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quorum uero & natura, & morbi constitutio sicca est, in his minus. Si quidē igitur decima quarta die resiccatus fuerit, et non amplius purulentum tussiendo reiecerit, sanus est. Sin minus, ad duo de uigessimam, & uigessimam primam animum aduerte, & si quidem tunc sputum illud quieuerit, euadit. Sin minus, interroga ipsum, an dulcior sit saliuua, & si affirmauerit hoc, scito pulmonem ipsi suppuratum esse, & morbus annum durabit, si non in quadraginta diebus pus eduxerit. Si uero insuauem saliuuam esse dixerit, status morbi lethalis est. Verum in primis diebus hi maxime manifesti fiunt. Si enim putrefactum ac purulentum expuerit in diebus duobus ac uiginti, & non exulceratus fuerit, euadit. Sin minus, non. Hæc peripneumonia nihil abest ab affectionibus quæ in pulmone sunt. Si igitur aliquid harum affectionum abfuerit, cognoscere oportet & quæ ægrotus mala habeat, & quæ medicus aggredi debeat. Si uero pauca horum signorum habuerit, ne decipiatur. Nam perniciofa non est peripneumonia, sed mollis. Cæterum peripneumoniam hoc modo curare oportet. Non tamen peccabit, si quis etiam pleuritidem & phrenitidem ita curare aggrediat. Primum caput leuius facere incipe, quo nihil influat ad pectus. Primis autem diebus sorbitiones sint dulciores. Sic enim id quod confedit ac compactum est, potissimum eluetis ac commoueris. Quarta die & quinta ac sexta, non amplius dulces, sed pingues. Nam ad sputum sursum excreandum conducunt. Si uero pro ratione spueri non possit, ex pharmacis sursum educentibus dato. Aluum autem in primis quatuor aut quinque diebus subducere oportet, & hoc paulo amplius, quo & febres obtusiores sint, & dolores leuiores. Quum autem euacuatus fuerit, & corpore debilis, infernam aluum tertio quoq; die deorsum commoueto, quo & corpus potens sit, & supernæ regiones humoris exortes. Nam si multus humor infra secedat, à quinta die, mortem inducit. Infra enim humore secedente, supernæ partes resiccantur. & sputi purgatio sursum non prodit. Oportet igitur & infernam aluum, neq; ualde suppressam esse, ut ne febres sint acutæ: neq; ualde egerere, quo saliuua sursum educi possit, & æger uiribus ualeat. At medicamenta sursum educentia, sexta & septima ac nona die, & morbo adhuc ulterius progresso, magis exhibeto. Sit autem medicamentum, ueratrū album, thapsia, elaterium recens, singula æquis portionibus. Quod si saliuua non probe purgetur, & spiritus fuerit frequens, & purgatio non præualeat, prædicendum est nullam spem uitæ reliquam esse, si purgatione nihil efficere possit. Sed & alia faciendā sunt quæ in peripneumonia fieri solent, si inferna aluus ministerium suum probe obierit. Quin & aliter facere curationem oportet.

A prima die initio sumpto, ari magni conchulam maiorem dato, dauci & urticae utriusque itidem unam, sinapis & rutae quantum tribus digitis comprehendere potes, & succu silphij magnitudine fabae. Haec in aceto dulci & aqua permixta & diluta ac excolata, ieiuno tepida bibenda dato. Postquam uero purum exspuere coeperit, ari conchulam maiorem, & sesamum, & amygdalas purgatas, in aceto dulci aqua diluto bibenda praebeto. Si uero magis ducere uoles, ra dicis Capparis corticem his ammifceto.

Pleuritis.

Quum pleuritis apprehenderit, haec patitur. Dolor latus, & febris & horror tenet, & frequentem spiritum habet, & erectae ceruicis spiratio urget, & tussiendo rejicit subbiliosa, uelut à mali punici corio, si non ruptiones habuerit. Si uero habuerit, etiam sanguinem à ruptionibus. Est autem & sanguinea pleuritis, in qua subcruenta rejicit. Et est quidem biliosa, mitior, si non ruptiones aeger habeat: sin minus, dolorosior quidem est, sed non lethaliior. At sanguinea fortis, & dolorosa, & lethalis est. Quum igitur affuerit simul singultus, simulque cum salua sanguinis grumos nigros tussiendo reiecerit, septima die moritur. Si uero dies decem transgressus fuerit, à pleuritide quidem sanus fit, uerum uigesima suppuratur, & pus tussiendo rejicit, demum uero reuomit, et non adeo facili curatu est.

Pleuritides siccae.

Sunt & siccae pleuritides sine spuro. Verum haec difficiles sunt. Iudicationes autem similes alijs sunt, sed ampliore in potu humectatione opus habent quam aliae. Biliosae uero & sanguineae, nona & undecima die iudicant, atque hi magis sani fiunt. At si à principio quidem molles quidam tenuerint dolores, à quinta uero ac sexta die acuti, hi usque ad duodecimum perueniunt, & non ualde effugunt. Periculum autem maxime est, usque ad septimum. Immo etiam usque ad duodecimum. Post has uero sanantur. Quae uero ab initio molles sunt, à septima autem & octaua acutae, ad decimum quartum iudicant, & sani fiunt.

Pleuritis ex dorso.

Pleuritis ad dorsum intantum ab alijs differt, dorsum dolet uelut ex plaga, & suspirat, & acruarim respirat. statim autem spuit pauca, & corpus delassatur. Tertia aut quarta die sanie mingit subcruentam. Moritur aut maxime quinta die: sin minus, septima. Has si effugerit, uiuerit. Et morbus lenis est ac minus lethalis. Custodire tamen oportet usque ad decimum quartum. Postea uero sanus euadit. Caeterum quibusdam pleuriticis salua quidem pura est, mictio autem cruenta, uelut serosa à carnibus affatis sanies. dolores uero acuti per spinam ad petus, & ad inguen tendunt. Hic si septimum diem effugerit, sanus fit. At si aliter in his pleuritidibus contingat dorsum rubesceri, & humeros calefcere, & inter desidendum grauari, & uenter exturbetur egestionem cum uirore pallida, ac ualde graueolenti, hic propter uentris egestionem, uigesima prima die moritur. Has si effugerit, sanus fit. Quibus autem statim spura uaria sunt, & dolores ualde acuti, hi tertia die moriuntur. Hanc autem transgressi, sanescunt. Qui uero sanus non fit septima, aut nona, aut decima, hic suppurari incipit. Melius est autem suppuratum fieri, etiam si dolorosum fit. Minus enim lethale est. Porro supra omnia relata signa, in unaquaque pleuritide considerare oportet linguam. Si enim bulla subliuida fiat in lingua, uelut ferro in oleum tincto, si quidem

si quidem in principio fiat aspera, difficilior est morbi emotio, & necesse est sanguinem tussiendo rejicere, in diebus quibus id fieri oportet. Si uero factio morbi progressu fiat, iudicationes quidem contingent ad decimum quartum diem, Verum necesse est sanguinem spuere. Habet autem se res de liberatione ab hoc morbo, hoc modo. Si quidem tertia die inceperit maturari ac expui, citius liberabitur. Si uero posterius maturelcat, posterius iudicationes fiunt, quem admodum in capitis signis. Dolores porro in omni pleuritide, plerūq; magis interdiu q̄ noctu leuiores fiunt. Curare uero pleuritidas hoc modo oportet, ut plurimum uelut phrenitidem & peripneumoniam, præterquã quod hic balneis calidis & uino dulci utendum est. Si igitur prima aut secunda die postquam inuasit, ægrum accefferis, si sterus prodijt purum, aut leuiter biliosum & modicum, insulum ex Thapsia per clysterem inijcito. Si uero alius commota, noctu quidem egerat, postridie uero dolor & tormen uexet, rursus clysterem adhibeto. At si æger biliosus sit natura, & non purgatus correptus fuerit à morbo, priusquam saluam biliosam expuat, etiam medicamento bilem probe purgato. Si uero iam expuat biliosa, medicamentū ne dederis. Si enim dederis, spiritū sursum prodire non poterit, sed septima aut nona die suffocabitur, maxime si præcordia doleat. Quod si ad dolores in lateribus etiam præcordia dolent, clysterem adhibere oportet. & in potu ieiuno bibendam dare, Aristolochiam, hyssopum, cuminum, silphium, pepulum, mecona appellatum albū, florem aris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua uero sic se habent. Multa calida pro uiribus ægri lauato, capite excepto. & quū iudicationes sunt, dolentes locos humidis fomentis tepescito, & oleo illinito. Quum uero impetu fertur morbus, & ægrum & medicum à curationibus quiescere conuenit, ne quid mali inducatur. Dandus autem est ptisanæ succus coctus, aliquāto crassior spissitudine mellis. Post balnea etiam uinum dulce & aquosum bibendum est, non frigidum, modicum, ex angusti oris pocillo, & ubi tussis inuasit, amplius bibendum & quàm maxime exsiccandum, & potu humectandum, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius spiritum reddat, & tussis minus affligat. Sed & mali punici dulcis uirnosus succum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim sæpe dato, & noctu & interdiu, & somnum quàm maxime prohibeto, quo purgatio & citius & copiosior fiat. At uero sanguineam pleuritidem sic curare oportet. Post iudicationes cibis leuibus reficito, & quietem agat, & nimium caueat solem, uentos, repletiones, acida, falsa, pingua, fumum, flatu in aluo, laborem, uenerem. Si enim morbus recidiuarit, mors sequetur. In expuitionibus autem si dolor habeat, & expuere non possit, ieiuno aris florem dato, magnitudine oliuæ, & succi silphij dimidium eius, & trifolij feminis modicum, Hæc ex melle delingat. Aut piperis grana quinque, & succi silphij magnitudinem fabæ, mel, acetum, & aquam, ieiuno tepida bibenda præbeto. Hoc etiam dolores sedat. Quod si pro ratione spuere non possit, sed moretur spiritū hærens in ipso, & fertat in pectore, ari magni radices cõchulam maiorem, & oleum ac acetum mixta dato, & acetum aqua dilutum in super bibat. Aliud forte.

Florem aris magnitudine fabæ, & nitrum asatum dupla portione, & hyssopi quantum tribus digitis comprehendi potest, melli misceto, & aquam ac oleum

oleum modicum adstillato, & tepesfacta in conchula maiore infundito, ut ne suffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, si non purgetur. Si uero neque stertat, neque uelut oportet spuatur, capparis fructus quantum tribus digitis comprehendi potest, & piper, & nitrum modicum, & mel, & acetum, & aquam misceto, atque haec tepida forbenda praebeto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua seruesfacta forbeat. Hoc etiam stertentibus dato, & his qui purgari non possunt. At si fortius facere uoles, hyssopi & sinapis, et nasturtij cocham maiorem, melle & aqua terito, & seruesfacta ac excolata, tepida forbenda dato. Atque hoc modo hi morbi curati sanantur, si non quid sputi in pulmone relinquitur pus fiat, a quo arida tussis sequitur, & febris ac horror emergunt, & erecta ceruicis spiratio tenet, & frequentem & acuatam respirationem aeger habet, et uox paulo grauior fit, & color cum calore faciem occupat. Progressu uero temporis, morbus magis manifestus redditur. Hinc si intra decem dies susceperis, ubi uictu & balneo calido calefeceris, medicamentum quod pus ducat in pulmonem infundito, alijsque pus ducentibus utitor, atque sic uelut suppurato uictus ratione praescribas. Caput quoque resiccato, ut ne quid in fluat. Si uero ex eo quod in pulmonem infusum est, pus non educatur, rumpitur hoc ipsum ex pulmone in thoracem, & post ruptionem sanus esse uidetur, quoniam ex angustia ad amplam capacitatem pus peruenit, & spiritus quem respirando attrahimus in pulmone locum ac sedem habet. Verum progrediente tempore pectus pure impletur, & tussis, & febres, & alij dolores omnes magis ipsum premunt, & morbus inlarefcit. Hunc post eruptionem per quindecim dies sinere oportet, quo pus rursus maturefcit, Nam ex eo quod pus ad amplio rem locum deuenit, per frigeratum est, & id quod in thorace humidi erat ad seipsum attraxit, ita ut ipsum sit semiputresfactum. Si quidem igitur sua sponte expui incipiat in hoc tempore, bene est. Sin minus, medicamentis aut potionibus opem ferre oportet, in ultimis ex quindecim illis diebus, festinando ad corporis excitationem antea quam magis affligatur, ita ut caput purum custodias, influxionum gratia. Si uero non spuatur, sed sui significationem ad latera praebat, secato aut urito. At si neque spuatur, neque ad latera de se significationem praebat, ubi multa calida ieiunum laualti, & neque potu usum in firma sella locasti, alter ex humeris ipsum apprehendat, tu uero concute ipsum, aure ad latera admota, quo percipias ex utraque significationem sui praebat. Optandum autem esset ex sinistra. Nam dexteram urere aut secare lethalius est. Quanto enim robustiores sunt dexterae partes, tanto etiam fortiores morbi in ipsis fiunt. Quod si praecrausitudine, humor non stultet, neque strepitus sit in pectore, uerum spiritum frequentem trahat, & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant haec, sed thoracem pure plenum esse probe noris. Proinde in terra eretriade liquida, & ualde trita ac tepida, linteum tenue tingito, eoque thoracem circum circa integito, & qua parte primum resiccatum fuerit, ea secato aut urito, quae proxime ad septum transuersum, cauendo tamen ne hoc ipsum laedas. Si uero uoles, ipsam terram eretriadem illinito, & similiter uelut in linteo considerato. Multi simul illinunt, ne quae primum illinuntur resiccetur. Post sectionem aut uisionem, linamento ex lino crudo utere, & paulatim pus emitte. Caeterum ubi secare uel urere uoles, corpori in eadem figura, in qua inter secandum aut urendum futurum est, notam imprimito, ut ne cutis te decipiat, si in

fi in figuræ tranſmutatione ſurſum aut deorſum magis cedat. Sed & tuſſes uiſtare oportet ex uictu, ut ne rurfus pus reuellant ad pulmonē. Malum enim hoc eſt: quare permittendum eſt ut ad ſectiōnē q̄ citiſſime reſiccetur. Poſtquā uero duodecima affuerit dies, reliquū pus totū emittito, & ex linteo linamentū indiſto, & bis in die pus emittito, & uentrē ſupernum ex uictu q̄ maxime reſiccato. Atq̄ hoc modo oportet etiā ſuppurationes ex uulneribus, & ex peripneumonia: & ex magnis deſtillationibus, & pulmone ad lateres prolapſo, conſiderare ac curare.

Frigeſactoriæ potiones in febre ardenti.

Frigeſactorias potiones in febris ardentibus quādo uoles bibendas daſto. Sunt autē multarum operationum. aliæ enim miſtionem inducunt, aliæ alui egeſtionem, aliæ utrūq̄ præſtant, aliæ neutrum, aliæ ſolum frigeſciant, uel ſi quis in uas aquæ feruentis frigidā aquam infundat, aut ipſum uas ad frigidum uentū exponat. Dabit itaq̄ alias alijs. Neq̄ enim dulces omnibus conducunt, neq̄ acerbæ, neq̄ eadē omnes bibere poſſunt. **i.** Fauorum ſiccōrū herminarum duarum menſuram aqua macerato, & conterens guſtato donec ſubdulcis aqua fiat, deinde excolato, & iniectis aprijs bibendam dato. **ii.** Seminis lini acetabulū, aquæ heminis decem aſſulis, in noua olla prunis impoſita coquito ac feruere ſinito ut tranſpirent, donec fucus ad tactum pinguis fiat.

iii. Aquam muſſam aquoſam ad dimidias coquito, deinde apio iniecto frigidam paulatim exhibeto. **iiii.** Ordeum Achilleum magnū ac plenū hemina menſura ſiccato, & acutis ſpicis ablatiſ, ubi probe laueris, aquæ congio aſſuſo coquito ad dimidias, frigeſcico ac bibedum dato. **v.** Cumini Aethiopici hemina decimæ parti, tres aquæ ſemicōgios affunde, & olla luto piſoſo oblita, donec tertia pars reſtet feruere ſine, & frigidā hanc ad omnem ardentē aliamq̄ febrem exhibe. **vi.** Aquam cœleſtem ipſam per ſeipſam præbe. **vii.** Prilina hemina congio aquæ aſſuſo, ad dimidias coquito, deinde excolato, & aprijs iniectis frigidam dato. **viii.** Proſunt & uina alba aquoſa ex uuis paſſis.

ix. Proſunt & uuarū paſſarum expreſſarum retrimēta aquoſa. **x.** Uuarum paſſarum albarum exemptis uinacis heminam, radicū quinquefolij maſnipulum, tundito, & aſſuſis aquæ heminis uiginti, ad dimidias coquito, & frigidam hanc paulatim bibedam dato. **xi.** Ad farina ordei pleni craſſæ chonicem dimidiam, aquæ congii aſſundas, & quum iam intumeſcunt craſſæ farinae partes, manibus teras, donec aqua alba fiat, et adiāt pugillo iniecto, ſub dio per noctem exponito, ac exhibeto. **xii.** Ouorum trium aut quatuor candidum, in aquæ congio concuſſum bibat. Hoc ualde frigeſcico, & ægrum ad aluū exonerandam conturbat. **xiii.** Ordei torrefactū probe loti chonicem dimidiam, in aquæ congio bis aut ter feruere ſinito, & frigidam hanc exhibeto.

xiiii. Piſanæ ſuccum coctum tenuem, & uinum dulce dato. Hoc urinam ducit. **xv.** Cucumeris peponis corio nudati pollinē ex aqua præbeto. Hæc potio urinam ciet, frigeſcico, & ſitim ſedat. **xvi.** Eruum in aqua præcoquito, deinde ollam nouā, in maiorē ollam aqua plenam ponito, & alia aqua eruo aſſuſa, ad modicū tempus coquito. poſtea ubi coctū fuerit eruum, tertiā aquæ partem reliquā excolatam bibendam dato, ita ut ad ſingulos cyathos, & cucumeris, & erui pollinem inſpergas. Hoc cōſtanter ſitim ſedat. **xvii.** Vinum Thaliū uetus parte una, cū uiginti quinq̄ aquæ partib. dato. **xviii.** Triſoliū, cucu

cucumeris pollinem, & crassam ordci farinam in aqua macerato, & hanc bibendam dato. **xxix.** Aprij manipulos tres, pulegij pugillos duos, in acci heminis decem ad tertias coquito. Hoc melle & aqua diluti, aquosum bibat, adianti pugillo iniecto. Hoc urinam ducit, & aluum soluit. **xxx.** Mala odorata dulcia contundito, & aqua macerato, & aquam bibendam dato. **xxxi.** Mala cydonea eodem modo, si aluus soluta fuerit in febre ardente. **xxxii.** Quod si morbus regius insuper corpiat, uuae passæ albæ exemptis uinaceis, & cicerum alborum, utrorumq; dimidiam heminā, & ordeï Achillei magni ac pleni tantundem, & cnicï tantundem, aquæ heminas decem, & apium, & mētā, & coriandrum, de singulis parum, terito donec placide aqua dulcescat, & adianti pugillo postea iniecto, ubi sub dio per noctem exposuisti exhibeto. Potes etiam alia his similia imitari. Omnia uero per noctem sub dio exposita dabis febricitanti, exceptis his quibus alui plus quæm conuenit fluunt. **xxxiii.** Pulegij pugillos tres, aprij dupli, in uino diluto coquito ac exhibeto; hoc urinam ciet, & bilem per aluum trahit.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS, LIBER IIII. IANO CORNARIO

Medico Phisico interprete.



Ad hominis generationē de omnibus & uiri & mulieris partibus semen progressum, & in uterum muliebrē illapsū condensatur, temporeq; ueniente natura hominis formam referens ex ipso producit. Habet autem & mulier, & uir, quatuor species humoris in corpore, à quibus morbi fiunt, qui non à uolentia aliqua fiunt. Sunt autem species hæ, Pituita, Sanguis, Bilis, & Hydrops siue aqua: & de his nō minima, neq; debilissima, in semen procedit portio. Et quia animal secundum parentes nascitur, tot humorum species, & sanorum & morbosorum in seipso habet. Ostendam autem quæ in unaquaq; harum specierū & plura & pauciora in corpore fiunt, & à quo ægrotant. Et quæ morbi in imparibus diebus iudicantur. Et quæ sint morborum principia. Et qualia singula ex ipsis in corpore efficiant, ut morbum inducāt, & à quo rigor febrilis fiat, & cur post ipsum febris irruit. Primum autē demonstrare uolo, quomodo bilis, & sanguis, & hydrops, & pituita, copiosiora & pauciora fiant à cibis & potibus, hoc modo. Vētriculus dum plenus est, omnium horum corpori fons est. Verū ubi uacuus est, corpore frui tur colliquefcente. Sunt autē & alij fontes quatuor, à quibus unusquisq; horum humorum in corpus procedit, postquā sanē ipsi à uentriculo acceperunt: & hi quoq; fontes ubi euacuantur, de corpore fruuntur. Sed & ipsum corpus attrahit, ubi uentriculus in seipso quid habuerit. Et sanē sanguini fons est cor, pituitæ caput, Aquæ splen, Bili locus folliculi in hepate. hi sunt quatuor humoribus his fontes, uentriculo excepto. Ex his autē maxime caui sunt, Caput & Splen, Nam in hoc ipso maxima amplitudo est. Verū de hoc paulo postea clarius dicam. Quin & hæc sic se habent. In omnibus cibis ac potibus et biliōsi quid est, & aquosi, & sanguinei, & pituitosi: in alio plus, in alio minus. Quapropter & quæ eduntur ac bibuntur, alia alijs præstant ad sanitatē. Atq; hæc mihi de hoc dicta

dicta sunt. Postquam uero comedit aut bibit homo, corpus in seipsum humorum relatum ex uentriculo, & fontes trahunt per uenas de uentriculo, similis humor similem, & corpori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis humor similem trahit de terra. Habet enim eodem modo terra omnigenas in se ipsa ac innumeras facultates. Quaecumque enim in ipsa nascuntur, his omnibus exhibet humorẽ similem unicuique, qualem & hoc ipsum quod nascitur sibi similem, iuxta cognationem habet. & trahit unũ quodque de terra alimentũ, quale etiam ipsum existit. Nam & rosa de terra trahit talem humorẽ, qualis ipsa in potentia est: & allium de terra humorem eiusmodi trahit, quale ipsum in potentia est. Et alia omnia terræ nascentia, ex terra trahunt, singula iuxta se ipsa. Si enim hæc res non ita se haberet, non nascerentur plantæ similes feminibus. Cui porro plantæ in terra cognatus humor multo uberior est quæ conuenit, ea planta ægrotat. Cui uero paucior quæ opportunum est, ea resiccatur. At si ab initio nõ in fit terræ humor, quem planta iuxta cognationem trahat, ne germinare quidem poterit. Intelligentiã autem huius rei, quæ si non habeat planta humorem secundum naturam, ne ab initio quidem germinet, inde nobis suppeditatur. Ioniam enim regio & Peloponnesus pro temporibus anni a sole non minime calet ac illustratur, ut sol nascentibus est terra sufficere possit, attamen fieri non potest, multis frustra iam id tentatibus, ut in Ioniam aut Peloponneso Silphium nascatur. At in Libya sua sponte nascitur. Non enim est neque in Ioniam, neque in Peloponneso, eiusmodi humor qui ipsum alere possit. Quum autem sint & alia multæ medicinæ, quas sole sufficiente, regiones alere non possunt, alia uero sua sponte producant, hoc ipsum eius quod nunc dicitur sum considerandi occasionẽ exhibet, quantum uidelicet locus alteri loco etiam ualde uicinus præster ad iucundi uini productionem, sole æqualiter sufficere. Hic etenim in terra humor est, qui uinum suaue exhibere potest, illic non est. Sũt etiam syluestria non pauca in loco nascentia, quæ ad orgyæ seu cubitorũ quatuor spatium translata: nasci minime comperias. Non enim habet terra talem humorem translato, qualem illa syluestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quædam uenenosiores, alia humidiores, alia dulciores, alia sicciores, alia asperiores, & innumera alia aliter se habent. Innumera enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter hæc generum primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum, Et mihi sanè uidetur hæc omnes plantæ syluestres fuisse, Verum homines ipsas mansuefecerunt, fructum ferre efficientes unamquæque iuxta suum semen. Trahit enim similis humor similem ex terra, & ex hoc augetur ac nutritur. & nihil ex terræ nascentibus alteri simile est, quod non æquale, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia quæ nascuntur in cibi ac potus usum uenturitia, multas facultates de terra ad se trahunt, & in omnibus est aliquid pituitosi ac sanguinei. Et ex hoc adeo ad hanc demonstrationis necessitatẽ deueni, quod a cibis ac potibus in uentriculum procedentibus trahit corpus, secundum fontes quos nominaui, similis humor similem per uenas. Referam quoque aliud argumentum, quod singula prout relatum est trahant, & simul dicam, unde pituita in corpore gignatur. Vbi quis caseum comedit, aut aliquid acre, aut aliud quid edit aut bibit, quod pituitosum est, statim ipsi ad os ac nares accurrat, atque hoccia fieri partim omnes uidemus, partim ita esse credere oportet, ex his quæ

ego referam. Añtero itaq; quod quantũ in cibo aut potu pituitæ inest, illud ubi ad uentriculũ peruenit, partim corpus ad seipsum trahit, partim caput, ut quod cauum sit, & uelut cucurbita corpori in cumbat, ad se trahit, utpote uiscola existente pituita, ita ut hanc alia per aliam sequatur ad caput: & quæ quidem recēs ex cibo generatur pituita, in capite manet. Verus autem, prout copiosior est recens, ab ipsa uiolente extruditur. Quapropter ubi quis edit aut bibit aliquid pituitosi, excreat pituitam. Habet autē et hæc res se hoc modo. Si ubi edit aut bibit quid pituitosi homo, non rursus exeat quod redundat, neq; per os, neq; per nares, necesse est ipsum manere in capite, aut ad corpus descendere de capite, & ad uentriculum peruenire. Ac optimum quidem fuerit, si ad uentriculum perueniat. Exire enim poterit unā cum stercore, et si quidem multũ fuerit ac humidũ, sterqus humectare poterit. Si uero modicũ, non hoc effecerit. At si in capite maneat, multum dolorem capiti exhibuerit, quũ in uenis est. Si uero modicũ, nõ hoc fecerit. Significationem autem de se præbet copiosum ne sit an modicum. Quod si ad corpus deueniat, atq; illic alio humori ammixtũ fuerit, si quidē multa fuerit pituita, statim corpus læserit: si uero pauca, nõ adeo ledere poterit, quũ magnũ sit corpus, si non & aliud quoddam principium ipsi reliquũ sit. Verum temporis progressu, si alia pituita superaccedat, lædi utiq; possit. At si corpus uetice ac uentriculo deleet, atq; hæc foras perferat, nihil mali ex ipsa habuerit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomodo caput pituitā ex uentriculo trahat, & simile ad simile perueniat, & simul à me dictum est, quomodo & quare copiosior pituita homini à cibus ac potibus fiat. Nunc uero dicam de bile, quomodo & cur copiosior in corpore fiat, & quomodo locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quodq; aliàs biliosum ac leue est, copiosior etiam bilis fit in hepate, & statim dolet hepar, quod pueri cor uocant, atq; hoc ita fieri uidemus, et clarũ nobis est q; à cibo aut potu factũ est. Trahit etenim corpus in seipsum de cibus omnem prædictum humorē. Trahit etiam folliculus in hepate, quicquid isthic biliosi inest. Et si derepēte multa bilis fiat, homo hepar dolet, et de uentre copiosior fit. Hoc enim cōtingente, procedit de ueteri bile propter multitudinem ad uentriculum, & ex hoc tormen uentriculo oboritur, et pars ipsius per uesicam, pars per aluũ egreditur, atq; sic minima pars in homine manet, & dolores cessant. Si uero neutrum horum contingat, procedit primum de ueteri bile ad corpus, distribuitur enim ad ipsum: & si multa fuerit, statim significationē sui præbet aliq; humori ammixta. Si uero modica, non adeo læserit, quum magnum sit corpus, si nõ & aliud quoddam principiu suboriatur. Verũ temporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominem utiq; læserit. Si uero non superaccedat, excolare illam poterit corpus, ut & bilis, & quæcũq; biliosa sunt prodeant. Nam quæ in cibo ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sanè etiam alia quæcũq; lædentia sunt medicamenta, ubi aliud ab alio in uentriculum incidit, sua ipsius potestate causam habens, id quod superatũ est expellit, ac ipsum lædit. At si superaccedat alia bilis in corpore, ab his quæ in uentriculum in cident, morbus huic oboritur. Atq; in hoc sermone iam ego declarauit, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore, à cibus & potibus: & q; trahit in seipsum folliculus in hepar, iuxta similitudinem id quod biliosum est à cibus

à cibis ac potibus. Nunc uero dicam de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat in corpore, & quomodo splen trahat in seipsum. Affero autem ubi homo bibit amplius, & corpus, & splenem, aquam in seipsa trahere ex uentriculo. Et si plus traxerint quam oportet, statim hominem affligi. atque hoc ita fieri intelligunt quicunque homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, optimum est, si uetus aqua quae in splene inerat, ad uescicam aut uentriculum excoletur, & per haec expellatur. Nam per supernas regiones non purgatur aqua de splene, nisi quantum eius in uasis inest, quae de liene procedunt; uerum ad uentriculum & uescicam depurgatio fieri potest. Si uero haec ad fluxionem apta non fuerint, neque aqua per ea foras excoletur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atque isthuc alij humori miscetur. Et si quidem pauca fuerit, non sanè læserit. sed de corpore ad uescicam, & ad uentriculum, per uenas excolari poterit. Sunt enim multae ex hoc tendentes deorsum, quae ex infernis partibus ad seipsas trahunt, ubi sicciore fuerint quam prius erant. At si alia aqua generetur, & uentriculus ac uescica foras non expellant, splen eleuatur, & infernae corporis partes dolore afficiuntur. Atque haec à me dicta sunt, quomodo & cur aqua copiosior generetur in corpore à potu; & quomodo splen trahit. Nunc autem de sanguine dicam, quomodo & cur amplior in corpore generetur. Postquam bibit aut comedit homo aliquid quod sanguineum est, trahit quidem et totum corpus in seipsum, trahit autem & cor sanguineum ad seipsum. Et ubi plus attraxit, non oboritur cordi dolor. Est enim corres solida ac densa, & propterea dolore non affigitur. Et ex ipso procedunt uenae crassae iugulares appellatae, ad quas statim si copiosius accedat, sanguineum illud distribuitur, & illae impletae breui ad caput & corpus delegant. Et quum ediderit aut biberit homo quid sanguinei, statim uenae iugulares attolluntur, & facies rubet. Accedente uero ad cor & corpus sanguine quam satis est uberiore, à cibis ac potibus, & ad alium humorem ammixto, si non ab ipso egressus fuerit, per alium aut uescicam, reliquo humori ammixtus, dolorem corpori inducit. Si uero modicus accedat, non sanè læserit corpus. Verum temporis progressu distribuitur ab ipso ad uentriculum, aut ad nares, quae ipsum foras excolant, & nulla laesio contingit. Si uero paulatim copiosior fiat, morbosus efficitur. Atque ita quomodo copiosior sanguis generetur, à me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis, Bilis, Pituita, & Aqua, omnia haec à me demonstrata sunt, & quomodo, & cur copiosiora fiant, à cibis ac potibus. Quod autem ex his fiant ac generentur, hoc arguemento constat. Si homo parum edit, & parum bibit, nullum morbum hoc ipsi inducit. Et haec quidem de hoc mihi dicta sunt. Attigi etiam obiter ostendere intelligenti, quomodo haec pauciora fiant. Verum de hoc paulo post melius tractabo. Cæterum fontes hi quatuor quos nominavi, quum pleni fuerint, semper corpori distribuunt; quum uero uacui, uice uersa trahunt ab ipso. Sic etiam uentriculus facit. Et habet se res hoc modo, ueluti si quis tria aut plura aenea uasa in planissimo loco componat, & coaptata quam optime disponat, fistulis ad foramina insertis, atque ita placide in unum uas aquam infundat, donec omnia ab aqua fuerint expleta. Ab uno enim diffluet in reliqua uasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquam autem plena facta fuerint uasa, si quis de uno aquam effundat, retribuet se retro fluens aqua ad unum uas, & uacua fient reliqua uasa

rursus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sanè & in corpore res se habet. Postquam enim cibi ac potus in uentriculum inciderint, fruitur corpus de uenire, & unà cum fontibus impletur. Vbi uero alius uacuatur, rursus retro humor ab ipse redditur, quemadmodum susceperat, ueluti ex alijs ad unum uasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes, aliæ tenuiores, aliæ crassiores, multæ ac frequentes. Hæc autem donec uiuit homo apertæ sunt, & suscipiunt & dimittunt nouum humorè. Vbi uero mortuus fuerit, clauduntur & extenuantur. Quandiu igitur uiuit homo, fruitur corpus de uentriculo, ubi quid in seipso habuerit: fruuntur etiam fontes, & impleti corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de uentriculi humore, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuere, non sanè haberet corpus sufficiens alimētum, sed paucius. Non enim amplius haberent alimentum fontes, quod corpori subministrarent. At uero si fontes isti nō essent, dum edimus ac bibimus, uere nō cognosceremus, neq; quid iucundum, neq; quid iniucundum esset, propter hanc quam referam necessitatem. Hi loci quum minores sint, & intra reliquum corpus, semper etiam antea quàm attrahat unusquisq; iuxta suam facultatē, reliquo corpori denūciat de cibis ac potibus, qui biliōsus sit, & qui pituitosus, & qui sanguineus, & qui aquosus. Quicquid enim horum humorum plus q̄ opportunum est, in cibis ac potibus nobis obuenerit, neq; cibos illos iucundos facit. Quæ uero maxime appetimus, pro eorum ratione etiam illi iucundi sunt. Si uero cibis ac potibus opus habuerit fons quidam, pro hac ratione etiam corpus trahet ab ipsis fontibus, donec humor paucior q̄ oportet fiat, & tunc sanè appetit homo aut edere, aut bibere tale quid, quod portionem illam expleat, ac reliquis adæquet. Et propterea ubi multum cibi sumpsimus aut bibimus, quādoq; adhuc cibum aut potum appetimus, & nihil aliud libenter edimus, quàm quod appetimus. Postquam autem comedimus, & adæquatus fuerit humor, his perfectis & in fontibus, & in corpore, tunc cessat appetētia. Atq; hæc de hoc à me dicta sunt. Quin & hoc se ita habet, quod ad folliculum in hepate, sola bilis à cibis ac potibus fecernitur. Venulæ enim quæ debiles & tenues sunt, alium humorem trahere non possunt, qui grauior & crassior existit, & simul non est ea loci capacitas, ut alius humor in hoc folliculo consistat: & est hic locus maxime familiaris bili secundum naturam, & ob id in ipso nullus alius fit morbus, quàm is quem homines Cardiogmum, hoc est cordis morbum uocant. At Caput, & Cor, & Splen, de omnibus humoribus participant. Vnumquodq; tamen si non ægrotet, plurimum de relictis participat, iuxta suam ipsius naturam, caput pituita, cor sanguine, splen aqua. Trahunt autem & de alio humore uenæ in seiphas, amplæ & crassæ, & instar pampini retortæ existentes, ita ut ubi trahant, alius humor alium sequatur. Et cordi quidem propinquant uenæ iugulares crassæ; ad quas cito distribuitur, ubi illi amplior quàm commodus est humor accedat. Hæc uero ad reliquum corpus delegant: & simul ipsum cor solidum est ac densum, ut ab humore nō ægrotet, & propterea nullus morbus in corde oboritur. Caput autem & splen maxime sunt morbis obnoxia. Aegrotant enim & ab his quæ à natura insunt, quum plura quàm opportunum est accesserint. Aegrotant item ab alijs humoribus. Venæ enim in ipsis crassæ ac multæ sunt, & ipsa quoq; uenosa sunt ac caua, ut & alijs humoribus recipiendis capacitas in ipsis sit, pau-

fatim nimirum accedētibus, & ad eum humorē qui à natura inest, se ammiscen-
 ribus. Quemadmodū in uase magno amplior capacitas est quàm in paruo. Sic
 sanē et in capite, aut in splene, res se habet. Magna enim capacitas maxime in ip-
 sis est. Si uero repletæ fuerint isthic humore uenæ, ab ipso sanē in illis morbus
 oboritur. Atq; hæc mihi de hoc nunc dicta sunt. Volo autē melius declarare,
 quomodo unusquisq; horum humorū in corpore paucior fiat. Quatuor equi-
 dem humores esse demōstrari hominem lædentes. Quatuor item ipsorū fontē-
 res. Quatuor quoq; esse dico locos, per quos homo de singulis his expurgatur.
 Sunt autē hi, os, nares, podex, urinæ meatus. Et ubi humor aliquis affligens co-
 piosior factus fuerit, si his locis homo depurgetur; nullus ipsum morbus ab il-
 lo premit. Et si uentriculus plenus fuerit, liquefctē corpore ab humore, defluit
 ad ipsum, & extra prodit per aliquem horum locorū, & propterea humor pau-
 cior fit in corpore. Corpus enim uelut & antea dixi, uentriculo retribuit, ubi ua-
 cuus fuerit; & fruitur de ipso, ubi plenus existit. Atq; hæc à me dicta sunt, quo-
 modo & cur pauciores fiant humores hominem affligētes. Quomodo uero &
 cur homo sanus degat, referam. Postquam comedit ac bibit, & humor ad cor-
 pus peruenit, eo quo dictum est modo, ammixtus alij, tum ei qui in corpore,
 tum ei qui in fonte est, ea quidem die qua accesserit, in corpore manet. post tri-
 die uero alius humor ad ipsum accedit. Atque hi quidem duo sunt dies, duo
 uero in corpore humores. Et alteri quidem humori duo dies sunt, alteri unus.
 Et qui quidem postridie accessit, manet in corpore, ut qui fit crassus. Alter au-
 tem coctus à caliditate diffunditur, & tenuis fiens, postera die ad uentriculum
 accedit, & per omne tempus à recenti expellitur. Vbi uero ad uentriculū perue-
 nit, cibos in hoc loco coquit, & de se sanguinē in corpore facit. Si uero perman-
 ferit, tempore graueolens fit. Tertia uero die unā cum stercore, & urina exit, co-
 pia ipse sibi ipsi æqualis, & consimilis, & æquilibris, etiam si sup̄plus pars que-
 dam sit, quo humor maneat in corpore iuxta relatam rationem. Influit autē &
 tertia die humor de corpore ad uentriculum amplior & graueolentior, qui uides
 licet reliquus fuit à secundo, & desert cibos cōcoctos, & quicquid est in corpo-
 re morbosum, & rursus simul exit. Indicio est autem urina quæ saluginosa est,
 quod cibi deserunt de corpore etiam id quod morbosum est. Et cibi quidē sem-
 per postridie per aluum secedunt, humor autē ad tertiam diem. Hoc modo sani-
 tas cōtingere solet. Atq; hæc dicta sunt, quomodo, & cur homines sani degūt.
 At uero humor hic si particulatim foras prodiret postridie, cibi nō similiter ex
 uentriculo graueolentes facti foras prodirent, sed ueluti cocti: & urina potui si-
 milis, & corpus semper euacuaretur, & per omne tempus homo, ubi uentrem
 exonerasset ac minxisset, opus haberet statim potu ac cibo, pro egestionis fa-
 ctæ copia, si modo ualidus esse deberet, quum humor sufficiens in corpore nō
 relinquatur, sed unā cum stercore foras prodeat postridie, aut eadem die. Et si
 quidem comedisset, bene esset. Sin minus, & euacuatus debilis esset, neq; hu-
 mor crassus fieri posset, ut postridie foras prodiret. Non enim sufficiens in cor-
 pore relinquatur. Nunc uero aluum exonerantes probe ualemus, & si per bidu-
 um nihil cibi acceperimus, & uiuere, & facere quid possumus, & non penitus
 debilitamur ex euacuatione in hoc tempore. Humor enim in corpore manens,
 robur exhibet. Atq; hæc à me dicta sunt, quomodo & cur fieri nō possit, ut

Exa. Antonianus
De morbis

humor qui corpori accessit, foras egrediatur eadem die, immo neq̄ posttridie. Id porro assero, si humor pluribus quàm tribus diebus in corpore permaneat, aut alius multus implens accedat, uenis calefcntibus ac stantibus, maius malum, aut minus, homini significationem de se præbere: hyeme quidem minus, & postterius: æstate uero maius, ac prius. Atq̄ hæc à me dicta sunt, de eo quod fieri solet, si humor in corpore maneat. At uero si corpus cibos eadem die egererit, non sufficenter humore uti posset, sed essent homines tenues ac debiles. Nunc uero quæ maneat cibi ac potus, quamdiu permanent, corpus fruitur sensim de uentriculo trahens, & impletur. Hæc dixi & quomodo, & cur cibi non possint eadem die exire. Si uero cibi maneat in uentriculo, ampliore tempore quàm opportunum est, & alij ad ipsos incidant, corpus utiq̄ repletur: & dum premuntur à plenitudine uenæ, calor ac dolor corpori accesserint, æstate quidem citius, hyeme uero postterius. Æstate enim calidus est aer ambiens, & calidior corpus in seipsum trahit. Et si calido adhuc existente uentriculo, calidior quàm opportunus est spiritus homini accedat, nihil miri est hominem ex tali febrile, hyeme uero quum frigidum spiritum trahat in seipsum, multo magis poterit corpus repletionem ferre, homine modice uentrem exonerante. Et hæc à me dicta sunt de eo quod fieri solet, si cibi ampliore tempore in uentriculo maneat. Et attigi quoq̄ obiter ut declararem omnem humoris ac cibi, & longioris & breuioris temporis differētiā, cur homines agrotent. Verum de hoc melius tractabo temporis progressu. Reuertor rursus retro de sanitate dicturus, quod sanè corpus hominis humore de cibus ac potibus fruitur, & prodeit foras in sano, tum cibi, tum humor, iuxta relatam rationem. Et si quidē foras prodeat plus humoris, quàm de cibus ac potibus accessit, homo attenuatur. Prodit autem foris plus quàm accessit ob hanc causam. Si in quiete degat homo, & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verum præsertim sanitate quæ multa est, non lædit ualde. Malum uero illud huiusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus, aduenerit copiosius, non ita multo, corpus calefcit sensim, ut non ualde lædatur: & liquefcit in uentriculo, & cibum homini iniucundum facit. Si uero humor alius alio copiosior fuerit, febris ex hoc homini oboritur. Verum de hoc exactius paulo post tradam. Quandoq̄ etiam ubi cibus iucundus est, homo attenuatur. Causa uero eadem est. His autem sentibus, plus humoris extra prodit, quàm succenturitur. Et propterea in quiete degenti contingit ut attenuetur. At uero laborantibus hominibus itidem corpus coalescit. Et hoc à labore calefcnte, tum humor in ipso diffunditur, tum attenuationis morbus oboritur. Quum autem inutilis fiat humor, & ad uentriculum, & ad uesicā defluit, hæc autem foras expellunt. Pars uero ipsius extra exhalat, per internam corporis raritatem. Pars autem quæ adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem modo & exercitationes iuuenum idem efficiunt quod labor. Si uero etiam non paucior fuerit humor eo qui prius exiuit, accedatq̄ insuper alius à cibus ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem accedit, si non aliud quid credere poterit, & si neq̄ laboret pro prioris laboris aut exercitationis ratione, alij alij pauciores sunt. Cæterum bonus corporis habitus accedit ex usu, hæc de causâ. Postquam reficatus est tempore humor, & in priore labore prius egressus

egressus est alius alio copiosior, & unus alius alios ualde superauit, homo repletus fit. Et si quidem à multis ualde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si uero à paucis, parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufferre ac reualefcere potest, humiditate enim uberiore in ipso existente, calorē exoluit. Calefcit enim corpus à febre, & si quidem modicū fuerit id quod affligit, tertia die eodē modo dimittit, per duas autem continue tenet: Si uero copiosius, quinta die per quatuor uero tenet pro ratione. Atque hoc modo morbi per dies iudicantur. At si dimiserit febris in imparib. diebus, et sanus homo fit, et moritur. Quae de causa, paulo post dicam. Nunc autem referam cur febris dimittat. Sic autem sentio. Quaecumq; febris de corpore hominem corripuerit, necesse est tertia die humorem affligentem exire de corpore, aut in alio quopiam impari die, iuxta rationem antea relatam. Non enim exit prius q̄ alius bonus de uentriculo ipsi accedat. Nam intermedia & postera die corpus trahit de uentriculo, quicquid ipsi in seipso dimiserit priore die, nisi uentriculus id expulerit, & alium humorem habuerit, quod sanè malum homini esset. Si uero dimiserit febris tertia die, eodem modo dimittit quo etiam eadem die, uelut dictum est. Atq; ita quidem contingit, ut febris de corpore fiens, tertia die remittat. Dico autem, etiam si quinta die, aut septima, aut nona dimittat, eodem modo dimittere, quemadmodum & tertia exiuit. Etenim alimētum febrī contingit, secundū locos quos paulo antea dixi. Vbi enim humor copiosior praeualuerit, homo liberatur à febre. Dimittit autem febris in diebus imparibus ea de causa. Quod uidelicet in paribus diebus trahit corpus de uentriculo: in imparibus uero dimittit, uentriculus autem extra propellit in homine sano, iuxta huiusmodi necessitatem morbi in imparibus diebus iudicatur. Atq; hac quidem ratione homo febricitas sanus euadit. Affero autem & quod doleant maxime homines aegroti in imparibus diebus, propter hoc & secundū rationem fieri. Conturbatur equidem homo quum febricitat. Cuius rei signum est, quod horror alius atq; alius per corpus transcurrit. Hoc uero non sanè ita contingeret, si non conturbaretur humor, & de ipso aut plus, aut minus secerneretur, & alius alius superaret. Conturbatur autem maxime in imparibus diebus quū aegrotat. Sed & horror maxime tunc fit. Habet enim se res hoc modo. De humore affligente expellitur aliquid ex corpore, à recentissimo humore superatum, & procedit ad aluum infernā, & aluus ipsa unā cum affligente calefcit, suscipiens in seipsam magis quam priore tempore. Hoc autem maxime fit in morbi iudicatione. Et si paulatim corpus ad aluum dimiserit, & non multum fuerit id quod hominem affligit, & aluus, & corpus, calorē sufferre in iudicatione potest, & homo sanus euadit, ubi humor affligens egressus fuerit, & is qui febrī alimentū praebeuit consumptus, & sanus praeualuerit. Atq; hac ratione propter relatas à me causas, homo aegrotus sanus euasit. Nunc uero referam cur moriantur homines in imparibus diebus. Sic autem sentio. Si multum fuerit id quod affligit in corpore, magis q̄ opportunum est, & acuatim robustū, turbatur ad uentriculum, & quum non possit calorem sufferre corpus, eo fruitur, et graueolentiā circa spiritum fieri necesse est, et quū nequeat corpus praedebilitate, nimirum omni humore morbofo existente, spiritum trahere, quo ea quae in uentriculo sunt refrigerentur, quicquid est humoris uitalis id foras exhalat, atq; ita homo moritur. Non enim superat alius humor,

sed totus à morboſo qui multus eſt eleuatus, ac cōſumptus à febrī exhauit ac perſpirauit. Atq; hoc modo in imparibus diebus maxime dolor affligit. Neq; eſt quiſquā cui hoc nō ſit notum. At uero q̄ humor turbetur in iſdem diebus, hoc ſignū eſt. Quicūq; iam à febre continua correpti, pharmaco uſi ſunt in diebus paribus, hi nimum purgati nūquam ſunt. Qui uero in diebus imparibus medicamento forti uſi ſunt, nimiū purgati ſunt. Multi uero etiam perierunt nimum purgati. Proinde priores Medici in hoc maxime peccarūt. Medicamēta enim exhibuerūt in diebus imparibus, & homines peremerunt, nō ſcientes q̄ hæc res ſe ita habet. Humor enim in corpore ægroti magis turbatur in imparibus diebus, nimirū corpore humorem ad uētriculum tranſmittēte. Et ſi quis iam turbatum, adhuc magis perturbet medicamento immiſſo, nihil miri eſt ex talibus hominē perire. Quin et ulcera ſi curentur, maxime in his diebus inflammātur. Venit enim humor ad omnes uenas quū turbatur, eaſq; replet. Et ubi ad ulcuſ peruenit, ſi quidem non curetur, & pus exitū habeat, expellitur ab humore qui in turbatione acceſſit, & ulcuſ foras expurgatur. Si uero curetur, pus exitum non habens, & iſthic unā cum eo qui acceſſit permanēs, dolorem inducit, & carnem circa ulcuſ attollit: & ex illo ſi quidē in cruribus habuerit ulcuſ, attolluntur uenæ quæ in iuncturis crurum exiſtūt. Si uero in manibus, quæ in manuū iuncturis ſunt, & ex hoc glandularum tumores ſiunt. Quibuſcunq; uero hominibus febris incidit, ſi nihil aliud male habeat homo, à pinguiore q̄ oportet exiſtente humore incidit. & uenæ impletæ dolorem ac calorem ulcuſi inducunt. Hoc autem calefactū, etiam reliquū corpus calefacit. Atq; hoc modo caliditas ad ulcera peruenit. Caleſcit enim corpus, & ulcera, ab humoris cōmotione. Et labor talia efficit. Liberātur autem ulcera ab inflāmatione quinta die, & iuxta horum dierum rationem, prout etiam ulcera fuerint magna, & tertia, & quinta, & ſeptima, & nona, & undecima. Deinde abſoluto primo circuitu, rurſus ſecundi principium tertia ſequens hinc eſt, quæ à prima, decimaquarta eſt. Maxima uero ulcera decimaquarta die ab inflāmatione liberantur. Atq; hæc ratio docet morboſos in imparibus diebus iudicari, & humorem in ſano homine tertia die exire, ſtercuſ autem ſecunda. Et hæc tertia die contingentiæ mutuum inter ſe teſtimonium præbent, quòd res ſe ita habeat. Atq; ita mihi hic ſermo uniuerſus ad ſummum perductus eſt. Nunc uero exactius referre uolo, cur homines ægrotent, ſimul quæ cum hoc ſermone dicam quæ ſint principia morborum, & qualia unumquodq; ipſorum efficiat. Sic autem aſſero. Si cibi plures quàm oportunitate eſt, qui iam concocti ſunt, intus maneat, & homo non purgetur, & alij cibi ſuperingerantur, corpus ab humore prioris ac recentis repletum caleſcit, & febris ex hoc homini oboritur. Verum febris hoc modo ſiens, non periculofa, neq; fortis eſt, in qua humor æqualis eſt, copia paululum uberiore nos affligens. Si enim hoc ita ſe habuerit, & quis admodum ualidus ſit, & quæ commoda ſunt adhibuerit, ſanus euadit. Vnus autem morbus ſolus eſt ex omni humore, & ſeptem ſigna habet. Nam & tuſis ipſum habet, quæ & debilis, & ſicca eſt: et ueter durus ſit, urpote & ſtercore intus contento: caput grauatur: & uomit: & febrit: & urina nō probe prodit. Hæc ſep̄ ſigna huius morbi ſunt ex omni humore ſientis. Si uero alij egeſtione non prodeunte, unus ex alijs humorib; ſuperet, melius deget homo. Et ſi quis febre ſiente

fiente ab omni humore, nō adhibeat idonea, inualeſcet mōrbus quāntū ipſe humores ſuperauerit, hoc modo. Caleſcēte ſanguine exhalat maxime per hunc humor aquoſus, qui febrī eſt infeſtiſſimus. Relinquitur autem pinguis ac leuis, qui eſt biliſus, & febrī maxime nutrimentum eſt. Exhalat autem hoc modo, Velut ſi quis aquam & oleum in uas æneum infundat, & ligna multa ſubiecta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior erit, ex uale enim exhalabit; oleum autē paululum imminuetur. Nam aqua præ raritate ab igne attenuari poteſt, & leuis reddita exhalare. Oleum uero utpote quod eſt coniunctum ac denſum, attenuari non poteſt, neq; ſimiliter ut aqua exhalare. Sic ſanē & in homine ſeres habet. Aqua enim caleſcēte corpore foras exhalat, Biliſus autem humor, ut qui coniunctus eſt ac denſus, non ſimiliter attenuatus exhalare poteſt. Verum attenuatus hic biliſus humor, corpus magis calere facit. Copioſius enim & melius alimentum febrī bilis ſuppeditat, & prorūpens aut firmata in corpore, morbum ſupra priora corroborat. Atq; hæc quidē dicta ſunt de eo quodd afficitur homo, ſi non purgetur & curetur. Si uero non ipſa copia præualuerit, ſiue ſemel multa ſiens, ſiue paulatim colligatur, reliquū corpus diu hoc ſit, præ robore ſuſſerre poteſt, donec principiū aliquod ſuperaccedat. Atq; hoc ſanē modo morbus ſit, ſi homo à copioſiore ſiente humore nō expurgetur.

Principia ex quibus ſunt morbi tria ſunt. Et unum quidem iam à me relatū eſt, qualia & quot efficiat in corpore. demōſtraui enim quomodo & cur agros ter homo, ſi non purgetur. Alterum eſt, ſi contingat ut ea quæ ex cælo obueniunt, inepta et præter uictus rationē ſint. Tertiu eſt, ſi uiolentiū quid accidat. Vix lentum autē eſſe dico, & caſum, & uulnus, & plagam, & laborē, & ſi quid aliud eſt huiusmodi. Horū uero principiorū maximū eſt Violentia, ſi magna fuerit; ſi uero parua, nō ita maximum. Secundum eſt, ſi nō purgetur homo. Tertium, ſi quæ ex cælo obueniunt inepta fuerint ad ſanitatē. Proinde diligenter ab his ſe cuſtodire oportet. Singula uero talia in corpore faciunt, qualia ego dicturus ſum. Equidem ſi uulnus fiat, manifeſtum eſt quod caro diſſecta eſt, & ulcus factum eſt. hoc autem morbum eſſe dico. Si uero contuſio fiat, homine percuſſo, aut lapſo, aut aliud quid tale perpeſſo, & tumor oboritur, ſanguis ſtatim præ uiolentia calefactus, & uenis hiantibus illapſus, nō habens exitum præ copia; quō abire poſſit, conglobatur; & propterea tumor ſit, & tamdiu aedeſt, donec depurgatus fuerit, eo modo quo de locis depurgari dictum eſt, aut etiam per ipſum tumorem, et ſiue per chirurgiam, ſiue ſine ea, ſanguini tranſitus fiat, aut per tempus ſuppurato, aut non. Sed & labor tale quid efficit. Quum enim homines laborarint, quibus ſanē maxime ſanguinis afflictio contigerit, illic firmatur ac caleſcit, & ex hoc dolor oboritur. Si uero hæc quidē ſuperarit homo, uerum multa copia labor accedat, & aluus ac ueſica nō breui copiam expulerint; febris ſanē ex hoc irruerit. Et ſi quidem prior humor æqualis fuerit, nequæquam. Si uero in labore ipſorum plurimus in corpore permaneat, ſuperat ille. Atque hæc à me dicta ſunt de uiolentia, qualia in corpore efficit. Et hæc quidem duo ſunt principia, Violentia, & plenitudo, quæ ſi non purgantur homines, corpora calefaciunt. At uero quod ex cælo obuenit principium, ſi ineptum fiat in homine, ſuperat aliquid humoris, & uelut ad morbum calefacit, & frigeſcit prius, ſi fieri contingat. Dicam autem prius de eo, quod caleſcit

calefacit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fuerit aliquid morboſi, quale in priori dixi, & ea quæ ex cœlo obueniunt incommoda fuerint, & caleſcat homo, turbatur humor omnis in corpore caleſcens. Hoc autem uiolentia facit. Et ſi quidem depurgetur homo, humore illo turbato, ſecernitur quantũ eius plus quam commodum eſt redundarit. Et habet hæc res ſimilitudinem ad id quod Scythæ faciunt ex equino lacte. Lac enim in caua uafa lignea inſuſum concutiunt. Illud autem dum turbatur, ſpumefcit ac ſecernitur, & pingue quidẽ, quod Butyrum uocant, quum leue ſit, in ſuperficie conſiſtit: graue uero & craſſum, deorſum ſidit, quod etiam ſecretum ſiccant. Vbi uero concretum ac ſiccatur fuerit, Hippacem ipſum uocant. At ſerum lactis medium locum tenet. Sic etiam in homine, dum turbatur humor, quicquid eius eſt in corpore, à principijs quæ dixi diſparatur. Et in ſuperficie quidem bilis conſiſtit. Leuiſſima enim exiſtit. Secundo loco ſanguis. Tertio pituita. Grauiſſimus autem horum humorũ eſt aqua. His uero ita ſe habentibus, quiſquis ex his in morbo plurimus fuerit, in principio ſiente turbatione, deuenit ad locũ, ubi plurimus eſſe poſſit. Verum in turbatione, ſpaciola capacitate ſiente, ſecretus diſtrahitur, & calefacit corpus. Aut aliqua corporis parte firmatus, unã cum alio humore, cum quo eſt in alio loco, dolorem ac calorem exhibet. Qui uero calefactus eſt locus, in ſuperetiam reliquum corpus cõcalefacit, & ex hoc febris oboritur. Et oboritur magis à bile, & pituita, & ſanguine, calidiſſimi enim hi humores exiſtũt. Et ſi quis horum in aliqua corporis parte firmatus fuerit, ut plurimũ morbus illinc nominatur, & cognomen habet. Cæterũ ab aqua non ualde fortis febris oboritur, neq; diuturna. Nam igni non bonum alimẽtum aqua præbet. Atq; hæc quidem de hoc dicta ſunt. At uero ante turbationem, non habet multus humor quo proccedat, ſed ſuſum ac deorſum uoluitur & diſtrahitur alijs humoribus permixtus. Omnia enim plena exiſtunt. In turbatione uero euacuantur. Verum aliud alio magis euacuatur. Et multus humor ſuum locum occupat, & alienus alijs nõ ammiſcetur, ſi firmatus fuerit priuſquam ille uiribus adæquetur. Poſteſt autem ipſi adæquari is qui ab ipſo poſtea ad morbum ſuperacceſſit, donec purgatus fuerit locus qualicumq; purgatione. Si uero multus fuerit affligens humor, fruſtur, & cõſumitur ad morbum etiam alius qui priuſ ſalubris erat. Et tali modo homo moritur. fruſtur autem, ſi morbus nõ amplius ſufficiens alimentum habuerit, & cõſumitur ab humore qui in loco dolente exiſtit. primum enim proſpinquũ aſſumit, deinde longius depaſcitur, donec conſumptũ fuerit, & nõ amplius ineſt in corpore alimentũ. Alimentũ autẽ eſt homini humor leuiſ. Quem admodũ igitur ut certũ eſt, putrefactio primũ paulatim fit, ſi maxime caleſcat. Poſtea ubi iſthic alimentum putrefactioni non amplius ſufficit, depaſcitur de ſano, initio ſumpto à proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnoſum eſt putrefecerit, poſtquam uero in totum depaſta eſt, alimẽtum putredini conſumitur. Sic ſanẽ etiam in morbo. Sumpto enim à loco illo initio, ubi iſthic alimentum ſufficiens non amplius ineſt, depaſcitur ulterius, à proximo initio factio. Poſtquam enim per totum graſſatus fuerit, alimentũ morbo cõſumitur, & alius ſalubris humor nõ ſuperat. Et ſi hoc fiat, homo moritur. Quin & in turbatione, ubi hic ſalubris humor amplioſiorem locum occupat, & non firmatus fuerit, ſed uoluitur ac diſtrahatur, nõ amplius alijs miſcetur, ſed ad morbum cõſumi-

circa ossa, & prope medullam consistit: hos progressu tēporis magis lædet, pri-
mum quidem in illum ipsum locum, deinde ipsi propinquū, & semper ulterius
depascitur, & alius ipsum assumit, ut quæ calida sit, & postea tum alius, tū læ-
dens humor, adhuc magis calefacit. At humor crassus calefcens primū diffun-
ditur, is qui propinquus affligenti existit, diffusus autē aquoso humori affligē-
ti miscetur, deinde in concussione corporis inanior redditur. & tam diu rigor
tenet, quandiu aquosus humor alij humori ammixtus est. Quin & febris hoc
modo generata oboritur. Affligentia ad locum firmata, calefcens corpus fe-
brē in se suscipere cogūt: & ab affligente, & ab aluo calefactum, reliquum aquo-
sum humorē superat. Atq; sic febris fit post frigus, si qua corporis parte copio-
sior humor formatus fuerit. Si uero uoluitur ac distrahatur, tali modo febris ob-
oritur. Post frigus febris uoluitur, maxime affligēs circa aluum & supernam,
& infernam. Isthic enim plurima loci capacitas existit. Dum autem uoluitur,
primum propinqua calefcunt, & uiscera, & quæ in aluo sunt. Postea etiā alius
humor diffusus calore fruitur, & aquoso humori miscetur. Atq; febris post tri-
gorem hic fit, ubi affligens uoluitur, imò etiam ubi firmatū fuerit reliqua cor-
poris parte. Et hæc à me dicta sunt, quomodo, & quando, rigor morbosus fiat,
& quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruit. Et quæ sint princi-
pia morborum, & qualem unūquodq; ipsorum morbum in corpore inducat,
& quomodo & cur in diebus imparibus morbi iudicantur. Et unde homines
sani sint, & unde ægrotent. & quomodo bilis, & pituita, copiosior & paucior
fiat. Itemq; alia multa quæ in ipsa natura humana sunt demonstrari, quæ sanè
hic sermo exigebat. Atq; hæc cita relata finem habent. Nunc autē de lumbrici-
cis latis dicam. Affero enim ipsos in puero dum adhuc in utero est nasci. Post-
quam enim semel ex utero egressus est, non tanto tempore sterces in aluo ma-
ner, ut ex eius diuturnitate ac putrefactione, tantæ magnitudinis animal gene-
rari possit. Excernit enim semper hesternū sterces per omnes dies, si sanus ho-
mo esse debet. Tale uero animal nasci non possit, etiamsi multis diebus homo
sterces non egeret. Multa enim nascuntur dum puer in utero est hoc modo,
Vbi ex lacte & sanguine computrescente ac redūdante, utpote quod dulce est,
pus factum fuerit seruidum, animal isthic generatur. Nascuntur autem & rotun-
di lumbrici isthic eodem modo. Signū uero qd hæc res ita se habet, hoc est. Post-
quam in lucē editi sunt pueri, mulieres ipsi in cibo, offerūt medicamenta, quo
sterces ex intestino exeat, & nō comburatur, & simul ut intestinum dilatetur.
Vbi uero cibum obtulerunt, multi sanè pueri & rotundos & latos lumbricos
unà cum primo stercore excernunt. Si uero non excreuerint, fiunt etiam insu-
perq; nascuntur in uentribus. Et rotundi quidem pariunt, lati uero non ampli-
us, etiamsi quidam ipsos parere dicant. Nam homo qui latum lumbricum hæ-
bet, uelut cucumeris semen excernit aliàs atq; aliàs, unà cū stercore ipso, & sunt
homines qui hoc lumbrici partus esse dicunt. Mihi uero nō recte dicere uiden-
tur qui talia dicunt. Neq; enim ab uno animali tot pulli generari possunt: neq;
ea est loci in intestino capacitas, ut partus educare queant. Augescente autem
puero, augetur etiam lumbricus in intestino, ab his quæ in uentriculū ingesta
sunt, & æqualis fit intestino, quibusdam in pubertate, quibusdam posterius, qui-
busdam paulo prius. Et postquam intestino adæquatus est, similiter augetur,
&

& quanto maior factus fuerit, unā cum stercore excernitur de intestino recto, & excidit uelut cucumeris semē, saepe uero etiā maior. Quibusdam uero iter facientibus, aut laborantibus, & uētriculo calefēte, deorsum descendit, ipsiſq; prominet ex podice inflatus, hocq; facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa uero quōd non pariat, sed ita habeat uelut ego dico, hæc sunt. Si quis curret hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit aut positionem, si quidem fuerit homo bene preparatus, totus rotundus factus ad pile figuram exit, & homo sanus euadit. Si uero ad medicinam hereat, recta pars de lumbrico abrupitur, lōgitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiā longe amplior, & ubi abruptus fuerit per multum tempus signa cum stercore non prodeunt. Postea uero augetur. Atq; hæc argumenta sunt, quōd lumbricus latus non parit, sed abrupitur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rasura. Signa habet hæc. Cacat aliās atq; aliās uelut cucumeris semen, & ubi ieiunus est homo, exilit ad hepar aliās atq; aliās, & dolorē inducit; & quandoq; spūta ori inſuunt ubi ad hepar alsilit, quandoq; non. Quibusdam etiā uocem intercipit, si fortiter ad hepar irruat, & ualde multa spūta ex ore fluunt, paulo autem post sedātur, & tormen multum in uentriculo aliās atq; aliās oboritur. Quandoq; etiā ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquando firmatus innititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Contingit & hoc. Qui hoc animalculum habet, in toto quidem tempore ualde debilis fieri non poterit. Vbi uero debilis factus fuerit, uix reualeſcit. Latus enim lumbricus partis alicuius partis cepit, ex his quæ in uentriculum ingesta sunt. Si quidem igitur curatus fuerit iusto modo, sanus fieri poterit. Si uero non curetur, sua sponte nō exit. Mortem tamen non inducit, sed confeneſcit. Atq; hæc à me dicta sunt de lumbrico lato, unde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. Cæterum calculi morbo principium oboritur à lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nutrice impurum fit, si pituitosis cibus ac potibus, & alimentis impuris nutritur. Conferunt enim omnia in uentriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet autem & hæc res se hoc modo. Si nutritrix nō sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut sanguinea, aut pituitosa: Lac etiā malum puero generatur. Consentit enim corpus & uentriculus. Plurimum uero ipsi ad lac cedit, de eo quod ipsa plurimum in seipsa habuerit. Et puer si de nutrice lac non purum suxerit, sed biliosum uelut dixi, morbosum fit ac debilis: & in præsens maxime affligitur, quandiu lac prauum ac morbosum suxerit. At ubi suxerit lac non purum, sed terreum & pituitosum, & habuerit puer uenas de uentriculo ad uescicam tendentes amplas ac attrahentes: procedit autē & quod bibit nutritrix, & lac in uentriculum pueri, tale quale trahit à uentriculo de lacte, in totū similiter prout uenæ ad uentriculum detrudere possunt: si quid sanè in lacte nō purum fuerit, id quo uescica fruitur lapis fit tali modo, uelut in aqua non pura, in calice aut uasæneo turbata, & rursus sedata, sex aceruata fit in medio. Sic sanè & in uescica de urina non pura existente. Et non per urinam eijcitur, ut quæ in cauo fit loco, & maxime aceruata fiens, præ dolore per mictionē non pertransit, & à pituita cruda concreſcit. Glutinum enim fit pituita ad fecem ammixta. Et primum paruā lanugo superstat, deinde quod accedit arenosum fit, glutino fiente pituita, quæ est in uescica de lacte, & augetur, et quicquid humoris in glutinatione accesserit,

emingitur. Rursus autem fex solida fit, & lapidis speciem accipit. Quemadmodum ferrum ex lapidibus ac terra dum comburuntur fit. Et in prima quidem in ignem immisione, conglutinati sunt lapides cum terra ad ferri recrementum. At ubi iterum atque iterum in ignem immissa fuerint, recrementum quidem foras decedit liquefcens ex ferro, id quod ita fieri oculis uidemus. Ferrum autem in igne relinquitur, & recremento decedente subfidet, fitque solidum ac densum. Sic profecto etiam fex in uesica, dum pituita glutinum fit, emingitur id quod ab urina liquefcit. Fex autem subfidet, & densatur, ac solida fit uelut ferrum. Vbi uero subfedit ac solida facta est, sursum ac deorsum in uesica uolutatur, & feriens uesicam dolorem inducit, & si uehementer feriat ac ulceret, aliquid de ipsa aufert. Verum id quod insuper affertur, adhuc magis quam id quod arenosum decessit, concretionem efficit. Atque tali modo fit lapis de lacte in uesica: & si puero anxietas aliqua ab hoc oboritur, alias atque alias, ubi meire uult, urinae meatum apprehendit. At si puero iam adulto lapis gignatur ex terrae esu, dolor non adest ipsi prius quam ipse sibipsum cibum deligat. Et haec a me de hoc relata sunt. Ceterum morbus signa quinque habet. Nam ubi meire uult, dolore affligitur, & urina paulatim fluit uelut in urinae stillicidio, & est subcruenta, nimirum uesica a lapide exulcerata, & uesica inflammata est. Verum hoc signum in conspicuum est, indicat tamen summa pars praeputij. Quandoque mingit arenosa, uerum a talibus, qualia ego dicam. Eijcit autem aliquando lapides duos, aut etiam plures paruos, generatos eodem modo, uelut de uno dixi. Fiunt etiam tali modo. Quum lapis fuerit concretus, & profunde subsederit in uesicam in arena separata, ita ut ipsam aduenientem lapis non assumat in seipsum, sed grauior ac copiosior fiat, ut tamen ipsa ad seipsum non concrecat, etiam sic duo lapides fiunt. Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collisis inter se in agitatione aliquid disparatur, & arenosum per urinam eijcitur. Quod etiam aliquando contingit, ubi arena ad uesicam descendit, & non coaluit. Quidam dicunt quod potus in pulmonem deuenit, ex hoc uero in reliquum corpus. Hi autem qui haec dicunt, redarguuntur ex hoc quod dicturus sum, quod uidelicet pulmo cauus est, & in ipso fistula est. Quod si pulmo cauus non esset, & fistula non ipsi adhereret, animalia uocem non ederet. Vocem enim edimus de pulmone, quia cauus est, & fistula ipsi adest. Vocem autem articulant labia & lingua. Verum de hoc exactius in peripneumoniae tractatione egi. Ceterum hominibus quibus potus in pulmonem ferri uidetur, aduersabor, habetque res se hoc modo. Procedit potus in uentrem, a uentre autem in reliquum corpus expenditur. Oportet autem his quae dicturus sum mentem adhibere. Sermonis argumenta, quod potus non procedit in pulmonem, sed in uentrem, haec sunt. Si enim potus procederet in pulmonem, quum pulmo expletus esset, homo non facile respiraret, neque loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret. Et hoc quidem unum argumentum est. Deinde si potus in pulmonem procederet, cibi in nobis sicci existentes non similiter concoquerentur. Atque haec duo argumenta existunt. Sed & medicamenta aluum subducunt, si in potu sumantur, extra uentrem procederent. Habet autem haec res hoc modo. Quaecumque medicamenta purgatoria sunt aut superne, aut inferne, aut etiam utrunque praestant, ea haec faciunt. Omnia ualde urunt, & fortia quidem ex ipsis, si partem aliquam

aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora uero turbulenta corporis moram faciunt, quâcumque tandem partem occuparint. Si uero aliquod ex his medicamentis in pulmonem perueniret, uideretur mihi magnum aliquod malum induciturum esse. Pituita enim de capite descendens, et in ualde breui tempore exulcerat. Tenera enim & rara res est pulmo, & si exulceratus fuerit, non bene habebit homo ille, ob multas sanè causas. At uero uenter à medicamento non exulceratur. Nam res est ualida ac robusta, nimirum uelut pellis & corium. Et plerique sanè ex Libyæ incolis pecorum pellibus pro uestibus utuntur, uentribus autem pro utriculis. Robusta enim res uenter existit. Deinde ubi à uino nigro homines repleti fuerint, nigra recrementa excernunt. Atque hæc omnia argumenta existunt. Et ubi allia comederimus, aut aliud quoddam edulium olidum, urinam reddimus comesta odore referentem. Et hæc quidem omnia argumenta sunt. Sed & hoc considerandum uenit quod dicturus sum. Si quis cyceonem biberit, aut farinam coctam forbuerit, aut aliud quid eiusmodi, & hoc ipsum in pulmonem perueniret, certè arbitramur ipsum ne minimum quidem tempus uiuere posse. Vbi enim modicum quiddam pituitæ in pulmonem perueniret, aut in fistulam ipsius, multa ac fortis tussis oboritur, ac conuulsio. Si uero utique & uiixerit homo qui cyceonem biberit, aut farinam coctam forbuerit, ubi sanè concocta fuerit forbitio, uidentur mihi multa & fortis caliditas corpori oboritura esse, multusque dolor, ut omnino moriatur homo hoc modo, si illa in pulmonem perueniant. Atque hæc iam argumenta septem sunt. Præterea quomodo lac infantes pueros nutriti repperit, si ad pulmonem descenderet. Atque hoc mihi aliud adhuc argumentum est. Et hæc ne produxissimè quidem ad sermonis mei confirmationem, nisi multi adeo homines essent, quibus potus in pulmonem procedere uideretur, & necesse est ad opiniones fortiter inhaerentes multa argumenta adducere, si quis uelit auditorem à priorè sententia abducere ac conuertere ut suis uerbis fidem habeat. Et propter hoc etiam potus in pulmonem non procedit, sed in uentrem: quia contigua & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in hanc procedit. Et simul pulmonis fistulæ uelut hederæ folium incumbit, quare neque descendere permetteret in transglutendo, si in ipsum procederet. Atque hæc mihi de hoc relata sunt. Procedit nanque potus in uentriculum, & ubi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad uenas, & ad omentum, & in dediuè deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. Et postquam morbus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de uentriculo, & semper ad splenem uenit de potu, ubi biberit homo. Contingit autem in hoc morbo, ut neque febricitantiâ ex uentre, quam ubi homo sitiât, uesica autem & uentriculus noniusto modo excolent, neque conueniente diætâ homo utatur. At splen sub ægrotans à uentre de potu trahit. Morbus autem oboritur, & scrotum pellucidum fit, & clauiculæ, & collum, & pectora attenuantur. Colliquantur enim ab hoc morbo, & humor ad uentriculum defluit, & infernæ partes aqua plenæ sunt, & uenter cibum auersatur, & quandoque ualde adstringitur, quandoque defluit. Nec uesica iusto modo excolat, & plerumque horror aliâs atque aliâs per corpus discurrit, & quandoque febris corripit. Et quibusdam facies tumida

fit, quibusdam non. Aliquibus etiam tibiæ rumpuntur, ubi morbus diuturnus factus fuerit, & aqua illinc effluit. Incidunt & uigiliae, & impotentia corporis, ac maxime lumborum. Et postquam edit aut bibit, etiam paulo amplius splen affligitur, & spiritum frequentem semper emittit. Atque hæc signa hydropsis sunt. Est autem & circa uentriculum solum, siue febris corripuerit, siue non. Et uenter magnus fit, & crura implentur aqua. Verum supernæ corporis partes attenuantur his qui ita affecti putantur. At signa omnia debilitata sunt, & simul in cruribus aqua non discedit, & dolor tanto minor existit.

Cæterum circa uentriculum solum hydrops & aqua hac de causa fit. Etenim ubi acruatim aqua accessit, & uia in principijs non pateat ad infernas partes, sed acruatim in uenis concludatur, nimirum ut quæ respirationem non habeat, neque sursum neque deorsum inniti potest, haud aliter quam si quis magnum uas angusti osculi occludat, ac subito inuertat, deinde sensim operculum de osculo detrahat. Et si enim hoc fecerit, aqua non effluet foras, neque enim respirationem habet, sed à spiritu qui intus est, conclusa est. Nam spiritus qui intus est replet uas, & externo spiritui renititur, & excursus aquæ non datur præ spiritu uas implente, & simul aere incumbente. Si uero quis sensim uas inclinarit, aut fundum perforarit, spiritus de uase exibat. Egresso autem spiritu, procedit etiam aqua foras. Sic sanè in hydrope, si quidem per respirationem sursum aut deorsum contingat, in principio morbi, transit ad crura hydrops, & ad pedes. Sin minus, isthic solum uoluitur circa uentriculum, Atque ita quidem de his à me dictum est. Fit autem & mulieribus hydrops in utero ipso, & signa sanè in uentriculo, & in cruribus, & reliqua signa eadè habet. Et de hoc ipso à me dictum est in morbis muliebribus. Atque hæc tres sunt species morborum ab hydrope. Fiunt autem hi morbi omnes cito difficiles, & omnes cito augentur. Adhuc autem difficiliore sunt, si ex alio morbo corpus liquefactum, ad hunc deuenit. Si quidem igitur subito occupauerit morbus hominem, moritur, nempe alio morbo diutissime iam affligente. At ubi etiam alius ualde fluida fuerit, citissime moritur, & sentiens, & loquens. Atque hæc à me relata sunt de hydrope, & unde oriatur, & quod hæc sint ipsius signa.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE AFFECTIONIBVS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

Hunc Galenus Polybius dicit.

PRIMUM prudentem ratione apud se inita, quod maximi presertim res est hominibus sanitas, nosse convenit quomodo ex sua ipsius intelligentia, in morbis utilitatem capiat. Nosse autem convenit ea quae a medicis & dicuntur, & adhibetur corpori suo, eaque discernere posse. Atque haec singula haecenus nosse satis est, quatenus idiotae contingere potest. Haec vero non verit quis maxime, si harum rerum cognitione ac studio temperetur. Morbi omnes hominibus a bile ac pituita fiunt. Bilis autem & pituita morbos exhibent, quum in corpore nimium aut resiccantur, aut humectantur, aut incalescunt, aut frigesunt. patiuntur autem haec pituita & bilis, & a cibis, & a potibus, & a laboribus, & a vulneribus, & olfactu, & auditu, & visu, & coitu, & a calido, & a frigido. patiuntur autem quum singula ex relatis, aut non in debito tempore corpori exhibentur, aut non consueta, aut plura & fortiora, aut pauciora & debiliora. Vniuersi igitur morbi hominibus ex his fiunt. Oportet autem ad haec idiotam nosse, quae par est nosse idiotam. Quae vero artifices nosse par est, ea etiam adhibere ac tractare. De his autem quae dicuntur & fiunt, fieri potest ut idiotae ex intelligentia quadam coniecturam faciat. Iam vero unde singula haec nosse oportet, ego referam. Si in caput dolores inciderint, huius caput calefacere conducitur: ita ut multa calida lauemus, & sternutatione facta pituitam ac mucos subducamus. Et si quidem ex his a dolore liberetur, sufficientur haec. Si vero non liberetur, purgandum est caput a pituita. Victus autem sit forbitio, & potus aqua. Vinum autem non exhibeatur, donec dolor sedetur. Quum enim calidum existens caput, vinum attraxerit, dolor fortior euadit. Dolores incidunt a pituita, quum in capite mora cumulata fuerit. Si vero alias atque alias dolor & uertigo in caput inciderit, profunt quidem & haec adhibita, prodest autem etiam, si sanguis a naribus fuerit detractus, aut a uena in fronte. Si uero diuturnus & fortis in capite fiat morbus, & purgato capite non decedat, huius caput aut scarificare oportet, aut uenas in circuitu inurere. Ex his enim solus sanum fore spes est. Aegrotos considerare oportet statim in constitutionis morborum principio, quare opus habeat: & quales sint ut pharmaco purgentur, aut ut aliud quid, quodcumque tandem uolueris, exhibeas. Si uero omnino principio, ad finem iam uergente morbo exhibueris, in desperato iam corpore, forte quiddam praebere ueritus, periculum est ne magis delinquas, quam successum consequaris. Si in aures inciderit dolor, conducit multa calida lauare, & auribus fomentum adhibere. Et si quidem ad haec cesserit pituita de capite attenuata, & dolor cessauerit, sufficientur haec. Sin minus, optimum omnium pharmacum fuerit, quod in potu exhibitum, sursum pituitam purgat. Aut purgandum est caput medicamento, quo capitis pituita purgatur. Fit autem & hic dolor, quum intrinsecus ad aures pituita ex capite allapsa fuerit. Si uero fauces inflammatae fuerint

fuere, gargarismis uti oportet. Fit autem & hoc à pituita. Si uero gingiua, aut aliquid sub lingua inflammatum fuerit, his quæ cõmanduntur utendũ est. A pituita autem & hæc fiunt. Si uero uua dependerit & suffocarit, (Quidam hoc gurgulionem uocant) statim gargarismis utendum est, præparatis uelut scriptum est in medicamentis. Si uero ex his gracilis non fiat, retro naso capiti cucurbitæ duæ adhibeantur, & sanguinis plurimũ detrahatur, & pituitæ fluxus retro reuellatur. Si uero neq; ex his detumescat, scalpello incidito, & aquã educito. Sectio autem faciendã est, ubi summum sububicũdum factum fuerit, Nam si tale factum sectũ non fuerit, inflammatur, & aliquando de repente stragulat. Fit autem & hoc à pituita, ubi ex calefacto capite aceruatim defluerit.

Cæterum quod ad dentium dolores attinet, si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur. Si uero non corrosus est, neq; mouetur, dolorem autem exhibet, per unctionem resiccatur. Profunt etiam quæ cõmanducantur. Dolores autem fiunt, quum pituita sub radices dentium subierit. Exeduntur autem & corroduuntur, partim à pituita, partim à cibis, si natura debiles fuerint, & cavitatem habuerint, & male in gingiuis fixi fuerint. Si in nare Polypus nascatur: quæ res ex naso in obliquum per respirationem diffilatur, ac intumescit: eximitur, laqueo ex naso ad os distractus. Aliqui etiam pharmacis erodũt. Nascitur autem à pituita. Atq; hi quidem sunt morbi qui à capite oriuntur, exceptis oculorum morbis, de quibus priuatim agemus. At uero de morbis circa uentrem, hæc considerare oportet. Pleuritis, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, hi morbi acuti uocantur, & fiunt maxime quidem ac fortissimi hyeme, fiunt etiam æstate, uerum minus, & molliores. Quod si forte in tales incideris, hæc sanè faciendã ac consulendã, maxime successum senseris. Pleuritis. In pleuritide febris detinet, & lateris dolor, & erecta ceruice spiratio, & tussis, & sputum ab initio quidem subbiliosum sputum. Postquam autem quinta aut sexta dies aduenierit, etiam suppurulentum. Huic ad lateris quidem dolorem dandum est, quod pituitam & bilem à latere deducat. Sic enim dolor lenissimus fuerit. Alius autem curanda est per clysterem subducentem ac frigefaciẽtem. Hoc enim uniuerso morbo commodissimum erit. Exhibendus est etiam potus, & sorbitio. Et potiones dandæ sunt acidiore, quo sputum de latere repurgetur. Quum autẽ pus purgari inceperit, latus calefacere conducit, & forinsecus maturare ea quæ circa latus sunt, prius autẽ hoc facere nõ expedit. Resiccatur enim. Fit autẽ hic morbus maxime ex potu, quũ quis humectio corpore, aut ebrius, aut sobrius, frigerit. Fit etiã aliter. Iudicatur autẽ morbus breuissimus septima die, longissimus decimaquarta. Et si quidem in hac, per sputũ reiectũ ac purgatũ fuerit pus à latere, sanus fit. Si uero per sputũ nõ fuerit pus reiectũ, pectore suppuratus efficitur, & morbus longus erit. Porro iudicari in morbis est, quũ morbi augetur, aut marcescunt, aut in alium morbum transeunt, aut desinunt.

Peripneumonia. In peripneumonia febris detinet, & tussis, & excreat primum quidem pituitã crassam ac puram, Sexta uero & septima, subbiliosam & subbiliosam. Octaua autem & nona suppurulentam. Huic si quidẽ dolor adest, aut dorsũ, aut laterum, dandũ est medicamentũ, quod in pleuritide ad lateris dolorem, in medicamentario libro scriptũ est. Per potus autẽ, & sorbitiones, & uentris subductionẽ ac frigefactionẽ, eadem curatio adhibeatur quæ in pleuritide.

Quo

Quo uero sputū et pus ex pulmone repurgetur, danda sunt pharmaca in potu, quibus pulmo humectatur, & pus sursum purgatur. Fit autē hic morbus, quū pituita acuatim ex capite ad pulmonē fluxerit. Aliquādo etiā ex pleuritide in peripneumoniā & febrem ardentē transitus fit. Iudicatur autē breuissimus quidem in diebus quatuordecim, longissimus uero in duobus de uiginti. Pauci uero hūc morbum effugiūt. Fiunt etiā pectore suppurati ex hoc morbo, si nō in iudicatorijs diebus pulmo fuerit purgatus. Phrenitis ubi apprehenderit, febris primum debilis detinet, & dolor circa prae cordia, magis autē dextra, ad hepā. Quum autē quarta aut quinta aduenerit, & febris fortior fit, et dolores auge scunt, & color subbiliosus efficitur, & mēs percellitur. Huic ad dolorē quidem danda sunt quae in pleuritide, et tepor faciēdus ubi dolor heret. Sed & alius curanda, ac reliqua similiter faciēda sunt, excepto potu. Potu uero utendum est quocūq; alio uolueris, praeter uinū. Aut acetum & mel ac aquam dato. Vinum aut non conuenit mente motis, neq; in hoc morbo, neq; in quibusuis alijs. Cōducit autē in hoc morbo etiā caput multa calida lauare. Mollito enim corpore, sudor quoq; magis sequitur, & aluus & urina secedit. Et aeger ipse seipso repurantior euadit. Fit hic morbus à bile, quū mora uisceribus ac septo trāuerso infederit. Iudicatur autē morbus, breuissimus septima die: longissimus undecima. Effugiūt & hunc pauci, transitq; etiā ipse in peripneumoniā, & si transierit, pauci effugiunt. Febris ardens siue causos, quū habuerit, febris detinet, et sitis fortis, et lingua aspera ac nigra fit, à spiritus sanē caliditate. Et color subbiliosus fit, & sputa biliosa. Et aeger extrinsecus quidem frigidus fit, intrinsecus uero ualde calidus. Huic conducit frigefaciētia adhibere, & ad aluum, & forinsecus ad corpus, cauendo ne inhorrescat. potiones quoq; ac forbitiones dandę sunt frequētes, & paulatim q̄ frigidissimae. Venter autē curetur, & si quidem non subeant quae insunt, insula frigidissima per clysterem immittantur, aut quotidie, aut alternis. Hic autem morbus fit à bile, quū mota intra corpus firmata fuerit. Solet etiā in peripneumoniā transire. Iudicatur autē breuissimus quidē nona aut decima die. Longissimus autē decima quarta. Et si quidē transierit in peripneumoniā, pauci effugiunt. Si uero nō transierit, multi effugiunt. Atq; hi quidē morbi acuti uocantur, & oportet hos sic curare. Quaecūq; uero aliae febres hyeme fiunt, siue ex uino, siue ex lassitudine, siue ex aliqua alia re, eas obseruare oportet. Transiunt enim aliquādo in morbos acutos. Transiitio uero ipsarum talis est. Quum commotis duobus humoribus, pituita & bile, non conducentia corpori exhibentur, ipsi inter seiplos coacti, pituita uidelicet ac bilis, corpori ubicūq; tandem cōtingit allabuntur. Et fit pleuritis, aut phrenitis, aut peripneumonia. Obseruare igitur ac uitare oportet febres in hyeme. Sit autē obseruatio, & tutela ab ipsis, quies, & grauitas, & uentris euacuatio. In forbitionibus autem & potionibus degendū est, donec febris imminuta fuerit. Ex morbis fermē maxime acuti & occidunt, & la boriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tutela, & exactissima curatione. Et si curante nullum malum accedere oportet, sufficiunt enim quae ab ipsis morbis adsunt. Verum ut boni quid praestet, pro uitibus conetur. Et si quidem recte curante medico, à magnitudine morbi superetur aeger, nō haec culpa medici est. Si uero non recte curante, neq; cognoscere, à morbo superetur, medici culpa est. Aestate porrò haec fiūt, febris detinet fortis,

& fitis, & uomunt aliqui bilem, aliquibus uero etiam inferne secedit. His in potu dandum est, & ad forbendū, quod duncq; tandem tibi idoneum esse uisum fuerit. Si uero bilis aut pituita ad cor cōfederit, aqua frigida, aut aqua mulsa pota, uomant. Si uero uenter non secesserit, clysteri uendū est, aut subditiua glande. Morbus autem fit à bile. Liberatur autem maxime septima die, aut nona. Si uero febre detinente non purgentur, neq; deorsum, neq; sursum, dolor autem affuerit per totum corpus; tertia aut quarta die, pharmaco leui aut portione, deorsum purgato, facito autem forbitionē ex milio, aut farina: & hīsdem portionibus curato. Patiuntur autem & hæc à bile. Si uero externæ partes, nō ualde feruidæ fuerint, uerum internæ, & lingua aspera ac nigra fit, huic pharmacū nē dederis, curato autem frigefacientia adhibendo, & ad aluum, & ad reliquū corpus. Vocatur autē hæc febris æstuosa. Iudicatur maxime undecima die, & decima quarta. Si uero febrilis calor apprehēderit ac dimiserit, grauitas autē corporis ipsum deriuuerit: hunc donec quidem calor tenuerit, forbitionibus ac portionibus curato. Quum autem non tenuerit, etiam cibos dato, purgato autem celerime pharmaco, siue sursum siue deorsum opus habere tibi uisum fuerit. Si uero febris quidem non tenuerit, os uero amarum habuerit, & corpus graueur, & cibum auerfetur, pharmacum dandum est. Patitur autem hæc à bile, quum in uenas ac articulos incubuerit & firmata fuerit. Quicūq; uero alij dolores in æstate circa uentrem fiunt, si quidem ad præcordia & cor tenderint, aquā nullam aquosam facito, & aceti tribus heminis affusus, tepidam bibendam dato, & ubi modico tēpore ipsam retinuerit, & igne ac uestibus cōcalectus fuerit, uomat. Si uero à uomitu rursus accesserint ac suffocauerint, rursus uomitū faciat. Aut ipsum multa calida lorum, per clysterem subluet, & tepefactoria adhibe, si affuerit dolor. Patiuntur autem hæc maxime à pituita, quum commota ad cor allapsa fuerit. Danda sunt etiam his qui talibus doloribus uexantur, pharmaca quæ descripta sunt ad eiusmodi morbum, in medicamentario libro. Si uero transierit dolor aliās ad alium uentris locum, & febre caruerit, multa calida lauatur, & doloris gratia bibenda dentur, quæ in pleuritide sunt descripta, aut alia prout tibi uisum fuerit. Si uero à dolore non liberetur, per pharmacū deorsum subpurgetur. A cibis autem abstineat, quouiscq; dolor affuerit. Tales autem dolores, qui sic errant, à bile fiunt. Quicumq; uero dolores infra umbilicū fiunt, in his mollis infuso per clysterem immisso subluito. Si uero non sedentur, pharmacum deorsum purgans dato. Quicumq; uero dolores derepente in corpore fiunt citra febrem, in his lauare multa calida conducit, & tepefacere. Nam pituita & bilis compacta quidem, fortia sunt, & præualent in quacuncq; corporis parte cōstitierint, & laborem ac dolorē fortem exhibent. Diffusa uero debiliora sunt, quacuncq; corporis parte manifesta fuerint. At uero morbi qui in æstate fiunt, sic fieri solent. Quum corpus à sole fuerit calefactū, humectatur, humectatum autē ægrotat, aut torum, aut ea parte in quā pituita & bilis incubuerint. Si quidem igitur quis ipsos incipientes curet, neq; longi fiunt, neq; periculosi. Si uero non curet, aut male curet, & longiores fiunt, & sæpe quoq; occidunt. Sed & tertianæ et quartanæ febres, ex talibus fieri solent. Hæc morborum cōstitutio maxime quidem æstate fit, aliquibus uero etiam hyeme. Tertianæ febris quum apprehenderit, si quidem uidebitur tibi nō purgatus esse, quarta die

die pharmacum dato. Si uero pharmaco non uidebitur opus habere, medicamenta in potu exhibeto, quibus febris aut transfuretur, aut deficiat. Exhibeto autem uelut scriptum est in medicamentis. Et in apprehensione quidem, forbitione & potu nutrito. Interposito uero tempore, cibus per aluum secedentibus. Apprehendit autem plerumq; non ita sæpe. Si uero non curetur, in quartanam transire solet, & diuturna fieri. Si uero quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fuerit, primum caput purgato, & interpositis tribus aut quatuor diebus, pharmacum sursum uersus purgans dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus rursum aliud deorsum purgans dato in ipsa apprehensione. Si uero ex his non sedetur, rursum interpositis diebus, multa calida lauato, & pharmaca quæ scripta sunt dato. potibus autē & forbitionibus, & reliquæ diætata utendum est uelut in tertiana. Apprehendit autē hæc febris plurimos multo tempore, alios uero pauco. Et fit tum tertiana, tum quartana, à bile & pituita. Cur aut tertiana & quartana, alibi à me scriptum est. Vim porro habet medicamentata in his febribus, ut potis his corpus in loco sit, in cõsuetâ caliditate ac frigiditate. & neq; præter naturâ calefiat, neq; frigeat. Danda sunt aut uelut scriptum est in medicamentario libro. Pituita alba quum tenuerit, corpus totum intumescit albo tumore. & in eadem die alia parte melius sibi uidetur habere, alia deterius. Et tumor aliàs in alia corporis parte maior et minor fit. Huic pharmaca danda sunt deorsum purgantia, à quibus aqua, aut pituita purgatur. Victus autē ratio cõstituen-da est, in cibus & potibus, ac laboribus, à quibus siccissimus ac gracilissimus euadat. Morbus aut hic fit à pituita, quum quis ex febribus diuturnis pituitosus existēs, impurgatus manserit, et pituita ad carnes ipsius cõuersa fuerit. Et nihil quidem albidior est hæc pituita q̃ alia. Verū corporis color albidior apparet. Sanguis enim à pituitæ copia aquosior fit, & nō inest similiter in ipso bonus color. Quapropter albidiores apparent, & uocatur hic morbus pituita alba. Si quidē igitur curatus fuerit inchoante morbo, sanus fiet. Sin minus, in hydropē tranfit morbus, & hominem corrūpit. Quicūq; splenem habent magnū, qui quidē fuerint biliosi, hi mali coloris fiūt, & malis ulceribus scatent, & ex ore graue olent, & tenues euadūt. Et splen durus est, & semper cõsimili magnitudine, & cibi nō secedunt. Qui uero pituitosus sunt, hæc & minus patiūtur, & splen aliàs maior, aliàs minor efficitur. His cõducit si quidē impurgati fuerint, et caput & reliquū corpus purgare. Si uero purgatione nō egeat, uictus ratio cõstituen-da est, ita ut pituitosus corpus resicemus ac attenuemus, cibus & potibus, & uomitibus, & exercitijs plurimis, & deambulationib. Et in uere sursum per ueraturū purgētur. Biliosus aut cõducit, ut per uictū humectantē, aluum & uescicam subducamus, & ut de uena splenitide frequēter sanguinem mittant: & medicamentis urinam cientibus utantur, quæ splenē mollire scripta sunt, & ut pro anni tempore bilem purgēt. Quidam uero splenici à pharmacorū potu nihil utilitatis sentiunt, neq; à reliqua curatione, quicquā gracilior splen ipsorū euadit, sed quæ adhibentur à magnitudine morbi superātur, progressu uero temporis, alii quibus in hydropem morbus degenerat, & corrūpuntur. Aliquibus aut splen suppuratur, & uisti sani fiunt. Cū quibusdam uero cõsenescit durus & magnus existēs. Morbus aut fit, quum ex febribus & mala curatione, bilis aut pituita,

aut ambo in splenem incubuerint. Et diuturna quidem est affectio, non autem letalis. Ex pharmacis quæ splenis gratia exhibentur, alia per uescicam purgant, & ipsum molliorem faciunt. Alia uero purgant quidem, uerum neque per uescicam quicquam, quod manifestius fiat, neque usque alia parte. Splenem tamen molliunt. Voluulus quum apprehenderit, uenter durus fit, & nihil secernit, & dolor inferne omnem aluum tenet, & febris, & sitis. Aliquando uero præ dolore æger etiam bilem uomit. Hunc humectare oportet, & intrinsecus, & extrinsecus. Et multa calida lauare. Et bibenda dare quæ aluum mouent, & urinam subducunt. Et clysterem adhibere, si admittat. Si uero non admiserit clysterem, fistulam ad utriculi extremitatem alligato, & insufflando multum flatum immitto. Et ubi intestinum & uenter eleuata fuerint à flatu, exempta fistula, statim infusum per clysterem immitto. Et si susceperit, secessum emittet, & sanus euadet. Si uero non sic susceperit infusum, moritur maxime septima die. Talis autem morbus fit, quum stercore acruatim combusto in intestino, pituita circa hoc colligitur. Et intestinum intumescit, utpote his acruatim induratis. & neque phar maca quæ superne bibuntur suscipit, sed reuomit. Neque infusa inferne adhibita admittit. Est autem morbus acutus & periculosus. Aqua inter cutem fit plerumque quum quis ex longo morbo impurgatus multo tempore manet. Cor rumpuntur enim carnes, & liquantur, & fit aqua. Fit etiam hydrops à splene, quum ægrotauerit: & ab hepate, & à pituita alba, & à dysenteria ac lienteria. Et si quidem ex purgatione non facta fiat hydrops, uenter aqua impletur. pedes autem & suræ attolluntur. humeri uero & clauiculæ, & pectora & femora liquesunt. Hunc si à principio acceperis, priusquam aqua superexcrecat, phar maca bibenda dato, à quibus aqua aut pituita purgatur. Bilem uero ne moueas. Cibos autem & potus & labores ac deambulationes constituito, à quibus gracilis ac siccus euadat, & carnes quam robustissimæ fiant. Morbus autem est letalis, cum aliàs, tum si uenter aqua repletus fuerit. Quum uero à splene, aut hepate, aut pituita alba, aut dysenteria in hydropem transitus fit, condu cit quidem per eadem curare, effugiunt autem non ualde. Nam in morbis quum alter alteri succedit, plerumque occidit. Quum enim corpori à præsentis morbo debilitato, alius morbus accesserit, præ imbecillitate perit, priusquam alter morbus qui posterior accessit, desinat. Aqua porro sic fit. Quum carnes à pituita, & tempore, & morbo, & non purgata immudicia, & mala curatione, ac febribus corruptæ fuerint, liquesunt & fiunt aqua. Et uenter quidem non distribuit aquam in seipsum, uerum in circuitu circa ipsum consistit. Si quidem igitur à pharmacis, & alia uictus ratione, æger utilitatem percipiat, & uenter ipsius euacuetur, bene est. Sin minus, sectione facta, aquam emittito. Secatur autem uel iuxta umbilicum, uel retro iuxta lumbos. Effugiunt autem & hinc pauci. Dysenteria quum habuerit, dolor adest per totum uentrem, & tormen, & egerit bilem ac pituitam, & sanguinem combustum. Huius ubi purgaueris caput, phar maco in potu exhibito, quod sursum pituitam purgat, et aluum lacte cocto elueris, reliquum corpus curato, & si quidem febre caruerit, pinguibus & dulcibus. ac liquidis semper quæ insunt, ex aluo subducito. Et multa calida partes sub umbilico lauato, si dolor affuerit. Potus autem & sorbitiones ac cibos exhibeto, uelut feru

primum est in medicamentario libro. Morbus hic fit, ubi bilis & pituita in uenas ac aluum incubuerint, agrotat quidem sanguis, & corruptus secedit: agrotat autem & intestinum, & raditur ac exulceratur. Fit autem hic morbus, & longus, & laboriosus ac lethalis. Et si quidem robusto adhuc corpore curetur, spes est fugae. Si uero colliquato iam, & uentre omnino exulcerato, nulla uitae spes superest. Lienteria. In lienteria, hoc est, intestinorum leuitate, cibi secedunt non putrefacti, liquidi, dolor autem non adest, & corpus attenuatur. Hunc per eadem curato, uelut à dysenteria detentos. Morbus autem fit, quum ex capite & superiore uentre, pituitae defluxus fit in uentrem inferiorem. Quod ubi contingit, cibi ab ipso frigeunt ac humectantur. Et secessus ipsorum non putrefactorum uelox contingit. Et corpus liquefit, dum simul cibi per multum tempus in uentre non concoquuntur, & simul à uentre calido, praeter naturam calescit.

Profluuium uentris longum quum derinuerit, secedunt primum quidem liquida, quae sunt ingesta: postea pituita. Et probe quidem edit, uerum à multo secessu debilis ac tenuis fit. Hunc sursum uersus reficcato, uerato in potu dato, & capite à pituita purgato. Ventrem quoque lacte cocto eluito. Deinde reliqua cibis ac potibus curato, à quibus uenter & totum corpus reficcetur. Morbus autem ab isdem fit, à quibus etiam intestinorum leuitas. Hi morbi, dysenteria inquam, & lienteria, ac diarrhoea siue profluuium uentris, consimiles sunt. Et oportet ipsos sic sanare, ita ut defluxum à capite & superiore uentre intercipias, aut auertas. Morbi enim natura hinc est. Et nemo sententiam tuam reprehendet. Ferme autem & reliquos morbos sic considerare oportet, unde unicuique natura sit. Et si sic consideraueris ac deprehenderis principium morborum, minime aberraueris.

Tenesmos ubi apprehenderit, secedit sanguis ac mucus, & dolor fit in uentre inferiore, maxime ubi ad secessum deuenerit. Huic conducit uentrem humectare, & pinguefacere, ac tepefacere. Et quae infunt subducere, & calida lauare, excepto capite. Solet autem hic morbus plures cibos expetere, Formina enim euacuato uentre à sanguine ac mucositate pertranseuntibus, & ad intestinum allabentibus, sunt. Quum autem infunt cibi, minorem mordacitatem intestino inferunt. Et fit quidem ex isdem à quibus & dysenteria; uerum debilius, & breuis, & non lethalis.

Quum ex uino aut à conuiuio, bilis superne ac inferne fluxus, aut diarrhoea corripuerit, diarrhoeae quidem conducit ieiunare. Et si sitim habeat, uinum dulce dare, aut uuarum passaru dulcium retributa. Ad uesperam uero danda sunt, quae etiam his qui à pharmaco purgati sunt dantur. Si uero non cesset, uelis autem sedare, uomitum à cibo, aut lenticulae decocto facito, & costum sursum reuellit in infernum secessus. & si succo lentium aut ciceru infuso elueris, etiam sic sanè sedabitur. At uero his fluxui conducit, si dolor adsit, dare quae in pharmacis scripta sunt sedantia dolorem. Venter autem curetur, tum superior, tum inferior, per potiones humectantes, & per balnea calida corpus mollientia, capite excepto. et sic tum uomitus pro diuio fit: & si liquor aliquis ingressus fuerit, ea quae aduersantur sursum reuoluntur: tum infernus secessus magis prodit. Si uero euacuaueris, uiolenter uomuntur, & uiolentius secedunt. Ad uesperam uero dato & huic ea quae dari solent ei qui pharmacu bibit. sunt autem & hi dolores qui ex potationibus aut ex conuiuio oriuntur, quum cibi & potus plus solito in uentre ingressi fuerint, & quae ex

Intrinfecus corpus supercalefacere solent, bilem ac pituitam mouerint. Vrinae stillicidij modi quidem multi & omnigeni sunt. Conducit autem forinfecus quidem corpus balneis calidis mollire. Intrinfecus uero humectare, alium quidem per cibos, à quibus fluida fiat. Vesicam uero per potus, à quibus urina quam plurimum diffunditur. Danda sunt & urinam cientia medicameta, quae scripta sunt in medicamentario libro sedantia dolorem. Morbus autem fit à pituita. Et quum quidem uesica siccata fuerit, aut perfrigerata, aut euacuata, dolorem exhibet. Quum uero humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus fit autem senioribus diuturnior hic morbus. Junioribus autem breuior. Neuritis uero lethalis. Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxae iuncturam, & summas nates, ac coxendicem. Tandem uero etiam per totum crus dolor uagatur. Huic confert quum dolor tenuerit, mollire in quacunq; tandè cruris parte dolor hæserit, per balnea, & tepefactoria ac fomenta. Et aluū subducere. Vbi uero quieuerit dolor, pharmacū dandum est infra purgans. Et postea bibat lac asininum coctum. Doloris autē gratia dentur quae scripta sunt in medicamentis. Morbus hic fit, quum bilis & pituita in sanguisquam uenā incubuerint, aut ex alio morbo, aut aliter quantūcūq; sanguinis à pituita & bile cōpactum ægrotarit. Hic enim per crus uagatur per sanguisquam uenam: & ubicūq; cōstitit, sibi etiam dolor manifestus fit maxime, molestus quidem, sed non lethalis. Si uero in unum aliquem locum incubuerit dolor, & cōstitit, & medicamentis non fuerit exactus, urito quocūq; loco fuerit dolor. Vrito autē lino crudo.

Articularis morbus quum tenuerit, corripit calor & dolor corporis articulos. Corripit autem acutus, & in aliū atq; alium articulum dolores incumbunt, tum acutiores, tum molliores. Huic conducit adhibere qua parte dolor hæret, frigefactoria. Et quae insunt ex aluō subducere, per clysteres, aut glandem subditam. Ad forbendum uero & bibendū dato quodcūq; tibi conducibile uisum fuerit. Quū uero dolor intus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dato, & post hoc serum coctum, & asininū lac. Hic morbus à bile fit & pituita, quum cōmota in articulos incubuerint. Et breuis quidem fit & acutus, non autem lethalis. Solet autem iunioribus magis quam senioribus contingere.

Podagra uiolentior est omnibus eiusmodi circa articulos morbis, & diuturnissimus ac ægre cedēs morbus. Et est quidem hic morbus sanguinis in uenulis à bile ac pituita corrupti. Quanto autem in tenuioribus fuerit uenulis, & in plurima corporis necessitate cōstitutis, & in neruis, et ossibus multis ac densis: tanto sanè durabilior est morbus, & qui egerime depelli possit. Conducit autem & huic eadem quae morbo articulari. Et longus quidem est & hic morbus ac molestus, sed nō lethalis. Si uero in digitis dolor relinquatur, uenas paululum supra articuli in digito nodum inurito. Vrito autem cum lino crudo.

Morbum autem regii sic curare oportet. Extrinfecus quidē corpus molliendum est balneis calidis. Aluus uero & uesica humectanda, & urinam cientia danda, quae sunt praescripta. Si uero fortis fuerit, purgato capite, pharmacū quoddam potandū dato quod bilem deorsum purgat. Postea uero urinā cientibus utendum est. Morbus aut fit, quum bilis commota sub cutem uertitur.

Quod si hæc nouerit uir idiota, nō similiter in incurabiles morbos incidit. Solent enim morbi ex paruis occasionebus magni ac diuturni fieri. Et quicūq; cibi

cibi, aut potus, aut forbitiones congrue ac consequenter se habent, & quacūq; pharmaca doloris gratia, ea omnia sine periculo semper exhibētur, si iuxta præscriptum exhibueris. Quacūq; uero pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his pericula fiunt, & culpæ medentibus imputantur. Quàm maxime igitur ea uitare oportet. Atq; hi quidem sunt morbi qui circa uentrem fiunt. Excep̄tis pectore suppuratis, & tabidis, & muliebribus morbis. Hi enim seorsim describentur. Tubercula quæ enascuntur omnia, à pituita aut sanguine nascuntur, quum sanè à uulnere, aut casu fuerint collecta. Cōducit autem horum aliqua cataplasmatibus integere, & per pharmaca in potu data diffundere. Alia qua uero impositis cataplasmatibus maturare, & diffundūt quidem cataplasmata, quæ quum calida sint humectant, & non in seipsa trahunt. Maturant autem, quæ calefacientia contrahunt. Quum uero aliquod factum fuerit, aut sua sponte ruptum, pharmaco humorem repurgare conuenit, ubi autem pus esse fluere desiuerit, uelut ulcus sanare. Lepra, & pruritus, & scabies, & impetigines, & uiriligo, & alopecia, à pituita fiunt. Sunt autem talia turpitudine magis q̄ morbi. Fauus, & strumæ, & pani, & furunculi, & carbunculus, à pituita fiunt. Quo uero hæc depurges, pharmacis sic utendum est. Quicūq; biliosus fiunt, his dato ea à quibus bilis purgatur. Pituitosis uero, ea à quibus pituita. Atabiliarijs autē, ea à quibus atra bilis. Hydropicis ea per quæ aqua. Quæcūq; uero pharmaca in potu dantur, & non purgant neq; bilem, neq; pituitam, ea quum in corpus ingressa fuerint, uim exhibere oportet, aut frigefacientia, aut calefacientia, aut siccantia, aut humectantia, aut contrahentia, aut diffundentia. Quæ uero somnum faciunt, ea quietem sanguini exhibere oportet. Quum ad ægrotum deuenieris, interrogare oportet quæ panitur, & ex qua causa, & quot iam diebus: & an ueter secedat, & quo uictu utitur, Et primum considerare, an morbus à bile aut pituita factus sit, aut utriusq;. Et hoc probe nosse conuenit, q̄ necesse est, ut ab altero horum, aut utriusq; fiat. Deinde utrum siccitate aut humiditate opus habeat. Aut aliqua quidem partes corporis siccitate, aliqua uero humiditate. Postea an morbum sursum purgare oportet, aut deorsum, siue per uesicā. Et an augetur morbus aut marcescit, & an soluitur, aut in alium tran sit. Vulneratos fame affligito, & ex aluo quæ insunt subducito, aut per clysterem, aut pharmaco infra purgantem exhibito, & in potu dato aquam, aut acetum. Aut forbitiones præbeto. Inflammata cataplasmatibus frigefacito. Talia uero cataplasmata sint, aut betæ coctæ in aqua, aut apium, aut oleæ folia, aut fici folia, aut rubi, aut quercus, aut mali punicæ. Atq; his coctis utendū est. Crudis uero rhamni folijs, aut uiticis, aut saluig, aut Tithymali. Aut pulegiū uiride, aut porri, aut apium, aut coriandrū, aut ifaticidis folia impone. Si uero nihil horum habueris, neq; ullum aliud cataplasma, polentam aqua aut uino subactā imposito. Tanto autem tempore hæc cataplasmata profunt, quanto frigidiora fuerint q̄ ulcus. Quū uero fuerint calidiora, aut similiter calida, nocēt. Pinguiā ad inflammata nō conducunt, neq; ad ea quæ non sunt purgata, neq; ad putrescentia. Sed ad inflammata conferunt frigida. Et ad impurgata ac putrescentia, acria faciunt, & quæ mordacitatem aliquam inducentia purgant. Vbi uero carnem producere uoles, pinguiā & calida magis conducūt. Ab his enim caro putat. Quibuscūq; cibis aut potibus homines sani in uictu utūtur, ex his

oportet praesentibus uti ad aegrotos, ita ut prepares calidos et frigidos, et humidos, & siccos. Ex frigidis quidem calidos, & calidos ex non calidis, & siccos ex non siccis, & reliquos iuxta eundem modum. Neque uero de praesentibus desperare oportet, tanquam nihil possint, & absentes quaerere, qui nullam utilitatem aegro afferant. Comperies autem, si recte consideraueris, extra hos, paucos quibus ad aegrum utaris. Sorbitiones autem in morbis omnibus dato, aut psisanam, aut milium, aut farinam, aut alicam. Et quaecumque ex his dederis ad secessum, tenuia dato, & magis percocta, & dulciora potius quam saliora aut calidiora. Quae uero ad robur aut refocillationem, crassiora, pinguiora, & moderate cocta. Potibus autem utendum est, si quidem alium & uesciam subducere uelis, uino dulci aut aqua mullata. Si uero adstringere, austero, albo, tenui. Si corroborare, austero, nigro. Qui uinum bibunt citra affectionem erga ipsum, his dandi sunt potus qui praeparantur, & in medicamentario libro scripti habentur. His qui medicamentum biberunt, post purgationem detur, febrientibus quidem, aut lenticula, aut milium tenue, aut psisanam succus. Danda est autem psisana & milium, uelut quae leuia sunt. Alica uero uelut omnium robustissima. Et farina uelut his robustior. Lenticula autem odorata praeparetur, & modica secundo loco detur, ut quae leuis sit forbitio, & stomacho grata sursum uersus. Ammisceatur autem aut sal, aut mel, & cuminum, & oleum. Ad lenticulam uero ammisceatur pulegij herba, & parum aceti. Non febrientibus autem, panis puri medullam in iusculum interito, aut mazam & frustum piscis dato, aut ouiculae tenerrimae carnem, aut uolucris aut catuli coctam. Febrientibus autem etiam betam dato, aut cucurbitam, aut blitum. Et post cibum bibant uinum uinosum, uetus, album quam aquosissimum.

Quibus lauari non conducit, ungantur uino & oleo calido, & alternis ex tergeantur. Quum alium debilis, a cibis humectare uolueris, mazam dato & obsonia. Et marinorum quidem piscium frusta cocta cum intrito, carnes autem ouiculae tenerrimae, aut hedi, aut catuli, aut uolucris coctas. Et betam aut blitum, aut rumicem, aut cucurbitam, si tempus tulerit. Ex oleribus uero apium, & anethum ac ocimum, & uinum mellei coloris, uetus, album item ac aquosum.

Quum uero siccare uolueris corpus, panem dato, & obsonia asina, & sicca, & haec omnia calidiora, & carniuum partes carnosas: pisces, petrosos: olera, rutam, aut thymum, aut origanum. Vinum uero nigrum austerrum. Praeparantur autem obsonia cum sale & cumino. Alijs uero condimentis parcissime utendum est. Quum autem ex morbo refocillare uolueris, alia quidem eadem dato, quae exhibes quum uentrem humectas. Verum pro lactentibus carnes fortiores, & pro catulinis, uolucruum ac leporinas, & ex his aliquas assatas, tum de carnibus, tum de piscibus, & quam optime praeparatas. Quibuscumque morbis siccitas conducit, his semel in die cibum exhibere expedit, & cibos ac potus pauciores dare, quam ut repleantur, & hos laboribus ac deambulatione perficere, & quam minimum dormire. Quibuscumque uero humiditas conducit, his expedit in ediam non ferre, & cibi ac potus non indigos esse, neque laborare, & dormire quantum uoluerint. Quoscumque cibos, aut obsonia, aut potus aegroti concupiscunt, exhibere, si non corpori damnum inde accessurum est. Quum aut cibum aut potum augere in ceperis aut detrudere, paulatim & additiones, & subtractiones facere oportet. Quicumque cibos sufficientes perficere possint, his sorbitiones ne dederis. Excludunt

cludunt enim cibū. Qui uero nō possunt, his dato. Si uero quid dare uolueris refectionis gratia, alicā dato, et pūsanā triticam. Hæ enim forbitiones sunt fortiores. Dantur aut post cenam. Pharmaca quæ potantur, & quæ ad uulneta adhibentur, discere oportet: omnibus enim hoc expositū ac procliuē est. Non enim ex intelligentia homines hæc reperiūt, sed potius ex fortuna. Neq̄ artifices magis q̄ idiotæ. Quæcūq̄ uero in arte medica, intelligentia discūtur & reperiuntur, aut de cibus aut de medicamentis: ea ab his qui dinoscere possunt quæ in arte sunt, discere oportet, si quid discere uelis. Post forbitiones cibum debilibus dato, & uinū uinosum insuper bibendū. Ante cibos uero & potus aut forbitiones, & postea, & cibū & potum quicūq̄ tandem tibi uidebitur de bilibus exhibeto, ita ut & corpus & animā inspicias. Sic enim maxime profueris. Quam facultatē singuli cibi habeant, coniectare oportet, ex his qui uim manifestam faciūt. Quicūq̄ flatum, aut morsum, aut repletionē, aut ructū faciunt, aut tormen, aut secedūt, aut nō secedunt: hi manifesti sunt q̄ hæc operantur. & ex his etiam alios cōsiderare oportet. Habēt enim singula edulia, & quo profunt, & quo lædunt. Verū alia manifestissime operantur quæ operantur, alia uero obscurius. Cibi & obsonia præparantur ac exhibentur debilibus, à quibus neq̄ flatus fit, neq̄ ructus acidus, neq̄ tormē. et quæ neq̄ ualde per aluum secedūt, neq̄ ualde reficantur. Hæc autē sic sunt. Quæcūq̄ quidē uenter superat, et corpus ipsa suscipit, ea neq̄ flatū exhibent, neq̄ tormē. Si uero uenter non superarit, ab his & flatus, & tormē, & alia huiusmodi fiūt. Leuissima sunt cibaria, & potus ac obsonia, quæ moderata in corpus ingesta, aut paulo amplius supra modum, neq̄ repletionē exhibent, neq̄ tormen, neq̄ flatū, neq̄ aliud quiddam eiusmodi, & celerrime cōcoquuntur, & cōcocta secedunt, & per omnem diem in uentrem ingesta, minime molesta sunt, etiam si diu antea fuerint ingesta. Grauiora autem sunt, quæ moderata exhibita, aut infra modum, repletionem & dolorem exhibent. & quæ neq̄ dari, neq̄ edī, neq̄ bibi possunt, ut non dolorem exhibeant. Et si quis ipsa per tempus rursus bibat aut edat, etiam sic dolorem exhibent, & non pro ratione secedunt. Ad sanitatē optima sunt, quæ modice ingesta, sufficiunt, ut & famis & sitis sint medela. Et plurimo tempore corpus ipsa suscipit, & pro ratione secedunt. Ad robur autem optima sunt, quæ carnem plurimā ac densissimam producant, & sanguinē crassificant, & pro ingestorū ratione secedunt. & corpus plurimo tempore ipsa suscipit. Pringua, & caseosa, & mellita, & ex sesamo parata, ructū acidum maxime faciūt, & bilis fluxum superne ac inferne, & tormen, & flatum, & repletionē. Hoc ipsum etiam cōtingit, quum quis plura ederit aut biberit, q̄ uenter cōcoquere potest. Debilibus si quidem pro morbi ac corporis ratione dederis, quæcūq̄ tandem dederis, consumit hæc corpus, et neq̄ in digum est, neq̄ repletum. Si uero aberraris à temporis occasione, detrimentū in utraq̄ sequitur. Quæcūq̄ cibaria aut potus, aut obsonia corpus suscipit, ab his maxime neq̄ tormen fit, neq̄ flatus, neq̄ ructus acidus. Quū enim in uentrem ingesta fuerint, corpus ab ipsis trahit quod ipsi commodum est. Et necesse est iam quod restat debilius esse, q̄ ut tormen, aut flatum, aut aliud quiddam huiusmodi in uentre faciat. Vina dulcia, & austera, & mellei coloris uetusta, uentrem subducunt, maximeq̄ urinam cient ac nutriunt, & neq̄ flatum exhibent, neq̄ tormen, neq̄ repletio-

nem. Carnes percoctæ & exassatæ, utræq; debiles sunt ad robur augendū. Ad secessum uero percoctæ cōmodæ sunt, Assatæ uero magis sūt. Quæ uero moderatā habent & cocturā & assaturā, hæc & ad robur, & ad secessum moderate se habent. At uero crudiore ad robur quidem cōmodæ sunt, sed nō ad secessum. Ex cibus ac potibus qui cōmodissimi sunt corpori ac maxime sufficientes, & ad alimētum, & ad sanitatē, ex his ipsis etiam, ubi quis ipsis non in tempore utatur, aut pluribus q̄ tempestiuū est, & morbi, & ex morbis mortis fiunt. Reliqui uero cibi ac potus, qui talem uim non habent, parum utilitatis afferūt, etiā si quis semper ipsis in tēpore utatur, parum autem etiam lædunt. In utræq; enim partem debiles sunt, ut & boni aliquid faciāt, & mali. Sunt autē cibi & potus qui hāc uim habēt hi, panis, maza, carnes, pisces, uinum, & ex his alijs magis, alijs minus. Quicūq; ex sicco uictu uiuunt, his nō cum cibo potus detur, sed post cibū, multo tempore interposito. Et sic quidē siccus humor à siccis cibus ortus, corpus siccatur. Si uero quis simul cum cibo bibat, cibus humidior factus, corpus humidius facit. Panis calidus, & carnes calidæ, ipse per se comest, siccatur. Si uero cū liquore dederis, aut statim à cibo potū prebueris, nō siccatur.

Panis purus ex farinis, ad robur ac refectiōē commodior est, q̄ qui nō est ex tenuibus farinis paratus, & recēs utilior est q̄ uetus, & ex farinis recentibus melior q̄ ueterib. Polenta ex ordeo non madefacta, sed circūcirca conspersa ac decorticato, fortior est q̄ ex madefacta: & recens quā uetusta. Et maza prius subacta fortior est, quā nō subacta. Vinū diffusum, ac perfrigeratū, & excolatum, tenuius sit ac debilius. Carnes coctæ, si quidē percoctas feceris, debiliores sunt ac leuiore. Assatæ uero si exassatæ fuerint, et inueteratę ex aceto aut sale, debiliores sunt & leuiore recentibus. Debiles ac leues cibi, uentrē quidem nō lædunt, neq; corpus, eo quod calefacti non intumescūt, neq; replent, sed cito mollescunt, & cōcocti secedunt. Humiditas autē ab ipsis debilis corpori accedit, et neq; augēt, neq; robur memorabile exhibēt. At fortes cibi, et intumescūt, ubi in uentrem ingestū fuerint, & replent, & difficilius quidē ac tardius concoquuntur, & nō secedunt. Verū humor ab ipsis fortior ac incorruptus accedēs, multum robur ac augmentum corpori addit. Ex carnibus leuissimæ sunt in corpus, caninæ, & uolucruū, & leporinæ coctæ. Graues autem sunt bubulæ. Et porcinæ moderatiore, flatum autē faciunt, & coctæ & assatæ. Et sanis autē & debilibus conueniunt ouillæ. Suillæ uero his qui laborant & exercitātur, & ad bonum habitum, & ad robur cōmodæ sunt. Debilibus autē & priuatam uitam degentibus, fortiores. Sed & ferinæ mansuetis leuiore sunt, eo quod fructū non similem edunt. Differunt autem & pecorū carnes, & eorum quæ fructū edunt, & quæ non edunt. Et fructus nō idem in omnibus facit, sed partim densam ac fortem uictimā carnem efficit, partim raram & humidam, ac debilem. Ut in summa dicam, pisces leues sunt edulium, & cocti, & assati, & ipsi per se, & cū alijs cibus. Ipsi uero inter se ipsos sic differunt. Stagnorū pisces, & pingues, & fluuiatiles, grauiore sunt. Littorales autē marini, leuiore. Et percocti assatis sunt leuiore. Ex his itaq; fortes dato, ubi reficere aliquē uoles. Leues uero, ubi gracilem & tenuem facere oportuerit. Balneum calidū moderatum quidem, mollit et auget corpus. Quod uero opportunū modum excedit, siccatur quidē corporis partes humectat, humiditas uero resiccatur. Et siccatur quidem humectatur.

citatē debilitatē & animi deliquium exhibet. Humidæ uero siccatae, siccitatē ac
 fitim. Ex oleribus allia, & cocta & assata, urinā cient, & per aluū secedunt, &
 ad menses muliebres cōducunt. Cepæ ad urinas cōmodæ sunt. Succus enim
 acrimoniam quandā exhibet, ut secedat. Atq; his quidem sic utēdum est, sed
 debilibus non exhibenda. Apium & coctū & crudum urinā ciet, & palustre
 magis q̄ fatiuū, quod etiam maiorem uim habet. Coriandrū stomacho gra-
 tum est, & per aluum secedit, tum coctū, tum crudum. Ocimū & humidū est
 & frigidū, ac stomacho gratum. Porrū coctum quidem urinā ciet, & secedit.
 Crudum uero æstuosum est & pituitosum. Malum punicū reficit & pituito-
 sum est, et cū nucleo quidem, aluū sistit. Citra nucleū uero, secedit. Calidi cibi,
 sicci quidem sistunt, humorē enim in uentre reficcant. Si uero humidi sunt, hu-
 mectates per caliditatē, aluum subducunt. Acerba siccant, & cōtrahunt cor-
 pus. Habent & uim sistendi. Acida attenuant, morsum inducētia. Salsa se-
 cedunt, & urinam cient. Pingua & dulcia, humiditatē & pituitam exhibent.
 Reficiunt cucurbita, & beta, & bilitū, & rumex, & per humiditatē secedunt.
 Brassica uero acrimoniam quandam habet ad secessum, & simul boni succi est.
 Caseus, & sesamū, & uua passa, reficiūt & pituitosa sunt. Vinū dulce, et mellis
 speciē referens, ambo & reficiunt, & urinā cient, & pituitosa sunt. Austera ue-
 ro, ad robur & siccitatem commoda sunt. Vrinam autē cient etiam austera uetu-
 sta, quæ alba & tenuia existunt. Oleum & quæcūq; oleosa, reficiūt et pituitosa
 sunt. Ex oleribus coctis secedūt, quæ ex natura humidissima aut acerrima
 sunt, aut caliditatē habent. Dāda autē sunt hæc tepidiora ac flaccidiora. Sic enim
 ad secessum cōmodant. Cucumis pepo, & urinā cit, et aluo secedit, ac leuis est.
 Alter autē pepo, frigiditatē quandam exhibet, et fitim sedat. Alimētum uero
 à neutro horū contingit, nisi tenue quoddā. Sed neq; malum, neq; memorabi-
 le. Mel cum alijs quidem comestū, et nutrit, et bonū colorem exhibet. Ipsū
 autem per seipsum attenuat magis q̄ reficit. Nam & per urinā, & per secessum
 plus iusto expurgatur. Vrinam cientia in uentre & cito calehūt, & calefacta
 marcescūt ac liquecūt, & ob id citum secessum faciūt. Stabiles autē ac aluum
 sistentes cibi, & calecūt, & calefacti cito reficcantur ac compingūtur, & propter
 ea obduri facti, nō secedunt. Quæ per aluū secedunt, succosa sunt, & natura
 calida. Quæ uero urinam cient, sicca & frigida. Frumentū & uinū, differūt
 quidem & ipsa inter seipsa ex natura, tum robore & debilitate, tum leuitate ac
 grauitate. Differt etiā locus à loco, ex quo illa fuerint. Est enim alius aquosus, a-
 lius aquarū inops, & apricus, & umbrosus, & bonus, & malus. Quare omnia
 hæc ad hoc cōferunt, ut singuli cibi aut fortiores sint, aut debiliores. Quicūq;
 sanē panē comedere solitū fuerūt, his dandus est et in morbis. Quū quis cibos
 aut potus plures solito acceperit, si nō solito more perfecerit, optimū est ut sta-
 tim reuomat. Poma & fructus arborei, tum molles, tum duri corticis, propter
 ea post cibum molestiora sunt, & sano, & debili, quia corpus eius qui cibū sum-
 pte, solū ab ipsis humores trahit. Si uero ieiunus quis edat, plures. Quicūq;
 cibi aut flatum, aut æstum, aut morsum, aut repletionē, aut tormen faciūt, à tali-
 bus liberat uinum meracū in super potatum. Corpus enim à uino calefactum,
 per calorē amouet ea quæ insunt à cibis & potibus ac similibus. Venter ali-
 quando perturbatur, aliquādo sistitur, aliquādo etiam pro ratione secedit. Cur

autē hęc sic se habēt: primum quidem uenter quū humidior fuerit, & quū si cior, susceptū cibum corrumpit. Deinde quū mutatio facta fuerit, siue ex frigore ad caliditatē, siue ex caliditate ad frigiditatē, itidem corrūpit. Quare necesse est uentrē, ab iisdem cibus ac potibus propter hęc ipsa, & molliorem fieri, & duriorē. Cibaria & potus & obsonia, excepto pane, & maza, & carnibus, & piscibus, & uino, & aqua, reliqua omnia tenues ac debiles utilitates exhibēt, ad augmentū, & ad robur, & ad sanitatē. Tenuia item ac debilia mala ab ipsis sūt.

Quoscūq; ægrotos, febres nō continenter detinent, sed intermittētes corripiunt, his cibi dandi sunt post apprehensionē, ita ut coniecturā facias, ne febris à recens accepto cibo irruat, sed cibus iam cōcoctus. Vinū & mel optima iudicata sunt in hominibus, si iuxta naturā & sanis, et debilibus cū temporis opportunitate ac mediocritate exhibeantur. Et bona quidē sunt ipsa per se ipsa, bona uero etiā permixta, & tū alia, tū quācūq; memorabilē utilitatē habēt. Quęcūq; sanis cōmoda sunt, ea etiam ægrotis exhibita fortiora sunt. Et oportet detractio ipsorū uigore ea dare, alioqui nō feret ipsa corpus, sed magis lædūt, q̄ profunt.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE INTERNIS AFFECTIONIBVS, IANO

Cornario Medico Phifico interprete.



In pulmonis arteria fuerit exulcerata, aut aliqua tenuis uentula ex his quę in pulmonē dependent, rupta fuerit, aut aliqua fistula ex his quę per pulmonē distatę sunt: & alia in aliam distracta fuerit, & sanguine fuerint impletę: distrahuntur sanę ac rumpūtur ob has maxime causas, propter laborē, propter cursum, ob casus, ob plagas, ob uomitus uiolenter fiētes, ob febres. Hęc igitur patitur. Primū quidem tussis sicca obtinet. Deinde paulo post expuit saluam subcruentā, aliquando autē puram. Et si quidē hic breui à morbo liberetur, satis est: Si uero nō, temporis progressū sanguis amplior prodit, aliquādo purus, & aliquādo etiam subputridus. Sæpe uero etiam fauces nō animaduertētibz sanguine implentur. Postea sanguinis grumos paulatim & frequēter emergētes rejciunt. Aliquādo uero etiā graueo lentia ab ipsis cōtingit. et fauces aliquādo spuma quadā replentur. Et rigor ac febris apprehēdit, circa initia quidē morbi, uehēmēter: In progressu autē debilius, & aliās atq; aliās corrūpit. & dolor quādoq; in pectoribus in situs est, & in dorso, et in lateribus. Et ubi sanguinē spuere deserit, saluā multam liquidā expuit, quādoq; uero etiā uiscosam. Atq; hęc quidē sic patitur donec quatuordecim dies præterierint. Post hos uero si nō desuerit morbus, squamas ab arteria tussifēdo auellit, quales à pustulis decedūt. et dolor incidit in pectus, & in dorsum, & in latus. et præcordia cōtingens uelut ulcus dolet. Huic cōducit ut q̄ maxime quietē intus habeat, si morbus sic se habuerit. Si enim quid laborarit, et dolor accutior, et tussis magis q̄ prius premit, et rigor ac febris magis occupat. Et si ster nutauerit, dolor acutus irruit. Dolet autē & in lecto, quū se circumuertit. Huic cibos quidē eosdem, quos & pectore suppurato exhibere oportet, uerū hos non multos. Ex obsonijs autē his utatur. De piscibus quidē, squatina, aut pagro, aut galæo

galæo magno albo, aut alijs similibus, omnibus cū rhoe et origano cōditis. Carnem autē edat galli affatam, sine sale, aut capræ coctā, & uino austero uetustissimi ac iucundissimo nigro utatur. Deambulationib. autē moderatis. Verūtamē hęc fiant febre non tenente. Si uero febris tenuerit, forbitione farinæ aut milij utatur. Si uero cibos assumat, paucos assumat, & obsonia per aliuū secedentia. Et si pharmaco tibi utendū esse uidebitur, cnidio cocco, aut tithymalide ipsum subpurgato. Et post purgationē, farinæ coctæ pinguis heminā absorbendā dato. Deinde q̄ maxime reficito, ut q̄ minimum tenuis sit. Ad huiusmodi enim morbū non conducit tenuē esse. Deambulationes etiā primū pauca faciat, ut ne lassitudo succedat. Fomentum uero aliās atq; aliās adhibeatur. Et qua die fomentum adhibetur, sine cibo sit excepta farina coctā, cuius heminā absorbeat. A quam aut bibat. Postera die minus q̄ solitus fuit edat, & bibat uinū nigrum, iucundū, austerū modicum. De cætero uero bis aut ter in die cibi dentur. Sic autē huic paulatim dato, donec uentrē confirmaueris. Nam ex febris & inedia, si os quidē appetiuerit, uenter autē suscipere noluerit, ubi acruatim susceptis, inflammatur. Quare paulatim dare oportet. Si uero acruatim dederis, & parū laborarit, deambulationibus uenter nō perfrigeratur, nimirū cibus quiete compctis. Quare etiā febris succedere solet, & hyeme quidē minus, æstate uero periculū est ne delinquat. Hūc q̄ maxime reficere oportet, quo q̄ crassissimus fiat. et deambulationibus moderatis utatur, & minus solito luctetur, & parū labore primū, deinde amplius, nunquam aut multū, hęc si fecerit, celerrime sanus erit. Si uero tenuis fiat propter laborē, remittat ac quietē agat. Hic ubi sanus fuerit, neq; ad uentū celeriter currat, neq; equū, neq; currum cōscendat. Viter etiā uociferationē, & iracundiā. Periculum est enim ne morbus reuertatur. Quare hęc omnia uitare oportet. Si uero cibū auerferat, eruum torreto, et cortice depurgato, deinde per tridū in aqua macerato, singulis autē diebus aquā diffundito, & aliā affundito. Postea quarta die excolato ac reficcato, deinde tenuissime molitum cribrato. Et lini semen tostū tundito ac terito. Et sesamū tostū tundito ac terito. Et polentam nō salām, purā, tenuem accipito. Et erui quidē ac polentæ, amborū æqualis sit mēsurā, sesami uero tertia pars, lini uero dimidia unius partis. Hęc in lacte caprino coctā q̄ liquidissime absorbeat. Postea uero in prandij ipsi dentur cibi puri, et obsonia fortiora. Vinum autē idem bibat. Dato autē ipsi et cetauræ radices, ad has rupturas facientes, in uinū ipsas deradens, dato item dracontij radices in uinū derasas. Sed & tussis gratia, dracontij derasum in melle delingendū dato. Et si decoctū in lacte affuerit, se forbere non posse, lac bubulū q̄ plurimū bibat, tertia parte aque mulsæ ammixta. Atq; sic celerrime sanus erit. Morbus autē curatione multa opus habet. Est enim difficilis. Si enim curatus et sanus factus nō seipsum custodierit, pleriq; reuertēs morbus in teritus causā fit. hic si quidē ab hac curatiōe sanatus fuerit, satis est. Sin minus, ipsum lacte crasse factū, & in pectore, et in dorso urito. Si enim successerit uisio, fugæ morbi spes est. Si uero arteria cōuulsa fuerit, aut aliqua uena ex his que ad pulmonem tendūt, hęc patitur. Ab initio quidē morbi, tussis acuta obtinet, & rigor, & febris. et saluā expuit multā, albā et spumosā, aliquādo uero subcrūtā, & dolor caput ac collū detinet. hic morbus fortior est priore. & usq; ad decē primos dies talia patitur. Postea pleriq; undecima die pus crassum uiolētē ex-

puunt. Decimaquarta uero die puriora expuit, si euasurus est, & dolore minus uexatur, & breui sanus fit. Si uero morbus diuturnus futurus est, tunc & pus multo amplius expuit, et reliquus dolor multo amplior in corpore inest. Calores aut debiliores habent quā prius. Hūc si à principio acceperis, infra subpurgato scammoniae succo, si nō febricitarit. Post purgationē autem accipiat ea quae prius, et alia eadē a sumat, quieto quā maxime corpore, et molliter cubet. et haec quidē ab initio faciat usque ad decē dies. Si uero pectore suppuratus fiat, eadem quae etiā prius faciat. Si uero sanus fiat, ab his cibis ac potibus abstinere oportet, ab acidis, & acribus, & salis, & pinguibus. A labore itē ac iisdem à quibus prior, abstineat. Haec si fecerit, celerrime à morbo liberabitur. Si uero quid horum nō fecerit, rursus reuerso morbo periclitabitur, et morbus peior erit. Nam multi rupto pulmone uitā degunt, donec moriātur. Hunc si nō statim quis curat, recidiuāte morbo postea nō habueris quo prodesse possis, nisi haec feceris. Lacte bubulo crassefactum, in pectore et dorso urito. Si enim ustio successerit, proderis. Morbus aut hic ex iisdē delictis fit, ex quibus etiā prior. Pneumoniae siue pulmonia, ab his maxime fit. Quū pulmo sanguinē in seipsum traxerit, aut pituitā salfam, et non rursus dimiserit, sed in ipso coacta ac cōpacta fuerint: ab his tubercula fieri solent in pulmone et suppurari. Hic autem haec patitur. Ab initio et per totum morbum tussis acuta sicca obtinet. Et rigor, et febris, et dolor in pectoribus et in dorso incubit. Aliquādo etiam in latere. et erecta ceruice spiratio uehementis incidit. hic usque ad quatuordecim dies talia patitur. Sepe uero etiā plures. Deinde erumpit pus, et multū expuit. Saepē uero etiam uelut araneorū tunicas expuit. Saepē etiā subruentum. Et si quidē depurgatus fuerit et breui gracilis factus pulmo, interiū effugit. Si uero nō adheret, et per annū morbus tenet, et transmutatur, ut aliās alia aeger patiatur, huic in principio ante tequā pus erumpat, haec adhibere oportet. Quū febris remiserit, multa calida lauetur, et forbitionibus multis utatur. Pitifanae succū coctum, melle ad coctū affuso, sorbeat. Et uinum bibat dulce album, aut aquā mulsam coctam. Quū uero pus expuere inceperit, eadē bibat, quae prior suppuratus, & cibis ac potibus, & obsonijs iisdē utatur, abstinens ab acidis, & acribus, et salis, ac pinguib. Et a uenere ac ebrietatibus, nisi morbo cōmodum fuerit. Ex coloris aut inspectiōe est mandū est, qualibus opus habere uideatur. Reliqua uero eadē faciat. Bibat etiā lac bubulū, ac caprinū pro tēpore. prius aut subpurgetur lacte alinino cocto. Bibat etiam equinū lac excolatum quotidie mane, poculi tres heminas cōtinentis mēsurā, si facere poterit. Si quidē igitur sic curatus melius habebit, satis est, et si nō eruperit pus in pectus, ipse seipsum curet, quietē quā maxime corpori exhibēs, et quae cōmoda sunt sibi ipsi exhibēs. Si uero erupat pus in pectus, qua parte tibi significationē de se praebere uidebitur, illic maxime sectione aut uisione facta, pus emittito modicū primum. Reliqua uero eadē facito, quae & in priore suppurato facta descripta sunt. Si in pulmone uarix fiat, tussis sicca corripit, et rigor, et febris in principio quidē morbi ualde uehementē, habet etiā erecta ceruice spiratio. et dolor in capite cōsistit. Et supercilia impedere uidetur. et tumor in facie descendit, & in pectus, et in pedes. Saepē uero etiam in capite innititur. & praē dolore ubi is uexat, respicere nō potest. & corpus subpallidū est, & uenae per ipsum tendunt flammeae, aut nigrae. Huic quū sic habuerit, & dolor maxime

xime premit, primū sanguis detrahatur. Deinde multa calida lauato. Et ubi sitis habuerit, Cyceonem in uino nigro austero q̄ iucundissimo, æquali mēfura aquæ mixtū, bibendum dato. Frigidum aut maxime bibere oportet. Sorbitionibus autem utatur p̄fanae succo cocto, melle bono affuso. Hæc exhibere oportet in primis quatuordecim diebus. Si uero diutius morbus teneat, & dolor amplior fuerit in corpore, & impotentia aderit, huic sic habenti eadem exhibeto, quæ ei qui pulmonē suppuratū habet, ubi quatuordecim dies præterierint. Hic morbus fit à labore, et atra bile. Quū uenæ cauæ per pulmonem tendentes, sanguine aut atra bile impletæ fuerint, uenulæ aliæ in alias rumpuntur, ut quæ in angustijs sunt cōclusæ, & exitum non habeant; & dolorem exhibent ac flatū in pulmone. Hic morbus difficilis est, & multa curatione opus habet. Alioquin agrum non relinquit, & plerūq̄ in multis simul cōmoritur. Si inflammatiō in pulmone fiat, fit autem maxime à uinolentia, & gulositate, pisciū capitonum, & anguillarū. Hi enim pinguedinem habent naturæ hominis infestissimi. Iam uero etiam factus est morbus à pituita, ubi sanguini mixta in pulmone influxerit. Accidit etiam ex carnis esu, & ex aquæ mutatione. Hæc igitur æger patitur. Tussit fortiter, & saliuā expuit liquidam ac multā. Sæpe etiā crassam & albam, uelut à raucedine. Et dolor premit acutus in pectora, & dorsum, & laterū mollitudinem ac latera. Et acidū eructat. Et ex pectoribus ac pulmonibus, uelut ueter murmurat. Et uomit pituitam acidam. & si id quod uomuit in terram effundas, radit terram uelut aceto infuso. & dentes stupefcunt. & rigor ac febris, & sitis fortis detinet, et si quid pingue uoluerit edere, exugitur ad uiscera, et uomitum inducit. Et totum corpus torpor occupat. Quum uero reuo fuerit, paulo leuior sibi esse uideretur. postea ubi uespera diei accessit, uenter sonitum edit, & tormine uersatur, ac murmurat. Huic quū sic habuerit, & tempestiuū esse uisum fuerit, curationē sic adhibeto. Mel & lac, & acetum, & aquā, mixta in ollam infusa tepefacito, & organī capitati ramulis agitato, ubi uero tepida facta fuerint, bibēda dato, aut apprehēsa lingua, sensim per fistulam infundito. Deinde conuolutum quietem habere iubeto. Postea si uomitus succedat, prompte uomat. Si uero nō succedat, irratione per pennam facta uomat. & si quid pituitæ uomuerit, per dies quinque idem faciat. hinc enim leuior euadet. Bibat autem hæc exercitatus, si fieri poterit, & multa calida lotus: Sin minus, saltem lotus. postquam uero quinque dies præterierint, mane ieiunus bibat in aqua mulla, aut uino mulso silphij succū, erui magnitudine: & allium comedat, ac raphanidas ieiunus: et meracū uinum in super absorbeat nigrum, aut album austerum. Bibat etiam inter cibū, & post cibū. Cibis uero siccis, & carnibus carminis utatur coctis, si rigor & febris nō apprehenderit. hic si à tali infusione per fistulam in os, purgetur, fatis est. Sin minus, sursum per ueratrū ipsum purgato. Post purgationem uero farinæ coctæ duas heminas absorbendas dato, melle affuso. Vinum uero idem bibat aquosum. At si non in principio affuerit morbo, lacte ipsum crassifacitum in pectore ac dorso urito, ita enim maxime à morbo liberari poterit. Si uero non fuerit uisus permanet, et non ualde deficit, sed ad senectam usq̄ adhæret. Sæpe etiam cōmoritur, si non in primis quadraginta diebus mortuus fuerit. Quare multa quàm maxime opus est cura. Et seruū ac lac pro tempore bibat, bubulum & caprinū, & afininū ac equinum. Sic enim

facilime

facilime deget. Est autē morbus difficilis. Si pulmo ab erysipelate intumuerit, Hic autem tumor maxime à sanguine fit, quum pulmo in seipsum sanguinem attraxerit, & susceptum tenuerit. Morbus autē hic aestatis tempore maxime fit: Hæc igitur ab ipso æger patitur. Tussis incidit sicca, & rigor, & febris, & erecta ceruice spiratio, & dolor fortis in pectoribus. & nares aperit, uelut equus à cursu. Et linguam exerit, uelut canis aestate ab ardoris flatu uftus. Et tumor detinet pectora, & parum loquitur, & rubor est in facie. & pruritū fert in corpore, & præ dolore decumbere non potest. Sed ipse seipsum anxius iactat. Hic in septem diebus moritur. Verū tamen in principio quum sic habuerit, per hæc curetur. Corpus quidē perfrigeretur, betis in aqua frigida tinctis, ac corpori impositis, in recenti maxime dolore. Aut lintea frigida aqua tincta ac expressa apponito. Et si quidem sic melius habuerit, satis est. Sin minus, terram figularem frigidam pro cataplasmate imposito. et sub dio decumbar. Sic enim tractatus saepe septē dies effugerit. Quū autem septem dies præterierint, & dolor adhæserit, dolentē partem intus, cū oleo illinito, & tepefactoria eadē quæ in pleuride adhibeto: & potionem ad subpurgationē ipsi dato, ex peplo, & meconide, siue peplo, & grano cnidio. Et post purgationē, lenticulæ heminā abforbendam dato. Bibat aut aquam. Postera die multa calida aqua ipsum lauato, capite excepto. Postea origanū in aqua mullā macerato, & bibēdam dato. Ponbusq; q̄ calidissimis utatur. Cibos aut accipiat eosdem quos & qui à pleuride correptus est, si nō febris adhæserit. Hic morbus grauis est, & pauci effugiunt. Si pectus & dorsum dirupta fuerint: Dirumpūtur autem maxime à labore: æger hæc patitur. Tussis obtinet acuta, & saliuam expuit aliquādo subcruentā, & rigor & febris plerūq; corripit. & in pectore, & in dorso, dolor inest acutus. & in latere uelut lapis incumbere uidetur, & à dolore perpetuo pungi, uelut si quis acu stimulet. Huic quū sic habuerit, statim lacte in potu dato, pectus & dorsum inurito. Et sic celerrime sanus erit. De cætero uero quietā maxime corpori uitam degat. Si quid enim laborarit, & aut currum, aut equum ascenderit, aut humeros oneri subdidit, periclitabitur ne rursus morbus recidiam faciat. Et si hoc cōtingat, periculū est ut corripatur. Morbus enim reuersus magis premit q̄ ab initio. Si uero nō fuerit uftus, ipsū ipsum curato quibus & suppuratū, sorbitionibus, & ponbus, & cibus. In summa uero, quietem agat, & cōmodis cibis alatur, Si enim sic tractatus fuerit, celerrime sanus erit. Morbus autē grauis est. Si in latere tuberculū nascatur, & suppuratus fiat, hæc patitur. Rigor tenet & febris, & tussis sicca per multos dies. Et dolet latus, & ad māmam, & ad clauiculam, & ad scapulas, dolor impetū facit. Hic quum sic habuerit, in primis decē diebus sorbitionibus utatur, ptisanæ succo cocto melle affuso, quū sorbitione cocta fuerit. Vino aut utatur albo, dulci, aut austero, & aquoso. Et ut uinum saepe forbeat, ac expuat iubeto. Et à somno impedito, donec undecim dies præterierint. Post hos dies cibus paucissimis utatur, carnibus catulinis aut galli calidis. Oportet aut ipsas probe cū iusculo præparare, & iusculū abforbeat. Et sorbitionibus prius q̄ cibo utatur. & ne sitiat, donec latus suppuratū fiat. Suppuratur aut maxime in quadraginta diebus, aut paulo prius. Hoc autē cognosces, ubi suppuratū fiat latus. Pus enim nō expuit, neq; reuomit. Hūc quū sic habuerit, ubi cūq; tumor significationē de se præbuerit, secato aut urito. Et postea pus paulatim

paulatim emittitō. Et postquam exhauseris, linamētum crudi lini immittito & hoc posttridie rursus exempto, paulatim pus exhaurito. Deinde rursus linamētum indito, & rursus tertia die, & alijs deinceps, bis per diem exhaurito, donec reficcatum fuerit. Dato autē & cibos & obsonia, si admiserit. Et bibat modicum non multū, siue uinum, siue aquam. Edat etiam origanū tenellam plurimā melle tinctam. Si uero tenellam nō habeat, siccam tritam & melli ammixtam plurimā exhibeto. Et neq; frigeat, & balneis lauet, & molliter cubet. Et sic hunc morbum curans, celerrime sanum feceris. Quum autem sanus euaserit, uitet frigus, calorem, solem. Et deambulationibus modicis utatur post cibum, ut ne lassitudo corpus corripiat. Hæc faciēs sanus erit. Ex his morbis quoscunq; uiseris, statim post usionem, porrū multum tritum super ustruras imposito, & per diem unam finito. Tres sunt tabis species. Prima quidem fit à pituita. Quum enim caput pituita impletū ægrotarit, & calor accesserit, pituita in capite cōpūtescit, ut quæ moueri non potest ut decedat. Postea quū crassifac̄ta fuerint & putrefac̄ta ac superexplētæ uenulæ, fluxio in pulmonē fit. Et pulmo ubi succēperit, statim ægrotat, ut qui à pituita mordetur quæ falsa est ac putrida. Hæc igitur æger patitur. febris debilis inuadere incipit, & rigor, & doler pectora ac dorsum. Aliquando etiam tussis premit acuta. & expuit saliuam, multam & liuidam ac falsam. Et hæc quidē in principio morbi patitur. In progressu uero corpus attenuatur, cruribus exceptis, hæc enim intumescūt. & pedes et ungues contrahuntur. ex humeris autē tenuis & debilis est, et fauces uelut lanugine impletur, & uelut per arundinē sibilat: & fortiter sicut per torū morbum: & multa impostētia corpus habet. Hic quū sic habuerit, in anno corruptus male perit. Verum studium q̄ maxime adhibere oportet, ac reficere. Et primū quidē uera trum bibendū dare, infra autē subpurgare epithymo, aut peplio, aut grano cniadio, aut tithimalide. Hęc quater in anno dare oportet, sursum bis, deorsum bis. Dandū est & lac asininum coctum ad subpurgationē, aut bubulū, aut caprinū. Bibat etiā crudum lac bubulū, tertiā aquæ mullæ parte ammixta, per quinque & quadraginta dies, ammixto etiā origano. Caput autem ipsius prius purgetur, pharmaco ad nares appposito. Cibaria autē & obsonia dentur, neq; pingua, neq; nidorosa, neq; ualde acra. Hæc autē morbū obseruando facere oportet, & deambulationibus ad cibos uti, obseruādo ne frigeat. Hyeme uero iuxta ignem habitationem faciat. Vinum autē bibat austerum, nigrum, q̄ uetustissimū ac iucundissimū, uerum modicum. Et si tibi uisum fuerit, ante pharmacū fomentum adhibeto, & sic pharmacū dato. Si uero dare nolueris, factō fomētō, uomitum ex cibis facere cogito, uelut prius scriptum est. Huic si cōmodæ fuerint, deambulationibus utatur. Si uero non cōducant, corpore quāmaxime quiescat. Hic hoc modo tractatus, facillime in morbo deget. Est autem morbus lethalis, & pauci hunc effugiunt. Secunda tabes fit à labore. Eadem autem æger patitur quæ & prior. Morbus autem hic magis priore quiescit, & ætate remittit, Saliuam uero exspuit crassiores priore, & tussis premit maxime senes, & dolor fortior est in pectoribus, & uelut lapis incumbere ipsi uidetur. Dolent etiam dorsum. Et color ipsius limpido existit. & si quid laborarit, flatus & anhelatio oboritur. Hic ex hoc morbo in tribus annis maxime moritur. Curare autem oportet h̄sdem, quibus etiā priorem. Hic morbus multis adhæret

usq; ad tres annos, sed moriuntur. Estq; morbus grauis. Tertiatabes. Ab hac hæc patitur. Medulla ipsius spinalis sanguine plena fit. Tabescit autem similiter & à cauis uenis. Hæc uero pituita hydropiformi, & bile replentur. Patitur autem eadem, ab utris tandem tabescat. Et homo statim niger fit ac subturnidus. Et partes sub oculis pallidæ fiunt. Et uenæ in corpore pallidæ distentæ fiunt, quædam uero ualde rubicundæ. Maxime autem manifestæ fiunt, quæ sunt sub alis. Et spuit pallida, quæ ubi ipsum inuaserint, suffocant: & tussire uolens aliquando non potest. Quandoq; autem præ suffocatione & tussendi cupiditate, bilem acruatim uomit, aliquando uero pituitam. Sæpe uero etiam cibos, quum comederit. Et ubi reuomit, leuior sibi esse uidetur. Deinde modico tempore interposito, in ipsidem doloribus iacet. Hic etiam acutius loquitur q̄ quū sanus esset. Et rigor ac febris interquiescens, rursus sudorosa corripit. Hic ubi sic habuerit, cibis & sorbitionibus, & potibus ac pharmacis, & reliquis omnibus curato, uelut priores. Morbus autem durat maxime annos nouem. Postea durat dum corrumpitur, pauci uero ex ipso effugiunt. Grauis enim est morbus. Si uero uoles, sic ipsum curato. Primum fomentum adhibeto, & ubi fomentum adhibueris, postridie aquæ mulsæ dimidium congium ipsi bibendum dato, modico aceto affuso, & hæc citra respirationem bibere iubeto. Deinde stragulis ipsum ad multum ac q̄ longissimū tempus contegito. Si uero non suffineat, & euomere uelit, uomat. Si uero uomitus non sequatur, tempore iam alio quo interposito, aquæ tepidæ poculo magno superingesto uomat, irritatione per pennam facta. Quū uero euomuerit, ut bene habeat, quietem agat per hūc diem. Vbi autem cœnæ tempus fuerit, cœnet mazam modicam, & obsonium habeat, salsamentum & porrum. Hæc autem q̄ plurima edat. Vinū uero bibat dulce. Reliquo tempore per totam diem, exordio mane factio, multa calida lauetur. & post balneum cauere oportet, ut ne frigescat, sed decubens plurimo tempore dormiat. Quum autem à somno surrexerit, uiginti stadia minimum circumueat illa die. In alijs autem diebus alia quinque stadia prioribus addens uadat, singulis diebus additione facta, donec ad centum stadia perueniat. Ventrem uero quotidie subpurgare oportet, succis betæ, & à brassica, ita ut utranq; seorsim coquas, & de utraq; congiū excoles. Deinde adipis à rhenibus detracti mînz quadrantem ammiscuas ac simul coquas, in utriq; succis diuisim facta coctura. Quum autem bibere uoluerit, ad brassicæ quidem succum, salem adijceto. Ad betæ uero succum, mel affundito. Licet autem seorsim utranq; bibere: Aut melle in alterum poculum affuso bibat, in alteram uero immisso sale. Ebibere autem oportet totum succum, & hæc facere per triginta dies. Secundo uero mense edat panem, & carnes pingues suillas coctas, aliud uero nihil. Vinum autem bibat album, austerum, & iter faciat, non minus stadiorum triginta ante cœnam. Post cœnam uero decem, & ne frigeat, sed contegatur. Hæc si fecerit, leuius morbum feret. Tertio autem mense cyceonem floridum bibat, apij radicem, & anethum, & rutam, & mentam, & coriandrum, & papauer tenerum, & ocimum, & lentem, & mali punici dulcis & uinosi succum. Oportet autem dulcis duplam mensuram esse, ita ut utriusq; succi simul sit hemina dimidium, & uini nigri iucundi austeri hemina dimidium, & aquæ hemina dimidiū. Postea flores tritici in hoc diluantur permixto, & in poculum infundantur. Et postea farina

farinæ erui acetabulum adijciatur, & polentæ tantundem, & cascî ueteris capri ni rasi tantundem, & hæc permixta ebibat. Deinde modico tempore interposito prædeat panem, & obsoniū habeat, frustum torpedinis, aut squatinæ, aut galei, aut raie. Et carnes suillas edat coctas, & crassefaciat seipsum, quietem quæ maxime agens. Et decimo quoque die fomentū sibi ipsi leuiter adhibeat. Quarto autem mense, quinto quoque die leuiter fomento utatur. Et edat obsoniū plurimū. Sint autem obsonia, caseus, & carnes ouillæ coctæ pauca. Et iter faciat per stadia, uelut antea dictū est. Et primâ quarti mensis die, initio à decem stadijs factio eat, & quotidie addat, donec octoaginta stadia fiant. Et deambulet in die stadia octoaginta. Ante cœnam, triginta. Post cœnam, uiginti. Mane, triginta.

Reliquo uero tempore uictu utatur, mazam & panem utraq; edens. Et obsonium habeat, chartilaginea. Sed & carnes omnes edat, exceptis bubulis ac porcinis. A piscibus autem his abstineat, à mugile, anguilla, & melanuro. Edat autem torpedinem, squatinam, raia, galeum, pastinacam, & ranas: Ex asijis nihil. Si uero uideatur innoxius esse, etiam cyceonem bibat. Postquam autem dormire uoluerit, bibat de uino nigro, iucundo, ueteri, poculum duarum heminarum. Et per diem eodem uino utatur inter cibum. Et in die iter faciat per stadia centum quinquaginta: Ante cœnam, nonaginta. Post cœnam, uiginti. Mane, quadraginta. Hic hoc modo curatus, in anno sanus euadit. Resicatur medulla spinalis maxime, quum uentulæ ad medullam tendentes fuerint obstruatæ, itemque ex cerebro accessus. Propter corporis autem afflictionē hæc patitur, & ægrotat. Resicatur etiam à uenere. Hæc igitur patitur. Dolor acutus incidit ipsi in caput, & in collum, & in lumbos, & in lumborum musculos, & in articulos crurum, ut aliquando flectere non possit. Et sterqus non secedit, sed sistitur. Et urinæ difficultate uexatur. Hic in principio quidem morbi quietius degit. Quanto autem magis tempus morbo prolongatur, tanto magis omnia dolet. Et crura uelut ab aqua inter cutem tument. Et ulcera à lumbis emergunt, & alia quidem sanescunt, alia uero nascuntur. Huic quum sic habuerit, caput purgato, hippophais succo, aut cnidio grano, corpore prius ualde bene foto. Vesperi uero post purgationem, pitisanæ duas heminas forbeat, melle affuso. Vinum autem bibat album molle. Postera die asinini lactis cocti, melle affuso, octo heminas ebibendas ipsi dato. Si uero asininum non habeas, bubuli aut caprini cocti tres semicogios, melle affuso. Et dum temporis opportunitas adest, lac bibat, sero & lacte utens, per quinque ac quadraginta dies. Cibis autem & obsonijs, utatur quæ maxime per aluum secedentibus. Vinum bibat album, molle, Mendesium. Quum autem crassissimus fuerit, in lumbos ipsius ab utraq; uerticulum parte crustas quatuor inurito, & in dorsum utrinque quindecim. & in ceruicem duas, inter tendines. Si enim uestio successerit, sanum facies. Est autem morbus hic grauis. Quatuor morbi à rhenibus fiunt. A primo hæc patitur. Dolor acutus incidit in rhenem, & in lumbos, & in testem secundum rhenem situm. Et frequenter mingit, & adstringit paulatim ac supprimitur urina, & cum urina proccedit arena, Et ubi per urinæ meatum exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Quum autem ipsam per urinam eiecerit, dolor remittit. Postea uero rursus in eisdem doloribus iacet. Quum autem mingit, etiam colorem præ dolore fricat. Vulgus autem medicorum quod non intelligit morbum, ubi uidet arenam, putat uescicam

ficam è calculo laborare. At non uesica, sed rhen lapide laborat. Hic morbus fit à pituita, quum rhen susceptam in seipsum pituita, non rursus dimiserit, sed in ipso in totum concalluerit, & fiunt ex ea tenues lapilli, uelut arena. Huic quum sic habuerit, cum scamoniæ succo aut ipsa radice, fomēto prius adhibito, totū corpus purgato, postera uero die duobus cōgijs fucci cicris albi subpurgato, quæ sale iniecto bibēdum dabis. Post hæc potibus, & cibus, & balneis curato. & eadem quæ in urinæ stillicidio exhibentur pharmaca dato. Quum autem dolor presserit, multa calida lauato, et tepefactoria qua parte maxime dolet adhibeto. Quum autem intumuerit & eleuatus fuerit, sub id tempus iuxta rhenem secato, & extracto pure, arenam per urinam cienia sanato. Si enim sectus fuerit, fugæ spes est. Sin minus, morbus homini cōmoritur. Secundus rhenum morbus. Dolores fortiter premūt, uelut in priore. fit autem morbus à labore, quū ruptæ fuerint uenulæ ad rhenem tendentes, & postea rhen sanguine repletus fuerit. Hic ubi hæc patitur, cum urina sanguinem mingit in principio morbi, deinde progressu temporis pus. hic si quietem corpore habuerit, celerrime sanus erit. Si enim quid laborarit dolores, multo magis obtinebunt. Quū itaq; suppuratus fuerit rhen, circa spinam intumescit. Hunc ubi sic habuerit, circa tu mentem partem secato, profunda maxime sectione iuxta rhenem. Et si quidem successerit sectio, euestigio sanū facies. Si uero aberraueris, periculum est ne uelcus linamentis curandū fiat. Si autē concreuerit ulcus, uenter intrinsecus à rhe ne suppuratur. & si quidem pus intus rumpatur, & ad intestinū rectum procedat, fugæ spes est. Si uero cōtigerit alterum rhenem, periculū est ne pereat. Curatur autem pharmacis, & iisdem omnibus, quibus & prior. & diatam eādem habeat. Hic morbus grauis est, & multi ex ipso ad tabem rhenalem deuenerit.

Tertius rhenum morbus. Urina prodit, uelut à carnibus bubulis affatis succus. fit autem morbus ab atra bile, quū bilis in uenas cōfluxerit quæ ad rhenem tendunt, & quum cōstitit, exulcerat uenulas & rhenem. Ab ulceratione igitur tale quiddam cum urina procedit. Dolores autem hærent in lumbis, & in uesica, & inter anum ac pudēdum, & in ipso rhene, ad modicum tempus. Deinde remittit dolor, & rursus acutus breui corripit, & in tenuem uētris partem aliquando dolor incidit. huic quū sic habuerit, uentrem subpurgato, epithymo, aut scamoniæ radice. Bibenda uero eadem dato, quæ & ex urinæ stillicidio laborati. & quum dolor habuerit, multa calida lauato. & tepefactoria ad dolentem maxime locum adhibeto. & sorbitione utatur farina cocta, melle affuso. & reliquo uictu utatur q̄ maxime per aluū secedente. & uinū bibat albū Mendacium mellei coloris. Aut aliud album iucundissimū probe temperatū. Hic morbus nō ualde deficit, & pro temporis opportunitate serum & lac bibat. Serum quidem ad purgationē. Lactis aut potum faciat in tempore per quinque ac quadraginta dies. Hæc si ita feceris, morbum in melius dispones. Quartus rhenum morbus. Morbus hic fit à bile & pituita, maxime tempore ætatis. fit etiam à uenere morbus. Hic ager hæc patitur. Dolores premunt ipsum in lateris mollitudinem, & in lumbos, & in lumborum musculos: & patitur qualia solet mulier ex partu laborans. & nō sustinet in sanam partem decubere, sed ualde dolet. & ex lateris mollitudine quædam pendere uidentur, uelut abrupta. Si uero pronus decubat, nō dolet. pedes & tibiæ ipsius semper frigent. Urina uero

ro uix prodit, præ pituitositate & crassitudine sua, & si fueris ipsam ad modicum tempus depositam donec defecerit, uidebis subsidentiam crassam, uelut farinam, & si quidem bilis præualuerit, subfuluam ipsam uidebis. Si uero à pituita fuerit morbus, alba & crassa erit, et primū quidem in annū, aut paulo amplius aut breuius tempus, æger talia paties perseuerat. Si uero prologetur morbus, & magis dolet, & suppuratur, & quū suppuratus factus intumuerit, qua maxime parte intumuerit, in rhenē secato, & pus emittito, & si quidē successerit sectio, statim sanum facies. Hunc quū sic habuerit, si idē omnibus curato, quibus etiā priores. Et à principio morbi oportet & purgare, & ante subpurgationē fomentū adhibere, & balneis frequenter lauare. Vnguatur item & magis calefiat, neq̄ frigeat, & à sole abstineat. & neq̄ uenere utatur. Hæc si fecerit, & non celerrime sanus euaserit, nihil noui est. Morbus enim est grauissimus. Si uero circa pharmaca curari uelit, crassum ex diæta facere oportet, siue ex hoc morbo ægrotet, siue ex aliquo de prioribus, diuisis cibis quos edere solet in decē portiones, ita ut una parte detracta, reliquas comedat. Obsoniū autē habeat, carnē suis tritam. & ea die decē stadia deambulet, postera uero die & tertia usq̄ ad decē dies, portionē minus edat, & deambulet decē stadia aut plura singulis diebus addens. Quum autē ad ultimam cibi portionē deuenit, etiā ad centum stadia iter faciat. & edat quidem unam tantū portionem, & ea die centū stadia deambulet. Post coenam aut uiginti, mane uero quadraginta. Vinū autem bibat Mendacū album, austerum, atq̄ hæc per tres menses faciat, postea reliquo tempore deambulationes imminuat, & cibos plures comedat, eodem modo additione facta uelut detraxerat. Deambulationē uero detrahat usq̄ ad decimū diem. & postea q̄ maxime quietē habeat, & cibis puris alatur, & obsonia q̄ pinguisima habeat, et dulcia omnia ipsi cōmoda sunt. Ab oleribus autē, & acidis omnibus abstineat, itēq̄ ab acribus, & quæ flatū faciunt. Multa etiā calida lauet, & ne frigeat. Hæc si fecerit, celerrime sanus erit. A rhenum morbo corripit morbus magnus uenarū cauarū, quæ à capite iuxta iugulū per spinam tendunt, ad malleolū pedis externum, & ad intermediū magni digiti locum. Morbus hic fit à pituita & bile, quū in uenas cōfluxerint. Venæ autē hæc sanguine plene sunt. Si igitur quid alieni in ipsis præterlapsum fuerit, ægrotat. Si dextram partē morbus corripiat, dororē ex coxæ acetabulo in principio exhibere incipit. Quanto autē amplius tempus progressum & prolongatū fuerit, tanto acutior dolor infra descendit, & quū ad malleolū pedis externum, & ad magni digiti intermediū locum deuenit, rursus ad caput uenire incipit. & ubi in ipso ulcus cōstitit, fortiter premit, & homo caput sibi diffringi putat. & oculi pituita replentur, itēq̄ totū corpus, huic quum sic habuerit, elateriū bibendū dato, aut thapsiæ radicem, aut ueratri, aut succū scammoniæ, post purgationē uero eadem exhibeto quæ superioribus. Si uero ab hac curatione nō desinat, lacte ipsū crassefacito, et in scapulam dextrā quatuor crustas inurito, & in acetabulū coxæ dextræ, tres. & sub natēs, duas: & in medio femore, duas: & supra genu, unā: & supra malleolū, unam. Hic ubi sic usus fuerit, neq̄ sursum, neq̄ deorsum morbū procedere permittit. Si uero alicubi dolor ruptus usus fuerit, si quidē in crus incubuerit priusquam uratur, claudus erit. Si uero in caput, surdus aut cæcus. Si uero in uescam, prodit simul cum urina sanguis maxime, per quadraginta dies. Verum si in uescam erupere

rit, eadem pharmaca quæ & in urinæ stillicidio dato. & si alicubi dolor cōgregatus fuerit, urito. Vere aut̄ oportet carnosā quidē, ferro: ossēa uero & neruosa, fungis. Cæterū ante hæc, si in principio morbi accesseris, ista facere oportet. In potu exhibendū est uinum album Mendacum, aquosius, plurimū per diem, & inebrietur donec sanguis à naribus erumpat. Quū autem fluere inceperit, minimum tres & decem dies fluit. Vbi uero hi dies præterierint, nō amplius inebrietur, neq; ubi semel fluere inceperit. Bibat tamen paulo amplius uinum inter cibum, quo sanguis fluere possit. Iam uero quibusdā sedato sanguine, erupit in uescicam, & prodijt sanguis ac pus. Si igitur eruperit, eadē pharmaca quæ & ex urinæ stillicidio laboranti dato. Et de eodē uino plus bibendū exhibeto. Hic si ita curetur, & cibos per aluū secedentes assumat, & obsōnia eiusdē facultatis, citissime sanus erit. Morbus autē grauis est. Alius morbus à sinistra uena.

Hic æger alia quidem eadem patitur, quæ etiā prior. Verum in splenem dolor acutus incūbit statim, & in principio morbi. Et si nō intellexerit priusquam incubuerit, prosilit in pulmonem. Huic per fungos crustas octo inurito, capita lienis q̄ celerrime intercipiens. Et ubicunq; alius dolor incubuerit urito. Sic enim statim sanus erit. Si uero nō fuerit uestus, sanus aut̄ sponte fiat, plerisq; post duodecim annos, morbus rursus reuertitur, & si splenē occuparit, multis aquā inter cutem inducit. Verū oportet statim curare uelut priorē, & si uisum fuerit urere uelut priorē, si dolor in istē articulis constiterit. Si uero nō sic curatus fuerit, de cætero colliquefcens moritur. Morbus enim grauis est. De pituita eadē sentētia habeo, quas & de bile. & species ipsius multas esse puto. & alia quidē popularis est, quæ sanē recentissima est. Cuius etiam curatio facilima est. Vomitus enim post cibū facere oportet per duos aut tres dies, ita ut & prædeat insuper ac quiescat, si prioribus diebus semel in die cibū capere, & laborare solitus fuit. Sin minus, huiusmodi diæta utatur. Primū multa calida lauatur, quum uomitū facere uoluerit. & edat mazam oleo & melle subactā, & panem exaffarū ueterem. Hæc enim magis pituitā trahunt. Obsōnijs aut̄ utatur & oleis acris. Sed & pinguis, & dulcia, & acida omnia idonea sunt, ut permixta assumātur. Et oleribus omnibus uiridibus utatur. Et bibat inter cibum frequenter modicū uinū dulce, & in fine placētā insuper edat, & mel, & ficus. Et quū cœnabit, pocula large exhauriat, & ubi iam repletus fuerit, parū dormiat. Deinde experrectus uomat, magno uini poculo epoto, cū tepida aqua temperato. Trahit enim magis pituitā & humorē ex carnibus, & corpus magis resiccatur. Euomat aut̄ donec ficus euomuerit. Hæc enim postremum euomūtur. Atq; hæc quidē hac die faciat, postera uero cōtineat seipsum usq; ad cœnā, & in cœna sumat panē, cui nihil fursurū decessit. Obsōniū autē sit ex fortioribus. Vini uero bibat nigrū, austerum. Atq; hæc quidē popularis pituitæ medela est. Si uero edere & bibere potest, & cibis delectatur, deinde uero crura grauentur, & color immutatus fuerit, huic ostendendū est, pituitā molestantē in uentre esse. Verum oportet quū sic habuerit, mel & uinum dulce, & oleū, & nitrum tali ouilli magnitudine, permixta per clysterē infundere. hæc enim mitissima sunt in clysterem ad hominis naturā. Mensuram aut̄ singulorū esse oportet, uini quidem heminam, olei uero heminæ dimidiū, & mellis tantundē. Si uero clysterem nō uoluerit, humectū hominem facere oportet, fomēto humido admoto. Fortassis enim

enim etiã sic stercus subeuacuari poterit. Nam à ciborum nimia reficacatione hæc patitur. Si quidẽ igitur quis edat cibos ualde succofos, fortassis hæc nõ ita uehementer patiat. Si uero etiã aliquando patiat, modica curatione opus habuerit. Hunc ita curans, celerrime sanum feceris. At si antiquior fuerit pituita, appellatur autem hæc pituita alba, hæc patitur. Grauat hominem magis, & speciem à populari alienã habere uidetur pallidiorẽ. & totum corpus laxo tumore intumescit, & facies rubet, & os siccum est, & fitis tener: & quum come derit, spiritus densus ipsi incidit. Hic eadem die aliquãdo melius habet, aliquando de repente dolet, & sibi mori uidetur. Huic si quidem uenter sua sponte turbatus fuerit, sanitati proximus erit. Si uero non sua sponte uenter turbetur, purgare oportet cneoro dato, aut hippophae, aut cnidio grano, aut lapide Magne siã. Et post purgationẽ, lenticula hemina una aut duæ dentur ad absorbendũ. Coquatur autẽ allium in lenticula. Detur etiã betæ pinguis hemina nõ condita, polenta circũinpersa. Bibat uinum nigrũ, austerũ, & forte. Postera uero die mane stadia uiginti deambulet. A qua deambulatione reuersus, panẽ edat paruũ exaffatum, & obsonium habeat allium coctũ. & de eodẽ uino paulo meracius bibat. deinde stadia uadat triginta. & ubi tempus adierit cœnet, quãtum etiã prandere consueuit: obsonium autem habeat, maxime quidem pedes, & capita suilla. Sin minus, galli carnibus & suis tritis utatur. Ex piscibus autẽ scorpio, aut dracone, aut cuculo, aut callionymo, aut gobio, aut alijs piscibus qui æqualem facultatem habent. Ex oleribus autem solo allio, & nullo alio utatur. Hoc uero quã plurimũ edat, & crudum, & affatum, & coctum, semper plus singulis diebus. & labore ex modico amplius, respectu ad cibos factõ, hic morbus maxime fit tempore æstatis ex aquæ potu. Insuper & à somno multo. Iudicatur autem in triginta diebus, an lethalis sit, aut non. Atq; hæc quidem faciat ubi triginta dies præterierint. In primis autẽ diebus, forbitionibus utatur, lenticula cocta acidiorẽ ab aceto, & præsana acida. Bibat aquã mulsam tepidam, polenta modica inpersa, quo corpus præparatum sit ad pharmacorũ potum. Et his diebus sub dio dormiat. & si tibi uisum fuerit sanguinem à lumbis detrahere, cucurbitã affigito, & uenas in seroto crassissimas secato. hic ita curatus, citissime sanus fiet. A pituita maxime in aquam inter cutem transitus fit, hoc modo, pinguedo colliquefcit, & à calore qui in pituita est fit aqua. Cognosces autem hoc an quis sanari possit, aut non. Donec enim quis in pectine pinguedinem habet, fieri nõ potest ut ipsum sanes. Cognosces autem ex his maxime, an pinguedo in fit in pectine, aut non. Si quidem febres succedant, & nõ potest exurgere, & umbilicus inflatus extra prominet, indicium est non amplius in esse pinguedinem, & sanabilem esse. Huic conducit uentrem siccare, & panem dare cui nihil fursurum decessit, antiquũ, calidum. Obsoniũ autem carnẽ lepocinã, & canis perfecti, & ouicula, & suis affatã, & galli affatam ac calidã. & polypos edat coctos in uino nigro austerõ. Vinũ autem bibat nigrum, austerum q; crassissimũ ac acerbissimum. Piscibus autẽ utatur, gobio, dracone, callionymo, cuculo, scorpio, & alijs huiusmodi, omnibus coctis, non recentibus, & frigidis. hi enim siccissimi sunt. & in iusculum ne intingat, & infulsi sint pisces. ex oleribus autẽ utatur raphanis, & apio. Torreat autem lenticulam ab aceto acidiorẽ, & edat. Et deambulet quotidie, & post cœnã, & mane. & serotino tem

pore dormiat, & mane exurgat. Et si quidem ab his restituitur, satis est: Sin minus, cneorum, aut hippophais succum, aut granum cnidium, bibendum dato. Et post purgationem, lenticulæ heminas duas forbeat, & panem paruum comedat. Vinum uero bibat nigrum, acerbum modicum. Bibat autem pharmacum bis in die, donec uacuus fiat. Si uero tumor cõstitit in scroto, & femoribus ac tibijs, acuto scalpello multa & frequentia uulnufcula incutito. Et si hæc feceris, cito sanum efficiet. Aqua inter cutem ex his fit. Quum æstatis tempore siti uexatus aquam multam biberis: nam ex hoc maxime fieri solet: & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorem uehementem exhibet, ut pinguedo quæ in arterijs inest colliquecat, & si semel liqua-ri pinguedo inceperit, multo amplius in breui tempore aquam inter cutem facit. Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectora rupta. Quod autem fiat etiam à tuberculis aqua inter cutem, testimoniū habeo, & in boue, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maxime fiunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent. Si enim diffecueris, citissime cognoueris. Fluet enim aqua. Videntur autem talia multo magis in homine fieri, quam in pectoribus, quanto etiam morbosiore diæta utimur. Facti sunt autem & multi pectore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbum consequuntur. Tussis sicca, & fauces exasperari uidentur, & rigor ac febris succedit, & erecta ceruice spiratio, & corpus intumescit, & pedes tument, & ungues contrahuntur, & donec quidem in superno uentre fuerit aqua intercus, adeft dolor acutus. postquam autem ad infernum uentrē uenerit, melius habere sibi uidetur. Postea progressu temporis patitur qualia prius impleto uentre. Quoadque etiam ad latus intumescit, & indicat ubi fecare oportet. Si uero non indicat, multa calida lauato, & humeris apprehensum concutito, & deinde in utro latere magis fluctuet audito. Quo intellecto costam tertiam ab ultima usque ad os secato. Deinde cum terebra caua ultra perforato. Et ubi perforata fuerit, aquam parum emitto, & ubi emiseris, linamentum ex crudo lino indito, & spongiam mollem superimponito. Deinde ut ne excidat linamentum deligato. Emittere autem per duodecim dies aquam oportet, semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti decima tertia totam aquam emitte, & reliquo tempore si subnascatur aqua emitte, & uentrem cibus reficcare. Post sectionem autem hæc exhibere oportet. Succus silphij drachmæ pondus parato, & aristolochiam tali ceruini magnitudinis deradito, & lentium ac erui torrefactorum polentam, dimidiæ chencicis mensura utranque purgato, atque hæc melle & aceto subigito. Deinde pastillos sexaginta efformato, & quotidie unum tritum in uini nigri austeri ac iucundissimi, hemina dimidia diluito, & mane in potu dato. Reliquum uero uictum ac laborem eundem, uelut prior tempore, habere iubeto. Et si intumuerint pudenda ac femora, confidenter uulnufculus impactus pertudito. Hunc si ita curaueris, celerrime sanum facies. Ab hepate fit aqua intercus, quum in hepar pituita accesserit, & hepar ipsam susceperit, & humectum fuerit. Statim igitur calorem huic exhibet, & flatum inducit. Deinde temporis progressu aqua impletur. Postea morsus in corpus incidit. Et tumor in tibijs ac pedibus inest, & hepar durum est ac intumescit, & clauiculæ attenuantur. Huic quum sic habuerit, in principio si hepar doluerit, organum tritum, & silphij succum erui magnitudine, in uini albi dimidia

dimidia hemina diluta, bibenda dato, & lactis caprini poculum quatuor heminarum, tertia aquae mullae parte ammixta. A cibus autem per primos decem dies abstineat. Hi enim iudicant morbum, an lethalis sit, aut non. Sorbeat autem prifanae succū coctum, melle affuso. Vinum autē bibat album Mendāū, aut aliud iucundissimum aquosum. Quū autem decem dies praeterierint, cibos accipiat puros, & obsonium habeat, galli carnem affatā calidam. Habeat & carulīnam coctam. Pisce uero utatur galeo, & torpedine affatis. Vinū uero idem bibat, & si quidem ab his quiescat, fatis est: Sin minus, postq̄ sane crassissimus factus fuerit, & hepar maximum, fungis urito. Sic enim celestime sanum feceris. Inurere aut oportet crustas octo. Si uero aqua intercus innascatur, & rumatur in uentrem, isdem medicamentis & potibus, & cibus, ac laboribus, quibus priores curato. Vinū uero bibat austerum nigrum. Si uero tibi uideatur discessisse ab hepate, per ferrum ubi cūq̄ apparuerit urito, & aquā paulatim emitrito, & uelut reliquos priores curato. Si uero ab his non sanus fiat, tēporis progressū corrumpitur ac moritur. Morbus enim est grauis, & pauci hunc effugiunt. Aqua uero intercus à splene, hoc modo fit, & ab huiusmodi maxime causa, quum quis sicuū uiridium, & malorū fructus multos ederit. Multi uero iam etiā à cibo botrorum multorū, & à multo musto, morbum inciderunt. Si quidem igitur in morbum collabatur, statim in doloribus est. Dolores enim acuti in splene consistunt, transeunt autem: & in humerū, & in clauiculam, & in mammam, & ad lumbos, & febres fortes tenent. Et si parum quid ederit, uenter impletur, & splen attollitur, & dolorem exhibet. Hic morbus si durauerit, reliquo quidem tempore minus dolet. Quum uero fructuū malorum tempus fuerit, & hos ederit, magis q̄ prius dolet. Hūc ubi sic habuerit, à principio curato, & sursum quidem ueratrū exhibeto. Deorium uero cneorū, aut hippophais succum aut cniidiū granum, Lactis item asinini heminas octo, melle affuso. et si quidem ab his restituitur, fatis est: Sin minus, quū maximus fuerit lien, & maxime intumuerit, fungis urito, capita eius intercipiēs: aut ferramētis, cum multa cautione ac obseruatione ne ultra peruras. haec à morbi principio facito, & hac diæta nutriatur. Si quidē febris nō affuerit, pane utatur triticeo affato, aut ex duro triticeo bis cocto: obsoniū autē habeat salsamentū Gaditanū, aut saperdā. Et carnem ouillam tritā. Et acida ac salia omnia edat. Et bibat uinū austerum Coī q̄ niger rimū, A dulcibus abstineat. Quum autē exurgit, et potens est, luctetur summis humeris, et labore per circuitus multos in die, et comedat ea quae dicta sunt. Si uero aqua intercus fiat, isdē curato quibus et priores. Alia aqua intercus ab his fit. Aestatis hora si iter faciens per uiam longā, in aquam pluuialem ac stabilem inciderit, et biberit de ipsa multū affatū. Si igitur carnes abforbuerint & cōtinuerint in seipsis aquā, secessus aut nufquā fiat, haec patitur. Si quidē fuerit in carne, calorē facit & in uētre, & in corpore, ut pinguedo uentrē ambiens colliquefat. hic quādiu quidē iter facit, nihil mali habere uideatur. Postq̄ aut iter facere cessarit, et sol occiderit, statim dolorē multum habet. progressu uero morbi ualde attenuatur. Si uero etiā cibi fastidium accedat, multo plus attenuatur. Si uero cibos edere poterit, et ad laborē impotēs fuerit, etiā amplius laeditur, & pleriq̄ horū tumor in totū corpus deducitur. Et tenui quidē color corporis liuidus hīc, et uēter magnus, et sitis fortis tenet, et uiscera ipsius à calore resiccantur.

progrediēte uero tempore, ad edendum quidem prōptus fit, & edit quodcūq;
 quis dederit, & bibit, & dolet nihil. Si uero tumor obtinuerit, color huic fit pal-
 lidus. Et uenæ nigræ frequētes per corpus distenduntur. Indignatur autem &
 tristatur ex quauis re, etiā si nihil noui accidat. Venter uero aqua perhumescit,
 & magnus fit, & laternæ speciem præ se fert. Et temporis progressū cibos non
 admittit, sed uidentur ipsi cucumeris syluestris odorē habere, præ abominatio-
 ne. huic ubi sic habuerit, cneori aut hippophais succum dato, aut cnidium gra-
 num. hæc uero pharmaca ita dare oportet. Cneorum quidem per sextā diem,
 Hippophais autem succum per octauam. Cnidium uero granū per decimam.
 & dare ipsa oportet donec expurgetur, & uacuus fiat. Interpositis autē diebus
 alatur ex iisdem quibus et prior. Maxime autem de eadem aqua bibendū dato,
 ex qua morbus corripuit, plurimū, quo uentrē ipsius turbet, & ualde secessum
 faciat. Sic enim potissimum sanū facies. Si uero tibi uidebitur, etiam frequēter
 clysterem adhibeto, ex cneori tritī dimidia hemina, mellis tertia hemina: parte
 ammixta, his cū quatuor succi heræ heminis dilutis, atq; sic infusis. postera die
 etiam asini lactis cocti octo hemina: dentur affuso melle, aut adiecto sale pos-
 tanda. Et post purgationē, iisdem utatur quibus prior. & interiectis diebus, ci-
 bis ac potibus iisdem utatur, & deambulationibus similiter, & sic curatus bre-
 uī à morbo liberabitur tertio mense, aut sexto. Si uero negligentia aliqua conti-
 gerit, & non statim curatus fuerit, breui moritur. Sed & in attenuato iisdem us-
 tendum est ad sanationē. Præhumescere uero antea corpus ipsius oportet per
 fomenta, quo magis pharmacis obediat. At uero statim curam adhibere opor-
 tet: Sin minus, cum multis conuiescit morbus. Sed & uter tādē morbus sit,
 clysterem ex his adhibere conuenit. Vini albi heminas duas accipito, & mellis
 heminam dimidiam, & olei heminam dimidiam, nitri Aegyptij rubri torrefa-
 cti quadrantem, foliorum cucumeris syluestris tusorum ac expressorū succi he-
 minam. hæc omnia mixta & in ollulam infusa seruefacito, & per clysterē infun-
 dito. Morbus hepaticus. Fit ab atra bile, quum influxerit ad hepar. Accidit
 autem maxime in autumno, in mutationibus anni. Hæc igitur æger patitur.
 Dolor acutus ipsi in hepar incidit, & sub ultimas costas, & in humerum, & in
 claviculam, & sub mammam. Et suffocatio fortis tenet. Et aliquando liuidam
 bilem reuomit, & rigor, & febris primis diebus debilior habet. & dum attingi-
 tur, hepar dolet, & color ipsius subliuidus est, & cibi quos prius comedeat,
 suffocant ipsum, & ingestū urunt ac torquent uentrē. Atq; hæc quidem in prin-
 cipio patitur. Morbo uero progrediente, & febres remittunt, & à paucis cibis
 repletur. In solo autem hepate dolor restat, & ipse aliquando fortis, aliquando
 quietus. Quandoq; uero acutus corripit, & sæpe derepēte æger animam effla-
 uit. Huic conducunt ubi dolor habuerit, tum alia, tum tepefactoria eadem ap-
 posita, quæ etiam pleuritidi. Quum uero remisserit dolor, multa calida ipsum la-
 uato. & aquam mulsam bibendam dato, & uinum album dulce, aut austerū, us-
 trum tandē profuerit. Et forbitiones easdem quas etiam à pleuritide correpto.
 Cæterum ad dolorē hæc bibēda dato. Oui gallinacei cocti liquore terito, &
 succi solani dimidiā heminam affundito, et aquæ mulsæ dimidiā semiheminæ
 partē ammisceto, diluito, ac bibēda dato, et sedabunt dolorē. dato autē quotidie
 donec dolor quiescat. Bibat etiam silphij succū erui magnitudine, & cum eo
 organum

origanum tritum in uino albo diluat, & sic ieiunus bibat. Bibat in super & phar maca quæ in pleuritide dantur doloris gratia. Bibat & caprinum lac, tertia par te mellis ammixta. Sint autem lactis heminae quatuor. Hoc mane bibat, quom alia non biberit. A cibus autem abstineat, donec iudicetur morbus. Iudicatur autem maxime in septem diebus, in his enim manifestum fit, an lethalis sit, an non. Si uero etiam suffocatio accesserit, hæc dare oportet quo uomat. Mel, aqua, acetum, salem, permixta in ollam nouam infundito. Deinde tepefacito, & origa ni capitati ramulis unam cum semine agitato. Vbi uero tepefacta fuerint, tepida ebibenda dato. Deinde stragulis iniectis contactum finito, donec quam maxi me exudarit. Et ubi uomitus ipsum apprehenderit, prompte uomat irritatione ne per penam facta. Si uero uomere non possit, aquæ mullæ tepidæ poculum duarum heminarum in super bibat, & sic uomat. Et si quid pituitæ aut bilis euo merit, rursus idem facere oportet ad horas quatuor. proderit enim. Post morbi uero iudicationem curato modicis cibus, nisi puris datis. & si quid panem edere cupuerit, panem calidum maxime purum edat. Si uero mazam, eam quæ uino dulci subacta non est edat, ubi tamen prius aqua subegit. Obsonium autem habeat carnes catuli coctas, aut colubæ, aut pulli gallinæ carnis, omnibus coctis utatur. Ex piscibus autem galeo, torpedine, pastinaca, & rais paruis, omnibus coctis. Lauetur autem quotidie, & frigus uitet & parum deambulet antea in securitate. Hæc si seruauerit non est timor ut morbus reuertatur. Nam huiusmodi morbus gratis est ac diuturnus. Alius hepaticus morbus. Dolores quidem eodem modo premunt in hepar, & color differt a priore. Malicorum enim formam habet. In tempore uero æstatis maxime incidit. Fit autem a bubulæ carnis usu, & uini potu nimio. Hæc enim omnia isto anni tempore hepatis sunt infestissima, & bile maxime ad hepar adducunt. hæc igitur æger patitur. Dolores acuti incidunt, & non deficiunt ulla hora, sed semper magis premunt. Aliquando etiam uomit bilem pallidam. & ubi uomuit, paulo melius sibi habere uidetur. Si uero non uomuerit, bilis ad oculos peruenit, & fiunt ualde pallidi. Et pedes intumescunt. Atque hæc patitur quam diu ualde, quandoque minus. Quum autem dies præterierint in quibus morbus iudicatur, dolor minus urget, si nihil deliquerit, & eiusmodi dietam huic constituere oportet, qualem & priori. Si enim inebriatus fuerit intempertius, aut uenere usus fuerit, aut aliud quid fecerit quod commodum non est, hepar statim ipsi durum fit, & intumescit, ac a dolore pulsatur. Et si quid facere festinarit, de repente hepar & totum corpus dolet. huic ubi sic habuerit, & primi dies præterierint, fomentum adhibeto. deinde scammonio subpurgato. Si uero uenter coëctus fuerit, clysterem ex hisdem quibus in prioribus usus es adhibeto, quæ probe ducant. et post clysterem, lacte asinino cocto subpurgato, octo heminis eius, melle affuso, in potu datis. Dato etiam caprinum lac mane poculi quatuor heminas complectentis mensura, tertia parte aquæ mullæ ammixta. Dato iterum cocti lactis caprini heminas duas, tertia aquæ mullæ parte ammixta, aut ipso solo melle affuso. dandum est etiam equinum lac, eodem modo uelut asininum, & si quid ab his morbis curatus cedat, satis est. Sin minus, dextri cubiti internam uenam secato, & sanguinem detrahit. Si uero non usus fuerit tibi per asininum lac subpurgatus esse, bubuli lactis crudi duas heminas dato, tertia aquæ mullæ parte ammixta, quotidie ad dies decem. Deinde ad alios duodecim dies, sexta parte aquæ mullæ affusa, ad bibendum.

bibendum dato. De cætero uero ipsum lac duarum heminarum mēfura, donec pinguefiat exhibeto. Si uero neq̄ sic definat, urere oportet, quum maximū hep̄ factum fuerit, & maxime eminuerit. Vrito autē per buxeos fusos, in oleum feruens tinctos. Apponito autem donec tibi bene habere, & uftionē factā esse uisum fuerit. Aut per fungos octo crustas inurito. Si enim uftio successerit, sanum facies, & reliquo tēpore melius deget. Si uero nō successerit, de cætero ab alijs sanus non fiens, corrūpitur ac moritur. Alius morbus hepaticus. Rehi qua quidem eadem patitur hic æger uelut priores. Color autem niger est. At hepatis sel, pituita & sanguine replenū, uelut ratiocinamur, dirūpitur, & ubi dirūp̄tum fuerit, celerrime in sanat, & indignatur, & loquitur stulta, et latrat uelut canis. Et ungues punicei fiunt, & oculis uidere non potest, & pili in capite erecti stant, & febris acuta corripit. Huic eadē adhibere oportet quæ etiam prioribus Pleriq̄ uero moriuntur in undecim diebus, pauciq̄ effugiūt. Splenis morbus primus. Fit huiusmodi morbus, propter caliditatē solis bile cōmota, quū in seipsum bilem traxerit. Hæc igitur æger patitur, febris acuta in principio accedit, progrediente uero morbo remittit, excepto ipso splene, in quo semper calor hæret, & dolor aliās atq̄ aliās incidit acutus, & in lateris mollitudinē, & in uentrē. Et cibos in principio quidem admittit, nō aut ualde fecedunt, progressu autē temporis, & color pallidus fit, & dolor fortis irruir. & clauicula attenuantur. & cibos non similiter admittit, uelut in principio, & à modico impletur. Lien uero aliās magnus fit eadem die, & aliās minor, huic quū sic habuerit ueracitatem purgans deorsum, bibendū dato, & enidio cocco subpurgato. Ad uesperum aut post purgationē, lenticulæ acidioris heminā forbendā dato: & betarū pinguiū heminam polenta inasperā, postera uero & tertia die panē paruum dato, pro obsonio aut lenticula utatur, & carne suilla in lenticula cocta trita. Vinū bibat austerū, nigrū, paulo meracius. Et quietē his diebus habeat, nisi quod intus in umbra paululū deambulet. Reliquo uero tēpore hæc exhibēda sunt. Cibus sit panis cui nihil furfurū decessit. Obsoniū habeat carnē canis maioris, uel capræ, uel ouiculæ trita, & sallamentū Gaditanū, aut saperdam, & acida ac falsa omnia assumat, & acerba. Bibat uinum coum subastringens q̄ nigerrimum, à dulcibus autem & pinguibus ac nidorosis abstineat. & silphium non accipiat, neq̄ allium, neq̄ carnem porcinam. Neq̄ mugilem, nec recentem, nec salsum, neq̄ anguillam. Neq̄ olus ullum coctum sine aceto. Ex troximis autē, hoc est his quæ cruda eduntur, raphanide utatur & apio, in aceto tinctis, & polentam uino subactam edat. & uinum meracum forbeat. Si uero uelit, etiam panem in uinum interat, ac calidum edat. Dentur etiam pisces, scorpius, draco, cuculus, gobio, callionymus. Hos coctos & frigidos dato. Dato etiam quæ splenem attenuare possunt singulis diebus, asphodeli semen, aut uiscī folia, aut scenum græcum, aut uiscis semen, aut rutam, aut mentæ radicem, ex his quodcunque uolueris tritum in uino austero dato ieiuno. Si uero adeo ualidus fuerit, per triginta dies ad ligna secanda cogito, & summis humeris luctetur, & interdii deambulet, & uespere dormiat. Mane uero surgat, & quæ relata sunt edat. Si uero ab his non melius habeat, splenem fungis urito, decem magnis crustis inuftis, quum maximus fuerit splen, & maxime eleuatus. Si enim successerit uftio facta uelut oportet, sanum facies, uerum non breui. Opus enim habet morbus-
curatione-

curatione. Grauis est enim & diuturnus, si non fuerit statim curatus. Alius splenis morbus fit quidem ab iisdem à quibus & prior, patitur igitur aeger ab hoc morbo hæc, Venter inflatur, postea uero etiam splen intumescit, & durus est, & dolores acuti in splenem incidunt, Color autem mutatur, & conspicitur niger, pallidus, malicorij speciē referens, & ex aure male olet, & gingiuarū male olent, & à dentibus discedunt, & ex tibijs ulcera erumpunt, uelut pustulæ nocturnæ. Membra uero attenuantur, & sterqus non fecedit. Hunc quū sic habuerit, iisdem pharmacis & edulsijs, & potibus, & laboribus, atq; alijs omnibus curato, & ubi sterqus fecedere noluerit, clysterem adhibeto, ex mellis hemina dimidia, & nitri Aegyptij magnitudine tali ouilli. Hæc trita in quatuor hominis aquæ de betis coctis diluito, & per clysterem infundito. Si uero morbus ab his non sedetur, splenem ipsius urito uelut prioris, & si uisio successerit, sanum efficies. Alius splenis morbus fit, in anno, ueris maxime tempore, uerum à sanguine. Quum enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in uentrem, & dolores acuti in splenem incidunt, & in mammam, et in clauiculam, & in humerum, & sub scapulam. Color autem corporis est plūbiformis, & parua ulcuscula uelut lancinata in tibijs exurgunt, ex quibus ulcera magna fiunt, & quæ primum infra fecedunt, sanguinolenta sunt & æruginosæ. et uenter durus subit, & splen uelut lapis est. hic morbus magis lethalis est q̄ priores, et ex ipso pauci effugiunt. hunc quum sic habuerit, iisdem purgato quibus et priorem, ueruntamen pharmacum sursum purgans ne dederis. Deorsum uero granum enidium exhibeto. Et postera die etiam lactis equini cocti octo heminas dato, melle affuso. Si uero hoc non adsit, bubuli aut caprini cocti duos congios præbeto, ita ut alternatim mel in poculum ammiscetur, et uicissim bibantur. Ad uesperam aut post purgationem eadem quæ priori dato. Et si uisum fuerit, ab interna cubiti sinistri uena sanguinem detrahit. Reliquis autē diebus quotidie ieiuno lactis bubuli quatuor heminas dato, tertia muriæ parte ammixta. Cibis uero et potibus et alijs omnibus iisdem curato, quibus & priorem. Abstineat autem à uenere, et ebrietate, hic uelut prior. Et si uideatur etiam urito, quum crassissimus & maximus splen factus fuerit & si opportune uiseris ac successerit, sanum facies. Si uero ab hac curatione sanus non fiat, tempore corruptus moritur. Est enim morbus ualde grauis. Alius splenis morbus. Accidit & hic morbus uere maxime, quum splen pituitam assumpserit in seipsum, & statim magnus factus fuerit ac durus, & deinde rursus sedatur. Et quum quidem eleuatus fuerit, dolores incidunt acuti. Quum uero mollis fuerit, doloris exors est. Et ubi diuturnus factus fuerit morbus, obscurior esse uidetur, & insurgit, & cito sedatur. Hic quum sic habuerit, in principio morbi cibos admittere non potest, & cito attenuatur; & corpus impotentiam multam habet. Morbus autē si non statim curatus fuerit, aut sua sponte quieuerit, interpositis quinq; aut sex mensibus, rursus insurgit. Intermitit autem maxime per hyemem. hunc si in principio acceperis, decem crustas in splenem urito, et statim sanū facies. Si uero non uiseris, iisdem pharmacis curato, quibus & priores. Et alijs item iisdem, & potibus, ac laboribus, Sic enim celerrime sanum feceris. huius autem color fit exalbidus, subpallidus, & squalidus. Alius splenis morbus. Fit autumno maxime ab atra bile. Fit autem ab olerum multorum quæ cruda eduntur esu,

& ab aquæ potu. Patitur itaq; æger hæc. Quum morbus corripuerit, splenem
 uehementer dolet, & rigor & febris apprehēdit, et inedia ipsum habet, ac cibos
 auerſatur, & corpus cito cōcidit. Splen autē, magnus quidem non ualde fit, ue-
 rum durus. & ad uiscera allabitur, & adhærens fugit. Hunc quum sic habuerit,
 n̄ ſidem pharmaci & edulsi ac laboribus quibus priores curato. Et si se tibi ex-
 hibuerit, uirto ipsum eo modo quo etiam alios. Hic morbus in pleniſq; ſi ſtatim
 curatus fuerit, breui decedit. Quatuor morbi regiꝝ, primus quidē æſtate ma-
 xime corripit, bile commota. Conſiſtit igitur bilis ſub cute, & in capite, quare
 ſtatim corpus in alium colorē mutat, & fit pallidum, uelut malicorium. Et oculi
 ſi pallidi ſunt, & in capite ſub pilis uelut cortex ſubſeſt. & rigor ac febris corripit,
 & pallidum urinam mingit, & craſſum ſubpallidum in ipſa ſubſidet. & ma-
 ne q̄ diu ieiunus fuerit, ad cor & uiscera exugitur. & ſi quis ipſum alloquatur
 aut interroget, ægre fert, & anxius fit, & non ſuſtinet audire. Stercus autē excre-
 tum cum pallore albicat, & male olet. Hic quum ita habuerit, maxime moritur
 in quatuordecim diebus. Si uero has effugiat, ſanatur. Curare autem oportet ip-
 ſum ſic. Quum febris remiſerit, multa calida lauato, & aquam muſſam bibende-
 dam dato. Et ſorbtionibus utatur, p̄ ſanæ ſucco, melle aſuſo. Mel autem non
 ſimul coquito, donec præterierint quatuordecim dies. Hi enim iudicant an le-
 thalis ſit morbus, aut non. poſtea uero bis in die lauato, & nutrito primū modi-
 cis quæcūq; maxime admiferit. poſtea tamen plura dato. Vinū bibat albū plu-
 rimum per diem. & ſi progreſſu temporis uideatur tibi pallidus eſſe & debilis,
 uomitum à cibus facere iubeto, uelut in ſuperioribus morbis habetur. Et ſi quis
 dem ab his morbis quieſcat, ſatis eſt: Sin minus, ueratrum bibēdum dato. Poſt
 talem autem purgationem, ad ueſperam edat mazam mollem, aut panis medul-
 lam. Obſonium uero edat, pullum gallinaceum percoctū, probe cōditum cum
 cepa, coriandro, caſeo, ſale, ſefamo, & uua paſſa alba. Vinum autē bibat album,
 auſterum, ueruſtiſimū. Alutum uero in ſtra ſubpurgato, poſtera die ſucco cice-
 rum alborum, melle aſuſo, utatur, & duas heminas cuiſmodi ſucci ebibat. Ter-
 tia uero die in initio factō, ſingulis diebus hanc aquam bibat, ex his rebus coctam
 ſceniculi radices tenues ea copia quanta tribus digitis comprehendī poteſt, in
 duos aquæ congios mitto, ac coquito uſq; ad dimidias. Et cicerum alborum
 chcenicen, in duobus aquæ congijſ ad dimidias item coquito, & quod ſuper eſt
 excolatum ſub dio per integrā noctem exponito, & ambo hæc decocta miſce-
 to. Cum hac aqua & uinum temperatū bibat, & ipſam aquam ſolam ſi uelit, q̄
 plurimam bibat: & aliam aquam non bibat. Si uero hanc potionem nō admife-
 rit, aliam ſic præparatam dato. Caricarum albarum chcenicen in duobus aquæ
 congijſ coquito, excolato, & ſub dio per integrā noctem exponito, poſtea hæc
 aquam bibat, ſiue nudam ipſam uoluerit, ſiue cum uino mixtam. Bibat autē non
 acruatim multam, ſed pro una uice dimidiam heminam, ut ne alui profluuiū
 ipſi ſuccedat. & modico tempore interpoſito ruruſus bibat. Commoda autē ſunt
 & hæc in potu data ieiunio ſingulis diebus, trita & in uini ueteris albi hemina
 diluta, ap̄ij ſemen, cucumeris ſemen, ſeniculi ſemen, cuminum Aethiopicum,
 adiantum, coriandrum herba, uua paſſa alba. Hiſ & illis in potu acceptis utili-
 tatem percipiet, & celerrime ſanus fiet. Alius morbus regiꝝ ſiue arcuatus.
 Hic corripit tempore hyemis, et ex ebrietate & rigore. Incipit autem primū in
 gor

gor inuadere, postea etiam febris detinet. Et humor qui est in corpore, congelatur in cute. Quod autē sic habeat, ex his ostenditur. Liuidum est ipsius corpus & subdum. Et uenæ per corpus distētæ sunt pallidæ. maiores autem & crassiores sunt quæ prius. Et aliæ uenæ subnigriores distētæ sunt. Et si quis aliquam ipsarū fecerit, sanguis effluet pallidus, si pallidæ sunt uenæ. Si uero nigræ fuerint, niger sanguis effluet. Et uetrem internam corpori adiacentē, præ pruritu non sustinet. Hic promptus est ad iter faciendum & ambulandum, sed præ debilitate crura labascunt, ac ipsum non sufferunt, & sicut uehementer. Hic morbus non minus priore lethalis est. Procedit autem ad amplius tempus, si non in primis diebus sanus fiat. Si uero morbus prologetur, & ad octauum aut nonum diem duret, in morbum incidit, & morbus, et dolor magis premit, & exurgere non potest. Et plerique in hoc tempore statim pereunt. Huic ubi sic habuerit, si quidem principio morbi accesseris, quum iam septem dies præterierint, ueratrū bibendum dato. Ventrem uero infra subpurgato per succum, uelut priori. Et alia eadem pharmaca dato. Exhibeto & cathartidas, sine alis, & capite, quatuor tritas, & in uini albi hemina dimidia dilutas, modico etiam melle affuso. Atque has bis aut ter in die bibat. Progrediēte uero morbo, balneis & fomentis curato. Edat autem quæcunque admittit. Vinum bibat album, austerum, & alia eadem affumat quæ priori. Hic morbus diuturnus est & grauis, si non ab initio probe fuerit curatus. Alius morbus regius. Popularis appellatur hic, eo quod omni tempore corripit. Fit autem a repletionem maxime ac ebrietate. & postquam riguerit, statim sanè corpus immutatur, & pallidum fit, & oculi pallidi ualde sunt. Et sub pilos ac sub unguis morbus procedit. Et rigor ac febris debilis tenet. Et de bile est corpus, & in capite dolor adest. Et pallidum ac crassum mingit. hic morbus minus lethalis est prioribus. & curatus breui sanatur. Huic quum sic habuerit, cubiti uenam secato, & sanguinē detrahit. Deinde fomento adhibito, elaterium bibendum dato. Tertia uero die rursus infra subpurgato, cum lacte asininio. Reliquas uero sorbitiones, & potus, ac edulia, eadem dato quæ priori. Et caput ipsius frequenter purgato, & de succo bibendum dato. Et multa calida ipsum lauato, ac carnem defricato, & defricatas sordes in uino albo bibendas dato, & ad alia omnia ipsdem utatur. & breui sanus euadet. Alius morbus regius, fit quidem a pituita, hyeme autē maxime corripit. & color ipsius ægri est albus, & pectora ipsius pituita plena sunt. & spuit saliuā, & quum excreat, sicut gultus ipsi oboritur. Et album lotiū ac crassum mingit, & in urina subsidet, uelut farina. Hic morbus non est lethalis, & breui sanatur. Huic quum sic habuerit, cnidium granum bibendum dato. Et post purgationem, succi præsanæ quatuor heminas, melle affuso, exsorbendas dato. Superiorem uero uentrē uomiū tu inducto, uelut in prioribus purgato. Sic enim facillime pituitam a pulmone & arterijs abduxeris. Sed & gargasilimū ipsi frequenter præparato. Hic aliquando etiam febricit debili febre, & horror tenuis succedit. De cætero uero ipsi qui bus priores curato, & pharmacis, & fomentis, & balneis, & edulijis, & potibus, & sorbitionibus. Sic enim maxime sanum facies. Morbus Typhos uocatur.

Typhos quidē appellatur hic morbus, hoc est stupor attonitus, corripit autem tempore æstatis, quum canis sydus oritur, bile per corpus commota. Statim igitur ipsum febres fortes tenent, & calor acutus, & a grauitate debilitas. &

crurum ac manū impotentia; maxime enim inutilia ipsi sūt hæc membra. & uenter turbatur, & quæ secedunt graue olent. Et tormen forte succedit. Sed & hæc patitur, si quis ipsum erigere uelit, erigi non potest. neq; oculis uidere potest præ calore. Et si quis ipsum interrogat, præ dolore respondere non potest. Quum aut moriturus est, acutius uidet, & loquitur cōfidenter. & bibere ac edere cupit. & si quis det quod edat, breui etiam animam emittit, si nō euomuerit. Huic morbus hic iudicatur in septē, aut quatuordecim diebus. Multi uero perueniunt etiam ad uiginti quatuor. Si igitur hos trāserit, sanus erit. Nam in his diebus iudicatur, an lethalis sit morbus, aut non. Hunc quū ita habuerit, sic curato. In primis quidem diebus à balneo abstineat. Vngatur autē uino & oleo tepido, in lecto, & à cibis abstineat. Sorbitiones autem tenues frigidæ dato. Vinum autem bibat nigrum, austerum, si ipsi conducatur. Sin minus, album, & aquosum, austerū. Si uero litis fortis premat propter calorem, potu acruatim dato, euomere iubeto, bis aut ter hoc repetito. Et quū calor habuerit, lintea aqua frigida tincta apponito, qua parte se maxime ardere dixerit. Si uero horrore habuerit corpus, frige-factoria remittito. Hic quū doluerit, ab huiusmodi maxime dolore periclitatur, ne repente animā relinquat. Verum exhibere oportet ipsi doloris causā festināter, eadem pharmaca quæ ei quā à pleuritide tenetur. Quū autem exfurrexerit, cibo & potu, & balneis quā celerrime refocillato. Morbus enim est difficilis, & pauci effugiunt. Alius typhos. Corripit quidem hic morbus omni tempore. fit autē propter corporis humiditatē, quum cibos humidos, & potum multum, carnes combibūt, & fluidæ sunt, ab his maxime fit morbus. Incipit igitur febris, tertiana aut quartana, in principio fiens. Et dolor fortis in capite consistit, Aliquando etiam in corpore intermittens. Et uomit saliuam, & frequenter eructat, & oculorum regiones dolet, & facies albescit, & tumor in pedes descendit. Quādoq; uero etiam totū corpus intumescit. Et ad pectora, & ad dorsum aliquando dolor currit. & uenter turbatus est. & oculis fortiter tuetur, & saliuam multā & spumofam expuit, & in faucibus detineri uidetur. & exasperat ipsas. Sæpe uero etiā inflammantur fauces. Hic ubi sic habuerit, & dolor ita presserit, & erectæ ceruicis spiratio fortis inciderit, quandoq; de repente præ dolore animam emittit, in septem diebus, aut quatuordecim. Muti uero usq; ad uiginti quatuor dies durant. Sæpe uero etiā de repente morbus remittit, & æger sanus esse sibi uidetur. Verum obseruare oportet donec quatuor & uiginti dies præterierint. Si enim has effugerit, non ita ualde moritur. Huic quū ita habuerit, in primis diebus sorbitiones dare oportet, farinam coctam, tenui melle affuso. Vinū uero dandum est nigrū, paulatim, prout uoluerit temperatū. Cibi autē ne exhibeantur priusquā hi dies præterierint. Polypi uero in uino cocti edendi dentur, & iusculū forbendum. Et raphanidas multas edat, & nasturtij semen torrefactū, molitum ac cribratū, uino nigro acerbo affuso bibat. Et polenta tenuis modica mane bibenda detur. A balneo autem abstineat, donec hi dies præterierint. Vino uero & oleo tepefactis in lecto illinatur, & extergeatur. Et fructus pæoniæ grana decem in uino nigro cocta bibēda dato. & rapi probe percocti succum forbeat, caseo infuso cōditum, & papauere, & sale, & oleo, & silphio, & aceto. Si uero etiam pharmacū bibendū dare uolueris, cnidium granū dato. Et post purgationē, farinæ coctæ & pinguis duas herminas

minas exforbendas dato. Vinum aut bibat idem. Et ex pharmacis & sorbitio-
 nibus ac potibus quicquid dederis profuerit, siue singulatim, siue plura simul
 exhibueris. Atq; sic celerrime sanum feceris. Morbus aut est grauis, et pauci es-
 fugiunt. Alius typhos, hic quidem propter hoc fit. Quū bilis putrefacta am-
 mixta fuerit sanguini, per uenas & articulos, quū sanguis steterit, cōsistit quidē
 maxime in articulis. Incubīt aut quandoq; etiā in reliquū totum corpus, et do-
 lores acutos exhibet. & multi ex huiusmodi morbo claudī fiunt, quū bilis in ar-
 ticulis conclusa in totum callescit. Dolor autē intermittens, corripit per tres &
 quatuor dies. Hunc ubi sic habuerit, hoc modo curato. Doloze in corpore præ-
 ualente, tepesfactoria facere & adhibere oportet, oleo prius illito. Quum autem
 remiserit, ueraqum ipsi dato, toti corpori antea fomento adhibito. Postera die
 serum caprinum coctū bibendum dato, duorū congiorum mensura, ita ut in al-
 terem congiū mel affundas, & in alterū sal adijcias, deinde poculis uicissim
 permutatis bibat, donec totum ebiberit. Ad uesperā uero post purgationē, len-
 ticulæ heminam forbeat. & betarum pinguū heminam, polenta insperfa ebi-
 bat. Et pulli gallinacī carnē, aut colubā, aut turturis, aut ouiculā, aut suis pin-
 guem edat. Veratrū autem per sextū diem dato, & si alicubi in articulis tumor
 fiat, & discessus fieri nolit, cucurbita affixa sanguinē detrahito, punctura per a-
 cum triangularē facta in genua, si in genibus tumor fuerit. Verum nullum ex as-
 lijs articulis perpunxeris. Interpositis autē diebus cibum accipiat, panē maxi-
 me affatū. Mazam uero maxime oleo & melle subactā. Obsonia uero habeat,
 maxime quidē affatas carnes uolucruū, non fallas: Sin minus, etiā coctas, condi-
 tas, uerū sine caseo, & sesamo, & sale. Piscibus autem utatur carnosissimis, affa-
 tis eodem modo uelut carnes: & coctis origano conspersis, ac oleo ipsis affuso.
 Vinū aut bibat album, si conducatur: aut si hoc nō cōmodet, nigrū. & in deambu-
 lationibus se exerceat per diem, & post cenā, et mane. Serū aut & lac pro tēpo-
 re semper bibat. Si uero tibi uisum fuerit, etiā afininū lac decoctū dato. Et si fa-
 nus fiat, in custodia ipsum esse oportet, ut ne à frigore & aestu lædatur. & cibus
 non ualde expleatur. Periculum est enim ne morbus reuertatur. hic itaq; mor-
 bus si sic curetur, in sex mēsis sanatur. In tot enim mensū spatio iudicatur an
 mortalis sit, aut non, etiā nisi statim curetur. Nam morbus est grauis, & pleriq;
 commoritur. Alius typhos. Fit quidem hic morbus in tēpore pomorum,
 quū quis se fructibus mollis corticis, & foris nō lignosi, omnis generis repleue-
 rit. Pleriq; uero etiā ab his factus est talis morbus, ubi uidelicet placentarū, &
 liborum sesaminorū, & aliorū dulciorū ex melle paratorum, esu se insatiabili-
 ter expleuerunt. Mel enim coctū astuosum est, et uentri adhæret: postea quum
 concoctū fuerit in uētre, efferuescit: & uenter derepēte attollitur, & ardet ac di-
 rumpi uidetur. Deinde repente uentris profluuiū succedit. & quum semel fece-
 dere inceperit, per multos dies purgatur. & multi post hanc purgationem sani
 fiunt. Quum igitur sua sponte purgari cessauerit, lentū succi tres semicongios
 ipsum ebibere cogito, sale adiecto. post purgationē uero succi, ad uesperam, len-
 ticulæ frigidæ non falsæ heminā forbeat. Multum aut silphij in ipsam deradat:
 & betæ pinguis nō conditæ heminam, polenta insperfa. Vinū autem bibat ni-
 grum, austerū, paulatim. Reliquo uero tempore eadem faciat. Et cibos accipiat
 panē affatū, & Mazam oleo & melle q; maxime subactā. Primis autē die-

bus farinam edat coctam frige factā, melle affuso. Vinum autē bibat nigrū, acerbum, & donec quieuerit morbus hæc assumat. At qui ex fructibus morbo arreptus est, flatum sentit, & tormen, & dolorē: & cibi secedere non uolunt, & uenter ipsius magnus ac durus est, & rigor ac febris habet. huic si quidē sponte turbatus fuerit uenter, in uiginti diebus ut minimū purgatur. Et quū purgari cessa uerit, sanus statim erit. Si uero nō fuerit purgatus, purgato ipsū hippophais succo, aut enidio grano. Ad uesperā autem eadem exhibeto, quæ ei qui sponte purgatur. Postera die si febris habuerit, quietē habeat. Et de eodem uino in aqua frigidissima ipsi bibendū dato. Si uero febris nō habuerit, uictu utatur nō humido, sed fortiore. Et deambulet cōiectura iuxta cibos facta. Ab hoc morbo multis iam aqua intercus facta est. Et si tibi clysterē adhibere uisum fuerit, eadē quæ etiam hydropico per clysterem infundito. Si uero uolueris, hæc infunde re potes. In aquæ mullæ hemina, herbam thapsiæ coquito, & sic infundito. hic hoc modo curatus celerrime sanus erit. Alius typhos. Fit hic morbus quum humor qui est in corpore, putrefactus fuerit, & magis quā opportunū est resiccatus. Fit igitur æger hoc morbo correptus, specie limpidus ac humectus, subpal lidus, pellucidus, & uesicæ urinæ similis, uerū non intumescit, sed tenuis & aridus est, ac debilis. Attenuantur autē in corpore maxime clauicular, & facie fortiter gracilescit, & oculi ualde sunt excauati, & hec quidē à morbo patitur. Color autē corporis niger est, causa uero hæc est. Quū bilis atra in uenas, & ad cutē subierit, & postea calor successerit, necesse est à calore uenas comburi ac resiccari, Quare sanguis è uenis excedit, hæc igitur patitur. Hic tenuis fit, & fortiter gracilis, & oculis raro niçtat, & muscæ à stragulis uenatur. Et grauitas ciborū maior est quā quum sanus esset. & lucernæ extinctæ odore delectatur, et frequenter se men per somnū effundit. Sæpe uero etiā inter eundum genitura ipsi exit, huic quū sic habuerit, uentrem nigro ueratro purgato, supernū uidelicet: infernū uero scammonia succo. Post purgationē uero eadem quæ & alijs dato, & serū ac lac bubulum, aut caprinū pro tempore exhibeto. dato & lac asininum decoctū, ad purgationē. Hic ita curatus in duobus maxime annis sanus fit. Cibos autē quos uult assumat, & quæ maxime nutriatur, et deambulet cōiectura ad cibos facta. hic morbus corripit maiorem uiginti annis. Vbi uero corripuit, si non à principio morbi quis curatus fuerit, nō desinit, nisi uiginti anni præterierint, sed adheret. postea ab aliquibus dum curatur decedit. Morbus autē grauis est. Voluuli porro uocatur hi morbi, fiunt autē maxime ab his. Si hyemis tempore quis calido & humido uictu utitur, et nō deambulationib. se exerceat, respectu ad cibos factos. Verum repletus semper dormit, & deinde longū iter perficere cogatur, frigore fauente. Deinde riquerit sub ossa. hæc igitur patitur. Flatus in toto corpore oboritur, & color ipsius fit plūbiformis, & riget semper, ut etiam calida ipsi affusa, calida esse nō uideatur. Corpus autē ipsius dum lauatur, à calida desquamatur, maxime scrotum. & si digito corpus compresseris, impresionē facies, & notæ tibi apparebunt, uelut in farina aqua subacta. Maxime autē in potibus impresionem perfert. Crura uero ipsius grauiā sunt, & si obambulet, tremit, & si ad alium locū iter faciat, uehementer anhelat, & uulnæ depedere uidentur, & sitis urget noctu, cibi uero crudi secedunt quos cūque ingersit. Huic quū sic habuerit, fomento prius adhibito, cneorū bibendum dato, aut hippophais succum, aut enidium

cnidium granū. post purgationē uero, eadē dato quæ prioribus. Postera die la-
ctis afinini coctū conguū dato bis ebibendū, sale adiecto. Ad uesperā cœner pa-
nem. Obsonū autē habeat, ouicularē carnes coctas, & polypos coctos in uino ni-
gro, & iusculū forbeat. & lenticulā habeat sic præparatā: heminā lentis coctam
probe terito, deinde farinā ammisceto, & filphiū derafum addito, & salem adij-
cito, & acetū affundito, & alliu ad hæc simul coquito, & affusa aqua bis aut ter
feruefacito, et cū tudicula undiquæq; expassā brachia habēte, simul ipsā agitato:
deinde ablata frige facito. Sit autē non ualde crassa, & odoris gratia etiā pulegiū
ut simul coquatur, adijciatur. Intermedijs uero diebus, uomitus faciat per se-
xtum diem. Verū aliās atq; aliās ante uomitū, & pharmaci potū, fomentū adhi-
bere oportet. Et per tertiam diem lauetur, si conducat: Sin minus, ungtur. Et de-
ambulet si ita potēs fuerit, cōiectura ad cibos facta. & sambuci, ac conyzæ sem-
per teneræ, folia cocta edēda dato. Sic enim curatus, facillime deget, & morbus
annum desinet. Multis uero iam sanis factis, post duos annos morbus reuersus
est. Sed si hoc cōtingat, eodem modo curetur. Si uero tertiu reuertatur, tumor
quidem nō succedit. Tenuis autē fit & gracilis, incipitq; à facie attenuari, & co-
lore exalbescit magis q̄ prius. huic quādoq; aqua intercus fit in uētre. Si igitur
facta fuerit, secare ipsum non oportet, moritur enim, sed ipsē curare quibus eū
qui à plene aqua inter cutē laboret. hūc maxime in principio curare uelis, & sic
cito sanū facies, Opus autē habet morbus multa curatione. Est enim grauis.

Alius uoluulus arcuatus. Hic maxime ætatis tēpore in palustribus regio-
nibus corripit. Magis autē ab aquæ potu. Multi uero iam à tali morbo correpti
sunt, ex uoluatione ad solem capitis dolore affecti. Verū similia prioribus pa-
tiuntur, excepto colore. Nam pallidus fit æger, uelut malicorū. Et oculi aliquā-
do morbo arcuato implētur, hunc ubi sic habuerit, ipsē curare oportet quibus
priorē. Danda etiā in potu aqua à cicere albo cocta, & cū uino eadem permixta
danda est. Et caput eius tetragono medicamēto purgetur, hic minus q̄ prior le-
thalis est, & uocatur uoluulus arcuatus. Voluulus hæmatites. Reliqua qui-
dem eadem patitur cū prioribus. Incipit autē morbus autūno fieri. Hæc uero in
morbo accedūt. Ex ore male olet à dentibus, & gingiuæ discedūt, & à naribus
sanguis fluit. Aliquādo etiā ex cruribus ulcera pullulant, & alia sanescūt, alia e-
mergūt. Et color niger fit, & cutis tenuis. Est autē ad deambulandū ac laborandū
proptus. Hunc ubi sic habuerit, ipsēdem curato quibus priores, & hæc per
clysterem infundito. Cucumeris syluestris folia quinque terito, & mellis dimidiū
heminæ ammisceto, itēq; olei heminā dimidiā, & salis quantū una manu cō-
prehendere potes, & fucci betarū heminas quatuor. Ad subpurgationē uero la-
ctis afinini cocti heminas octo exhibeto, melle affuso. Bibat etiā bubulū lac pro
tēpore, per quadraginta dies. Bibat item mane bubuli lactis duas heminas, ter-
tia aquæ nullæ parte ammixta, per intermedios dies. His morbus multa mede-
la opus habet: Sin minus, nō exit, sed cū homine moritur. Vocatur autē uoluulus
hæmatites. Morbi crasisi appellati. Ex crasisi appellatis morbis, hi ma-
xime sūt. Quū pituita & bilis mixta fuerint in corpore, fluūt in uentrē, & quū
congregata fuerint in uentre, attollūtur, & sursum ac deorsum discurrūt, uelut
unda. Et rigor ac febris corripit. Et dolor in capite cōsistit, & quū dolor circa ui-
scera confiterit, suffocationē inducit. Aliquādo uero uomit pituitam acidam,
quandocūq; etiam salīam & postq̄ euomuit, os amarū ipsi esse uidetur. In lateri-

bus aut rubores detinentur. Nam quum pituita in uentre sit, sanguis à caliditate cōgregatus in latera allapsus est, & rubores in lateribus excitat. Et calor maxime latera occupat, ac costas. Et dorsum ipsius incuruum fit. Et quum maxime doleat, corporis contactū non sustinet. Nā uelut ex ulcere dolet. Et carnes præ dolore uibrantur, & testes contrahuntur. & in sedem, & in uescā, calor quidam ac dolor irruit. Et mingit crassum uelut in aqua inter cutē. Et ex capite desuunt capilli. & pedes semper frigidi sunt. & dolor premit maxime latera, & dorsum, & collum. & ad cutem aliquid ipsi proserpere uidetur. Morbus uero quādoq; urget, quandoq; remittit. In progressu autē magis alsidue premit, & cutis capit is crassa ac rubicunda est. Hic usq; ad sex annos talia pati perseuerat, postea & sudor multus diffunditur, & male olet. Sæpe uero etiam per somnū semen effundit. Quod uero per coitū emittit, suberuentū ac subliuidū prodit. Hic morbus fit propter calorē solis, & aquæ potum, proinde hunc quum sic habuerit, cneo aut hippophae, aut cnidio grano dato, subpurgato, dato etiam lactis asini cocti heminas octo bibendas, melle affuso, postera die post purgationē, eadem quæ alijs exhibero. Primis autē diebus ex hsdē nutriatur, ex quibus etiam is qui ab aqua inter cutem correptus est, & deambulationibus se exerceat, si ita potens fuerit. Si uero præ febrisus impotens fuerit, & cibos edere nō poterit, lenticulæ sorbitione utatur, potu uero uino nigro q̄ maxime aufero. Hic morbus maxime corripit autumno, & tēpore fructuum pomorū, hic si quidem curatus fuerit in sex annis, satis est. Sin minus, adhæret usq; ad decē annos. Cum multis uero simul moritur, si nō statim curatus fuerit. Alius crassus morbus.

Tales crassi morbi à bile fiunt, quū bilis in hepar influxerit, & in capite consistuerit, hæc igitur ager patitur, hepar intumescit, et præ tumore ad seprū transfuersum expāditur, & dolor statim in caput irruit, maxime uero in tēpora. & auribus nō acute audit. Sæpe uero etiam oculis nō uidet, & horror ac febris corripit. Atq; hæc quidem in principio morbi ipsi fiunt, intermittētia quandoq; ualde, quandoq; minus. Quāto autem magis morbus progressus fuerit, tanto amplior dolor in corpore existit, & pupillæ oculorū disperguntur ac hebetantur, & si digitū oculis admoueris, non sentit, eo quod non uidet. Quod autem non uidet ex hoc cognoueris, quod admoto digito non nictat, & hiccoss de stragulis tollit, si quos uiderit, pediculos ipsos esse putās: & quum hepar magis ad seprum transfuersum expāsum fuerit, delirat, & ob oculos ipsi obuersari uidentur reptilia, & omnis generis peregrinæ feræ, & milites armati pugnantes, & ipse sibi inter ipsos pugnare uidetur, & talia loquitur uelut qui uideat pugnas & bella geri, & inuadit, & minatur, si quis ipsum exire uetet, & si furrexerit, crura eleuare non potest, sed concidit, & pedes ipsius frigidi sunt. Et quū dormit, exilit à somno, & timet quū insomnia uidet horrenda. Cognoscimus aut hoc, q̄ ab insomnia exilit ac timet, postquā resipiscit. Nam insomnia denarrat, & ea quæ corpore fecit, & quæ lingua loquutus est. Atq; hæc quidē sic patitur. Quādoq; uero etiā per totam diem ac noctem uoce priuatus iacet, respirans spiritū multum aceruatū. Quum autē delirare cessauit, statim euestigio resipiscit, & si quis ipsum interroget, recte respōdet, & cognoscit ac intelligit omnia quæ dicuntur, deinde rursus post modicū tempus, in hsdē afflictionibus iacet. hic morbus accidit maxime in peregrinatione. Et si quis alicubi per desertā uiam iter faciat, & timor ipsum ex spectro corripiat. Fit etiā aliter, huic quū sic habuerit, uerari nō

gri obolorū quinq; pōdus, in uino dulci bibendū dato. Aut hæc per clysterē in fundiro. Nitri Aegyptij magnitudinē tali ouilli terito, & mellis optimi coctū dimidiam heminam, & olei dimidiam heminā, in mortario ammisceto, & aquæ à betis coctis heminas quatuor per noctē sub dio expositas addito : aut si uolueris, pro beta lac asininū coctū ammisceto. & hæc mixta per clysterē immitto, siue febris habeat, siue nō. Sorbitionibus aut utatur, prisana cocta, melle affuso. Bibat etiā mel & aquā & acetū, simul permixta, donec iudicatus fuerit morbus. Iudicatur autē in quatuordecim diebus ad summū, siue lethalis est, siue nō. Multis autem iam huiusmodi morbus sedatus, rursus redijt. Si igitur redierit, periculum est ne æger pereat. Iudicatur autē morbus in septem diebus, an lethalis sit, aut nō. Si uero has effugerit, nō ualde moritur, sed morbus in plerisq; curatus decedit. Quum autē deliuerit morbus, diæta bona utatur, quiete ingerens quæ uenter suscipiat, & non cōburantur, neq; uentris profluuiū succedat. Ambo enim hæc periculosa esse uidentur. Lauetur autē quotidie, & deambulet post cibos modice. Veste uero induatur leui ac molli. & pro tēpore anni lac & serū bibat, per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si fecerit, celerrime sanus erit. Morbus aut grauis est, & multa cura opus habet. Alius morbus crassus. Fit à pituita putrefacta. Quod autem putrida est unde fit, ex hoc manifestū est. Eructat ab hac quod odorē habet, uelut si quis raphanides edisset. Incipit autē fieri talis morbus à cruribus, deinde ab his ascendit ad uentrem. Et quū in uentre constiterit, rursus decurrit ad uiscera. Et quum in his constiterit, fugit & uomitū facit, pituitam acidam subputridam educēs. & ubi euomuit, nō habet seipsum neq; sibi cōstat æger. Deinde angustia fit circa uiscera. Quādoq; etiam in caput derepente dolor incūbit acutus. Et auribus acute audire non potest, neq; oculis uidere, præ grauitate. & sudor multis diffunditur male olens, & maxime quū dolor habuerit, & morbum leuat. Color autē ipsius arcuatus apparet. hic morbus priore paulo minus lethalis est. Huic quum ita habuerit, uentrē purgato, deorsum quidem, per hippophaes, sursum autē, per ueratū. & caput tetragono purgato. & quum à ueratō purgatus fuerit, postera die lacte alinino coctio subpurgato. Tertia deinde caprino coctio, & similiter quarta ac quinta. Reliquis uero uiginti diebus, lac bubulum crudum, aut etiā caprinum dato, tertia aquæ mulsæ parte ammixta. Bibat autem lactis congrū. Post purgationē uero deorsum uersus, eadem pharmaca exhibeantur quæ hydropicis. Reliquo tēpore quū lac bibit, cœnet panē exallatū. Obsoniū autem habeat, ex piscibus scorpiū, aut calionymū, aut cuculū, aut squatine frustū cum cōdimentis coctū, ex carnibus, ouillis, aut gallinacei pulli coctas. Vinū bibat albū, si cōducatur. Sin minus, nigrū austerū, deinde post cibum deambulet, ut ne frigeat. Si quidē igitur cōducant, cibos huic dato qui dicti sunt. Si uero nō conducunt, sorbitiones dato prisanæ : aut mihi. In hoc morbo si æger triginta dies transgressus fuerit, sanus fit. hi enim iudicant an lethalis sit, aut non. Est autem morbus grauis. Alius morbus crassus. Fit hic morbus à pituita alba. Congregatur autē in uentre, quum febres diurnæ corpus occupant. Initium hic morbus à facie sumit, & intumescit facies. deinde descendit in uentrem, & ubi in ipso constiterit, uentrem magnum attollit, & corpus uelut à labore lassatur, & in uentre grauitas inest, & dolor fortis, & pedes tument, & si pluuia in terram effundatur, pulueris odorem non sustinet. Si uero in pluuia steterit, & terram odoret, derepente cadit.

Hic morbus interquiescēs, longiore tēpore q̄ prior occupat, & tardius decedit. Curare uero ipsum oportet iisdē quibus hydropicū, fomentis uidelicet & phar macis, & edulsijs ac laboribus. Hic morbus per sex annos maxime obtinet. De inde decedit tēporis progressu, si probe curetur, etiā si nō in principio fuerit cu raturus. Est autē morbus difficilis, & multa cura opus habet. Coxendicū mor bus ex his maxime causis fit plerisq̄. Si quis diutius in sole uerfetur, & coxen dices fuerint calefacti, & humor qui est in articulis à calore fuerit reficcatus. Quod autē id quod reficcatur, cōdensatur, ac cōstringitur, hoc mihi signum est. Aeger enim articulos uertere aut mouere nō potest, præ dolore qui est in ipsis, & eo quod uerticula sunt compacta. Doler autē maxime lumbos, & uerticula ex obliquo iuxta coxēdices, & genua, consistit autē dolor multo tēpore in inguinibus simulq̄ coxēdices, acutus et æstuosus, & si quis ipsum erigat, aut trāsmo ueat, præ dolore eiularē q̄ maxime potest. Aliquando etiā conuulsiō succedit, & rigor ac febris. fit autē & à bile, & pituita, fit itē à sanguine, dolor cōsimilis uelut ab omnibus morbis, & rigor ac febris aliquando corripit debilis. Cæterū eum qui à sole hoc morbo correptus est, sic curare oportet. Corpus ipsius fomento humectetur, & cibi ac potus, & alia quæ exhibētur, tepida ac humida prabean tur. Atq̄ hæc omnia cocta, cibo utatur maza molli, uino dulci nō subacta. Vi num bibar albū, aquosum, & corpore quietē habeat, & quāuis impotens fuerit ut exsurgat, tamē modice singulis diebus deambulet. & ne frigeat, & nō multa aqua lauetur. & quū tibi bene habere uisus fuerit, & corpore humidus esse, leni fomēto uehementer foueto. Magis enim remittit, et condensatiōnē ex articulis humectat ac relaxat. Deinde postera die cnidiū granum bibendū dato. Si uero non profuerit, hæc per clysterē infundito. cumini heminā dimidiam terito, & colocynthidem integrā paruam ac rotundā in mortario tundito ac cribrato, & nitrī rubri Aegyptij minæ quadrantē torreto, ac terito. Atq̄ hæc in ollam cōij cito, & olei heminā, mellis heminam dimidiā, uini albi heminam, & succi betæ quantū uidebitur affundito, & donec bonam crassitudinē habere uisa fuerint coquito. Deinde per linteū excolato, & si mel nō simul coquere uelis, mellis Ar tici heminā ipsi ammisceto. Si uero Articum nō habeas, optimi alias cocti he minam in mortario ammisceto. Si uero crassius fuerit hoc infusum, de eodē ui no affundito, iustæ crassitudinis respectu habito, & per clysterē infundito. de inde usq̄ ad dies tres purgari finire oportet. Si uero pluribus diebus purgetur, bubuli aut caprini lactis heminas tres ebibēdas dato. deinde betas pingues nō falsas, condimentis cōspersas, edendas exhibeto. Ex hoc morbo multi claudi fa cti sunt. Si uero à bile morbus fiat, ueratrū deorsum purgans ipsi bibendum dato, aut scammonia succum, post huiusmodi uero purgatiōnē, succi pituanæ melle affuso, heminas duas exorbendas dato. postera uero aut tertia die adhi bito fomento, lacte afinino cocto subpurgato. Ad uesperam autē pinguis betæ heminas duas edat, polēta inspersa. Vinū bibar album, aquosum, dulce, & nūc, & post pharmaci purgatiōnem. Si uero à pituita ægroter, cnidium granū, aut hippophaes, adhibito prius fomēto, bibendū ipsi dato. post purgatiōnē uero, eadē sorbitiones ac potus exhibeto. Itēq̄ lactis potione. Intermedijs autē die bus, diæta q̄ leuissima utatur. Et si quidē ab his utilitatē sentit, bene est: Sin mi nus, ipsum urito multis ac profundis crustis inultis, in ossibus quidē partibus, per fungos. In carnosīs aut, per ferramenta. Si uero à sanguine ægrotarit, fomen tum

tum adhibeto, & cucurbitā affigito, et uenas in poplītibus fecato. Si autem tibi uisum fuerit, etiā cnicidum granū ipsi bibendum dato. Diæta uero q̄ siccissimā utatur. Vinū autem ne bibat. Si uero bibere uelit, q̄ minimum & aquosissimum dato, & modice deambulare iubeto, aut si potens fuerit, plurimū. Conducit autē & à pituita ægrotanti talia facere. Si uero stare nō possit, in lecto ipsum q̄ frequentissime circumferre oportet, à quacūq; causa ægrotarit, per omnia similiter, ut ne intus chartilago cōcreseat. Si uero cōcreuerit, & articuli conglutinati fuerint, omnino necesse est hominē claudum fieri. Et si clysterem adhibere uolueris ei qui à sanguine ægrotat, quo sanguinem ac pituitam à coxendicibus abducas, hæc infundere oportet. Salis pugillo trito, olei heminam, & de orde decocto duas heminas ammisceto, atq; sic infundito. Si enim sic curationē feceris, celerrime sanum facies. Morbus autē grauis ualde est ac diuturnus. Tetani tres. Si ob uulnus tetanus siue distentio fiat, eger hæc patitur. Maxillæ cōglutinantur, & rigent, & os aperire nō potest. & oculi lachrymātur ac detrahuntur, & dorsum conglutinatum riget, & crura flectere nequit, necq; manus, necq; spinam. Quum autē lethalis fuerit, potum & cibos quos prius accepit, aliquādo per nares reddit. Hūc quum sic habuerit, fouere oportet, & pinguius unctum, ad ignem nō ita prope calefacere, & tepefactoria illito corpori adhibere. Et absinthium, aut lauri folia, aut hyoscyami semē, et thus terito, deinde uino albo diluta in ollam nouā infundito, & oleum pari cū uino mensura affundito, & cum his calefactis large calidis corpus ac caput illinito. Postea super pellicem indumentū reclinatū, ita ut pars ad quā fuit animalis caro sursum uergat, mollibus ac puris stragulis ac uestimentis contegito, quo uehementer exsudare possit. Aquā uero mullam tepidam, si quidē hanc bibere poterit, per os exhibeto. Si uero nō poterit, per nares infundito. Vinū autē album q̄ iucundissimū ac plurimum bibendū dato. Hoc quotidie facere oportet, donec sanus fiat. Est autē morbus grauis, & statim curatione opus habet. Opisthotonos. In distentione retrorsum sientē (opisthotonū uocant) aliā quidem eadem æger patitur. Fit autem, quum tendines qui sunt retro in ceruice ægrotarit. Aegrotat autē, aut ab angina, aut ab uua, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquādo etiā in capite febribus succedētibus, cōuulsio succedit. Iam uero etiā à uulneribus. Hic trahitur in posteriorē partē, & præ dolore circa dorsum ac pectora, eiulat. Hic conuellitur uehementer, ut uix detinere possint ipsum præsentēs, ne è lecto excidat. Hic sæpe in die dolore affigitur, sæpe etiā leuius degit. Huic sic habētū eadem exhibere oportet, quæ priori. Morbus autē adheret ad summū diebus quadraginta. Si uero hos euaserit, sanus fit. Alius tetanus. Hic tetanus minus lethalis est q̄ priores. Fit autē ab ipsōdem. Multi uero etiā ex casu in partes posteriores, à morbo correpti sunt, patitur igitur æger hæc. Totū corpus cōuellitur. Aliquādo uero quacūq; corporis parte id cōgerit conuellitur, & primū quidē obambulat. Postea tēporis progressu in lectū cadit, & rursus remittit & dolor, & cōuulsio, & si surrexerit, & tortosis ad paucos dies obambulat, postea rursus in ipsō afflictionibus iacet. Atq; hæc patitur ac transmutat, per multū tempus, & si quid comedit, nō fecedit infra, nisi difficulter, atq; hoc cōbustū. At in pectoribus hæret cibus, & suffocationē inducit. Hūc si ipsō curaueris quibus priores, celerrime sanū facies. clysterē uero ex præfana cocta tenui, ac melle adhibeto.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE VIRGINVM MORBIS, IANO CORNAS
rio Medico Physico interprete.

PRINCIPIUM sit mihi compositionis eorum quæ perpetua sunt in arte medica: Non enim possibile est morborū naturam cognoscere: si quidem artis est inuenire: nisi quis nouerit naturam in diuisibili, ex qua in principio discreti sunt: primum de morbo sacro appellato, & de atonitis siue syderatis, & de timoribus, ex quibus adeo fortiter pauent homines, ut delirent, & dæmones quosdam uidere se putent, ipsi infestos, quandoq; nocte, quandoq; interdiu, aliquādo uero utroq; tempore. Postea ab huiusmodi spectris multi iam se strangulauerunt, plures autē mulieres, q̄ uiri. Est enim muliebris natura animi magis deiecta ac imminuti. Cæterum uirgines nobiles & maturæ uiro, hoc magis patiuntur, unā cum mensum descensu, antea non ualde hinc afflictae. Postea enim sanguis in uteros cōfluit, uelut effluxurus. Quū igitur osculum exitus nō fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, propter cibos & corporis augmentum, tunc sanguis nō habens effluxum, præ multitudine resilit ad cor, & ad septum transuersum. Quum igitur hæc repleta fuerint, cor fatuum sit, deinde ex fatuitate torpedio, postea ex torpedine delirium apprehendit. Quemadmodum quum aliquo longo tempore desidente, sanguis ex coxis ac femoribus depressus, in tibiis ac pedes torporem inducit. A torpore autem, pedes ad iter faciendum impositæ fiunt, donec sanguis ad seipsum reuertatur. Reuertitur autem celerrime, quum steterit in aqua frigida, quæ ultra malleolos madefaciat. Atq; hic quidem torpor facile cedit. Cito enim propter uenarum rectitudinem refluit. Et locus corporis nō est periculosus. At ex corde & septo transuerso tarde refluit. Venæ enim obliquæ sunt, & locus periculosus, et ad delirium ac insaniam paratus. Quum enim hæc partes repletæ fuerint, & horror cum febre ingruit, erroneas febres appellant. his autem sic habitibus, præ acuta quidem inflammatione, insanit: præ putredine uero, clamat: præ caliginositate autem, timet ac formidat: præ compressione uero circa cor, strangulationes parat: præ sanguinis autem malicia, animus increns ac anxius malum attrahit. Sed et alium horribiliter cōpellat, et in putros proflire ac incidere iubet, et strangulari, tanquam meliora sint hæc, & omnem uitæ utilitatem excedentia. Aliquādo uero sine spectris ac phantasmatis, uoluptas quædam adest, ex qua mortē, uelut bonum aliquod, amat. postquam autē respuit homo, mulieres tum alia multa, tum pretiosissimas muliebres uestes Dianæ consecrant, à uatibus id iubentibus deceptæ. Cæterum curatio ut hinc liberentur, est sanguinis detractio, si nihil fuerit quod impediatur. Ego uero iubeo uirgines quæ huiusmodi patiuntur, q̄ citissime uiris cohabitare. Si enim conceperint, sanæ fiunt. Si uero huiusmodi non affuerint ipsis, simul cum putredine, aut paulo post corripentur, si non uiro nupserint. At uero ex mulieribus uiro iunctis, steriles magis hæc patiuntur.

q̄ med. i. q̄ uis
Pauentur q̄ dæmon
nā. q̄ dæmon
Pauentur nā. q̄ dæmon
(See) dæmon. nā. q̄ dæmon
q̄ dæmon. nā. q̄ dæmon
nā. q̄ dæmon.

malū
de uirginibus
q̄ dæmon. nā. q̄ dæmon
nā. q̄ dæmon.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE NATVRA MULIEBRI, IANO CORNARIUS Medico Physico interprete.



Ne muliebri natura ac morbis hæc dico. Maxime quidem natura
 men in hominibus causam esse. postea uero naturas mulie-
 rum, & colores. Nã quæ superalbidæ sunt, humidiores sunt *ex colore uisum*
 & fluidiores. Nigræ uero duriores acerbioresq; ac adstric-
 tiores. Quæ uero uini colorem referunt, mediū quid inter
 utraq; habent. Sic autem & in ætatibus contingit. Iuencu- *ex etate*
 læ enim humidiores sunt, & multo sanguine plerunq; refer-
 unt. Aniculæ uero sicciore, & modicū sanguinem habentes. Mediæ aut, mediū
 quidā inter utraq; habent. Oportet aut eū qui hæc recte tractare uelit, primū
 quidē ex dijs ordiri. Deinde mulierū naturas discernere, itemq; ætates, & tem-
 pora, & locos, in quibuscūq; degunt. Frigidi enim loci, fluidi sunt. Calidi uero,
 siccī & stabiles. Initiū autem faciam ab humido secundū naturam. Si aqua in-
 tercus in utero oboriatur, menses pauciores ac deteriores fiunt. Deinde repente *signum uigilantissimum*
 deficiunt. & uenter in tumescit, & māmæ siccæ fiūt, & reliqua male habet. Et in uē-
 tre sibi habere uidetur. et ex his cognosces, quod aqua inter cutē laborat. Sed et
 in ore uterorū significationē de se præbet. T angētibus enim gracile apparet. &
 calor & aqua ipsam corripit. Quū autem tēpus amplius processerit, dolor imū
 uentrē, & lumbos, ac laterū mollitudinem occupat. Hic morbus maxime fit ex
 abortu. Accidit itē ex alijs. Quū sic habuerit, calida lauare oportet, & repara-
 riā adhibere, donec dolor sedetur. pharmacū aut deorsum purgans bibendū da-
 re oportet. post pharmacū uero, uteros bubuli stercoreis fomēto fouere. et postea
 ea medicamentū cū cantharide præparatū apponere. Et interpositis tribus die-
 bus, id quod cū felle paratur. Vna uero die interposita, per tridū aceto infuso
 colluatur. & si quidē ueter mollis & uacuu fiat, & febres sedatæ fuerint, et mē-
 ses prodeat, uiro cōdormiat. Sin minus, rursus eadē facito, donec menses proces-
 sant. & aliquibus subdititjs utatur. Intermedijs aut diebus crethmi corticē bis-
 bat, & paxoniæ grana nigra, & sambuci fructū, ieiuna in uino. & Mercurialem
 q; plurimā edat, & allium cocū ac crudū. & cibus mollibus, & polyphis, ac alijs
 mollib. utatur. Si uero pepererit, sana erit. Si uteri ad hepar accesserint, muta de
 repēte fit, et dentes cōserit, & color niger fit. patitur aut hæc derepēte dum sana
 est. Fit aut huiusmodi affectio uirginibus maxime antiquis, et uiduis, quæ iuue- *signum uigilantissimum*
 culæ sunt & pepererūt, ac uiduæ manent. Quū sic habuerit, depulsione per ma-
 nū infra facta, sub hepate aut sub præcordijs, fascia deligato, & aperto ore uinū
 odoratisimū infundito. Et graueolentia naribus adhibeto ac suffito. Sub utero
 uero bene olentia. Postq; aut respuerit, pharmacū infra purgās bibendū da-
 ro. & lac asininū postea bibendū exhibeto. Deinde uteros odoratis foueto, &
 medicamēta cū buprestis præparata apponito. Postridie uero Netopon unguē-
 tū. Intermissis autē duobus diebus, uteros cū odoratis colluito. Et postridie pu-
 legiū apponito. die uero una interposita, aromata suffito. Atq; hæc quidē uidug
 facito. Virginē aut ut uiro cohabitaret persuadeto. ad uteros uero nihil adhibeto,
 necq; pharmacū bibendū dato, uerū conyzā et castoreū in uino ieiung exhibeto.

&

& caput odoratis ne ungar, necq̄ odorata olfaciat. Si uteri procciderint, & fo-
 ras egredi fuerint, calor habet maxime pudenda, & sedem. Et urina paulatim
 desillat, ac mordet. hæc patitur si ex partu progressa uiro cōdormierit. Quum
 autem sic habuerit, myrti baccas & loti ramenta, in aqua coquito, & aquam per
 noctem sub diō exponito, & pudenda cū eo decocto q̄ frigidissimo perfundia-
 ro, & eadem trita pro cataplasmate adhibeto. postea bibens aquam lentium, &
 mel, et acetum, donec uteri fuerint eleuati, uomat. Et lectum à pedibus altio-
 rem facito, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata uero sub nares. Cibis uero
 utatur mollissimis ac frigidis. Et uinum aquosum album bibat. Ne laetur au-
 tem, necq̄ cum uiro dormiat. Si uero penitus ex pudēdis exciderint, depen-
 dent uelut scrotum. Et dolor corripit inum uentrem, & lumbos, & quum tem-
 pus processerit, ad locum redire non uolunt. Morbus autem corripit, quum ex
 partu progressa uteros doluerit, aut cū uiro in puerperij purgatione concubue-
 rit. Quum uero sic habuerit, frige-factoria ad pudenda apponere oportet, &
 quod foris est depurgatū, & cum uino nigro, in quo malum punicum coctum
 est, ablutum, intro detrudere. Deinde mel, & resinam mixta infundere. Decum-
 bat autem supina pedes sursum extentos habens, postea spōgias imposito, &
 ex lumbis deligato. Quum autem sic habuerit, à cibis quidē abstineat. potu ue-
 ro, q̄ paucissimo utatur, donec septem dies præterierint. & si quidem sic ingre-
 di uoluerint, bene habet: Sin minus, summas uteri oras deradito, calefacito, ab-
 luito, ac cerato picato illinito, & alligata ad scalam muliere, scalam iuxta caput
 pulsato, & uteros cum manu intrudito. postea crura ipsius alternatim colliga-
 to, & sic per diem ac noctem finito. & modicū ptisanæ succum frigidum dato,
 aliud uero nihil. Postera die decumbenti cucurbitam q̄ maximam ad coxendi-
 cem affigito, & multo tempore trahere finito. postquā uero detraxeris, ne scari-
 ficato, sed reclinatam finito, & nihil aliud q̄ succum exhibeto, donec septē dies
 præterierint. Si uero sitiat, aquam dato frigidam q̄ paucissimam. Vbi uero se-
 ptem dies præterierint, cibis mollissimis ac paucissimis utatur. Si uero uentrem
 exonerare uelit, decūbens exoneret, donec quadraginta dies prætereāt, postea
 surgat, et parcissime obambulet, et ne laetur, sed intra pudendum graueolen-
 tium suffitum admittat, et modica edat. Si uteri adglutinati fuerint, incum-
 bunt, et si contigeris, uidebis locum durum sub lateris mollitie, et dolor corripit
 inum uentrem, & laterum mollitudinē, & lumbos, & in crura dolor inruit, ea q̄
 extendere non potest. Sepe uero etiam suppurantur, et linamentis inditis cura-
 tæ ac fluentes moriuntur, si nō uisseris, aut secueris. Quum autem sic habuerit,
 pharmacum infra purgans bibendū dare oportet, et multa calida lauare ac fo-
 uere, et quum recens lota aut foia fuerit, iubere ut admota manu, cum digito os
 uterorum abstrahat, et myrrham caloniam suffiat, rosaceo affuso. Bibat autē
 pæoniæ grana nigra quinq̄, castorio ammixto, in uino odorato, et in coxam sa-
 nam decumbat, et apponat Baccarim unguentum, aut oleum album ad coxam
 sanam, et edat allium plurimum, et crudum, et coctū, et succum forbeat, et cibis
 mollibus utatur. postquā autem dolor quieuerit, abduces euntem super sanam
 coxam, postea uero fomentum ex urina adhibeto, lauro inspersa, et à fomento
 cyclaminum apponito. postera die lotæ suffitus ex aromatis adhibearur. Ca-
 terum ex hoc morbo maxime steriles fiunt. Si complicatum fuerit os uter-
 orum

rorum, menses non prodeunt. Si uero prodeant, pauci ac prauis sunt. Et tibi cum uiro coit, doler. & dolor inimum uentrem tenet ac lumbos. Et si contingat digitis & os requirat, non est manifestum. Quum sic habuerit, urina humana foueatur, & post fomentum lenticulae decocto lauetur, & postquam lota fuerit, uteri unguento Aegyptio foueatur. Et si odor ad nares ascenderit, spes est ipsam sanam fore. Et quum dormire uoluerit, Aegyptium oleum in lana subdat. Postera uero die consideret an magis correcti sint uteri. postea odoratis foueto, & purgatoria quae non mordeant subdito, & post subditiua medicamenta, pari mensura aceti ad aquam ammixta eluito. Quum autem menses prodierint, ieiuna et illota, & sufflata, cum uiro coeat. Maxime uero ex hoc morbo steriles fiunt. Si uteri ad coxam decurrerint, & menses non procedunt, & dolor ad inimum uentrem accedit, & ad lateris mollicie, et si digito contigeris, deprehendes os in coxa. Quum ita habuerit, calida lauato, & alia plurima edenda dato. Et lac ouillum purum bibat, & postquam lac purum exhaustit, fomento adhibito, postea pharmacum infra purgans exhibeto. Quum autem purgata fuerit, rursus uteros foueto, ex foculo & absinthio permixtis. Vbi uero recens fora fuerit, os cum digito abstrahito, & scillam apponito, & interposita die postea id quod praeparatur cum narcisino adhibeto. Si uero tibi purgata esse uisa fuerit, Netopon apponito. Et posthinc rosaceum unguentum. Ceterum prima mensium decurrentium die ab apponendo cessato, postera uero incipito ubi defecerint. At in mensibus si quidem sanguis eruperit, satis est. Sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus & alis ac capite reiectis, & paeoniae grana nigra quinque, & sepię oua, & apij semen, cum uino. Et si dolor habuerit, & urinae stillicidium uexarit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam bibat aquosam. Si uero a primo non fuerit purgata, rursus bibat donec fiat, postquam autem purgatio decurrit, ieiuna cum uiro coeat. In purgatione uero mercurialem edat, & polypos coctos, & cibus mollibus utatur. Liberabitur autem a morbo, si in uentre habuerit. Si ex partu non fuerit purgata, tumet uenter & crura, & rigor ac dolor inimum uentrem, ac lumbos tenet. Quandoque etiam ad uiscera ascendit, & animo linquitur. Atque haec patitur incipiente morbo, progressu uero temporis, cauae faciei partes rubescunt. Quum igitur sic habuerit, fomento uteris adhibito, cyclaminum apponito. Bibat autem medicamentum cum tæda praeparatum, donec fluxus fuerit commotus. Ad os uero uterorum, adipem anserinum illinito, & myrrham, & resinam tepidam, & quae maxime deambulet, & ante cibum Mercurialem coctam edat, & allium ac porrum, & brasicam succum forbeat, & cibus mollibus utatur, & magis marinis, & calida lauetur. A pinguis autem & dulcibus abstineat, donec sana fiat. Si uteri pituita impleti fuerint, flatus oboritur, et menses albi pituitosi superueniunt. Aliquando etiam sanguis tenuis pelliculis plenus, et praeter humiditate cum uiro coire non uult, & pallida ac tenuis fit. Interrogare igitur ipsum oportet, an quod fluit mordeat & exulceret, & si non mordeat, pronunciare a cerebro fluxum esse. Si uero mordeat, a uentre. Si quidem igitur a uentre fuerit, a lenticulae decocto uomat. Deinde ueratro purgato, postea idem in nares immittito. Postquam autem superior uenter tibi purgatus esse uidebitur, pharmacum infra purgans bibendum dato. A cibus autem pinguis ac dulcibus abstineat. Acres autem exhibeantur, uelut commodi, nisi pudenda fuerint exulcerata. praesentant autem fri

gidi. Et modice lauetur, non tamen calida, neq; caput. Ieiuna uero bibat hypericum, semen apij, saluiam, in uino aquoso. Quū autem cessauerit fluxus, cū succo grossorum eluito, & postea acerbis colluito. Est autem morbus grauis. Si uteri inflammati fuerint menses omnino non prodeunt, aut prauī & pauci. Et quum ieiunā est, uomitus ipsam corripit. Vbi uero quid ederit, uomit cibos. & dolor in uentre ac lumbos habet. & animi deliquiū inuadit. Venter autem aliquādo durus, aliquādo mollis est, & inflatur ac magnus fit. & putat se in uentre habere. Si uero cōtigerit, plenitudo illa uacua fit. Huic usq; ad decimū mensem tumor paulatim augetur, uelut in uentre habenti. Vbi uero decem menses præterierint, uenter aqua impletur, & umbilicus eminet. Et si digitum admoueris, os uteri gracile & collapsum cōperies. Et ubi menses apparuerint, pauci sunt & prauī. Et clauiculæ ac collum attenuantur. Et pedes intumescunt. Quū igitur sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendū dato. & ad uteros quæ purgant & non mordent apponito. Et post appositionē uteros eluito, pari mēsurā acetī acerrimi ad aquā ammixta. & Mercurialem edat, & succū eius farina inspersa, ubi cocta fuerit absorbeat. Morbus autē est periculosus. Si ignis facer erysipes fas dictus in uteris oboriatur, tumor fit à pedibus exorsus, & ad crura & ad lumbos procedens. Quum autē tempus amplius processerit, intumescit etiam uenter, & rigor ac febris corripit, itemq; debilitas. Præ dolore uero, quiescere non potest, sed iactat seipsam. Dolor autē ex imo uentre ascendit ad lumbos, postea sursum uergit ad præcordia, & pectora, & caput. Et mori sibi uidetur. Quū autem remiserit, torpor occupat manus. Aliquando etiam inguina & crura, & poplites. & liuida fit, & modico quādoq; tempore sibi melius habere uidetur. Deinde rursus eadem patitur. & corpus pustulis impletur. & facies rubescit, & siatis fortis tenet, & fauces siccæ sunt. Hic morbus si prægnanti fiat, moritur. Sin minus, curata sanatur. Quū igitur sic habuerit, adhibere oportet, si dolor habeat, frige-factoria, & uentrem turbare. Et si quidem in uentre habeat, cibus ac potibus utatur, à quibus fetus non corrumpitur. Si uero non secedant, clysterem adhibeto. Si autem in uentre non habuerit, pharmacum bibendum dato. & cibus paucissimis utatur mollissimis ac frigidis. & Mercurialē edat, & sambucū. & neq; salia, neq; pingua, neq; acria, uelut est origanum, aut thymus, aut ruta. Postquam autem calor & strangulatio remiserit, & tumor non fuerit sedatus, medicamentum fortius infra purgans postea bibendū dato. Morbum autem hunc paucae effugiunt. Si uteri præter naturam hient, & menses plus quam oportet prodeunt, uiscosioresq; ac frequentiores. & genitura non manet intus. Et si digito contigeris, os hians cōperies. & febris ac rigor & dolor, in uentre ac lumbos corripit. Hic morbus à fluxu sanguinolento corripit. fit autem quum menses suppressi derepente eruperint. Huic quum dolor maxime habuerit, tepe-factoria apponito. Et quum remiserit, uteros foueto. & pharmacum infra purgans bibendum dato. Et quæ non mordent subdito. & post subdititia medicamenta, cum acerbis colluito. & quā minimū lauato. Cibus autem siccissimis utatur. Si uero his factis sana non fiat, pharmacum bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur. Et quum menses moti fuerint, & quū quiesuerint, eiusdem modi uictum exhibeto. Morbus autem lethalis est. Si uteri ad medium lumborum processerint, dolor in uentre habet, & crura contrahunt

trahuntur. & quum aluum exonerat, dolores acutiores fiunt, & stercus cum ui prodit, & urina destillat, & animo linquitur. Quum sic habuerit, fistula ad uescicam alligata uteros sufflato, & fomentum adhibero. Aut multo calido lauato, & male olementia sub pudenda sufflato. Sub nares autem odorata. Quum autē dolor cessarit, lenticulæ decocto præpotato, pharmacum sursum purgans bibendum dato, à quo uenter moueatur. postquē autem uteri ad locū suum redierint, medicamentum infra purgans bibendum exhibero. & postea lac bibendū daretur. Postea fomento ad uteros adhibito ex uino, medicamēta cum lauro præparata immittito, & apponito quæ non mordent, ammixto aceto. Postea aromata sufflato. Cæterum steriles & claudæ fiunt ex hoc morbo. Quum fluxus albus obortus fuerit, uelut urina albinina apparet. Et dolor in uentre habet, & lumbos, & lateris mollitudinem, & tumores sunt crurum ac manuum. & caua eleuantur. & oculi humidi sunt, & color arcuatus ac albus fit. Et quū iter facit, anhelat. Morbus autem fit, si ubi natura pituitosa est, febricitarit, & bilis commota purgata non fuerit. Si quidem igitur uenter acuerit, uentris profluuia fiunt. Si uero ad uteros uertatur, fluxus fit. Postquā igitur uentris profluuū habuerit, papaueris albi ac rubri corticem pari pondere, & spinæ fructum in uino diluto terito, & polenta recenti insperfa bibat. Si uero uelis, malicorium calido cinere torrefactum ac tritum ex uino bibat, pari polenta ac farina insperfa. Minimum uero lauetur. Cibis autem utatur quæ siccissimis ac frigidis. Vbi uero fluxus quiesuerit, pharmacum bibendum dato, à quo superna purgentur, & lac asininum bibat. Postquā autem infra purgata fuerit, bubulū lac bibat, ad dies quadraginta, si poterit meracum, sub dio per noctem expositum, quarta aquæ parte ammixta. Vespere uero ubi ebibit, alicam forbeat. Quum autem decem dies fuerint transacti, lactis & aquæ decimam partem detrahit. Quantum autē detraheris, tantam tepidi recens multæ portionem additam bibat. posttridie uero duas portiones, ut in decem portionibus pro modico diluto sit meracū, & ad quatuor dies bibat. Dum autem decimam partem detrahit, etiam de forbitione amplius addat. Postquam autē quatuordecim dies transfegerit decimam lactis partem bibens, postea tertiam aquæ partem affundens, ad dies decem bibat. & cibis utatur. & sic fiant omnes dies quadraginta. Quum conceperit & iterum ac partus gestarit, ea quæ natura sterilis est, primum quidem menses deficient, & pauciores fiunt, & tēpus in quo prius fiebant, transmittūt. Postea derepente multi fiunt, & puri ac fortes. & si quidem semel facti fuerint, de cætero secundum rationem in uentre habet. Sin minus, & primum fiunt & iterum atque iterum in mēse, postea ex seipso desinet fluxus, pallidatque ac tenuis fit. Pharmacum igitur & sursum & deorsum purgans bibendum dare oportet. Et lac asininum postea bibendum aut serum. Postea adhibito fomento, uteros medicamento quod non mordeat purgato. Deinde cum aceto colluito. Postea aromata sufflato. Hæc autem facito ut prima mēsum die facta sint. Et ne sit illota & impasta, cyceonem insulsum crassum bibens, & aromatis sufflatur, netopo affuso & unguento rosaceo. Postea cum uiro coeat. Si acetabula pituita plena fuerint, menses quidem bene succedunt, & in uentre habet. Corrupti autem fetum ubi fortior factus fuerit. Non enim retinere potest, sed abrupitur. Cognoueris autē hoc modo. Humida fit, & mucosum ac uiscosum destluit, & nō mor-

det. & in mensibus ubi à fluxu purgari cessauerit, per duos ac tres dies muci àb uteris prodeunt. Hæc grossorū succo eluito, & collutione per acerba postea bis aut ter facta, de cætero apponito id à quo pituita purgatur. & mollia fomenta adhibeto. Et post subdititia apposita, pari mensura acetī ad aquā ammixta eluito. & in mensibus aromata suffito, postea impasta & illota cum uiro dormiat.

Quum menses occultati fuerint, dolor in uentre tenet, & onus in cubere ipsi uidetur, & lumbos doler, ac laterum mollitudinem. Quū uero ad præcordia uteri allapsi fuerint, suffocant, & ubi frequenter acida euomit, ad modicum tempus melius habet. Dolor autē & ad caput & ad collū procedit. Postq̄ igitur allapsum parant, aut allapsi sunt, tepefactoria adhibeto, & graueolentia suffito, infra autem odorata. & castorium bibendum dato, & conyzam. Vbi uero deorum prociderint, infra graueolentia suffito, sub nares autē odorata. Sedatis autem doloribus, pharmacum bibendum dato. Et lac asininū postea bibendum. Deinde succum à quo uomat dato, & ad nares apponito. Postquā autem purgaueris, fomēto uteris adhibito ex his quæ cū lauro præparantur, id quod ex narcisso præparatur apponito. Et tribus interpositis diebus, fomento adhibito, id quod ex cantharide præparatur apponito, & postera die adipem anserinum, postea intermissis tribus diebus, collutione cū aceto parata eluito. In purgationibus autem, mercurialem ante cibos edat, & cibis mollissimis utatur, & acria edat. Et bis in die calida lauetur. Si uero menses non fiant, ubi hæc opportuno tempore feceris, cantharides bibendas dato. & postquā prodierint, ieiuna & illota, ac suffita, cum uiro dormiat. Quum in uentre habens, fœtum menstruum aut bimestrem corruerit, & ad perfectionem gestare non poterit, & tenuis præter naturam fiat. Huius uteros purgare oportet ac corpus pinguefacere. Non enim prius fœtum perferre poterit, q̄ uteri ipsius crassi fiant, & robusti euadāt. Si uero crassifœcia fuerit mulier præter naturam, nō concipit in uentre. Nam omentum multum ac crassum incubens uteros deprimat, & geniturā non suscipit. Hanc attenuare oportet, & pharmacum infra purgans bibendum dare. & ad uteros apponere quod purget ipsos, & flatu inducat. Si uero os uterorum durum fiat, aut ceruix, digito intromisso id cognosces. Itemq̄ si ad coxam fuerint auersi. Quum sic habuerint, nihil acre adhibeto. Si enim os exulceraueris, ubi inflammatum fuerit, periculum est ne penitus sterilis fiat. Verum apponito quæ non mordent, à quibus purgetur. Si mulierem parere non poterit purgare uelis, & fuerit biliosa aut pituitosa. Cognosces autem utrū horum sit, si arena substrata quum menses fiunt, in sole sanguinem superfundas, ac siccare sinas. Si enim biliosa fuerit, supra arenā sanguis pallidus erit. Si uero pituitosa, uelut mucus erit. Et sanè utrum horum fuerit, infra purgato, & ad uteros subdititia apponito. Si menses omnino non fiant, si quidē præ dolore id contingat, primum uentrem infra purgato, deinde medicamentum à quo sanguis ex uteris purgatur apponito. postea intermissa die una aut altera, rursum id à quo sanguis purgatur apponito. Reliquo uero tempore corticem crethmi in uino tritum bibat. Si humidius fuerit os uterorum quàm oportet, acria apponito, quo morsum perrepret, & inflammatū ualde durum fiat. Si uero induratum fuerit, acria adhibeto. Mordentia enim saniem diffundunt. Deinde mollia apponito. Sed & ad alios morbos non minus apponito. Si puerperæ
uteri

uteri in coxam incubuerint, aut ad lateris mollitudinem, ad sanam coxam oleum Aegyptium album, aut baccharim unguentum apponere oportet. & in sanam coxam decumbat. & pæonia grana nigra quinq; bibat, & fructus sambuci conchæ testam maiorem, & castorij magnitudinem fabæ in uino. postea lota suffiatur. & potibus ac cibis mollibus utatur, & mercuriali. & acris omnibus, excepto raphano ac cepis. Quum suffocarint uteri, graueolentia omnia suffire oportet, bitumen uidelicet, sulphur, cornu, lucernarium funiculum, phocæ adipem, castorium. Odorata uero subter pudenda. Si uero puerperæ inflammati fuerint uteri, ardet, & suffocatio habet. Quum autem sic habuerit, muscum marinum tenuem tritum super linteolo extentum pro cataplasma te adhibeto. postea crudam oydeaceam farinam, & cinerem sarmetitium, ac lini semen, oleo & aceto affuso coquito, donec uelut farinæ subactæ massa fiat. Deinde quàm calidissima ferre potest imo uetri imponito. Si uero fixi fuerint uteri, lentem & mentam multam in aceto coquito, ut uapor inde in os trahat, & nares adhibeat. & graueolentia suffito. & mercurialem edat, & in succo eius farinam coctam forbeat. Quæ celerrime aut & priusquàm dolor occupet, exhibere oportet pharmaca, quæ uteros à dolore leuant. & cibos per aluū secedentes assumat. Si uero uenter calefiat, clysterem adhibeto. Si ex partu inflammati fuerint uteri, solani succum in pudenda infundito. & ubi hic calidus factus est, alium infundito, Si uero hic non fuerit, lentisci aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum expressum infunde. & quod in medio huius est tenerrimum, derafum longa forma inde, postea cerusam aqua tritam & lana exceptam appone. Si uero horuerit, tolle. Si uero mulier ab utero debilis sit, & bilis ipsam suffocet, & opus sit ipsam leuiter purgare, & dolorem sedare, peucedani succum tritum cyathorum mensura bibendum dato. Si in lumbis aut lateris mollitudinem fuerint uteri, & transuouere uelis, sulphur & bitumen terito, & melle cocto affuso, glandulam crassam facito, & in sedem indito. & uteri si sicci fiât, hæc quàm celerrime apponito. Mulieri si uteri sicci fiât, & ad pudenda promineant, & inguina dura fiât, & calor in pudendis in sit, cancerari incipit. Quum sic habuerit, cucumeris syluestris internam partem aridam terere oportet, & aquæ hemina affusa, in sedem immittere, & purgari finire donec purgetur. Quum autem mulieri pharmacū dederis, ammisce ad pharmacum ea quæ uteros purgant, & quæ expellunt.

Potiones, & subdititia medicamenta, quæ secundas educere, & menses detrahere possunt.

CAntharides quinq; auulsis alis & pedibus ac capite, deinde tribolos ad mare nascetes unâ cū radice, mensuram quanta est conchæ testa terito. & anthemii pallidam siue luteam internam partem siccam tritam, cōchæ testam addito, & feminis apij tantundē, & sepia oua quindecim, & in uino dulci diluto bibenda dato. & quum dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat. Aliud. Ranunculi foliorum & floris triti Aeginei stateris pondus, in uino dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album & uuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. & ubi urinæ stillidum uexarit, in aqua tepida desideat. Aliud. Adiantii staterem Aeginæ um, in uino albo pari aqua ammixta, bibendum dato. Aliud. Viola albæ

femen quantum tribus digitis apprehēdi potest, in uino albo eodē modo temperato, bibēdum dato. Aliud. Leucioj nigri radicem, in uino eodem modo fumat. Aliud. Crinanthemum quod in domibus nascitur, eodem modo misceto ac bibēdum dato. Aliud. Anchusae foliorum pugillos duos, in uino albo æquali aqua ammixta, bibendos dato. Aliud. Chamæleonis radicem, uelut ueratri potionem, deorsam in uino albo, aqua pari mensura ammixta, bibendam dato. Aliud. Brasicæ & porri succum, ad utrumq; succi silphij obolis tribus ammixtis, ex uino albo cū pari aqua bibendū dato. Aliud.

Oliuas albas priusquā oleum in sit cōpunctas siccato, postea tulas & cribratas ac in uinum iniectas bibendas dato. Hoc & menses detrahit, & secundam expellit. Aliud. Dictamni cretici obolum in aqua bibendū dato. Et si hoc in potu dato, secundam ejicere non potes, sambuci succo cocto immisso foueto, & cantharidem apponito. Hoc etiā foetum expellit. Quum autem morsum intulerit, auferat, & rosaceo unguento tinctum apponat donec elapsa fuerit.

Aliud. Populi nigrae creticae grana nouem trita, in uino bibēda dato. Cum hoc etiam abluatur, si difficulter pariat. Aliud. Conyzæ testam conchæ maiorem cum porri succo diluito, & netopi testam conchæ maiorem ammisceto, & hæc in uino bibenda dato. Aliud quod menses detrahit. Peucedanum & panaces, & pæoniae radicem, in uino bibēda dato. Aliud quod foetū mortuum & secundas ejicit. Violæ & portulacæ semen contundito ac misceto, & in uino albo ueteri exhibeto. Aliud quod menses detrahit. Seminis uiolæ albæ quantum tribus digitis apprehendi potest, & stercoris caprini pilulas quinque aut sex, in uino odoratissimo permisceto, & bibenda dato, ubi prius fomentum ex aqua & oleo immiseris. Adhibeto autem fomentum in sella, & ubi hæc bibit, quā celerrime lotam reclinato. Brasicam uero edendam exhibeto, & succum eius forbendum. Aliud. Seminis uiolæ albæ quātum tribus digitis apprehendi potest, in uino bibendum dato, & in aqua calida desideat. Si uero id nō habeat, foeniculi radices cōtusas, in aqua multa tepida macerato, & exhibeto. Aliud. Fraxini grana decem, in uino bibēda dato. Hoc in omni uterorum morbo commodum est, & ualde ciet urinam. Aliud. Succum silphij magnitudine erui, & nasturtij semen terito ac ammisceto, & in uino aut lacte canino bibenda exhibeto. Hoc etiam foetū expellit. Aliud foetum ejiciēs.

Ranunculum herbam, & parum elaterij, in aceto temperato mixta bibenda dato. Aliud ad idem. Brasicæ caulem tenerum, extremitate ex netopo illita, affricato. Aliud si menses non fiant. Terebinthi fructum tritū, in uino & aqua dilutū ac excolarum, ieiunæ bibendum dato, & calida lauatur. Aliud menses ciens. Rubra pæoniae grana, in uino ieiunæ bibēda dato. Aliud ad puerperij purgamenta purganda. Foeniculi semen, & crethmi corticē, & thus, in uino bibenda dato. Aliud. Tædam q̄ pinguisimam in uino coquito, & pæoniae grana quinque in uino terito, & heminae quadrantē bibendum dato.

Aliud. Mercurialis semen & folia, in uino bibenda præbero. Aliud. Pæoniae grana nigra quinque, & sepiæ oua in uino bibenda dato. Ad omnem puerperam. Ad irionē & polentam, oleū affunde, & coctū forbeat, & cibus q̄ mollissimis utatur. Aliud. Scamoniā in lacte muliebri tritā, lana exceptam appone. Aliud. Mercurialis folia trita in linteo subde. Aliud.

Herbam

Herbam artemisiā tritam, & unguento rosaceo imbutā appone. Aliud.

Albam radicē tritam ac rosaceo unguento subactā appone. Aliud. Paeoniae radicem melle, unguento rosaceo & Aegyptio subactam, in lana subde.

Aliud. Farinā non lotam eodem appone. Aliud. Lolij & tritici farinā, simul melle subactas, in lana subde. Aliud quod menses et puerperij purgamēta purgat & aquam ducit. Radicis struthij tusi tritū quātum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum appone. Nascitur aut in Andro in littoribus.

Aliud ad uteros depurgādos. Mercurialis cōtusa, & cucumeris syluestris modicū, in uino tere, & melle subacta appone. Aliud. Pilos leporis cōbustos, ac tritos in uino, & melle coctō & aqua subactos, bibēdos dato, & aqua calida lauetur. Aliud partus purgatoriū. Polentā crassius frefam dimidij hemichenicis mensura, in aqua heminis quatuor coquito, & ubi efferbuerit, bis aut ter forbendā dato. Aliud purgās puerperij purgamenta. Sambuci folia coquito, & oleo affuso bibēda dato. Edat & brassicas coctas, & porrū. Aliud purgans uteros. Rhois folia & irionem terito, & in uino, polenta inisperfa, bibenda dato. Aliud. Misyos obolos duos tritos & uino subactos apponito.

Aliud. Lini semen tritū, uino subactū apponito. Aliud. Trifolij semen in uino bibēdum dato. Si uero ad lumbos uteri incubuerint, polypos coctos edat, itemq; affatos, & uinum bibat nigrum, odoratū, meracum q̄ plurimum.

Aliae potiones, medicamenta subditicia ac purgatoria. Rhoem rubrum, & uinacea, in aqua coquito, & farina tritici recentis in aquam inisperfa, bibendam dato. Aliud. Farinam in aquā iniectam bibendā dato. Aliud. Mora rubi

ficcato ac terito, & polenta recēti ammixta, amborū acetabuli mēsuram, in uino odorato & aquoso, bibat. Aliud. Terram nigram famiam in aqua tritā, tali magnitudine bibendam praebero. Aliud. Hypocistidem in uino bibendam dato. Aliud. Mala punica uinosa exsuccato, & polentā cū succo subactam ficcato. Postea tritam in uino bibendam dato. Aliud. Baccas myrti nigras tritas in aqua diluito, & polenta inisperfa, bibēdas exhibeto. Aliud. Mali punici dulcis affati drachmā, in uino tritā bibēdam dato. Aliud. Triticū & ordeum torrefacta, trita, & ad farinā redacta, in uino nigro bibēda dato. Aliud.

Mali punici dulcis internam partem, pari aqua ammixta bibendam dato. Aliud. Cicutaē quantū tribus digitis apprehēdi potest, cū aqua bibendū dato. Aliud. Farinae tritici recentis, & gypsi, aequales partes mixtas in aqua bibendas dato. Aliud. Mali punici dulcis corticē ac corium, in uino bibendū dato. Aliud, si sanguis ex uteris fluat. Viticis folia in uino nigro bibenda dato. Aliud, ad fluxū ac dolorem. Rosmarini radicē in uino bibendam dato. Alias item potiones ad uteros habes. Cedri fructus, fesei, cuminum Aethiopicū, casiae fructum, iuniperi baccas, milium, lentisici fructum, nigellam, dauci radicē ac semen. Aromata uero, thymū, thymbrā, ericen, hypericū, papauer album, crethmi radices ac semen, malue radices, mercurialis semen, & folia, urticae semen, saluiam, populū nigram, dictamnū, pseudo dictamnū, amomum, cardamomū, heleniū, aristolochiap, castoriū, adiantū, draconitū, peucedanū, ruta folia, ac semē, apij semē, sceniculi semē, hipposelini semē & radices, hippomarathi semen & radices, struthij semē & radices, hyssopū ciliicū, irionē, paeoniā, panaces. Quodcūq; horū uolueris, & cū altero permixtū, & per se in uino

aut aqua prout uolueris coctum, exhibeto bibendum. Commoda sunt & purgatoria, & quæ dolores sedant. Maluæ radicem in aqua dato Aliud.

Pæoniæ semen modico cedrino oleo ammixto, in uino bibendum dato. Et uterorum dolores sedabis. Aliud, quum uteri suffocarint. Castorium & conyzam in uino albo bibenda dato. Si uero ad nares accesserint, cniidij internam partem albam, melle ammixto, naribus illinito. Aliud sedans dolores. Maluæ radicem, & fœniculi ac crethmi corticem, ex aqua bibenda dato. Aliud.

Stellas marinas nigras, & bralsicam misceto, & in uino odorato bibenda præbeto. Aliud. Myrrhæ obolos tres, coriandri parum, resinam, pæoniæ radicem, cuminum Aethiopicum, hæc trita in uino albo diluta, leuiter tepesacta bibenda dato. Aliud, quod secundas expellit. Ricini radicem bibendam dato.

Aliud, si ad cor allapsi uteri strangularint. Viticis & pæoniæ semen, in uino bibendum dato. Apposititia acria sanguinem ducit. Cantharidas quinque thuri ac myrrhæ ammisceto, & glandulam longam magnitudine gallæ formato, & lana obuolutam linteo albo circumdato, & unguento Aegypto albo aut rosaceo madefactam apponito. Aliud. Buprestim si parua fuerit, totam, si magna, dimidiam, ad prædicta ammisceto, & eodē modo apponito. Si uero mollioribus uti uelint, buprestidas in uinū mitte, & cuminum Aethiopicum, & seseli, ac anisum addito ac feruefacito, ad decem uero buprestidas, acetabulum olei ammisceto, reliquis omnibus æquali portione acceptis. Ammisceto etiam myrrhæ ac thuris parum. Ex hoc pugillum accipito, & uelut priorem glandulam subdito. Aliud. Nigellam terito cum melle, & uino subactam in glandulam redigito, ac utere uelut superiore. Aliud. Philistium eodem modo præparatū apponito. Aliud. Telephium eodem modo præparatū subdito. Aliud. Anemonæ folia trita linteo excipito, & myrrhæ parū ammisceto, & eodē modo utitor. Aliud, quod sanguinē ducit. Glandem Aegyptiā terito, & susinū unguetum quod est in terra Aegypcia addito, & aqua diluta, ac lana inuoluta apponito. Aliud bilem purgans. Cucumeris sylvestris medullam tritam, ac melle subactā, & ad glandis formā redactam apponito. Aliud.

Colocynthidis sylvestris internā partem terito, & melle subactā eodem modo subdito. Aliud. Elaterij portiones quatuor, adipe asferino & caprino, & mify ammixto, in glandulam formato, & in linteo apponito. Aliud. Thia spī tritum, & melle imbutum apponito. Aliud. Foliorum ficī saniem desradito, & elaterij portiones duas ammisceto, & nitri tantundem, melleque subacta apponito. Aliud, si uteri inflammati fuerint. Nitrum rubrū, ficus pineæ guedinem internā, utriusque pares portiones tritas, & ad gallæ magnitudinem efformatas subdito. Aliud. Cumini folia cum uino trita, in linteo subdito.

Aliud. Radicem albā terito, & melle affuso feruefacito, & glandulam inde factā subdito. Aliud. Succū silphij, et ficū, mixta in glandē formata apponito. Aliud. Cucumeris sylvestris semen tritū eodē modo. Aliud. Fel tauri, nitrū rubrū, neropon, cyclaminū terito, et de singulis gallæ magnitudinē, de cyclamino uero plurimū, melli ammisceto apponito. Aliud. Cyclamini caput purgatū, in aqua tritū ac linteo illigatū apponito. Aliud. Myrrhā, salē, cuminū, fel tauri, hæc melle subacta ac linteo excepta subdito. Aliud. Grana cniidia triginta deligito, et tria Indici pharmaci oculorū, quod piper uocatur, et alia

tria de rotundis. Hæc tria in uino ueteri trita, & oleo dulci diluta ac subacta, la-
naq; excepta subdat, & urina eluatur. Aliud. Tithymali succū melle sub-
actum, ac linteo exceptum apponito. Aliud. Scillæ radicem longitudine
digitorū sex sumito, & duobus digitis lana obuolutis subdito. Aliam molli-
entia, à quibus aqua purgatur, & sanguis ac menses ducuntur, si nō diuturni fue-
rint, & os uteri molliatur. Narcissinum, cuminum Aethiopicum, thus, ab-
sinthium, cyperum: aliorum quidem singulorū æquales portiones sumito, nar-
cissini uero partes quatuor. Hæc trita & in glandulam efformata, linteoq; cru-
di lini excepta apponito. Aliud. Cyclaminum magnitudine tali, & florem
æris magnitudine fabæ terito, melle subigito, & efformatam hinc glandulam
subdito. Aliud. Pulegium, myrrham, thus, fel suillum, melle subigito, & in
glandulam efformata subdito. Aliam acerba. Rhoem uino nigro subac-
tum apponito. Aliud. Cnicum eodē modo preparatū subdito. Aliud.
Loriamenta eodē modo apponito. Aliud. Rhoem melle ammixto sub-
dito. Aliam mollientia. Sulphur, adipem, uirellum oui, farina, melle sub-
igito, & tepēfacta in lana subde. Aliud. Pinguēdinem anferis, adipem ouillū,
ceram albā, refinam, unguentū rosaceū, tenui linteo excepta appone. Aliud.
Medullam cerui & adipem liquefacito, & in lana apponito. Aliud. Ad-
ipem ouillum aut caprinum, & oui candidū, rosaceo unguēto subactum, ac lana
exceptum apponito. Quæ ad eluendos uteros infunduntur. Grossos
hybernos in aquam missos ad lentum ignem coquito, & oleo ad decoctum as-
fuso eluito. Deinde uero malicoriū, & gallam, & lori ramēta, in uino acerbo co-
quito, & hoc excolatū infundito. Aliud. Fecem uini combustam in aquam
mitte, & postea cum aqua collue. deinde malicorio, myrti baccis, folijs rhois in
uino coctis, uinum excolatum infunde. Aliud. Lentiscī, saluie, hyperici fo-
lia, in uino nigro coquito, ac infundito. Aliud. Si quid in uteris fuerit exul-
ceratum. Buryrum, thus, myrrham, refinā parum, infunde. Aliud. Porrum
in aqua coquito, & excolatam aquam ad uinū ammixtam infundito. Aliud.
Sambuci fructum, anisum, thus, myrrham, uinum, sumito & horum succum
infundito. Aliud. Brassicā in aqua coquito, & in brassicæ succo, mercuria-
lem coquito, modico lini semine adiecto, et postea excolatū infundito. Aliud.
Myrrhæ acetabulum, thus, fefeli, anisum, semen lini, netopum, refinam, mel,
pinguedinem anferis, acetū album Aegyptium, horū singulorum æquales por-
tiones terito, et in uini albi heminis duabus diluito, et postea tepida infundito.
Aliud. Mercuriale in aqua coquito ac excolato, & myrrhæ acetabulū, thu-
ris, netopi, singulorū aquas portiones ammisceto, ac tepida infundito. Aliud.
Saluā & hypericū in aqua coquito, ac infundito. Aliud. Sabuci fructū, &
lauri baccas, æquis portioib. in uino coquito, deinde uinū infundito. Aliud.
Pulegiū in aqua coquito, & oleo ad aquā affuso immittito. Aliud. Pinguē-
dinē anferis, & refinā, colliquefacta infundito. Aliud. Buryrū, oleū cedrinū
modicū, cū melle liquefacito, & tepida infundito. Aliud. Cyperū, iuncū ro-
tundū odoratū, calamū aromaticū, pari portione myrrhæ ammisceto, & cū his
Sisymbriū in uino coquito, ac infundito. Aliud. Semē apij, anisi, fefelis, nigel-
lam, in uino coquito ac infundito. Aliud. Cedrū creticam in uino coctā in-
funde. Aliud. Bryoniam albam et myrrhā, in aqua diluta infunde. Aliud.

Argentii florem cum uino et aqua infunde. Aliud. Elaterij potiones duas aqua dilutas infunde. Aliud. Cucurbitas siue colocynthidas syluestres duas, in uini aut lactis cocti heminis quatuor madefacito, excolato, ac infundito.

Aliud. Cucumeris syluestris medullā palmi parui magnitudine, in aqua heminis quatuor coquito, et melle ac oleo affuso infundito. Aliud. Radicis thapsiæ duas potiones, et mel ac oleum, in duabus aqua heminis diluito ac infundito. Aliud. Veratri duas potiones in duabus aqua heminis tepide infundito. Aliud. Thlaspios acetabulū melle admixto, in duabus aqua heminis diluito, ac tepide infundito. Aliud. Cucumeris syluestris magnitudinem palmi parui, in aqua heminis quinque coquito, et melle affuso infundito.

Aliud. Grana cnidia sexaginta, oleo et melle diluta infundito. Aliud. Si natura pituitosa fuerit. Cneori potionē tritam, in aqua mulfæ hemina Aegyptiaca diluito, ac infundito. Aliud. Si biliosa fuerit. Daphnes potionē odoratā illius drachmæ pondus, scamonixæ potionē, terito et in aqua mulfæ, aut aqua uua: passæ hemina Attica diluito. Aliud. Daphnoidis potionē eodem modo, et si biliosa fuerit, hæc infunde. Si uero pituitosa, grana cnidia electa, & succi tithymali potionē infundito. Similiter etiā cneoro, et peplo, utriusque his uti oportet. Immitto aut cum infuso nō ampliore quæ duarum heminarū. Suffritus porrò sunt hæc contusa. Gallam suffrito. Aliud. Ramenta loti ad olea: folia sicca contusa misceto, et oleo subacta suffrito. Aliud. Prunas subijcito, et ordeis paleis humidis inspersis suffritū facito. Aliud. Super amphoræ oleariæ operculo stœben incēdito. Aliud. Cupressi ramēta suffrito. Aliud.

Scammoniam, myrrhā, thus, unguento affuso suffrito. Aliud. Bitumen, et ordeis paleas misceto, ac addita pinguedine phocæ suffrito. Aliud. Fraxinū, cupressi ramēta, cyperi radicē, unguento rosaceo subacta suffrito. Aliud. Calamum, cyperum, bryoniam, muscū arboreum, apij semen, anisum, simul mixta & unguento rosaceo subacta suffrito. Aliud. Resinā siccam cineri feruido inspersam suffrito. Aliud. Cinamomū, myrrham, cassiam, paribus singula portionibus suffrito. Aliud. Crocū ammixta myrrha, et musco, æquali cum croco portione suffrito. Aliud. Calamum, cneorū, crocum, folia rosarū rubra suauē olentia trita et siccata ad crocū ammisceto, et styracē dimidia croci portione addito. Hæc trita mixta & siccata, melle coctio modico subigito. Horū uero omnium suffritus sit oboli Attici pondus. Suffiantur aut super stercore bubulo. Formetur autem sterfus uelut acetabulum olearium, habeatque fundum tenue, et sit siccum. Ignis autem sit sarmentitius, in quo sterfus iaceat, et ex illo mulier insidens contacta suffiatur. Aliud. Galbanum, resinam, mannam, unguento rosaceo subacta suffrito. Aliud. Panacis et cupressi ramenta, unguento Aegyptio albo subacta suffrito. Aliud. Cinamomū, nardum & myrrhā unguento rosaceo imbuta suffrito. Aliud. Violæ albæ semen, cedri ramēta, & galbanū, melle subacta suffrito. Aliud. Stercoris caprini pilulas, & leporis pilos, pinguedine phocæ subacta suffrito. Aliud. Coaguli phocæ pelliculam contusam ac tritam, & spongiam, & muscum arboreū, trita simul mixta, atque phocæ pinguedine excepta suffrito. Aliud. Stercus caprinū, & pulmonem phocæ, ac cedri ramēta suffrito. Aliud. Stercus bubulū, cedri ramēta, & bitumen suffrito. Aliud. Spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramēta, & myrti sicca

folia. Hæc trita & unguento molli subacta suffito. Multa uero aromata in unguentum injcito. Aliud. Vinacea rufa trita, & cedri baccas, & refinam pinus, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta. Stercus bubulum contusum ac cribratum, aceti dimidia mensura, & decocti erui dimidia adiecta, leniter pro fomento adhibeto. Postquam autem fomentum adhibueris, lenticulæ decoctum bibendum dato ac reuocandum. Et farinam sorbendam, ac uinum insuper bibendum. Postridie uero granum cnidium deuorandū exhibeto. Sequenti die quod urinam ciet, hoc scilicet. Ciceris albi partes duas tritas, uuae passæ tertiam partem, affusa aqua ad dimidias coquito, deinde excolatam aquam per noctem sub dio exponito, & postridie bibendam dato. Et de cætero saluam ac lini semen, polenta ad ambo hæc ammixta, bis per diem in uini diluti heminis quatuor dato. Aliud. Olei heminas dimidias tres, foliorum sambuci manus plenæ mensuram. Hæc cocta in craterē calidum fundito, & per testas calidas immittas fomentum facito, muliere in sella collocata, ac uesimētis cooperta. Aliud. Foliorum sambuci manus plenæ mensurā, & myrri tantundem in aquam missa coquito, & ad excolatam aquam, ordeï paleas injcito, coquito, & linteo excipito, ac cum hoc fomentū facito, prout maxime calorem ferre poterit. Aliud. Acetum, oleum, aquam, mel, hæc mixta ualde feruefacito, deinde accepta uesica capiente cōgium, aur utriculo ex tenui corio facto, infundito, & panniculo laneo obuoluto, foueto. Quū autem tepidus factus fuerit panniculus, alium obuoluito. Aliud. Pini corticem, et rhois folia in aquā coniecta fortiter coquito: & in excolata aqua ordeï paleas coquito, oleo affuso, ubi uero simul coxeris linteo excipito, ac foueto. Aliud. Loti ramenta & cupressi, aqua & oleo affuso coquito. Deinde simul cocta linteo excipito, ac foueto. Aliud. Aromata in aquæ chœnicem coniecta coquito, & in excolata aqua furfures triticeos coquito, & foueto. Aliud. Eodem modo gallam contusam, & rhamni corticē in aqua coquito. & cū aqua furfures triticeos subigito, ac oleum ammisceto. Postea semiaslatum panem duos chœnices habentem facito, linteoque excipito, ac foueto. Aliud. Brassicam & porrum decoquito, & cum succo eodem modo fomentum facito. Aliud. Ordeï paleas coquito, oleo affuso, & linteo excipito, ac foueto. Aliud. Solanum & oleæ folia coquito, & eodem modo fomentum facito. Atque hæc sanè, si quidem humidis uiri uolueris, pro fomento uelut scripta sunt adhibe. Si uero siccis, panes parato & exallatos, & semiaslatos, et cum his foueto. Sed et testis calidis linteo in uolutis foueto, itemque cum ipsis linteis calefactis, et cum lenticulis uasis testaceis, feruente aqua infusa. Apponito autem ad pedes. Aliud. Iridis radicē tundito ac coquito, et eodem modo foueto. Si aqua in uteris gignatur, menses pauciores fiunt, & deteriores, et per longius tempus, et prægnans est semper per duos menses, aut paulo amplius. Quum autem hoc tēpus aduenerit, et cor rumpit, et aqua multa in ipsa gignitur. huic autem lac bibendū dare oportet, et per plura, mecona dictū, donec fœtus moueri inceperit. Per uero ante hoc cor rumpitur, et per abortū extruditur, et uteri sanguine manant. Hæc autem patitur nihil magis ex labore, quam aliter. Hoc autem cognoscere poteris quod hydrops inest, ex digiti cōtactu. Cōperies enim osculū ipsorū gracile, et obscuratū ac plenū humiditate. Si uero nō circa initia, sed dum iam mouetur, fœtus ipsi corrumpatur ac

suffito

suffocetur, tunc & uenter imus intumescit, & ad contactum dolet, uelut ulcere
 praesentis. & febris ipsam ac dentium fremitus corripit. Et dolorem habet acus-
 tum & uehementē, circa pudenda, & imum uentrē, & lumbos, & laterum mol-
 litudinem ac coxendices. Quū sic habuerit, calida ipsam lauare oportet. Et qua
 parte dolor haeserit tepefactoria adhibere, experimento facto de eo quod maxi-
 me admittat. & pharmaciū deorsum purgans bibendum dato. Interposito uero
 tempore quantum tibi sufficiens esse uidebitur, & collutione facta, & fomento
 adhibito, cyclaminum apponito, ita ut melle subactam, & linteo exceptam deli-
 ges, & ad os uterorum apponas. Cupressi etiam ramēta in aqua madefacta, eo-
 dem modo apponito. Verum haec breuiore tempore, & per longius temporis
 interuallum, quanto magis mordent & exulcerant. Et specillum stamneum pa-
 ratum immittito, & digitum eodem modo. Potiones quoque bibēdas dato, ex-
 perimentum faciens quas libenter admittat. & cum uiro dormiat, maxime op-
 portuno tempore praesente. Si enim genituram cōceperit, & pregnās facta fue-
 rit, ac pepererit, subexpurgantur & quae prius in ipsa fuerant, cum ipso puerpe-
 rij purgamento. Atque sic maxime sana fieri poterit. Si indurati fuerint uteri,
 & os ipsorum asperum fit, & menses occultantur. Quum uero apparuerint, ue-
 lut arena sunt. & genitura hoc tempore non fit. Si uero etiam digito cōtigeris,
 asperum comperies os uterorum. Quum sic habuerit, cyclaminum terere opor-
 tet, & salem ac ficum crudam ammiscere, & cum melle efformata apponere. &
 fomento adhibito, purgatoria in fundere. Edat autem mercurialem, et brassicas
 coctas, et succum sorbeat, et calida lauetur. Si indurati fuerint uteri, et mens-
 es occultantur, et os ipsorum conuiuet, et non concipit. Quum sic habuerit, si
 digito contigeris, comperies os asperum, et digitū non intromittit, et febris ip-
 sam corripit, ac dentium fremitus. Et dolor habet imum uentrem, et laterū mol-
 litudinem, et lumbos. Patitur autem haec, si foetus in ipsa corruptus fuerit pu-
 trefactus. Quibusdam uero etiam ex partu cōtingit. Saepē etiam aliter. Quum
 sic habuerit, multa calida ipsam lauare oportet, et fomentum adhibere. Quum
 autem recens lota aut fota fuerit, immisso specillo os aperito ac dilatato, et per
 digitum eodem modo, et uelut in priore scriptum est apponito. Et potiones si-
 militer bibendas dato, et eodem modo curato uelut priorem. Si uteri ad la-
 tus allapsi fuerint, tulsis detinet, et dolor sub latus, et uterus durus uelut pila in-
 sident, et ad contactum dolet uelut ab ulcere. Et contabescit, et uidetur peripneu-
 monia esse, et conuellitur, et gibbosa fit. Et menses omnino non apparēt. Quis-
 busdam uero prius conspecti, euanescent. Tunc autem sientes, debiles sunt ac
 pauci, aut deteriores quam antea, et genitura non fit hoc tempore. Quū sic ha-
 buerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, et eo epoto, multa calis-
 da ipsum lauato, et ex tepefactorijs quod maxime admittit adhibeto, et a quis-
 bus sanguis purgatur ea apponito, et lini semen tostum, tusum ac cribratum, et
 peplum album, et saluam cum polenta tenui, et caseum caprinum, fordis et
 salis muriā derafis: haec misceto, ut casei sint partes duae, reliquorum uero una:
 polenta autem sit antiqua nō falsa, et ieiuna in uino bibenda dato. Vespero ue-
 ro cyceonem crassum melle affuso exhibeto, et ex potibus quemcumque libenter
 admiserit bibendū dato. Et frequenter fomētum adhibeto. Calidam uero asper-
 gito, et per ceratum leniter mollito, ac a latere detrudito, et latus fascia lata delis-
 gato

gato. & lac bubulum quæ plurimum ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibis autem utatur quæ mollissimis. Morbus hic uehemens est & lethalis. & pauca etiam si curentur ipsam effugiunt. Si os uterorum concludatur, forte fit uelut grossus ficus. Et si digito contigeris, comperies durum ac contractum. & digitum non intromittit. & menses occultantur. & genituram non suscipit hoc tempore. & dolor habet in uentre, & lumbos, & laterum mollitudinem. Quoadque etiam sursum procedit, et suffocat. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum præbeto. & multa calida lauato. & quæ os molliunt apponito. & specillum immittito ac aperito, & digitum similiter. & calidam aspergito. Quum autem molle factum fuerit, ea quæ sanguinem purgant apponito. & ex potionibus dato, experimento facto quam libenter admittat. & brassicam edat, & succum eius sorbeat. Si uteri obliqui fiant, etiam os ipsorum obliquum fit, & menses ipsi nunc occultantur, nunc prius apparentes euanescent. & non similes fiunt, sed deteriores & pauciores quæ antea. & genitura non fit hoc tempore. & dolor habet in uentre, & lumbos, & coxam, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet. & calida lauare ac fouere. Vbi uero recens foeta aut lota fuerit, digito immisso os uterorum corrigat ac dirigat. & odoratorum suffitum admittat. & ex potionibus dato, iuxta experimentum quam libenter suscipit. Cibis autem utatur mollibus. & alia edat cocta ac cruda. & cum uiro dormiat. & in sanam coxam decubat. Alteri uero fomentum adhibeat. Morbus autem difficulter cedit. Si inflati fuerint uteri, & uenter attollitur ac inflatur, & pedes intumescunt, & caua faciei partes. Color uero iniucundus fit. & menses non fiunt. & genitura hoc tempore non fit, & anhelat. et anxia moeret. & quum surrexerit, aut progressa fuerit, erescitæ cervicis spiratio ipsam tenet. et quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat. & gemit, & magis ægre tristatur quæ priusquam ederet. Saepe uero etiam suffocatur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. & calida lauato, ac fomentum adhibeto. Interposito uero tempore quodam, apponito ea à quibus purgetur, ac non mordeatur. Frequentissime uero totum corpus foet uero. Tunc autem & sub pudenda odorata suffiantur. Sub nares autem graueolentia. & potionibus dato quæ uteros purgant, & ad locum compellunt. Et Mercurialem edat. & lac bibat, uelut de latere dictum est. Morbus autem non est diuturnus. Si sanguinis grumi in utero coierint, os ipsorum uelut eruo plenum fit. & si attigeris, ita habere deprehendes. & menses non fiunt. Neque genitura retinetur, quæ diu sic habuerit. Quum igitur ita habuerit, cyclamini corticem detrahit, & allium, & salem, & ficum, & mellis parum terito ac permisceto, & glandulam hinc formatam ad uterorum apponito. & alia uteris conuenientia medicamenta subdito, quæ uidelicet acra sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur, & de potionibus dato eas quæ uteros purgant, & omnia circumradito. & uesicæ pellicula siue cuticula digitis obuoluta, os uterorum deradito. Si obortiti fuerint uteri, & menses non fiunt, & genitura non manet intus, & dolor habet in uentre, & lumbos, & laterum mollitudines, et si digito contigeris, os uterorum attingere non poteris, nam fortiter secessit. Quum sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis tamen deorsum, et os ipsum ac uteros quæ maxime fouere, ac calida lauare bis

in die. & de potionibus dato quā libenter susceperit pro experimento. & uirgā cōdormiat frequentissime, & brasīcam edat. Si uteri cōmoti in loco nō manerint, quō prolapsi fuerint dolores exhibent, & incōspicui fiunt. Quādoq; uero eminent, uelut sedes prolapsa. Et quum quidē supina decubuerit, in loco manent. Quum autē surrexerit, aut se inclinauerit, aut aliās se commouerit, exeunt. Sæpe uero etiā quietem habent. Hanc t̄p̄ maxime quiescere oportet, & nō moueri. & lectum ad pedes altiore m̄statui. & iisdem uti, uelut in superioribus. & cum acerbis infusis cōspargere. & graueolentia suffire. Sub nares autem odorata. & malum punicū in medio per umbilicū perforato, & in ipso picem quę maxime cōgruat cum uino tepefacito, & non ualde premens t̄p̄ penitissime apponito. Quū autem quid apposueris, lata fasciā exceptū ex lumbis deligato, ut ne dilabatur, sed maneat & faciat quod expetit. & peplum cum cafeo, & polenta, bibendum dato, uelut in allapsu ad latus dictū est. & ex potionibus quā maxime admiserit bibēdam præbeto. Cibis autē mollissimis utatur. & cum uiro t̄p̄ maxime dormiat. Si hauerit os uterorū magis t̄p̄ solet, menses plures fiūt, & deteriores, & humidiores, & per longius tempus. & genitura ipsam nō contingit, neq; intus manet, sed rursus foras effunditur. & si digito contigeris, os uterorum hians cōperies. & impotentia ipsam corripit præ mēsis, & febris ac rigor. & dolor tenet inum uentrē, & lumbos, ac lateris mollitudinē, patitur autem hæc maxime, si quid in ipsa fufum fuerit, & corruptū computruerit. patitur etiam ex partu. & aliā aliter. Quum sic habuerit, pharmacū bibendum dare oportet, à quo sursum purgatur. & quum dolor habuerit, tepefactoria apponere. & calida lauare. & interposito tēpore, per infusa colluere, uelut scriptū est in priore. & de potionibus dare quam libentissime susceperit. & suffire quæ siccant. Edat autē polypos & mercurialem. Si leuigati fuerint uteri, & menses plures fiunt, & deteriores, & humidiores, ac frequentiores. & genitura intus non manet, sed rursus exit. & si digito contigeris, comperies os leue. Et impotentia ipsam corripit præ mēsis, & febris ac rigor, et dolor inum uentrē, et lumbos, ac lateris mollitudinem, maxime si quid in ipsa corruptū computruerit, et ex partu, et aliās. Quū sic habuerit, curare oportet ubi dolor habuerit, uelut scriptū est in priore. Si uteri ad uentrē nutauerint, dolor acutus et uehemens coxendices, et lumbos, ac laterū mollitudinem habet. Et crus claudicat. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendū dare oportet, postfridie uero suffire hoc modo. Ordei choenices duas, et oleæ folia probe cōtusa, et galiam contusam ac cribratā, et hyoscyami tertiam choenicis partē. Hæc mixta, et olei hemina dimidia affusa, efformata, in olla per dies quatuor, ter in die suffito. Noctū uero lac bubulum, et mel, et aquam bibat, et calida lauatur. Si ad caput conuersi fuerint uteri, signum hoc est. Venas in naso et sub oculis dolere uidetur. Hanc calida multa lauare oportet, etiam in capite, lauro et myrto in aqua incōctis, et caput ungueto rosaceo illinatur. et odorata subter suffiatur. et brasīcam edat, et succū absorbeat. Si ad crura et pedes conuersi fuerint, ex hoc cognosces. Magnis pedum digitis cōuellitur sub unguis. Et dolor crura ac femora tenet. Quum sic habuerit, multa calida ipsam lauare oportet. et fomētum adhibere quod maxime libenter admiserit. et subter suffire graueolentia. Et unguento rosaceo unguere. Si mulier cibum auersans uteros doleat, et febris ipsam

ipsam ac rigor corripiat, pepeli albi quintam dimidia choenicis partem, & seminis urticae tantūdem, & casei caprini rasi dimidia choenicem, simul cum uino uetere mollito, deinde cocta forbenda dato. Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in uentre non maneant, uuam passam nigram, & mali punici dulcis grana trita, & coagulum hœdi, uino nigro diluito ac utitor, ita ut caseum caprinum derasum, & polentam tritici torrefactam adijcias, & bene reperata bibenda prebeas. Si ex partu sanguinem uomat, hepatis fistula fauciatā est, & dolor ad uiscera procedit, & cor conuellitur. Hanc multa calida lauare oportet, & tepe factoria quæ maxime admiserit adhibere, et afininū lac bibendū ad dies quinque dare. Postea uero uaccæ nigrae lac bibendū præbere, ita ut sine cibo degat, ad dies quadraginta. Ad uesperam uero sesamū tritum bibat. Morbus hic est periculofus. Si mulier diu non concepit, mēsis apparentibus tertia aut quarta die, alumen tritum unguento dilutum, lana exceptū appono. & per tres dies appositum habeat. Tertia uero die fel bouis radito, & ramentū oleo dilutum ac subactum, linteo exceptum apponito. Et tres dies appositum habeat. Sequenti uero cum uiro coeat. Ad uterorum morbum sedandū, lini scisci unā cum stipula pugillum tenuiter tusum, in uino albo quæ iucundissimo per noctem madefacto, deinde excolatum in ollula tepefacto, & in eo lanam mollissimā tinctam apponito, & uicissim priore detracta aliam subdito. Si uteros purgare uoles, primum quidem ordeum oleo imbutum in prunis suffire oportet. Postridie uero carnem ouillam coqueret, cum ordeo decocto sub dio per noctem exposito. Sit autem decoctum ordeo congi mensura, & ualde ipsas coquito. Vbi uero coctę fuerint, leuiter tepidas edat, & iusculum sorbeat. Postridie autē thus & pulegium tritum, melle subactum & lana exceptum ad triduum subdito.

Si uteri ad sedem conuersi fuerint, & secessus secedere prohibuerint, dolores habent & lumbos, & inum uentrem, & ilia. Quæ sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, & lumbos fouere, & graueolentia suffire. & apponere quæ purgant & impellunt ipsos uteros. & bibenda dare ea quæ maxime admittit. Si ulceratum fuerit os uterorum aut inflammatū, myrrham & adipem anserinū, & ceram albam, & thus, in leporis pilis qui sub uentre sunt misceto ac terito, & in lana mollissima apponito. Si secundæ decedere non possint, statim quidem à cibo abstinere oportet. Viticis autem folia trita in uino & melle, oleo affuso tepefacto, & hemina mensuram bibendam dato. Si inflammati fuerint uteri, sambuci folia tenerrima in tritici recentis crassiore farina coquito, & leuiter tepida forbenda dato. Si uteri transmoti fuerint, hederam sicissimam tritam, & linteolo tenui illigatam subdito, et pingue aliud nihil adhibeto. Bibendum uero dato triticum recens, & peplum tostum, & saluiam, & cyperū, & anisum. Hæc trita uino diluta cum furfuribus ordeo bis in die dato, pro uice dimidiæ heminam. Si menses constituto tempore non fiant, brassicæ folia & rutam terito, postea paleas ordeo choenicis mensura madefacto donec flaccescant, & per noctem sub dio exposito. Mane uero in hemina inde excolata brassicam ac rutam diluito, & affuso oleo coquaffato, & bibenda dato. postea polyppum uino albo suffocari edendum dato, & uinū ebibendum. Si uero uoueris, pisces odoratissimos coctos edendos dato, & iusculū forbēdum. Si ex feruido & superficiali ulcere pudēda fuerint exulcerata, myrti baccis in uino co-

ctis pudenda colluat. Et postea mali punici dulcis putamina in uino coquito, & myrrham ac resinam simul mixta uino diluito, & intinctū in his linteū subdito. Si urinæ sullicidiū corripiat, cucumeris siue cucurbitæ os & fundum refecato, et subiecta pruna cucumim circumponito, & insperfa in ignem myrrha, mulierem super cucumim locato, ita ut summam cucumeris partem quæ penitis sine in pudendum indat, quo uapor plurimus in pudenda transmittatur. Et ex potionibus urinam cientibus ieiunæ aliquas exhibeto. Si ad cor progressi uteri suffocent, & nō decedant, porri semen tritum, & pulegiū, in aquæ cyathis tribus, & aceti albi cyatho uno, & mellis tertia cyathi parte diluito, tepefacito, & ieiunæ forbenda dato. Si ex partu, aut abortu, rigor corripuit, iuniperi fructum & saluiam simul trita, in aceti albi cyatho diluito, & uini albi diluti poculum affundito, uersato ac stare finito. Mane uero excolato, & tepefactum bibendum dato. Si uteri inflati fuerint, & si uentus in utero fiat & dolor, saluiam & cyperum tusa madefacito per noctem, & mane excolato, & purum cremorem in ollam fundito, tritici farina crassiore adiecta, & aceti albi cyatho affuso, & fucci filiphij magnitudine fabæ addita, & cocta crudius forbenda dato.

Si in pudendis graueolentia fuerit, & columella nascatur, & dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunæ in uino datum. Graueolentiam uero, anisum eodem modo datum. Columellam uero refecare oportet. Si uiscera fiant in pudendis, & pruritus corripiat, oleæ & hederæ & rubi & mali punicæ dulcis folia trita in uino ueteri dilue, & postea carnem recentem folijs intege & appone. Et habeat subditam per noctem. Mane uero eximat, & myrrū in uino decoquat, & cum uino pudenda colluat. Si genituram non suscipiat, mensibus secundū naturam fientibus, membrana ante uteri os excreuit. Cōtingit etiam ex alijs causis. Cognosces aut hoc, si digitum admoueris, membrana prætextū continges. Ad hæc medicamentū subditiū facere oportet. Resinam itaque & aris florem melle diluito, & linteum ex his tinctū penitissime indito, filo ad extremam partem dependente illigato. Quū itaque hoc exiluerit, myrrum in uino coquito, & cum uino tepido eluatur.

Si anhelationes corripuerint mulierem, sulphuris magnitudinem fabæ, & nasturtij tantundem, & rutam, & cuminū Aethiopicum, hæc trita & uino diluta, ieiunæ bibēda præbeto. Oportet autē & à cibis abstinere, & nō frequēter edere. Si paries inflata fuerit, hepar ouillum aut caprinum calido cinere obrutū, edendum dato meracius ad dies quatuor, & uinū bibat uetus. Si lumbos doleat, anisum & cuminū Aethiopicum bibat, et calida lauetur, & subcalidam bibat. Si menses nō fiant, testam crassam exurito ac terito, & origanū in pinguedine anseris coctam terito, & ad testam in linteū ammisecato, ac tepida apponito. Si uteri conclusi fuerint, & menses nō apparuerint, colocynthidem syluestrem, & filiphij semen, cuminum Aethiopicum, nitru, saleem thebaicū, adipem rhenalem, farinā, myrrham, & resinam, Omnia hæc seruefacito, simulque mixta ac trita in glandulā efformato, & apponito. Si uteri ad uiscera cōuersi strangularint, uinū cedrienum, & cuminum Aethiopicum bibat, & calida lauetur, & subcalidam bibat.

Si menses non fiant, adipem anseris, et netopū, et resinam, mulier lana excepta subdat. Si uero magis quæ conuenit prodeant, susinum, et raia linguā, in lana apponat. Si transmoti uteri, aliquo allapsi fuerint, ordeum decortum

catum tritum unā cum paleis fume, & cum cornu ceruino uino subige, & hinc uteros suffito. Si secunda decedere non possint, feniculum uino & oleo ac melle feruefactū bibendum dato. Si menses nō appareant, & uelis ipsos detrahre, crassiore tritici farinam & ordeum coquito, & oleo affuso edenda dato. Si inflammati fuerint uteri, cotyledonis folia, & porri, in crassiore tritici farina coquito, & affuso oleo edēda dato. Si moti uteri aliquo allapsi fuerint, & dolorem exhibuerint, olea scabiem, & lauri ac cupressi ramenta, in aqua coquito, & linteo excepta apponito. Si uterus doleat, & ad uescam fuerit dolor, porri semen in aqua tritum ieiuna bibendum præbe, & tepefactoria adhibe. Si uteri prominuerint, lotos ipsos cum aqua tepida, & uino ac oleo illitos, rursus intrudito, & ex lumbis deligato, & graueolentia suffito, & si urinam emittere non poterit, calida lauato ac foueto, & cupressi ramenta suffito. Et portiones urinam cientes bibēdas dato. Si fluxus fiat, acerbis suffito, & stercus asini derafum, lanae illigatum subdito. Sit autē stercus siccum. Si in pudendis ulcera fiant, adipem bubulum illinito, & apponito, & cum uino in quo myrtus cocta est colluito. Si ex partu os uterorum fuerit exulceratum, florem rosarū tritum & uino imbutum, in pillis leporinis apponito, & acerbis colluito. Si uteros doleat, allij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum terito, & melle subacta subdito, & calida lauetur, & subcalidam bibat. Si ex feruido ac superficiali ulcere pudenda fuerint ulcerata, adipē bubulum, & butyrum, & anseris adipem, ac fulinum unguentū misceto, & ex his pūdenda illinito, & aqua tepida colluito. Si uteri ascendentes suffocant, feniculum lucernarū accensum extinguito, & naribus admoueto, quo fumū atrahat, postea myrrham unguento dilutam, & lana exceptam apponito. Et resina oleo dilutam bibendam dato. Si secunda nō secedat, conyzam tritam lana exceptam apponito, & ignem in uino trita bibēdam dato. Si caput doleat, & inum uentrē, & lumbos, bilis in uteris est. Huic itaq; pharmacū dare oportet, quod sursum ac deorsum purgare potest, & calida lauare, & apponere quæ bilem purgant. Et anisum ac nigellam uino diluito, & bibēda dato. Si fluxus oboritur, caneros fluuiales in uino suffocato, & uinum bibendū dato, & quæ siccant suffito, & apponito. Si fluxus oboritur, porri pugillum in uino tritum bibendū dato, & siccis & acerbis utatur. Si fluxus oboritur, multi stercus combustum, rufumq; ac cribratum, uino dilutū bibat. Reliquis autem eodē modo utatur. Si fluxus oboritur, & iam diuturnus fuerit, spongiam combustam ac tritam, uino odorato dilutam, bibendam dato, & per suffitus resicca, & quæ restringunt appone. Si uteros purgare uelis, nitrum, cuminū, allium, & ficus terito, & melle subacta apponito, & calida lauetur, et subcalidam bibat. Si uteros doleat, cyclamini radicem in uino ieiuna bibendā dato, et calida lauetur, et subcalidam bibat. Si lac extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, feniculi uero semen bibendū dato, et radices feniculi decorticatas, ac butyrum simul coquito, Quum autē cocta fuerint, frige facito ac bibēda dato. Comodum est etiam hippomarathrū et hippocelinum simul coctum. Si lac extinctū fuerit, porrum tritum aqua dilutū bibendum præbe, et calida lauetur, et porrū ac brassicam edat, simul coctis Cytisi folijs, et succum forbeat. Si lac extinctum fuerit, saluiam, cedri aut iuniperi baccis

adiec̄tis coquat, & ad diffusum, uinum affundat, ac bibat. & ad cætera farina in
 sperfa additoꝝ bulbo, & modico oleo affuso, edat. Et acria, & acida, & falsa, ac
 cruda olera omnia uitet. Nafurtiũ uero in uino potũ commodum est. Nam lac
 purgat. & calida lauetur. & subcalidã bibat. Si uelis mulierem prægnãtem
 fieri, ipsã & uteros purgato, postea farinã ieiunã edendam dato. & uinũ me-
 racum in super bibẽdum. & nitrum rubrũ, cuminum, ac refinam, melle subactã
 in linteo subdito. & ubi aqua defluerit, nigros pessos mollitorios apponat. &
 cum uiro dormiat. Si prægnantẽ facere uoles mulierẽ, ipsã & uteros pur-
 gato. Deinde linteum tenuissimum reficcatũ, ac melle imbutũ in glandes effor-
 mato, & in fici succo tinctos apponito, donec fuerint aperti. Postea uero magis
 intrudito. Vbi aut defluerit aqua, uino & oleo colluta cũ uiro dormiat. Bibat
 autẽ & pulegiũ in uino cedrino, quũ uiro condormire uolet. Medicamen-
 tum scetũ ex uteris pellens. Cucumeris syluestris succũ potionis mensura, in
 mazam cõsperum apponito, ubi ad duos dies antea ieiunauit. Aliud. Sta-
 phidis syluestris pugillos duos, in aqua mullã dilutos, bibẽdos dato. Expe-
 rimentũ focẽditatis. Caput aliĩ integrũ derafum uteris apponito. Post tridie
 uero digitũ immittat, ac contingẽs cõsideret. et si quidẽ oluerit inde os, bene ha-
 bet. Sin minus, rursum apponat. Aliud experimentũ. Netopũ modicũ in
 lana inuolutũ apponat, & cõsideret an per os oleat. Alia subditia medicamẽ
 ta. Scorpiĩ marini fel, in lana inuolutũ, & in umbra siccatũ apponito. Pu-
 legium sicũ tritum, melle imbutũ in lana apponito. Cucumeris syluestris
 femen, & testam cõbustam, uino subactã, cũ pilis leporinis, in lana subdito.
 Alumen Aegyptiũ, lana inuolutũ apponito. Cantharidas uino subactas,
 in lana subdito. Herbam artemisiã uino subactã apponito. Nigellã in
 uino tritã, in lana subdito. Aliud ad recens enixam. Vnguentũ rosaceũ &
 ceram, in lana apponito. Bulbion ex tritico, tritũ & uino subactum in lana
 subdito. Vini albi ueteris fecem cõbustam, et uino albo extinctã ac tritam,
 in lana apponito. Galbanũ, netopum, & misy, cũ unguento rosaceo, in lin-
 teo apponito. Elaterij potiones duas, & fauũ cum uino, in linteo apponito.
 Butyrũ & alumen melle subactũ, in linteo subdito. Scamoniã succũ,
 adipem, cũ maza misceto, & uino imbuta, in linteo apponito. Si cõcipere no-
 lit, misyos fabã magnitudinẽ aqua dilutã bibendam dato, & per annũ non cõ-
 cipiet. Si periculũ facere uelis in muliere, an prægnã sit aut nõ, rubro lapide
 siue terra erithrea oculos sublinito. Et si quidem ingrediatur pharmacum, præ-
 gnans est, sin minus, nõ. Si prægnãti pudenda feruido & superficiali ulce-
 re fuerint exulcerata, amygdala trita, & medullã bubulã in aqua coquito, & mo-
 dica farina adiecta, pudenda illinito. & baccarũ myrti decoctio colluito. Si
 uiro ex lapide laborarit, fermen radice Aethiopicã, in uino ueteri ad dies decẽ
 dato. Deinde in aqua ad dies uiginti, & bis in die multa calida lauato. Cata-
 plasmata. Alliũ, porulacã, apium, loti & cedri ramẽta, trita simul mixta aqua,
 mullã diluito, & cataplasma hinc factũ imponito. Rubi folia, myrti folia, si-
 mul trita aqua mullã diluito, & polẽta ammixta subactã imponito. Sambu-
 ci folia, myrti folia, terebinthi folia tenerrima, eodẽ modo apponito. Loti ra-
 mẽta, mori folia, simul trita mixta, aqua diluta cũ uua passa imponito. Suffi-
 tus. Onicula: aut capræ cornu tusum, & ordeũ tostum ac frefum, oleo subigĩ-
 to

to ac suffito. Cerui cornu, & oliuas nondū habentes oleū, simul trita mixta suffito. Rhoem rubrū, & polentā tostam, oleo subigito ac suffito. Polen tam, & steruus bubulum, & paleas, oleo subigito ac suffito. Loti ramēta, & rhois folia, & cupressi sicca ramēta, uino nigro austero subacta suffito. Galbanū, mannam, & resinā, unguēto subacta suffito. Caprę cornu, & gallam, & adipē suillum, ac cedriā suffito. Terram ex alinorū pedibus deradito, & steruus asininum, cum uino nigro subigito ac suffito. Collutiones. Folia myrti, & lauri, ac hederę in aqua coquito, & cū hac tepida colluito. Rhois, & mali punicę, ac rubi folia, in aqua mulla coquito, & cū ea excolata colluito. Sambuci & lentifici folia in aqua coquito, & excolatā leuiter tepidā infundito. Fœniculi & brassicę radices rufas in aqua coquito, oleo affuso, & postea cū excolata colluito. Oenanthen, & cyperū, & uuas passas, in aqua mulla coquito, ac colluito. Malagmata. Maluam & scenogræcū in aqua feruifacito, & cū excolata aqua leuiter tepida colluito. Cupressi ramēta & amaracū, in passo aqua teperato coquito, ac colluito. Serpillū & uiolę albę radicem, in aqua mulla coquito, ac colluito. Hypericū, & lentificū, & baccas cedri in aqua coquito, et cū leuiter tepida colluito. Fauum, & butyrū, & resinam, & adipem anserinū, in aqua coquito, & colluito. Fomenta. Lolium tostum ac molitū, in posca meraciore coquito. Postq̃ autē coxeris, linteū illigato, & foueto. Lentē tostam, decorticatā, & in farinā crasiorem alicę similem redactam, in aqua coquito, & linteū illigato, ac foueto. Eruū eodem modo parato, ac foueto. Cōmoda est & salua eodē modo parata. Saluiam & hypericū in aqua coquito, et ordi paleis in decocto coctis, et linteū exceptis foueto. Loti & cupressi ramēta in uua passę cremore coquito, linteūq̃ ipsa illigato ac foueto. Olea, & myrti, & hederę, ac lauri folia, in aqua coquito, & in decocto, ordi paleas coquito, deinde linteū illigato, ac foueto. Cupressi ramēta & cedri, & ordi furfures, simul misceto, et in uua passę cremore subigito, ac panē formato, & cū hoc affato, calido in linteū illigato, foueto. Violę albę semen, aut radices, in aqua coquito, & cū aqua furfures tritici subigito, ac panē formato, cū quo calido in linteū inuoluto, foueto. Serpillam in aqua coquito, & furfure triticeo in aqua coniecto, eodē modo foueto. Spongias calcificas & adhibeto, et cū mollibus lamis, & pāniculis laneis, & uasis testaceis aqua infusa, & utriculis eodem modo, & decoctionibus in utres infusus foueto.

Purgatorium. Si mulierē parere non poterit, facere uelis ut prægnās fiat, cōsiderare oportet in mensibus, an biliosa aut pituitosa sit. Cognosces autē hoc, arena tenui sicca ad solem cōspersa, & quū mēses prodierint, sanguine super arenam in sole effuso, ita ut ipsum siccatū sinas. Si enim biliosa fuerit, sanguis super arenā siccatus, pallidus sit. Si uero pituitosa, uelut mucus existit. horū igitur utrū tandem fuerit, uentrē purgato, siue fursum siue deorsum purgatione opus habere uisa tibi fuerit, postea paucis diebus interpositis, uteros purgato. Vterorum fomēta. Si duri fuerint uteri, & nō concipiat, Vinū q̃ iucundissimū, cū pari aqua temperatū, trium semicongiorū Atticorum mēsurā, & fœniculi radices, & feminis fœniculi quartā partē, & unguētū rosacę semiheminā. Hęc in uas nouū fundito, & uinū affundito. Vasis autē operculū perforato, & impolita arundine foueto. Arundinē uero cum operculo tollito, Si enim sine operculo

Io abstuleris, exuretur. Postq̄ autē fota fuerit, scillam apponito, uelut infra scrip-
tum est. Apponito autē donec dixerit molle & amplū esse uterorū ofculum, &
si quidem exulcerata fuerit, & pustulæ in purgatione fuerint, si summa labia ul-
cerata fuerint, anisum, & adipē anserinū, in rosaceo oleo terito, et in lana inuolu-
uito, & accepta carne bubula, magno pedis digito crassiore, sex digitorū longis
tudine, ipsam pharmaco illinito, et lana exceptā inuoluito, et ad extremā carnis
partē quæ foras spectat filum alligato, & reliquā in uteros indito, ubi est ulcus.

Mensium purgatoria. Si non procedat mēstrua purgatio, cucumeris syl-
uestris internā partem pōdere trium obolorum, & artemisiā herbam, & thus
ris obolum, terito & ammixto melle in lana inuoluito, & ad os uteri apponito,
quinquies in die hoc faciens. Aliud. Vitem uiridē terito, & melle ammixto
lana excipito, & eodē modo apponito. Aliud. Cupressi fructū, & cucume-
ris syluestris internā partem, & thus, terito & melle ammixto lana excipito, &
eodē modo subdito. Aliud. Cupressi fructū & thus terito, & melle ammix-
to lana excipito, ac subdito. Aliud. Abrotoni obolos tres, cū melle lana
excipe ac subde. Aliud. Elaterij obolū, & myrrhæ obolum terito, & cū mel-
le lanæ inuoluito, ac subdito. Purgatoriū si mulier non cōcipiat. Tauri
urinam collige trium heminarū mensura. Deinde artemisiā herbam, aut parthe-
nium, aut adiantū, & laurū uiridem, & cedri ramenta simul contunde. Deinde
in effossa scrobe carbones accēde, & imposita olla urinæ tauri infunde, & contu-
sa in mortario adijce. postea fellam circūpone, & artemisiā herbam, aut hyssō-
pū, aut origanū impone, & muliere super hæc collocata, donec fuder foue. Vbi
uero sudarit, laua cum calida, et in lauacrū artemisiā & laurum immitte. Deinde
subdititiū medicamentū adhibe. Aut artemisiā, aut bulbiū in uino albo tritū la-
næ inuolutū subdat. Hæc ad tres dies faciat, & deinde cū uiro dormiat. Sub-
dititiū pharmacum ad conceptū faciens. Ex nitro & thure, cū melle glandem
formato, & apponito. Aliud purgatoriū molliens. Caricam coquito donec
granula abijciat, & hanc expressam leuissime tritam in lana cū rosaceo unguē-
to apponat. Aliud acrius. Brasicæ, rutæ, pares portiones tere ac utere eos-
dem modo. Aliud molle & purgatoriū. Medullam anseris, aut bouis, aut
cerui, magnitudine fabæ, affuso unguēto rosaceo et lacte muliebri terito, uelut
molle pharmacum teri solet. Deinde ex hoc os uteri illinito. Aliud tepidum
purgatorium. Anseris medullam magnitudine nucis, resinæ lentissimæ aut
terebinthinæ magnitudinem nucis. Hæc in unguento rosaceo ad lentū ignem
liquefacito, & uelut ceratum facito. et deinde ex hoc tepido os uteri illinito, et
peccinē madefacito. Aliud detrahens purgationem et sistens. Pæoniæ
grana nigra aut rubra, tria aut quatuor in uino trita bibenda dato. Si uero ma-
gis detrahere uoles, grana nigra eodem modo trita bibenda præbeto. Aliud
purgans ac detrahens. Lauri baccas ad summum uiginti, et felis dimidium
acetabulum, cum uino trita bibat. Aliud. Tauri fel trium dimidiorum ob-
olorū Atticorū pondere, in uino ieiunæ bibendum dato. Et efformata quoq̄
ex ipso catapotia deuoranda dato. Aliud. Farinam recentem, myrrhæ obo-
los tres, croci tantundem, castorij obolū, Hæc cum unguento rosaceo trita ap-
ponat. Aliud purgatoriū. Semē urticæ, et maluæ succū, cū adipe anserino
tritum subdat. Aliud. Si nō purgata fuerit ex partu, floris farina quantum
tribus

tribus digitis cōprehendi potest coquito, & melle affuso, uentri uelut cataplasma imponito, & bibendum dato. Aliud quod uteros aperit & purgat. Cantharidas quinq; aceto albo affuso terito, & non ualde liquidum pharmacū facito, sed ut digitis effingi possit, & de ficu alba pingui, sine granulis & pelle, duplam cantharidū partem ammisceto, & efformatam glandulam tenui lana inuolutam subdito. Aliud. Si ex partu non fuerit purgata, trifoliū in uino albo bibendum dato, hoc etiā mēses educit, & foetus expellit. Aliud purgans uteros. Quum puero immortuo sanguis intus manserit, colocynthidē syluestrem in melle tritā delingat, aut subdat. Aliud sanguinē purgans. Sanguinem ex uteris expelles, si uiolę albę semen tritū, uino dilutū bibēdum dederis. Aliud quod similiter sanguinē ex uteris expellit. Rhois seminis quū rubrū fuerit, grana uiridia triginta terito, & rosas caninas rubras, rubicundo ex ipsis delecto, in uino bibenda dato, quū sanguis eruperit. Aliud purgatoriū. Si menses non apparuerint, styracem & origanū terito, cōmisceto, & adipe anserino affuso apponito. Aliud quod subditū uteros purgat ac euacuat. Absinthij radicem tritam cū melle, cum oleo apponito. Subdititia uteros purgantia, aperientia, & aquam ducentia. Scillæ frustum longitudine sex digitorum, & digiti parui crassitudine accipito, & de hoc duos digitos circūderadito ac leigato, & reliquū lana sordida inuoluito, eam uero partem quę circūdata est ad os uterorum subditam, per diem ac noctem appositā finito. Postquam aut lauit & abstulit, aqua odorata colluatur. Aliud purgatorium molle, quod aquam & pituitam ducit, & pallidos ac subcruentos menses detrahit, si nō diu turni fuerint, & os emollit. Vnguentum narcisīnū, cuminū quod edimus, myrrham, thus, absinthium, cupressum, salem, rosaceū oleum sumito. Et de alijs quidem singulis cōgium accipito, narcisīni uero partem quartā, & omnia in glandem efformata, ac crudi lini linteo excepta subdito. Aut linteum tenue pennā circūdato ac deligato, & in oleo albo Aegyptio tinctū apponito, & tota die appositum finito. Deinde ubi lauit & abstulit, aqua odorata colluatur.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS MULIEBRIBVS LIBER I. IANO COR

nario Medico Phifico interprete.



De muliebribus morbis sic sentio. Mulierem quę non peperit grauius et citius ē mēribus agrotare, quā eam quę peperit. Quum enim peperit uenulę fluidiores sunt ad menses. Fluidas autem ipsas facit purgatio illa quę fit a partu. Et ubi hęc erumpunt, uicinā maxime uentri ac mamms corporis partes discinduntur. Discinditur item reliquum corpus, a quo uero hoc fiat, dictum est a me in natura pueri in partu. Discisso autem corpore necesse est uenas magis aperiri, & ampliores ac fluidiores ad menses fieri: itēq; uteros magis aperiri, nimirū puero per ipsos egresso, qui & uini & dolore induxit, & quum hęc sic se habeant, mulier purgationē a partu expectata, minus laboriose mēribus decurrentibus purgatur. Si uero etiā affectio aliqua mulieri quę iam peperit accadat, ut mēses uenientes probe purgari non possint

possint, facilius dolorem feret, quæ si non peperisset. A sueti enim sunt uteri, & corpus idoneum ut impleatur, utpote in ventre haberi, & simul multa amplitudo in corpore est. Maior autem fit etiam amplitudo ubi peperit, nimirum corpore distenso. & corpus in amplitudine existens, minus dolore affigitur, si non uenæ superimpleantur, & nimium doleant. At uero ei quæ non peperit, quum corpus non asuetum sit, si impleta fuerit, & fortius ac solidius & densius sit, si purgationem à partu experiatur: & quum uteri ægrius aperiantur, menses laboriose procedunt, et affectiones plures accidunt: ut propterea menses obturætur, si prius non peperit. Habet autem res se hoc modo, uelut etiam prius à me dictum est. Dico mulierem rariore carne præditam & teneriorem esse quam uirum. & hæc res sic se habet. à ventre trahit humiditatem, & citius, & magis, corpus mulieris quam uiri. Et enim si quis super aqua, & per regionem aquosam, duobus diebus ac duobus noctibus, molles lanas ponat, & uestem puram & contextam æquali ad lanas pondere, subtilis uiri quam apponderatione facta, multo grauiores lanas cooperiet quam uestem. Fit autem hoc ex eo quod semper ab aqua sursum decedit in uasa ampliora oscula habentia. & lanæ quidem tanquam raræ & molles, ex decedente amplius suscipiunt. Vestis autem ut quæ plena est & ex contextu obturata, explebitur, non multum ex decedente aqua suscipiens. Sic sanè etiam mulier, uelut quæ rarior est, ante partum à ventre humiditatem corpori attrahit, & citius quam uir. & tanquam teneriori carne prædita mulieri, ubi corpus sanguine repletum fuerit, si non ab ipso secesserit, carnis impletis ac calefactis, dolor oboritur. Habet enim mulier sanguinem calidiorem, & propterea calidior est quam uir. Si uero amplior accedens sanguis secesserit, dolor non fit à sanguine, neque calor. Uir autem ut qui solidiore carne præditus est quam mulier, neque in superna uentris parte adeo sanguine superimpletur, ut nisi aliquid sanguinis singulis mensibus secedat, dolore fieri necesse fit: & sanguinis quantum satis est ad nutrimentum trahit: & quum corpus ipsi non sit tenerum, non dolore affigitur, neque superincalcescit à plenitudine, uelut mulieri. Mulier autem confert ad hoc uiro, quod magis laborat quam mulier. Nam labor aliquid humoris abducit. Postquam igitur mulierem quæ non peperit, occultati fuerint menses, et uiam foras reperire non poterint, morbus fit. Hoc autem contingit, si uterorum conclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudendi pars contracta. Si enim horum quid fuerit, menses exitum inuenire non poterint, priusquam uteri ad sanam naturam redierint. Fit autem hic morbus his maxime, quæ angustos uteros habent, aut ceruicem ultra pudendum sitam. Si enim horum alterum fuerit, et mulier uiro non misceatur, et ueter magis quam oportet euacuetur, ab hac affectione uteri obtorquetur. Neque enim humidi in seipsis sunt, utpote muliere non coeunte: & amplitudo ipsis spatiosa est, utpote quum uenter magis uacuum existat. Quare obtorquetur, dum ficcior et leuior est ueter quam conuenit. & aliquando dum ipsi obtorquetur, etiam os ipsorum distorqueri contingit, nimirum ceruicem ultra pudendum sita. Si enim humidi fuerint uteri à coitu, & uenter non euacuetur, non facile distorquentur. Hęc igitur causa est ut ipsi sint conclusi, nimirum à uenere abstinente muliere. In tertijs porro mensibus optime afficietur, si quæ prius insunt progressa fuerint educata. Sin minus, mulier hæc patietur. Suffocatio aliàs atque aliàs in ipsam irruet, & febris aliàs atque aliàs corripiet, ac horror, & lumborum dolor. hæc patietur in tertijs mensibus, si ipsi non prodierint. In quartis uero si non egressi prioribus exitum fecerint, etiam

*7.º Mucosa hinc
genua in hinc
u =*

*Neque menses
in uentris
325 Vol. menses
hinc de uentris que*

etiam tūc tertij mēsis afflictionibus omnibus magis affligetur, & maxime tempore mensium. Deinde minus. Sæpe uero etiam à dolore libera sibi esse uidebitur. Erunt autem in quartis etiam hæc signa. Vrinam multam ac crassa enjciet, aliàs atq; aliàs. Et uēter ipsius durus erit, & maior q̄ prius, & dentibus fremet, & cibum auerfabitur, & uigilabit. Hæc patietur in quartis mensibus. Si uero curret, etiā in his sana euadit. Et in quintis si non multi menses descenderint, dolor adhuc fortior accidit. In sextis uero iam incurabilis est. & iuxta priora quidem signa magis dolebit. Deinde ad ea etiā hæc aderūt. Anxia erit, & aliàs atq; aliàs seipsam iactabit, & animo deficiet, & pituitam uomet, & fitis fortis ipsam corripit. Nimirum dum exuritur uenter ab uteris sanguine plenis. & ad contactum dolebit, maxime pectinē. Et aliàs atq; aliàs acute febriet. & uteri aliàs atq; aliàs murmurabūt, dum uidelicet sanguis in ipsis commouetur ac discurrit. & uenter consueto modo nō secedet. Neq; uesica urinā excolabit, maxime quum uteri ad stomachum qui neruofus est, mulieri allapfi fuerint, & ad uētram irruerint, dolet spinam, & totū dorsum. & lingua ipsius refrenatur. & hanc non claram habet. & animi deliquium adest. Aliquibus etiam uocis priuatio. & stomachus mordetur. & flaua bilis exit. & spiritus offendens. & anxia est, & iactat se ipsam, & ardet. Postquam autē trāsmutati fuerint, & uesica tenuem sanguinem ab uteris trahet, tunc urina mingitur rubra. Et dolet quidem reliquum corpus, maxime uero collum, & spinam, & lumbos, ac inguina. Et ipsi ad hoc progressæ, & uenter attollitur, & crura supra modum intumescūt, & tibiæ ac pedes. & mors succedit. Et circa hanc quidē sic finiūt menstruæ purgationes ad sex menses occultatæ. fiunt item hæc. Quibusdam mulieribus menses bimestres in uteris existentes multi ad pulmonem procedunt. & ubi recepti fuerint, omnia patiuntur quæ in tabe dicta sunt. & non est possibile ipsam superesse. fiunt & hæc. Quibusdam suppurati fiunt menses, ubi per duos aut tres menses moram traxerint. Hoc autem maxime fit, si à febre fuerint cōbusti. Signa uero sunt si suppurati fuerint. dolores enim incidunt in pectinem, & pulsationes fortes, & contactum non sustinet. & si melius habitura est, menses ipsi erumpunt in pudendum, & procedit pus ac sanguis, & procedit graueolens, ad septē, aut octo, autem nouem dies. In priore uero tempore dolet uelut dictum est antea. Postq̄ autem depurgata fuerit, optimū quidem est si non fiant ulcera. Si uero reliquantur ulcera, ampliore curatione opus habebit, quo ulcera non putrescant, & graueolentia fiant. Sterilis autem euadet, etiam si melius habebit, ubi magna ulcera fuerint quæ in uteris facta sunt. Si uero non cōtinget, ut menses ipsi in pudendum procedant suppurati facti, ad partes supra inguen, iuxta lateris mollitudinem erumpent, circa tuberculum, utpote pure rupto, & illa parte purulenta graueolentia procedent. & si hoc fiat, mulier non superstes manet. Si uero etiam superstes maneat, semper sterilis erit. Hac enim parte de cætero uia fit mēsis uteris foras prodeant. Nam os uterorum ad hunc locum allapsum est. fit & hoc. Quibusdam ubi bimestres aut trimestres aut diuturniores fuerint menses, & ad lateris mollitudinem allapfi fuerint, quū non suppurati sint menses, uelut tuberculum fit supra inguen, sine capite, magnum, rubrum. & uulgus medicorū ignarum quid hoc esset, iam sæpe secuerunt, & sic in periculum induxerunt. Cæterum id quod uelut tuberculum fit, tali modo fit. Fruitur sanguine

caro ipsa, utpote osculo uterorū lateris mollitudini adiacente. & impletur caro ab ipso, & infurgit ac eminet, uelut sanguine repleta. Et aliquando si transitorū fuerit os uterorum, & ad pudendum cōuersum, & menses procefferint per pudendum, id quod circa lateris mollitudinem emittit sedatur. In uteros enim distribuitur, hī uero foras laxantur. Si uero non cōuersum fuerit os uterorum ad pudendum, circa lateris mollitudinem suppuratur, & hac parte trāsitus fit mensibus, & eadem pericula sunt, quæ prius sunt relata. Sed & ad uomitum cōuertitur, & quibusdam in sedem, uelut in uirginum morbis à me dictum est, & signa & dolores eosdem ostendit, quos isthuc retulimus. At hanc uiam minus faciūt menses mulieribus quàm uirginibus. Quum menses fuerint occultati, dolor habebit in uentre, & onus quoddam incubere uideatur, & lumbos & laterum mollitudinē mirum in modum dolet. Si uero omnino nō procedunt, præ morbo aut crassi & uiscoli, aut glutinosi fiunt. Primum igitur uentrem purgare oportet sursum ac deorsum. Deinde uteros subditio medicamento, à quo sanguis purgatur. Atq; ita quiescere, & potandū dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Bibat etiam Crethmon in uino tædaceo. Si uero fluxus ipsi non fiat, continget ut prægnans esse uideatur, & dum cum uiro coit doleat, ut putet quid incubere, & grauitas fit in uentre, & uenter prominat, & desiderijs similibus afficitur, uelut in uentre habeat, & stomachi dolore afficitur, maxime ubi quinquaginta dies præterierint. Et dolor aliàs atq; aliàs habet uentrem, & partem circa umbilicum, & collum, et inguina, & lumbos. Et postquā menses duo aut tres præterierint, quandoq; menses acruatiū ipsi in pudendum erūpunt, & quæ prodeunt uelut carnem esse putat, quemadmodū ex foetus corruptione & nigra. Quibusdam etiam ulcera fiunt in uteris, & opus habent diligentia nimaduersione. Multis uero contingit ut putent se sex mensibus in utero habere, aut etiam paulo breuiore tēpore, & uenter prominat, et alia sibi fieri putat, uelut in uentre habēti. Postea sunt et quibus suppurati eruperūt supra inguen, simul cum quinto aut sexto mēse, et uiam ea parte patefecerūt. Quibusdam autem ulcera fiunt in uteris etiam infra sub inguine, et periclitatur mulier de uita. Si uero etiā superstes maneat, sterilis erit. Quibusdam etiam in pudendū erumunt, et prodeunt ipsi putrefacti ac purulenti. Et ab his ulcera fiunt in uteris, & periclitatur. Et oportet ut ne antiqua fiant ulcera, cum attentione mederi. Sterilis autem et hæc fit, etiam si fuerit curata. Si uero non eruperint menses sex mensibus intus conclusi, omnia patietur uelut ea quæ non peperit, in qua menses uia inuenire non possunt. Et si quidem curata fuerit, sana erit. Sin minus, etiam ad octo menses durans moritur. Multis uero contingit, ut menses pituitosi ad multum tempus prodeunt, etiam pauciores sanis sint, sana aut talis fit, si conuenienti cura fuerit sanata. Si uero menses mulieri prodeant quidem, uerū pauciores q̄ conuenit, utpote osculo uterorum paululū à pudendo emoto, aut nuper concluso ad hoc, ut prodeant quidem, uerum obturentur ab ipsis etiam transitus, per quos penetrant ubi ad uteros descendūt: moderati sanē paulatim prodeunt, sanguine semper perfecte osculo incubente. Et postquā dies præterierint quibus purgari solet, et conclusus fuerit sanguis in uteris relictus, et alij menses subdescendentes non expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauant, et primis mensibus duobus aut tribus non ualde prodeunt.

Postquam

Postquam autem plures menses praeterierint, adhuc magis dolebit, & non habet in uentre, quae diu sanè sic habuerit. et febris corripit ipsam debilis, maxime in diebus quibus purgari solet. Verisimile est autem et in intermedio tempore ipsam febrere, et horrere, et stomachi dolore uexari, et ad multitudinem addere singulis diebus. Et dolet aliàs atque aliàs corpus, et maxime lumbos, et spinam, et inguina, et articulos manuum ac pedum. Verum his locis non simul dolet, sed aliàs atque aliàs, qua parte sanguis discretus, et in utero esse non potens impetu suo grauarit. & qua sanè corporis parte incubuerit, tumor est, fitque etiam conuulsio fortis articularum corporis. Et aliàs aliud ex relatis antea signis ipsi apparet. Hæc siquidem iuxta debitum modum curata fuerit, sana euadet. Sin minus, morbus septimestris aut diuturnior factus, lethalis fuerit, aut claudam faciet, aut artes aliquas impotentes efficiet, si præ rigore & cibi fastidio, sanguis circa neruos compactus fuerit, quæcunque tandem locum occupauerit. Hic autem morbus magis fit his quæ uirum non habent. Si uero hi morbi iam relati, aut quicunque postea referentur, incidant in eam quæ partum non sit experta, diuturniores erunt, & minus dolorosi. Verum signa eadem, & eisdem fines, tum ei quæ non perierit, tum ei quæ puerperia experta est, contingunt, si non curentur. Oportet autem statim curationem facere. Sin minus, statim compareret morbi. Si uero menses plures quam oporteat prodeant, & crassiores: Nimirum corpore natura fluído existente, & osculo uterorum prope pudendum sito, & ad hæc multo cum uiro coitu utatur, & conuiuetur, semel aliquando multi descendentes, & cumulate prodeutes, os uterorum impetu suo magis dilatant. & si ad hæc non incidat uasorum euacuatio, sed rursus multus accesserit calor, & os amplum faciunt, & corpus: utpote dum conuiuante & uoluptatem ac consuetudinem uiri conseruante muliere, facili fluxu ad uteros etiam calor defertur. & decolor erit quæ diu sic habuerit. & si postea morbus aliquis aut affectio incidit, ut corpus affligatur, & uteri similiter iuxta solitum morem ampli sunt, & corpus facili fluxu in ipsos præditum est. Et post hæc febris habet, & cibum auerlat, & anxia est, & tenuis ac debilis. & lumbos ex mensibus dolebit. & progressu temporis si non curata fuerit, omnia ipsam magis affligent in intermedio tempore. & periculum ipsi imminet, ne sterilis fiat, aut a tempore & morbo uexata, si alius morbus incidat, ex hoc moriatur. prodeunt autem menses crassiores & plurimi, in intermedio diebus. Incipientes autem & desinentes, pauciores & tenuiores. Moderati uero sunt menses prodeutes in omni muliere si sana sit, ut duarum heminarum Articularum mensura secedant, aut paulo plures, uel pauciores. atque hoc ad duos aut tres dies. Longius autem tempus aut breuius, morbosum & sterile est. Coniectare porro oportet, mulieris corpus inspiciendo, & interrogare collatione ad priora facta, an semper morbosam uiuat, aut non. Si enim pauciores aut plures dies quæ solent prodeant, aut ipsi pauciores aut plures fuerint, morbosum sunt: Nisi natura ipsa morbosam & sterilem fuerit. Si uero hoc fuerit, & ad salubriorem statum transfutatur, melius est: procedit autem sanguis uelut a uictima, & cito congelatur si sana fuerit mulier. Quibus uero in natura est, ut plures quæ quatuor dies purgentur, & menses ualde multi prodeunt, hæc tenues fiunt, & foetus ipsarum tenues, & emarcescunt. Quibus autem purgatio infra tres dies fit, aut pauci menses secedunt, hæc crassæ sunt, & bene coloratæ, uirilesque ac partus immemores.

& neq̄ concipiunt. Si suffocatio derepēte accesserit: fit autem maximē his quæ cum uiris non coeunt, & senioribus magis q̄ iunioribus. Leuiores enim uteri ipsarum sunt: fit autem potissimū tunc, ubi mulieri uasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit: reficcati à labore uteri conuertuntur, ut qui uacui sint ac leues. Est enim ipsis locus spatiosus ut conuertantur, utpote uentre uacuo existente. Dum autem conuertuntur, impetunt hepar, & iuxta consistunt, & ad præcordia irruunt. Currunt enim & progrediuntur sursum ad humiditatem, tanquam à labore magis q̄ opportunum est reficcati. Hepar autem humidum est. Postq̄ autē impetuerint hepar, suffocationem faciunt, derepente perspirationem circa uentrē intercipiētes. & aliquādo simul incipiunt hepar impetere, & à capite pituita defluit ad præcordia, uelut ab eo quod suffocatur. et aliquādo simul cum pituitæ defluxu, descēdunt ab hepate ad locum suum, & cessat suffocatio. Descendunt autē detrahentes humiditatē, & grauari. Stridor autē ab ipsis fit, dum ad suam ipsorū sedem procedunt. postquā autē eō deuenerint, aliquādo uenter post illa humidior fit, q̄ superiori tempore. Laxat enim iam caput pituita in uentrem. Vbi uero apud hepar & præcordia fuerint uteri, & strangularint, mulier albas oculorum partes subuertit, & frigida fit. Sunt autē & quæ liuidæ fiunt. Quædam etiam dentibus frendunt, & saliuæ ad os fluunt. & similes fiunt his qui ab Herculeo morbo detinētur. Si uero diutius morā traxerint uteri apud hepar & præcordia, mulier strangulatur. Quādoq̄ uero ubi mulier uasa euacuata habuerit, & insuper laborarit, uteri cōuersi ad uesicæ stomachum allabuntur, & urinæ stillicidium inducunt. Aliud autem nihil mali habet, & curata cito sanescit, quandoq̄ etiam sponte. Quibusdā uero ex labore aut inedia, ad lumbos aut ad coxas allapsi, dolores exhibent. Si mulier corpore male habuerit, & menses biliosi prodierint, ex hoc probe cognosci possunt. Nigri sunt ualde, quandoq̄ uero nigri aut splendidi. & paucissimi prodeunt, & citissime congelantur. & semen amborum, & maris & foeminae euanescit. & non habet in uentre. & incipiente quidē morbo, purgatur diebus quibus solita fuit, non pluribus. progredientibus autem mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores singulis diebus apparent. Et febres succedunt erroneæ acuta, cum horrore & cibi fastidio aliàs atq̄ aliàs, & stomachi dolor. & dolebit maxime ubi menses ipsi appropinquant. Postquā autem purgata fuerit, & ad modicum tempus, superiorū respectu melius habuerit, postea rursus ad idem perueniet. Dum autem curatur, cito sana fit. Si uero non curetur, & tempus procedat, omnia prius relata ualde ipsum affligent. & dolor corripiet, nunc uentris partem infra umbilicum, nunc inguina, nunc lumbos & coxædicum ad sedem iuncturam, nunc collum, aliquādo uero strangulatio fortis accidet. & caligo ante oculos obuersabitur, & uertigo, utpote purgatione sursum uergēte ascendente. Si enim corpus male habuerit mulieri menses pauciores fiunt. & quibus corpus plenum fuerit, his menses plures prodeunt. At uero biliosæ si menses prodeant, pusillanimitas incidit, & cibi fastidium aliàs atq̄ aliàs, & anxietas, ac uigilia, & cruciatur frequenter. & nō uult deambulare. & tristis est, & nō uidere sibi uidetur, & timet. Et si curetur, ex his sana erit. Si uero tēpus processerit, adhuc magis dolebit. Optime autē cum hac agatur, si uomitus biliosus succedat, aut uenter turbetur, non fortiter, & subeant biliosa. & si fluxus succedat ipsi nō for

tis. Si enim quid ex his forte incidit in corpus afflicti, periclitabitur. Si uero leniter depurgetur aliquid biliosum aut totum id quod molestum est, sana fiet. Si uero necque curetur, necque quicquam horum fiat, moritur mulier. plerumque tamen contingit ut fluxus incidat biliosus ex hoc morbo. & si fluxus fiat, primum quidem pauca sunt que comparent, per omnes autem dies omnino plura contingunt. Temporis autem progressu plerumque etiam morbus acutus fit. & uteri a purgatione biliosa prodeunte mordentur, ac exulcerantur. Sed & in hoc adhuc sana fit, si curetur, & fluxus coepescatur. Si uero uteri ab ulceribus fuerint inflammati, adhuc acutior morbus erit, & multa graueolentia ac purulenta prodibunt, ab ipsis uteris iam egressa, & semper uelut aqua de carnibus. & prius relata omnia ipsam magis affligent, & ulcera adhuc magis efferatiora erunt, donec ipsam uincant. Si uero etiam sanata fuerit, sterilis erit a cicatricibus. Si mulier corpore male habuerit, & pituitosi menses prodierint, cognosci autem possunt si pituitosi prodeant. Pelliculosi enim apparent, & uelut araneorum casses distenduntur, & subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus & caput ipsi pituita repleta fuerint, & haec non subpurgetur, necque per nares, necque per sedem, necque per urinam meatum. Sed in mensibus, & in turbatione sanguinis, una cum purgatione foras exit. Et si haec sic habuerint, ad duos quidem aut tres menses nihil aegrotat. postquam autem amplius tempus progressum fuerit, & non curetur, magis dolebit, & febris erronea corripiet. & cibum aliam atque aliam fastidiet, & stomachum dolebit, & maxime dolebit ubi menses appropinquant. Quum uero purgata fuerit, ad modicum tempus, superiorum respectu melius habebit, postea ad idem relabatur, & si non curetur, sed tempus procedat, fient ipsi omnia quae ei cui biliosum menses prodeant, donec fluxus sistatur. Consequitur etiam uer haec fluxum pituitosum habeat, aut alia quae ego dicam paulo postea. Et si quidem fluxus succedat, semper procedunt per omnes dies, nunc aceruata, nunc pauca, & quandoque uelut a carnibus aqua prodeit, quandoque uelut faecies. & in hoc ipso multi sanguinis grumi insunt, & radit terram uelut acetum, & mordet ubicumque mulierem contigerit, & uteros exulcerat. Et ubi ad hoc peruenit, reliqua quaedam similiter patitur, uelut prior. Minus uero quam illa caput dolebit, et ulcera necque deformia, necque magna, necque purulenta, necque graueolentia, similiter uelut illi fiunt, sed minus huic. Si uero curetur, sana euadit, etiam ubi morbus progressum fecit, & non ualde moritur. Verum praegrans esse non potest quae sic habet. Quaecumque uiro cohabitantes in uentre habere non possunt, interrogandae sunt, an ipsis menses prodeant, aut non; & an purulenti sint, aut frigidi. Si quidem igitur responderit, interrogetur an statim exeat genitura, an postera die, aut tertia, aut sexta, aut septima. Si igitur dixerit statim exire ubi coeuit, uteri osculum rectum non est, sed distortum, & genituram non capit. Si uero postera die, aut tertia, uterus perhumectus est, & semen eluitur. Si uero sexta aut septima, semen putrefcit, putrefactum uero exit. Si igitur ab initio non suscipiat semen, os uteri primum curandum est, ut rectum sit. Si uero eluatur postera, aut tertia die, uterus & caput. Si uero putrefcat & exeat, & uterus, & totum corpus curetur. Atque haec singula sic cognoscere oportet. Quali uero purgatione opus habeat, hoc modo cognoscit. Quum menses prodeunt, linteum complicatum palmi magnitudine super tenuem cinerem ex-

pandito, deinde ut quæ exeunt super hoc defluant curato. Præstat aut duo esse lintea, utrunq; seorsim, alterum diurnum, alterum nocturnum. & diurnum quidem, postera die lauare oportet. Nocturnum uero, ubi per diem ac noctem super cinere situm fuit. In lotura uero considerare oportet, qualia nam fiant lintea lota, ubi in sole fuerint siccata. Optimū tamen est in tenebricoso loco ea resiccare. Si quidem igitur pituita fuerit quæ conceptionem impedit, mucosa lintea erunt. Si uero propter saluginem & bilem impeditur, fulua & subliuida. His igitur consideratis, & diligenti animaduersione expensis, totū etiam corpus inspicio, an multa purgatione opus habeat, aut fecus, ita ut & ad colorem, & ætate, & robur, & anni tempus, & qua diæta utantur respicias. Curatio uero & totius corporis est, & uteros ac osculum ipsorum sanare. & si hoc conclusum fuerit, a perire. Si uero illi distorti fuerint, dirigere oportet. Si autē humidī fuerint, resiccare. & alia quoq; facere contraria. Fere autē omnibus multa curatio eadē est, excepta mēsum detractio. Nam quibus nihil prodit, his detrahere oportet. Immo quicquid in mēsum mali inest, hæc auferre oportet: quum uide licet pituitosi sunt, & pelliculosi, & saniosi, & tenues, aut albi, & grumosi: & quum nigri sunt, & carbūculosi, aut caliginosi, aut acres, salsi, turbati, purulenti. Hæc omnes causa: tollendæ. Prohibent enim in uentre conceptum. Quibuscūq; igitur menses pituitosi ac pelliculosi sunt, hæc carnosæ sunt, & his os humectū est, et fatua multa ac uiscosa. Et si acidum aut acre quid gustarint, sputū in ore liquidius erit, & insulsum. et ad omnia quæ ederint aut biberint, turbatio sequitur. & super primitur ipsis ac attollitur uenter. & nauisæ adest, & anxietas ac iactatio multa. Et à capite fluxus defluit, & omnia obducit, & multā humiditatem inducit. & partes sub oculis luiddæ sunt ac inflatæ. Has totas fouere oportet, & frequenter uomere, & à cibis, et ieiunas. Infernū autem uentrem mollire, sed pharmacis omnino leuibus, quæ minime bilem ducunt. & semel in die cibū capere, & frequenter exerceri. Et cibo siccissimo uri, & potu paucissimo meracior. Melius autem est ut uenter facile solubilis cōseruetur. Verum uteros si ad hanc diætā non paruerint, pharmacis subdititijs nō mordacibus purgare oportet. Fomentum tamē semper purgationibus præmittendū est, prius id quod ex foeniculo paratur. Deinde quod ex suffimētis. Fomento uera & subditiōnes medicamentorū facito, cōiectura facta ut omnia fiant, & pro ratione adhibeantur, quo tempore menses prodeunt. Si quidē igitur puri & sinceri ac cruenti fiant, ita ad uirum accedat incipientibus mēsum. Optimū autem, desinētibus, & adhuc euntibus, magis quā ubi disparuerunt. Quū autem ad uirum itura est, suffimentum quoddam ex adstringētibus suffiat, atq; hoc per canistrū, & arundinem, pharmacō calido cineri insperfo. Quū uero insperferis, & canistrū, siue operculum circūponito, & per arundinē insidenti fomentū adhibeto. Vbi uero opus fuerit ipsam suffiri, plūbea fistula utere, ut aperto osculo suffiatur. Deinde quū surrexit, rursus in lecto plumbeam fistulam apponat, Deinde ea subtracta cū uiro coeat. Et si ea quæ à uiro prodeunt, nō fuerint ei manifesta, extensis & alternatim positis cruribus quiescat. Ieiuniū autem utile est in hac die, præterquā si cyceonem uelit non saluum in aqua. Hunc autem tunc bibat quum uult suffiri. Si uero ubi cum uiro coiuit, postridie detineat genituram, & neq; altera die exeat: à cibis quidem & balneis prohibeatur. Bibat autem polentam in aqua non saluam

fam, bis ac ter in die. Atq; hæc diæta fit per sex dies, aut quod melius est, septē, si non exierint ea quæ à uiro suscepta dum cū ipso coiuit. Illota uero maneat per omne tempus, et det operā ut motus uitet. Si uero deambulare uelit, deambulet in loco plano et leui, nequaquā accliuui, neq; decliuui. Desideat etiam super mollia, si conceperit. Reliquam uero diætā eandē faciat usq; ad dies triginta. Illota autē sit, aut si lauare opus habeat, pauca & nō ualde calida lauetur. Caput uero ne mā deficiat. Cibis autē utatur & panibus, & maza si uelit. Ex carnibus autem, palumbe, & similibus, ex marinis, his quæ aluum sistunt, prohibeatur ab oleribus acribus. Vino uero nigro utatur. Carnibus autem assatis potius q̄ coctis, tum manfuetis, tum ferinis. Et hæc quidē si conceperit, hoc modo facere oportet. Si uero non cōceperit, sed secunda aut tertia die exeūt ea quæ à uiro immissa sunt, fluentia cū multa humiditate: manifestū est quōd uteri sunt humidiores. Curare itaq; oportet iuxta relatū modum, donec sicci fiant. Quum autē sicci esse uidebuntur, sic curato. Optimū est pharmacū mollitoriū, & retro, & anteriori parte ipsi adhibitiū, donec uteri ad naturam suam redeant. & rursus ad uirū accedat, quum menses nō amplius multi, sed pauci & bene colorati fuerint, & ad libidinem concitatur. Sed & in alijs diebus cum uiro cōsuetudinem habere oportet, si optime habuerint uteri. Quum autē in relatis diebus cōsuetudinem habuerit cum uiro, si probe parati fuerint uteri, & si geniturā ad decē aut duodecim dies detinuerit, ne adeat uirum. Si uero non concipiat, uteri autem sani sint: cōtinuēgit enim & hoc pleriq; quum debiles existentes uteri, ab affectione macilentifunt: aut præ medicamentis & fomento multo, genituram ferre non possunt; priusquā aſueti fiant et conualescant. Hoc autē sic cognosci potest. Quū ab ipsa exierint, secūda aut tertia die exeunt, aut adhuc prius, crassa & compacta uelut mucus: nisi mali quid sit, & propter aliū uterorum morbum genitura discedat. Quum igitur talia apparuerint, curatione quidē uterorum nō est opus, uerum reliqui corporis cura habenda est, quo huiusmodi bonus habitus sit ipsi, ut cor tractum simul sit corpus, & iuxta mole præditū, ex paucorū balnearū, plurium uero & leuium laborum usu. Ab acribus autē & salis prohibeatur. Vomitus utatur ante dies quibus menses fieri solent, & rursus fame maceretur, & alia perficiat quæ dicta sunt. Atq; hæc quidem harū curatio est. Quibus autē statim ubi coiuerint disfluunt ea quæ à uiro sunt immissa, his os uterorū causa est. Curare uero sic oportet. Si quidem ualde cōclusum fuerit, tædis & plumbeis fistulis immisissis aperito, & molli fomēto ex feniculo foueto, et subdititijs, quæ uteris attenuant, & in directū redigunt, purgato. Post purgationes autē & fomēta, ea in fundito quæ causæ sunt cōtraria. Quibus uero os distortū est, & ad coxam allapsū: sūt enim etiā talia prohibētia ne uterus semen suscipiat. Quū igitur tale quid acciderit, odoratis fomētis fouere oportet, post fomentum autē, per digitū auulsum à coxa detrahit. Quū autē discesserit, tædis & plumbeis fistulis immisissis iuxta priorē rationem in directū dirigito, ubi uero rectificati ac aperti fuerint uteri, medicamentis subdititijs purgato, & alia facito iuxta relatam rationē. Quum autē magis q̄ oportet aperti fuerint uteri, purgationes ne opus habent, post purgationes autē, collutionibus & suffimētis. Si uero propiores sint q̄ oportet, uomitus uteri opus habent, & fomento fœtido, donec ad suum locum redeant. Diæta uero utendū est relatā. Si uero os pingue fuerit

& crassum, & propterea non concipiat, sinapi coctum ieiuna edat, & metracum insuper bibat. Apponat autem nitrum rubrum, & cuminum, ac resinam. Optimum autem fuerit nitrum uino ammiscere & resinæ, unâ cum cumino & unguentum albo. Aut cornu cerui urito, & duplū crudæ ordea cææ farinae cū uino ammisceto. Si uero non melius habeat, porrum coquito, & ipsam insidere facito. Aut phagum id est glandem tritam apponat. Et alio recenti uescatur, & aqua multa insuper pota uomat. Quibus porro intus manet uiri semen & compressit, & turbationem facit, his atriplicis semē aut succum, cum melle aut cum cumino delingendū dato. Quum autem à uiro immissa graueolentia fuerint, non concipit. Portulacam igitur & adipem anserinum misceto & apponito. Quibus uero sexta aut septima die, à uiro immissa prodeūt putrefacta, his ueri simile est ab utriusq; fieri, & bilis, & fæluginis influxu. Curare autē sic oportet, per ueratū, aut scammoniam, aut pepilū. Hæc enim sursum ac deorsum pituitam & bilem purgant, & flatus educunt. Ante purgationes aut fomentis utendum est ex suffimētis. Vbi uero fomentum adhibueris, per subditiua purgato, eodē modo uelut in prioribus. Et post subditiuorum ac purgationū usum, mollia torijs utere, & subditiua medicamento ex mercuriali & artemisia herba, & anemona, & ueratro albo aut nigro. Atq; hæc quidem medicationes hoc modo his cōducunt. Diatā uero respectū ad torū hominis corpus factō cōstituire oportet, siue siccior, siue carnosior mulier esse uideatur. Et si quidē siccior fuerit, balneis pluribus, & obsonijs omnibus coctis, tum marinis, tū carnibus utatur. Vino uero aquoso, & oleribus coctis, & pinguibus omnibus ac dulcibus. Hæc enim pleriq; faciūt ut humiditas sit, tū in reliquo corpore, tum in utero. Si uero humidior fuerit, tales uteri nullo ex his opus habet, sed uice uersa neq; cōtracta re, neq; lauare recētū motu factō oportet, neq; suffire. Nam ad periculū hæc procedere solēt. Et si magis q̄ pro natura fuerint humectæ, siccare sanè ac suffire oportet. Si uero biliosa in ipsos cōfluāt, medicamentū dare quod bilē purgat. Si uero fæluginosa, iac afininū, & uinū, & alia auxiliaria. Morborū porro uires cōsiderare oportet, & causas ex quibus morbi fiūt exquirere, atq; sic ad alia procedere, & morbos circa locos curare, & quæ quidē ob causam oſculorū hiantium prohibentur, ut ne detineant in uētre, horū oſcula præparare, ut probe diducta sint. Quū uero humiditas prohibuerit, hæc inspicere ut ne impediatur, totis mulierū negotijs expēsis, siue ex toto corpore quid moueri uideatur, siue ex ipsis uteris, siue ex utriusq;. Vteros autē sic curare oportet, ut neq; humidifint, neq; ualde sicci. Imò sicciores quidē, tātō magis bono succo, quāto sunt sicciores, eiusmodi humiditate ut pingues magis fiat q̄ graciles. Humectos uero & madidos siccare, ita ut relinquantur quo humidi sint, et nō ualde resiccētur. Excessus enim in his ualde sunt uitādi. Concipit autē in uētre, neq; ea quæ humiditatē habet, neq; quæ resiccata est, nisi quid horū in ueteri natura fuerit. Cæterū uirum adire ipsam oportet, post adhibita curationem, desinētibus aut inchoantibus mensib. Optimum est etiā ubi quieuerint. Maxime uero in his diebus experiendū est, an prægnās fieri possit, hi enim sunt oportunissimi. Si uero nō statim cōcipiat, & reliqua bene habeat, nihil prohibet etiā alijs diebus cū uiro coire. Nā hæc exercitatio alacritatē ipsi inducit, & uenulæ hinc laxātur. & si ea quæ à uiro prodeūt concurrerint secundū rectitudinē cum eo quod à muliere, citius cōcipiet. Hæc enim causa

caussa est his, quibus siue statim, siue posteriore tempore exeunt. Atque hæc quidem de his dicta sunt. Si uero humidius fuerit os uterorum, genituram attrahere non possunt. Utendum autem est medicamentis subditius acris. Comorsus enim & inflammatus stomachus, solidus ac firmus quoadque fit, & aliquo modo accedat. Sed & si in callu durati fuerint, præstat acria apponere quæ mordeant. Quæ enim tenuia et feruida sunt, calli duriciam diffundunt. Si uero mollitus fuerit callus, mollibus curato, & his quæ non mordent. Quod si diu non concipiat, mensibus non appareribus, quum tertia aut quarta dies aderit, alumen tritum, unguento dilutum, & lana exceptum apponito, & habeat per triduum. Quarta uero die fel bubulū siccū in oleo seruefacito, & lanam tenerā eo imbutā subdito, & habeat per triduum. Postridie autem eximat, & cum uiro coeat. Si geniturā non suscipiat mulier, mensibus secundū naturam procedentibus, membrana præposita est. fit etiā ex alijs causis. cognosces autem ubi digito obicem contigeris. facito autem medicamentū subditiuū, resinam et aris florē cum melle subacta in linteo apponito temperatissime, filo ad extremitatē alligato. ubi uero hoc extraxerit, myrtū in uino coquat, & uino tepido perluatur. præstat autem membranā auferre. Sūt autem mulieres quæ facile quidem in uentre concipiunt, gestare uero non possunt, sed fetus ipsas corrumpuntur, aut tertio, aut quarto mense, nulla causa accedente, neque cibo incommo- modo ingestio. et hæc est causa quæ relata est, & maxime quum uteri augmentum fetus dimiserint, aut ueter ipsis turbetur. Debilitas autem, & febris uehementis, & cibi fastidiū incidit eo tempore quo fetus corrumpunt. Est autem & hæc causa, si uteri fuerint leues, aut natura, aut ulceribus in ipsis innatis. Si enim leues fuerint, quoadque continentes ipsum pelliculæ, minus temperat oportet coherere: utpote quum uteri ipsi pleni existant. cognouerit autem quis hæc singula, si de his exacte interroget. De leuitate uero cognouerit, si alia mulier contigerit, dum uteri uacui sunt. Non enim hoc tempore manifestū fit. Si uero menses prodierint his acruatim procedunt. Quibusdam tamen ipsarum contingit ut fetus edant. Et si qua curetur, spes partus adest. & de his quidem sic habet. Si mulierem puerperam facere uelis, aliās concipere nequeunt, menses considerare oportet, an pituitosi sunt aut biliosi. Cognosces autem sic. Arenā tenuem ac siccam subijcito, & quum menses procedunt, in sole sanguinē superfundito, ac siccare finito. Et si quidem biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus pallidus erit. Si uero pituitosa fuerit, uelut mucosus. Utrum igitur horū fuerit, uentrem purgato, siue supra opus habuerit, siue infra. postea uteros purgato. Si uero concipere uoles, hederæ grana septem, aut folia, singulis mensibus in uino ueteri, cessantibus mensibus bibēda dato. Et mali coriū in uino odorato meraco coquito, & glandem ex hoc factā in meridie subdito. Aut alumen Aegyptiū tritum lanæ illigatū apponito. Quum autem sol occiderit, eo detracto, uino odorato perluatur. Hæc autem cessantibus mensibus facere oportet. Sed & hoc sic habet. Quum purgata fuerint mulieres, maxime in uentre concipiunt cum uiro consuetudinē habentes. et genitura ipsis corroboratur, si quoadque oportet coierint. Et semen uiri facile ammiscetur, & si præualuerit, illi accessio modata ac appropriatur. Tunc enim maxime os uterorum hiāt, & distentū esse post purgationes. Et uenæ geniturā attrahunt. At in priorē tempore, et os uterorum condusum est, & uenæ magis sanguine plenæ existētes, non similiter geniturā attrahunt. Si uero genitura iugi cursu defluat, mulier uiro misceri non cupiet.

& si misceatur, non concipit: & lumbi ac coxendices doloribus uexantur, & febris debilis corripit, & impotentia ac animi deliquium succedit. & aliquando uteri in suo loco non sunt. Si quidē igitur præ plenitudine defluat, sinere ipsam optimum est. Si uero uterus laxus fiat, diæta sit alica, caro suilla, aut palūbis, & uinum nigrū. poriones uero, quæ ad fluxum describentur. Nunc porro dicam de morbis earum quæ in uentre habent. Pronuncio autē de muliere in uentre habete duos aut tres menses & ultra, si menses statim prodeant singulis mensibus, necesse est tenuem ipsam fieri ac debile. Quādoq; etiam febris ipsam corripit his diebus, q̄s diu menses prodierint. Et dum prodeunt, & postq; prodierint, pallida fit. Sed & pauci prodeunt. His uteri magis q̄s opportunū est hiant, & augmentū foetus dimittunt. Descendit enim quā mulier in uentre habet, sanguis paulatim in uteros à toto corpore, & in orbē circa id quod in uteris est circumstans, illud auget. Si uero hiant uteri magis quā oportet, sanguinē singulis mensibus, uelut procedere solet, dimittunt. Et quod in uteris est, tenue ac debile fit. Si uero curetur mulier, melior & foetus, & mulier euadit. Si uero non curetur, foetus corrūpitur. Sed & ipsa periclitatur, ne diuturnum habeat morbum, si purgatio plus quā oportet prodeat. Quia & post corruptionem periculum imminet, nimirū uteris magis apertis. Si uero mulieri in utero habenti caput pituitosum fuerit, & pituita acris in uentrē descenderit, & à capite uentrem pertrūpit, & febris debilis ipsam corripit, & palpitationes quibusdam debiles subexolutæ, augetes acutæ. Si uero etiam cibi fastidiū, & impotentia corripiat, periculum est ne breui foetus corrumpatur. Sed & ipsa in periculum adducetur, si non curetur. ubi uero effugerit, utpote uentre fluido existente, statim concludere ac cōstringere oportet. Multa uero etiam alia sunt pericula, in quibus foetus corrumpuntur. Nam si mulier in uentre habens ægrotarit, aut debilis fuerit, aut onus leuarit, aut percussa fuerit, aut saltarit, aut cibum fastidierit, aut animi deliquio correpta fuerit, aut amplius aut minus nutrimentum accipiat, aut timeat, & consterneretur, aut uociferetur, aut intemperanter uiuat foetum corrumpet. Nam et cibus corruptionis causa est, et potus multus. Sed & ipsi uteri naturas habent, quibus abortum faciunt, quum sunt flatulosi, densi, magni, parui, & alia his similia. Si mulier in utero habens, uentrem aut lumbos doleat, formidare oportet ne foetum per abortum edat, pelliculis qui ipsum continent ruptis. Sunt etiam quæ foetus corrumpunt, si acre quid, aut amarum ederint, aut biberint præter consuetudinē, dum adhuc paruus in utero est puerulus. Si enim puero quid accidar præter cōsuetudinē, & si paruulus adhuc fuerit, moritur. Et si eiusmodi edat aut bibat, uelut diximus, ut necesse sit ipsi turbare uentrem, dum adhuc paruus est puer. Percipiunt enim & concitantur ipsi uteri, fluxione ex uentrē secedente. Et si laborarit mulier plus quam oportet, et uenter ipsius concludatur, aut magnus fiat, etiam sic puer corrumpitur, uelut à labore calefactus, et à uentre pressus. Plerūq; enim dum parui sunt, debiles sunt. Quidam uero etiam magni corrumpuntur. Quare mirari non oportet mulieres, quod inuitæ corrūpant. Nam custodia & scientia multa opus est, ut in uteris gestent puerum & enutriant, & ut euadant ab ipso in partu. Si uero mulier in uentre habens, corpore male habeat, & fuerit biliosa & doloribus uexata, & aliàs atq; aliàs febricitet, & os examarescat, & lingua cum uirore

uifore pallida fiat, oculi uelut morbo regio affecti, unguis biliofi, urina acris: hæc tum aliàs, tum fi febricitet, aliàs atq; aliàs ipfi accident: poftquã uero etiam purgationem contigerit biliofam effe, planè timendum eft etiam pueros debiles fore: hæc fi biliofa per feccffum egerat (id quod ualde contingit) melius deget. Et fi biliofa aut ualde nigra funt partus purgamenta, etiam ut plurimũ pinguedo fuccedit, & prodeunt paulatim, & non cito congelantur. & primò quidem tempore leuius fert, poftea uero grauius, & minus purgatur q̃ oportet. Si enim corpus male habuerit, etiam partus purgamẽta pauciora ac deteriora ipfi procedẽt. Patietur autem & hæc omnia, etiam fi menses prodeant biliofi. Verũ breuiori tempore ægrotabit. Et morbus ad eadem pericula, & figna, & trãfmuationes deueniet. Aut enim ipfis uomitus biliofus, aut purgatio per uentrẽ, in hoc morbo fit, et uteri exulcerantur. Multa uero custodia mulier opus habet.

Quum igitur tale quid factũ fuerit, ut ne moriatur, sterilis erit. Si uero nihil horum fiat, et non curetur, fed partus purgamenta fuerint ipfi occultata, in triginta et una diebus ut plurimum moritur. Huic pharmacum in potu exhibendum eft quod bilem ducat. Prodest & anifum, & quæ ad urinam ciendam dantur. Vomatur autẽ, & sudores eliciantur, & aluus fucco pifanæ, & melle, & ouis, & maluæ aqua infufa eluatur.

Quibus in uentre habentibus circa feptimum aut octauum mensem, derepente mammarũ & uentris plenitudo collabitur, & ubera gracilefcunt, & lac nõ apparet, his dicendum eft, puerum aut mortuum effe, aut uiuere & debilem effe. Si enim in uentre habuerint, & apparuerint menses: aut abortus fiunt, fi plures fuerint & male olentes, aut foetus morbofi fiunt.

Si mulier in uentre habẽs pituitofa fuerit, & caput dolet, et aliàs atq; aliàs febricitat, & in capite obuoluitur pituita. Et grauitatẽ exhibet ac frigus. & in corpus procedit, & in uenas, quũ caput fuerit repletũ. Fit etiam colore plumbo fimilis, & uomit pituitã, lingua alba eft, & urina cõmuniter exalbefcit, frigida eft, turbatio adeft, & æger motus. Vbi uero pepererit, procedet ipfi purgatio pituitofa, & apparebit pelliculofa, & uelut araneorũ cafes in hac diftenti erunt. & patietur quidem eadem omnia etiam ea cui menses pituitofi prodeunt. uerum breuiore tẽpore ægrotabit. & eadem pericula, & figna, & trãfmuationes morbus habebit. Continget enim ipfi uomitũ pituitofum fieri, & affectiones fimiles ue illi accident. Depẽdent enim eodem modo partus purgamẽta, & menses pituitofi, uerum purgamenta partus breuiore tempore quã menses. & niſi eruperit ipfa purgatio quæ diu morã traxit, moritur in quinque & quadraginta diebus, etiam ſi pituitofum partus purgamentũ ipfi prodierit. Curata autẽ mulier, fanata fiet, et inflabitur ab initio ſi fanata fuerit. Grauis enim erit hic morbus. Huic dare oportet pharmacũ quod pituitã ducit. & lac caprinum coctum cum melle mifcere. Si uero sæpe nõ obediat, nafturtiũ, aut cnicum, aut cneorũ, aut polypodũ, aut ferũ, aut medicamentũ ex fale cõpoſitum exhibeto, & quæcũq; pituitã laxant, ac educũt.

Si uero mulier in utero habẽs, lienofa fit à relatis affectionibus, in hoc morbo menses hydropi fimiles & pituitofos demittit. & partus purgamẽta procedẽt hydropi fimilia, et prodibũt modo multa, modo pauca, et fiũt quemadmodũ aqua à carnibus, uelut ſi quis carnes cruentas abluat. Aliquãdo uero paulo craſſiora, et nõ cõgelantur. Et patietur eadẽ omnia etiã ea cui menses aquoſi procedunt, & pericula eadem ac trãfmuationes morbus habebit. Con-

tinget

tinget enim ipsi fluxum aquosum fieri, aut purgationē occultari, & ad uentrem, conuerti, & ad crura, aut ad pectus, aut aliquam harum partium, & pericula erunt eadem quæ prius sunt relata. Si prægnans intumescat, urtica semen plurimum, & mel, & uinum dilutum odoratum potandum dato, bis in die.

Si prægnantem bilis uexet, pisanae succum dato, rhoe rubro in sperfo, aut eo qui ex moris paratur. Sorbeat autem frigidam, & sistetur. Si suffocatio derepente accidat prægnanti. Fit autem hoc maxime ubi mulier laborarit, & cibum fastidierit, uteris à labore calefactis, & pauciore humore foetus accedente, Et quum uterus ac uenter inanior sit quam oportet, procedit foetus ad hepar & præcordia, ut quæ sunt humecta, & suffocationem fortem derepente inducit. Intercepit enim perspirationem circa uentrem, et mulier uoce priuarur, et albas oculorum partes subuertit, et reliqua patitur omnia quæ relata sunt, si mulier non prægnans ab utero suffocetur. Quin et suffocatio fieri incipit mulieri in uentre habenti, quum à capite desinit pituita ad præcordia, utpote corpore respirationem trahere non potente. Et si quidem unâ cum pituita descensu, foetus redierit ad suum locum, uelut qui humorem attraxit, et à pituita delatus sit, mulier sana fit. Stridor autem fit foetu locum suum occupante. Et uenter mulieris ut plurimum humidus fit. Si uero non breui redeat foetus in suum locum, duo iam sunt quæ foetum affligunt, pituita quæ à capite descendit, grauat enim et insistens frigefacit: et loci alienitas, et periclitabitur. Et si non breui quis commo diorem diætam adhibuerit, mulier suffocabitur. Et de his quidem sic habet.

Si uero mulieri in uentre habenti, tempus partus iam affuerit, et dolor partus tenuerit, et ad multum tempus mulier puerum edere non poterit, omnino obliquus aut in pedes procedit. Vtile est autem in caput procedere. Et si obliquus procedat, difficilis fit affectio. Sicut enim si quis in uas olearii angustius oris nucleum immittat, non procliuè est extrahere ipsum obliquatum. Sic sanetiam mulieri grauis affectio est, ubi foetus fuerit obliquatus. Difficile est enim ipsum exire. Graue autem est etiam si in pedes processerit, et sæpe aut matres pereunt, aut pueri, aut ambo. Est autem et hæc magna causa ut non facile exeat, si mortuus, aut syderatus, aut duplicatus fuerit. Quum mulier in uentre habuerit, tota fit cum uirore pallida, quoniã purus ipsius sanguis semper quotidie ex corpore destillat, et in foetum descendit, et augmentum ipsi accedit. Et quum paucior sanguis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam, et semper alienos cibos appetere, et sanguinea in uentrem intrare. Et debilior fit, quoniã sanguis minuitur. Affero porro mulierem ubi pariet, frequentem spiritum emittere. Et si purgatio inceperit, uenter plenus est, et calore pressus. Maxime uero frequenter respirat, ubi partus appropinquat. Et tunc maxime lumbos dolent. Nam et lumbi à foetu colliduntur. Doler autem stomachum siue uentriculi osculum in intermedio tempore aliàs atq; aliàs, utpote dum uenter, maxime uero uterus, circum foetum obuoluitur. Et si puerperæ uterus infletur, ouiculae aut caprae hepar cinere obruito, deinde coquito, et hoc edat, ac uinum meracius uentus, si nihil prohibuerit, bibat ad dies quatuor, si longius aberit à partu. Si uero lumbos doleat, anisum et cuminum Aethiopicum bibat. Et calida lauetur. Si uero anhelatio corripiat, sulphuris magnitudinē fabæ, et cardamomi tantundē, et rutæ ac cumini Aethiopici tantundē. Hæc terito, et uino diluta ieiunium bibenda

*in uentre uero partus
in
in purgatione*

bibenda præbeto. Et à cibis frequenter abſtineat. Si in partu purgatio multa prodierit, uterus contrahitur, & uefica, & inteſtinum, & neq; ſtercus continent, ſed & urinam emittunt. Oua igitur ſorbenda dato, & panem cinericiū edendum, & reliqua quæ ſcripta ſunt. Si uero ea quæ in partu eſt, ſicca fuerit, & difficulter humectetur, oleū bibat, & locos oleo calido cum maluæ aqua irriget. & cerato liquido illinat, & anferinū adipem cum oleo infundat. Si uero parere non poterit, reſinam, aut cuminum, aut pinus corticem ſuffito.

Quicunq; uero tumores uteri in partu, aut ex partu ſunt, eos adſtringere non oportet, uelut medici faciunt: uerum pharmaca optima exhibeto. Cuminum Aethiopicum quantum tribus digitis capi poteſt, & aniſi, & ſeſelis grana quinque aut ſex, pæoniæ radicis aut etiam feminis teſtam conchæ maioris dimidiâ. Hæc in uino albo odorato maxime, ieiunæ exhibeto. Aut dauci Aethiopici radicem, ſeſeli, pæoniæ radicem, eodem modo. Aut hippoſelinî, aut dauci Aethiopici ſemen, eodem modo. Aut crethmî radicem. Aut cuminum Aethiopicum quatuor obolorū Atticorū pondere. Aut piper, aniſum, daucū, pæoniæ Articæ radicē, hæc in uino terito, & bibenda dato. Aut myrtidani ramulos duos aut tres, & cuminū Aethiopicum, & pæoniæ radicē. Aut etiam lini ſemen ſimiliter, quo etiam pueros tuſſientes nutriūt, cum oui aſſati uitello, & cum ſeſamo roſto. Si prægnati pudenda ſuperficiario ac feruido ulcere affecta ſint, amygdalas tritas, & medullam bubulam in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito. & aqua à coctis myrti baccis perluito. Nunc uero di-

cam de puerperij purgamentis, & his quæ poſt partum exeunt. Quæ muſi
 fieri aut partus purgamenta nõ fuerint purgata, aut mēſes non prodierint, aut
 etiam uterus durus fuerit: dolor habet lumbos, & lateris mollitudinē, & ingui-
 na, & femora, & pedes amare dolet, & uēter attollitur, & horrores per corpus
 dii currunt. Ex talibus autem febres ſunt acutæ. Hanc ita habentem, ſi quidem
 ſine febre fuerit, balneis curato. Caput autem oleo anthino inungito. Maluam
 autem coquito, & oleo cyprino in aquam eius inuſo, mitigandi gratia inſidere
 iūbeto. In omnibus autem morbis in quibus fomentum auxiliatur, melius eſt
 poſtea oleo ungi. Si uero febris habeat, à balneis abſtinere. fomentis autē & te-
 pefactorijs inum uentrem & lumbos curare. In potu autē exhibere pharmaca
 uterina, aut ſepiæ ouis, aut caſtorio ammixtis. poſt hoc uero farinam cum ruta
 coctam, aut piſanæ ſuccū ſorbendum dare. Si uero mulieri cum puero in
 partu non prodierit humor uelut oportet, ſed ſiquidem in capite habuerit hu-
 morem à calore attractum, in partu & ante, caput dolebit. Si uero in uentrē
 ceruatim deſcenderit, ubi concitatus fuerit, ipſum turbabit. Et non oportet, lori-
 ge progredi ſinere, ſed auxilium ferre, ut ne ex partu uētris profluuiū ſuccēdes,
 corpore male habente, ipſam dolore affligat. Si uero à capite delatus fluxus, ad
 puerperij purgationē uertatur, & multum concitetur, melius habebit. Si uero
 plus moderato, curam adhibeto. Si uero in uentrem, facilior utiq; exitus pue-
 ro contigerit. Si uero purgatio modica mulieri prodierit, dolor fortis cor-
 ripit lumbos, & omnem circa pudenda locum, & intumescit, & femora ardent.

Et ex ore ac naribus pituita fluit fortiter aquoſa. & dolet caput, & febris ha-
 bet, & horror, & tumor, & dentes ſtridunt, & uenter, & uefica conſtringetur,
 & oculus ſubuerit, & caliginofum uifum habet. Quum mulieri puerperæ

purgæ

Ex uent. loci
 nati in emia

Nota ualde
 curare =

purgatio non facile procedit, uelut uteris inflammatis, & osculo ipsorum con-
 cluso. Obtorquetur enim stomachus uteri post pueri egressum. Si enim quid
 horum fuerit, purgatio non procedet. Si uero non processerit purgatio, contin-
 get ipsam febrile, & horrorem habere, & uentrem magnū esse, & si ipsam attinge-
 ris, totum corpus dolere, maxime si quis uentrem attingat, & alia atq; alia sto-
 machi dolore uexatur, & lumbos dolet, & cibi fastidium, & uigilia, & punctu-
 ra adest. postea quinto aut septimo die quandoq; uenter turbatur, & lecedunt
 nigra, & ualde graeolentia alia atq; alia, et urina uelut almina. Et si secesserint,
 uidetur sibi melius habere, et curata, breui sana fit; sin minus, periclitabitur pro-
 fluuiū uentris fortī ipsi illapso. Et puerperij purgamenta ipsi occultabuntur. Si
 uero uenter ipsi non turbetur, neq; purgatio prodeat sua spē, neq; ea quae cō-
 moda sunt breui exhibeantur, tempus autē progrediatur, multo magis ex pra-
 dictis affligetur. Et in super periclitabitur, ne liuida fiat uelut plumbū, et aquam
 intercutem incidat. et umbilicus extabit ipsi, ab uteris eleuatus. Et circum circa
 nigrior erit. et ubi haec facta fuerint, fieri nō potest ut mulier superstes maneat.
 Pereunt autem aliq; alio tempore, pro corporis et affectionis ratione. Verū unā
 et uicesimam diem non excedunt, id quod plerūq; sic contingit. Si uero pur-
 gatio ipsi eruperit, siue à pharmacis, siue sua sponte: fit enim et hoc si uteri os la-
 xarit, à sanguine acruatim derepēte delato coactū: et si eruperit, graeolentia
 purulenta depurgatur. Quādoq; etiam nigra. et melius habebit, et curata sane-
 sci. Fiunt autem et ulcera in uteris, urpote puerperij purgamentis putrefactis.
 Si uero fiant, maiore cura opus erit, ut ne ipsi ulcera magna et putredinosa fiant:
 periculum est autem ne aut moriatur, aut sterilis fiat. Signa uero haec sunt, si ul-
 cera intus fuerint. Quum purgatio ipsi prodierit, uelut spina per uteros transi-
 re uidetur. et calor ipsam corripit, ac maxime uentrem inuadit. Et si attingatur,
 partem infra umbilicum dolet, uelut si purum neruosum ulcus contingat. Post
 dolores fortes alia atq; alia in uteros incidunt. Et febris aliquando ad contra-
 ctum manus debilis. et alia atq; alia puerperij purgamenta procedunt, mali-
 gna, purulenta, graeolentia. Haec sunt signa, si ulcera in uteris fuerint, et multa
 cura opus habent. Atq; huius quidē morbi tot fines existunt. Si uero purgatio
 puerperij primis tribus aut quatuor diebus processerit, uerum postea derepen-
 te euanescit: eadē affectiones cōsimiles priori patitur, sed minus. et si trāsmu-
 tetur morbus, in idem transmūtabitur. Diuturnus autē et debilior priorē erit.
 Si uero curetur mulier, superstes erit, si cito curetur, et de hoc morbo sic habet.
 Si uero ex partu non fuerit purgata, uenter intumescit, et splen, et crura. Et
 febris habet, et rigor corripit, et dolores profiliunt ad lumbos. Aliquādo etiā
 ad uiscera. Et perfrigeratur, et febris habet. pulsus debiles sunt, et aliquādo ac-
 ti, et alia attolluntur, alia deficiunt. Haec patitur incipiēte morbo, et sic habet.
 Temporis autem progressu, caue faciei partes rubescit. Quum sic habuerit, le-
 ues cibos exhibeto. Et si turgēt, pharmacū infra purgans bibendū dato, si bilio-
 sa fuerit, quod bilem purgat: Si pituitosa, quod pituitam. Postea uero uteros o-
 doratis foueto, et mollitorium in die apponito. Si uero osculum solidū fuerit,
 totū foueto, et mollitoria apponito. Deinde calida aqua lauato, et plumbas
 fistas indito. postea salis grana, et myrrham in lintreum illigato, et picem co-
 ctam annixtis aromatis lana excipito, et singulorum pares portiones ad gal-
 parat

Stans alii dicitur
 in utero puerperij
 uel in utero puerperij
 & sic in fine autem

Haec ex parte
 uel in utero puerperij

una p. 114.

paruae figuram efformato, & per diem ac noctem apponito. Deinde uero inter misis tribus diebus, isdem foueto. Et grana cnicidia decorticata duarum portio- num mensura, & piperis grana trita, oleo Aegyptio albo, & melle optimo am- mixto, in lanam infarcito, & pennae obuoluta, tota die ac nocte apponito. Et si tibi purgata esse uideatur, melius est finire. Si uero purgatione opus habere ui- deatur, duobus diebus interpositis, rursus id quod ex cucumere syluestri para- tur, per diem ac noctem subdito. Deinde Netropon, et oleum rosaceum odoratis- simum, & adipem cerui liquefacito, & die una in lana subdito, & multa calida, quantum eius fieri potest, leniter lauato. Statim autem ubi purgatorijs, & calis- da, fuerint purgata loca affecta, adipe anserino, & myrrha, et resina tepida os u- terorum illinat, & foueat. uteros uero postridie uino et oleo narcisino eluat. Aut si narcisinum non sit, uino solo. Atque haec die uno ante menses faciat. Postquam uero menses prodierint, primis diebus atramentum, hoc est spodium cyprium terat, & salis granum addat, & haec lana excepta paululum in corpore habeat. Et ieiuna uinum meracum odoratum abforbeat. Vbi uero quieuerint menses, per diem id quod ex pulegio paratur apponat, & uinum accedat. Et si in uentre con- ceperit, sana euadit. Cibis autem in purgatione utatur. Ad haec commodat, me- curialem coquere, & porrum, allium, brassicam, & grana mali punici ammisce- re, & succum forbere. Alijs autem obsonijs marinis potius quam carnibus utatur. A dulcibus uero & oleosis prohibeatur. Bibat autem semper ieiuna id quod ex ta- da paratur, donec purgetur. Et mensibus productibus idem ualde bibat. Si uero paulo pauciora quam oportet prodierint mulieri puerperij purgamenta, uelut uteris angusto ore praeditis ac distortis, aut aliqua pudendi pars ualde fuerit co- elusa ab inflammatione: Mulier acurè febricit, & stomachi dolore ueatur, & do- let totum corpus, & moleste fert, & ad articulos manuum ac crurum & lumbo- rum dolor procedit, & locum circa collum, & spinam & inguina dolebit, & quaes- dam corporis partes impotentes fient. Postea calor quietus erit, & horror ualde manifestus. Vomunt autem & pituitosa, amara, acrida. & de hac sic habet, & continget ut si curetur, sana fiat. Sin minus, clauda & quarundam corporis par- tium impotens erit. Non autem ualde sterilis est hic morbus. Si quidem ul- cerati fuerint uteri, & puerperij purgamenta non prodierint, uelut oportet, om- nia dolebit, & si non magna fuerint ulcera, curata breui sanescit. Oportet au- tem curationem ulcerum in uteris exacte facere, ut quae in tenera & subtili sensu praedita sint parte, & in neruosa quietate. Multae autem sunt partes cum quibus societatem habet, sicut puerperij, stomachus. Mens percellitur, & improba fit, & non facile intelligit. Si uero uteri angustis oris ipsi fuerint, & puerperij purgationem non emiserint, inflammantur: & si non curetur breui, omnia magis ipsam affli- gent. Et odor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammati fuerint ute- ri, sua sponte exit malum graue olens, & liquidum, aut nigrum grumulosum. & mulieri puerperij purgamenta purgantur. Quoad hoc uero non exit, sed mulieri mortem portendit, nisi quis breui uenam fecerit, aut uentrem emolliat, praestet autem etiam chy- sterem adhibere. Si uero ad uomitum facilis fuerit, etiam uomitum inducere. Me- lius autem est lotium cire & exudare. Verum in his occasio optima, si quum opus his fuerit. Si uero ex partu purgata mulier fuerit, paulo plura quam oportet. Contingit enim hoc, si uteri amplioris osculi fuerint, & uenae quaedam

Vide de C. 310
Cauder mulier
de uirginitate
cap. 5. apho

Uteri Ulcera

Ex adent. q.
in flammato
Pudo gyno
de S. apho. H. S.
non tam in
Uteri m. S. S.

Nota vide
purgant.

ruptæ sint, quæ sub uteros tendunt, præ uolentia egressus ipsius foetus: febris & rigor habebit ipsam tenuis, & calor per totum corpus. Aliquãdo enim horror, & cibi fastidium, & omnino abominabitur. & tenuis erit ac debilis, & pallida, & tumida, & cibum auersatur. Si uero quid edat aut bibat, non cõcoquitur. Quibusdam uero etiam aluus & uesica erupit, & horror magis obtinet. Et de hac sic habet. Si uero puerperæ aliqua pudendi pars obturata fuerit: lam enim etiam hoc cognoui: si ulceratū fuerit os pudendi, ubi sanè ulceratum fuerit, in partu à pueri exitu uiolatum, simile quid sit ulcero superficiali ac feruenti, & ualde inflammatur. Et labia præ inflammatione inter se coincidunt, & se mutuo contingunt, utpote quæ sunt exulcerata. Sed & frigus fit, & ambo labia clausa sunt, constringentia purgatione relicta. Si uero prodiret purgatio, ulcera nõ concluda essent. Nunc autē influit, & aliena carne crassescunt. Proinde ea sanare oportet, uelut in reliquo corpore, & ad cicatrices perducere. Locus autem leuis & concolor reddatur. Mulier quædam patiebatur eadem quæ patiuntur uteri dum à puerperij purgamentis non purgantur, & ad hæc dolebat pudendum. Et ex contactu cognoui, quod obturata esset, et narrauit, & curata depurgata est, & sana euasit ac fecunda. Si uero curata non fuisset, neq; purgatio ipsi sponte erupisset, ulcus maius fecisset, & malo non remittente, perichitata fuisset ne ulcera cancerosa fierent. Si uero processerit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracem q; ac pulmonem: fit enim & hoc: moriuntur sæpe statim, si detineatur ac firmetur. Si uero probe exeat per os aut nares, sana euadit. Si uero morbus paulo diuturnior fiat, patietur sanè mulier ea quæ dicta sunt de uirgine, cui menses primum cõparentes sursum impetum fecerunt. Verum mulier longiore tempore superstes erit q; uirgo, et affectiones debiliores erunt, donec pulmo purulentus fiat. Si uero puerperij purgatio non exeat per os, sed sursum tamen impetum fecerit, occultabitur, & nõ procedet iusto modo. Et tussis corripiet, & anhelationes. Et impleto pulmone à sanguine, ualde dolebit latus & dorsum. Et quum tussiet, sicce tussiet. Aliquãdo uero spumofum expuet. T emporis autē progressu sputū apparet subnigrum & turbatū. Et calor pectora tenet, magis q; reliquum corpus, nimirū sanguine ipsa calefaciente. Et febrit mulier, & uenter ipsi coarctatur, & cibum fastidit, & uigilabit, & abominabitur. & non superstes manet, sed moritur plerunq; uicesima prima die. Si uero purgatio sursum progressa, per os nõ exeat, neq; in pulmonem uertatur; conuertetur ipsi ad faciem, & erit hæc ualde rubicūda, & caput graue, quod neq; mouere potest absq; doloribus. & oculi ualde rubicundi erunt, & ex ipsis sanguis tenuis fluet. Et quibusdam ex naribus sanguis manat. Et si hic exierit, diuturnior morbus fit. Et aures nõ acute audiunt in hoc morbo. & stomachi dolore uexatur, & eructat, & mente alienatur, & deliria fiunt furiosa. Quibusdam autem adest oculorum distortorum ferocitas. Et reliqua omnia perpetietur, uelut si purgatio ad pulmonem uertatur. Verū non tussiet, neq; expuet eiusmodi, neq; dorsum similiter dolebit. Curata uero sana fit. Non multa uero spes est de uita ipsius. Et si etiam superstes maneat, surditas aut cæcitas omnino ipsi accedet. Atq; hic est huius morbi finis. Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in ventre non maneat, nam passam nigram, & mali punici dulcis grana terito, & uino nigro dilutus uitior, ita ut caseum caprinum derafum, & polentam tritici torrefactā inspergas

spergas, & bene tēperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem uomat, hepatis fistula fauciatā est, & dolor ad uiscera procedit, & cor cōuellitur. Hanc multa calida lauare oportet, & tepefactoria quę maxime admiserit adhibere. & lac asinum ad dies septem uel quinque bibendum dare, postea uero uaccę nigrę lac bibendum præbere, ita ut sine cibo degat, si fieri poterit, ad dies quadraginta. Ad uesperā uero sesamum tritū bibat. Morbus hic est periculosus. Quomodo autem lac fiat, dictū à me est in pueri in partu natiuitate, & alia similiter.

Si lac fuerit extinguit, porrum tritū & aqua dilutum bibendū dato. Et calida lauetur, & in cibo porrū ac brassicam edat. Sed & cythii folia simul coquat, et succum sorbeat. Bibat etiam sceniculi succū, & de radicibus sceniculi. Et ordeū molitum ac butyrum simul coquito, frigefacito, ac bibenda præbeto. Bonū est & hippomarathrū, & hipposelinū, & cythius. Hęc omnia simul multum lac faciunt & augent. Caprę item Scyrię, casei autē maxime cōmodi sunt. Sed & sal uiam coquat. Aut à iuniperi baccis, aut cedri fructu, succum diffundat, & uino affuso bibat. & reliqua oleo affuso edat. & ab acribus, & falsis, & acidis, & crudis cleribus omnibus prohibeatur. Nafurtiū uero in uino potum cōmodum est. Nam lac purgat, & calida lauetur, & sub calidā bibat. Viticis item fructum in uino bibendū dato. & betę succus potatus multū lac facit. Sesamum quoque recens, & ordeū trimestre, in mortariū coniecta terito, & succū per linteū exprimito, & mel aut amamelidas ammisceto, deinde in uino nigro bibenda dato.

Quū mulier peperit, & à secunda non fuerit liberata, præstat dare ea à quibus maxime purgantur puerperij purgamenta: allia cocta aut allata in uino & oleo, cum polypis ac sepiolis super prunis tostis, quicquid tandē ex his uoluerit. Castorium uero aut nardum bibat. Bibat etiam rutam in uino nigro dulci et iuna, aut sine uino. Si uero uinum nō fuerit dulce, melius est mel ammiscere. Edat etiam brassicam coctam cū ruta & mercuriali. & semē aliquod utero cōmodum bibat. Si uero puerperij purgamenta in grumos fuerint coacta, & dolor in imo uentre fiat, porrū coctum, & quęcumque syluestria ac hortensia olera dato, uerum omnia pinguia facito: & per tertium quęcumque diem sub clemētī celo lauetur. Frigus enim his inimicū est. Et post balneū inungere melius est, & non multa calida uti. Quum secunda non statim exierit post partū, imi uentris dolores fiunt, in laterū mollitudine, & rigores ac febres. Et si discesserit secunda, sanatur etiam mulier. Sæpe uero putrescit, & discedit sexta aut septima die, aut etiam prius. Huic autē dare oportet pharmaca quę ego describam, & spiritum cōtinere iubere. Omnium uero optimū noui artemisiam herbam, & dictamnum, & uiolę albę florem. Et silphij succus optimus est fabę gręcę magnitudine in aqua potus. Et si secūdas excludere nō poterit, à cibo abstineat. Et postea uiticis folia trita in uino & melle, oleo affuso tepefacito, & heminx mēsuram bibendam dato, & exhibunt. Si mulieri secūda in uteris relicta fuerit, hoc sic cōtingit. Si per uim ruptus fuerit umbilicus, aut ab obstetrice umbilico seca per imperitiā resectus, quę uidelicet umbilicum pueri prius incidit, antequā secunda ex uteris exisset, & uteri sursum retrahunt secundam, utpote lubricam & diffusam, & in seipsis detinent. Nam secūda ex umbilico pueri hæret. & umbilicus postremus ex uteris exit. Si enim prior exiret, non accederet per ipsum puero nutrimentum, quoniam ex ipso dependet. Quum in uentre habens

fectum corruerit menstruum, aut bimestrem, & secundæ exire non poterint, fuerit autem tenuis: huius corpus tunc purgare oportet ac pinguefacere. Non enim prius exeūt fetus putrefacti, nisi fortes fuerint uteri, & probe compacti.

Si mulieri secūda relicta fuerit, si non ampli fuerint uteri, purgatio ipsa minus quæ oportet procedit, & uenter durus fit ac magnus. Et frigus detinet, & febris acuta. & dolor per totum corpus, & uentris maxime partē eam quæ est infra umbilicum. & grauitas fit in uteris, & tormē, uelut fetus in sit. Et curata secundam breui eijcit putrefactam, & sana euadit. Si ex partu uterus ulceratus fuerit, rosarum floribus curato. Sed & acerbis infusus colluatur. Si uero os eius ulceratum fuerit ac inflammatum, myrrham, & adipem anferinum, & ceram albā, & thus, pilis leporinis sub uentre enatis misceto, & simul trita in lana apponito.

Si ex partu uteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest. Ex uentre uero nunquam deficit calor, & fit, & coxas dolet, & uenter imus fortiter intumescit, & alius turbatur. Seccessus autē est malus & olidus, & calor uehemens corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta sinciput est, & uentris stomachus non potest trahere cibos ac potus, & cōcoquere nequit, & nisi curentur statim, plurimæ moriuntur. Venter autē est in causa. Sambuci igitur folia tenerrima, in crassiore tritici recētis farina cocta, leuiter tepida forbeat. Dato & aquā mulsam, & uinum aquosum. Et pectinem cataplasmatis frigefactorijs integito. Cibum autē quæ minimum edat, & uenter sistatur, & caput curetur. præcordijs uero & uterorum loco, cataplasmata adhibeto. Quum dos uerit sedem, aut aliud quid, iuniperi baccas, aut apij & urticæ semē terito, ac bibendum dato. Si ex partu doleat, resinam terebinthinam, & mel, & uinum tepidum, forbēda dato. Et si inflammati fuerint uteri, inde sedantur. Si uero nō doleat uterorum locū, amygdalas amaras tritas, & oleæ folia tenera, & anisum, & irionem, & organum, & nitru. Hæc misceto, terito, & uterorum collyria formato. Si uero inflammati fuerint, & dolor habuerit, rosarum folia, cinamomum, & calsiā, simul terito, & netopo affuso, placentulas ac pastillos drachmales formato, eas quæ in ollam nouā fictilem igne candētem mittito, circūlocataque muliere ac uestibus cōtrecta, in uteros suffito. Hoc dolores sedat.

Si uero ex partu uteri doluerint, calor debilis habet. uerum uenter imus intus igne ardet, & ad coxendicem aliquando intumescit. & dolor habet imum uentrem, & laterum mollitudinem. Et seccessus biliosi sunt & graueolentes, & si nō sistatur uenter, derepente moritur. Quum igitur sic habuerint, uentrem frigefacere oportet, cauendo ne horrefcat. Bibar autem si non sistatur, aquam de crassiore tritici farina in ipsa macerata, & panis farinam edat. Sorbeat autē mali punici uinosi succum aqua dilutum, farina lentium inpersa. Et hoc coquito, misce lentem, & cuminum, & salem, & oleum, & acetum, atque hanc forbitionem frigidam exhibeto. Lenticulam item acidam dato, et uinū uinosum pramnium in super forbendum. Ab alijs autē cibis abstinere oportet donec febris soluatur. Si uero uisum fuerit, etiam lauetur. Si uero debilis fuerit, polentam bibendam dato. Et si imbecillior sit, ex aqua frigida. Cibum autem exhibeto leuem, qui non euacuet, ubi calor remiserit. Morbus hic acutus est & lethalis. Si inflammati fuerint puerperæ uteri, uenter ardet, & magnus sit, & ad præcordia suffocatio habet. Quum sic habuerit, mulsam marinā quem super pilces inijciunt, pro cataplasma

mate

*Ex furore uentris
uenter moritur*

Uenter debilis

in abet

mate adhibeto. Verum in mortario misceto ac rundo, crudam ordeaceam farinam, & cinerem fermentitium, & lini semen tostum, & hæc oleo & aceto subigito, & uelut cyceonem crassum facito, deinde coquito donec uelut farinæ subactæ massa fiat, atq; ita q̄ calidissima imponito, & si opus fuerit, etiam insidere facito. Si puerperæ inflammati fuerint uteri, intumescunt, & ubi puerperæ purgamenta intus manserint, occulte distenduntur, distenduntur autem ubi condensati fuerint à frigore. His si quidē perfrigeretur, calefacere cōducit. Si uero inflammati fuerint, & frigus discesserit, medicamentum subdititium facere, quod inflammationi aduersatur, & simul lauare, ac fouere, & pharmaca adhibere, quæ ego describam, & uaporem in os ac nares attrahere. Si uero suffocent, lentes in aceto, & sale, & origano multo coquere, & attractionē facere. Et mercurialem edat, & in succo eius tenuem farinā forbeat. & quàm celerrime ac prius quàm dolor corripiat, pharmaca dato quæ uterorū dolores sedant, & cibos per alium secedentes assumat, & si uenter sit inflammatus, dysterē adhibito q̄ citissime subluatur. Si uteri pituita fuerint impleti, flatūs in uteris fiunt, & menses procedunt pauciores, albi, pituitosi. Quādoq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, & ter in mense comparere, & præ humiditate cum uiro commisceri non uult, neq; libidine ad hoc faciendum concitatur, & tenuis fit. Dolet autem imum uētre, & lumbos & inguina, & si mordeat id quod effluit, & exulceret osculi uteri circumferentiā summam, fluxionem diuturnam fore pronūciato. Et si non multa fuerit fluxio, lenticalæ decoctum cum ueratro exhibeto ad uouendū. Deinde in nares infundito, & pharmacum deorsum purgans bibendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si uero grauetur, & frigeat, & torpedo habeat, lac præbeto, & uisnum odoratum. Bibat autem ieiuna hypericū, apij semen, saluiam, in uino odorato aquoso, & uteros medicamēto ex uini fece colluat, & si ulcerati fuerint, interpositis diebus duobus aut tribus, pharmaco ex grano cnidio eluat, et postea cum acerbis lauet, myrri ac lauri decocto, & medicamento ex flore argenti illinat. Morbus autē est grauis & pauca effugiunt. Si uero acetabula pituita plena fuerint, menses fiunt pauciores, & si in uētre habuerit, corrumpit ubi foetus fortior factus fuerit. Non enim corroboratur, sed defluit. Cognoueris autem hinc. Humida fit, & quod defluit mucosum & uiscosum uelut à uētre defertur, & non mordet, & in mensibus postquā sanguine purgari desierit, per duos aut tres dies, mucī ex uteris prodeit, & horror tenet, & calor non acutus, uerū non deficit. Hanc succo grossorum colluito, à quibus omnis aqua purgatur, & hoc iterum atq; iterum. Postquam autem purgata fuerit, de cætero acerbis utatur. Apponat autē mollia, à quibus pituita purgatur, & foueat uteros medicamēto ex lauro, & colluat pharmaco ex aceto, & aromatis suffitiū faciat, postquam menses cessarint, postea uero à cibis & balneis abstinere oportet. Coeat autem cum uiro, & cibos ac uinum parce sumat, & calide degat, & tegumēta cruribus circumdet, & oleo illinat. Si aqua intercus in uteris nascatur, menses pauciores & prauī fiunt, & ante tēpus deficiunt, & imus uenter intumescit, et mammae solidae, molles fiunt, & lac malum. Et putat se in uentre habere, & ex his cognosces quod aqua intercus est. Sed & in uterorum osculo significationem de se præbet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet, & rigor ac febris corripit

ripit. Quanto uero magis tempus processerit, tanto magis dolor habet in uentre, & lumbos, & laterum mollitudinē, ac inguina. Hic morbus ex abortu fit. Sed & ex alijs causis, & quum menses fuerint occultati. Hanc multa calida lauare oportet, et tepefactoria adhibere si dolor habuerit. Postquam autem se datus fuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet, & uteros medicamento ex bubulo stercore fouere. Deinde id quod ex cantharide paratur apponere, & biduum aut triduum intermittere. Et si robur affuerit, netopo colluere. & si uenter mollis fiat, & febres cessent, & menses secundū rationē procedant cum uiro dormiat, & in medicamentis subdititijs perseueret. & interposita die crethmi corticem bibat, & pæoniæ grana nigra quinque, & sambuci fructum in uino ieiuna. Et mercurialem quæ plurimam edat, & allium crudum ac coctum. & mollibus ad somnū utatur, & multa portione, & alijs mollibus. & obsonijs marinis potius quæ carnibus. & si pepererit, sana euadit. Si hydrops in uteris fiat, menses pauciores fiunt ac deteriores, & per longius tempus, & pauciores quæ oportet, aut paulo plures. & uenter intumescit, & locus supra pectinē, & tibiæ, & lumbi. Vbi uero multum temporis processerit, & in uentre habuerit, corruptus ac eijcit. & aqua cum ipso foetu effunditur. & mulier plerumque moritur. Sanguis autem corrumpitur, & aquosus redditur. Huic lac bibendum dato, & perispermum album potandum, donec foetus moueri poterit. Quin & ante hoc ut plurimum foetus corrumpitur, & per abortū eijcitur. & uteri sanguine & aqua manant. Hæc autem patitur nihilo magis ex labore, quæ aliter. Cognoscere uero poteris quod hydrops est, ex digiti contactu. Deprehendes enim osculū ipsorum gracile & plenum humiditate. Si uero foetus in ipsa non circa initia, sed iam bis mensis corrumpitur ac suffocatur, tunc & uenter imus intumescit, & ad contactum dolet, uelut ulcere præsentē. & febris magna ipsam ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus & uehemens pudenda, & in uentre, & lumbos, & laterum mollitudinē, & coxas. Quū sic habuerit, calida ipsam lauato, & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto, experimento facto de eo quod maxime admittat. & pharmacū deorsum purgans bibendū dato. Intermissione uero facta per tempus quantum tibi satis esse uidebitur, & colluito, & foueto, & cyclaminū mel se subactum, ac linteo exceptum, ad os uterorū apponito. Et cupressi ramēta in aqua madefacta, eodē modo apponito. Verū hæc breuiore tempore, & per longius tēporis interuallum, quāto magis mordent & lancinant. Et specillum stanneum paratū immittito, et digitū eodem modo. Portiones quoque bibēdas dato, quascumque maxime libenter admiserit. & cū uiro dormiat, maxime opportuno tēpore præsentē. Si enim geniturā conceperit, & prægnās facta fuerit, ac pepererit, subpurgatur, & ea que prius in ipsa fuerūt, unā cum ipsis puerperij purgamentis subeūtia. Atque sic maxime sana fieri poterit. Si mulier aqua in utero laborarit, splene ipsius magno & aquoso existente. Fit autē splen aquosus ab hac affectione, quū febris habuerit, & nō dimiserit hominē, & sitis ipsum corripuerit foris, & biberit, ac non reuouerit. Nam quod in uescicam penetrat, per urinam eijcitur. Reliquū uero splen capit, abstrahēs à uentre ad seipsum, ut qui rarus est & spongiformis, & secundum uentrē situs. Et si his sic habētibus non exudarit, neque alius laxetur, ab hoc splen attollitur, & hoc magis si aqua fuerit potus. & si quis ipsa contingat, mollis est uelut mollissima pluma siue lana: quam

quandoque uero etiam renititur. Eleuatus autē & impletus, distribuit per uenas corpori, & maxime in omentū, & locos circa uentrē, et crura. Altera enim pars ad alteram delegat in corpore, ubi singulis plus quā oportet affuerit, & cōtinere non poterint. Succedit autem ex hoc semper hydrops, ubi splen ad seipsum trahere cōsueuerit, quū natura rarus sit ac mollis. Quibusdā uero hoc morbi principium fit sine febre, si calor quidam in uentre constitit, uelut pituita in ipsum collapsa. & si homo sitim non continuerit, neque uesica, neque uenter, urinā & stercus iusto modo excolarint: neque cōmoda diæta homo utatur. Si uero hydropica fuerit, prodeunt menses multi derepente, quādoque uero pauci. Et fiunt aliquādo uelut aqua à carnibus, sicut si quis cruentas carnes abluisset: aliquando uero paulo spūsiore, & non cōgelantur. & anhelatio ipsam corripit priusquā menses prodeunt, & dolor in splene, & magis si quid dulce ederit, & uenter attollitur ac magnus fit. Et ubi plura quā solita est ederit, dolet uētre, & lumbos aliās atque aliās dolor uexat. & febris ipsam paulatim corripit. postquā autē depurgata fuerit, melius sibi habere uidetur superiorū respectu. postea ad idem relabitur. & si curetur uelut conuenit, sana euadet. Sin minus, & fluxus comparet, & per omne tempus semper fluet paulatim uelut serosa sanies, & ampliore curatione opus habet. Si uero fluxus non succedat, sed uteri à prioribus menses non laxarint: tunc & uenter ipsi magnus erit, & grauitas intus erit, uelut in uentre habenti, et uelut puer in uentre ipsius moueri uidebitur, nimirum dum uteri aqua pleni sunt, & aqua mouetur. Aliās enim atque aliās fluctuat in ipsis aqua, uelut in utre. & pars infra umbilicum ad contactum dolet. & clauiculae, & thorax, & facies, & oculi attenuantur. & mammae attolluntur. Quibusdam uero & uenter, & crura aqua implentur. Quibusdam autē alterum horum. & si quidem ambo impleta fuerint, nulla spes est de hominis uita. Si uero etiam alterum horum, modica spes est si curetur, & non ualde fuerit attenuata. Diuturnus est autem hic morbus. Et fiunt omnia magis his quae non pepererunt, fiunt autem saepe etiam his qui pepererunt. Periculosa uero sunt uelut dictū est, & plerūque acuta & magna, & intellectu difficilia, eo quod mulieres participant morbis, & aliquando neque ipsae sciunt quod aegrotant, priusquam morbos experiantur à mensibus, & seniores factae fuerint. Tunc autem & necessitas, & tempus, ipsas morborum causam docet. & quandoque non cognoscentibus ex quo morbo aegrotent, morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur recte mens dicus ab aegrotante ex quo morbo aegrotet. Veretur enim narrare, etiamsi sciant: & praeter imperitia ac ignorantia, turpe sibi id esse putant. Sed & medici sumul peccant non exacte causam morbi percunctantes, sed uelut uiriles morbos sanantes. et multas noui iam ab huiusmodi affectionibus corruptas. Quare statim causam exacte interrogare oportet. Multum enim differt muliebrium morborum ac uirilium curatio. Si uteri fuerint ulcerati, sanguis & pus purgatur, & fector grauis oboritur. & dolor acutus corripit lumbos, & inguina, & inum uētre, & dolor sursum procedit ad laterum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas. Aliquando etiam ad clauiculas peruenit. & mordetur, & caput uehementer dolet, & delirat. Progressu uero temporis tota intumescit. & debilitas ipsam corripit, & animi deliquium, & febris tenuis, & perfrigeratio. Intumescunt autem maxime crura. Morbus autem corripit ex abortu,

si qua corrupto ac putrefacto intus puero, nō fuerit expurgata. & calor totum corpus tenet. Corripit etiā ex fluxibus, & si in ipsis acria fuerint, & biliosa mordeant. Si in hoc modo habentē incideris, ubi quidem dolores habuerint, multa calida lauato. & tepefactoria adhibeto qua parte fuerit dolor. & si quidem superne fuerint dolores, & mulier fortis est, totam fomentato. & pharmacū deorsum purgans bibendum dato. & ubi tempus anni fuerit, serum coctum insuper bibendum præbeto, per dies quinque, si id facere poterit. Si uero non fuerit serū, lac asinum coquito, & per dies tres aut quatuor bibendū dato. Post lactis autem potum, cum aquis ipsam reficito, & cum cibis commodis, carnibus ouillis teneris recentibus, & uolucrum: & beta, et cucurbita. Abstineat autem à falsis & acribus, et marinis omnibus. Et à carnibus porcinis, & bubulis, ac caprinis. Edat autem panes. Si uero animi deliquia teneant, & non ualida sit, & perfrige retur, forbitionem accipiat. Sunt autē quidam qui his caput dolentibus lac bibendum præbent, quia caput dolent. Alij aquam, quia animo linquantur. Ego uero uice uersa, si caput dolent, & mente percellantur, aquam comodam puto. Quum autē mordentur, & acria sunt quæ pungunt, lac his lenitatem inducit. Vbi uero tibi ualida esse uidebitur, uteros colluito. primū medicamēto ex uini fece, postea interpositis diebus tribus aut quatuor, eo quod cum brasiacæ decocto tepido paratur. Et rursus intermissis diebus tribus eo quod cū butyro paratur eluito. Et si ubi hæc feceris sanescant uteri, eo quod cum malicorio paratur colluito. Super ulcera uero argenti florem, & gallam, & myrrham, & thus, & spinæ Aegyptiæ fructum, & cenanthen syluestrem, & chrysolollam, & squamam aris, & lotiamenta, & crocum, & alumen Aegyptium combustum illinito. Horum singulorum una æqualis sit portio. Alumen uero & gallam, & crocum, una omnium portione sumito. Hæc omnia trita ac permixta in uino albo dulci diluito, deinde coquito donec mellis crassitudo fiat, et dato ut cū hoc pharmacō bis in die ulcera inungat, ubi aqua tepida prius lauit. Coquatur autem in aqua, & hedera, & salua. Et ubi tibi hæc faciēti melius habere uisa fuerit, lac caprinum coctum præbibendū una die dato. Postea uero lac bubulū præbeto eodem modo uelut in prioribus. post lactis aut potum, per cibos quæ maxime crassa fecerit, & ut in uentre habeat facito. Sana enim fiet. Plerūque uero ex hoc morbo euadunt, & steriles sunt. Senioribus aut non ualde quid horū accidit, postea uero bibenda sunt pharmaca, lini semen torrefactū, & sesamum, et urticæ semen, & pæonia radix amara, hæc in uino nigro odorato trita bibat. Si uteri ulcerati fuerint, & sanguis, & pus, & serosa sanies fluit, putrescentibus enim uteris, morbus ab ipsis sit, & uenter imus eleuatur, & attenuatur, & ad contactum dolo, uelut ulcere præsentē. Et febris ac fremitus ipsam occupat, & dolor acutus ac uehemens inuadit pendenda, & pubem, & imum uentrem, & lateris mollitudinem, & lumbos. Morbus autem maxime corripit ex partu, si quid in ipsis diuisum cōputruerit. Itæque ex abortu, & aliās sua spōte. In has si incidēris, aqua multa calida lauato, et qua parte dolor habuerit, tepefactoria adhibeto & spongiam ex aqua calida expressam. & colluito acribus & acerbis uitatis, molliorib, uero ammixtis, prout tibi tempestiuū esse uidebitur. & lini semen ac fambuci fructū tūdito, et ammixto melle pharmacū facito, atque hoc uitor, calida uero aqua lauato. Et acceptā spongiam, aut mollē lanam, in aqua calida tingito, & pudenda

rosken

gona

labruy

pudenda ac ulcera expurgato. Deinde in uino meraco, rursus spongiam aut lannam tingens, eodem modo utere. Et postea pharmaco hoc inunge, quoties tibi tempestiuum esse uisum fuerit. Postea resina & adipe suillo mixtis simul illinito saepe interdiu ac noctu. postea uero lini semen torreto, tūdito, ac cribrato: & peplum album in polenta tūdito ac cribrato: & caseum caprinum assato, & fordes ac saluginem deradito, & pinguitudinem eius, & polentæ pollinem ammisceto. Sit autem una pharmaci mensura, & casei, & polentæ. Hæc bibenda dato mane ieiunæ, in uino austero diluto. Ad uesperam autem misceto, & crassum cyceonem præbeto, & quicquid muliercula maxime libenter admiserit, bibendum dato. Et donec quidem sanguis multus fluxerit, & dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint, hæc facito. Postquã autem ulcus minus fuerit, & dolores debiles apprehenderit, & per longius tempus, pharmaca bibenda dato à quibus purgetur deorsum magis quàm sursum, & intermisso tempore quantum opportunum esse uisum fuerit, lenibus fomentis foueto, muliere in alio collocata, prout tempestiuum esse uidebitur. Hæc si fecerit, sana euadet. Moribus autem est lenior & lethalis. & pauca ipsam effugiunt. Si uero uehementer exulcerati fuerint, sanguis & pus purgatur, & odor fit grauis. Et quã dolor apprehenderit, uelut à partus dolore fiunt ea quæ circa fluxum contingere solent. Et quum tempus affuerit, crura & pedes intumescunt. Et curant medici hunc morbum uelut hydropem, uerum hic talis non est. Hanc si curandam acceperis, primum calida lauato, & calefacito. Et acribus ac mollibus et acerbis, & aqua & uino colluito. Et polycarpon, & polycnemom, ac mel simul coquito, deinde lanam in his tingito, & pudenda illinito. Et resinam, ac mel, & pinguedinem suillam illinito. Et bibendum dato semen lini ac sesamum torrefactum, & buryrum, & caseum caprinum, & polentam in omnibus. Bibat autem in uino ieiuna. Ad uesperam uero plurimum mellis affundito. Et donec quidem sanguis purgetur, & dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint, hoc facito. Quum autem ipsi minus prodierit, & dolores debiliores per longius tempus tenuerint, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, ac finito. Hæc si fecerit, sana euadet. Sobolis autem spes non adest. Quæcunq; ulcerationes in uteris fiunt, ex abortu, aut alia quadam causa, eas omnes respectu ad totum corpus factu curare oportet, quacumq; curatione opus habere uisa fuerint, siue ex uniuerso corpore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis uteris. Cognosces autem ab ipsis uteris sint, hoc modo. Quæ enim ulcerationes ab ipsis uteris sunt, purgationem exhibent purulentam & compactam: quæ uero non ab ipsis, tenuem & saniosam. Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharmaco eas curare oportet, & dare quod & sursum, & deorsum purget. Primum autem sursum. Et si quidem post pharmaci potionem, fluxiones pauciores fiunt ac faciliores, intermissione facta rursus eodem modo medicari oportet. Post pharmaci uero potionem, talem uictum præscribito, ex quo homo ipsa quam siccissima fiat. Id autem continget, si toti ipsius corpori, per tertiam aut quartam diem, fomentum adhibueris, & à fomentis statim uomitus feceris. post uomitus autem & fomenta, dietam constituito ex illuue, & aquæ potu, & panis cibo, nullo uero obsonio, quam uino nigro meraco. Nullo item olere. Quum uero uomitus præparas, multis & acribus oleribus opus habes, quibus ipsam impleas, multis

balsam

*Uterus sine fluxione
hæc inter, & qd
libet.*

mens & tempus

tis etiam cibus, et obsonio quodcumque uoluerit. Et ut impleas ipsam multo uino aquoso, & ut à fomentis ipsam laues multa calida. Atque hæc quidem curatio est huiusmodi fluxionum. Melius tamen est ut utrasque pharmacis cures, & uomitum procures, & sursum trahas. Diæta uero siccatoria melior est, & illuuiis. Ceterum uteros hoc modo curare oportet. primum quidem fouere sambuci folijs in aqua coctis. Deinde post fomentum, smegmate ex uini fece colluere. Et si quidem putredo in ulceribus fuerit, & quæ exeunt graueolentia, smegmate meroiore. Si uero nihil tale, aquosiore. post fecem autem, cum aqua in qua cocta est myrtus & salua. Postea uero cum uino colluere, meraco, albo, tepido. Quum autem mordetur iam à collutionibus, tunc iam pura sunt ulcera. colluere igitur oportet fece aquosiore, & uino nigro. post uinum uero, adipem suillum recetem liquato, & pinguedinem anseris si affuerit, sin minus, aliam, maxime gallinaceam, aut ex uolucrum gente. Si uero neque hæc adsit, oleum uetus ex oliuis ammisce to, atque hoc tepido colluito post uinum, per alium clysterem in os uteri infuso. Et si fuerit ulceratum, linamenta ex mollitorijs facta apponito. Et si hæc subdita ardorem induxerint, his ademptis mulierem aqua tepida lauare iubeto, tali quali colluebatur. Si uero ad hanc diætam fluxiones non discedant, pauciores tamen fiant, & uehementer mordeant, & ea quæ effluunt bilis fuerint ac salugo: & non solum internas partes, sed etiam externas exulcerent, diætam transmutare oportet, & totam humectare, quo fluxiones que aquosissimæ fiant, & minime mordaces, balneis multis calidis, maza, oleribus coctis omnibus pinguibus, piscibus cartilagineis, cum cepis & coriandro, in muria dulci coctis: coquantur autem pingui modo: carnibus coctis omnibus, excepta bubula & caprina: His enim per coctis cum anetho & feniculo: uino mellei coloris, fuluo, aquoso, uberiore lactis potu cum uino dulci. Reliqua uero de collutionibus iuxta relatam modum facta. Atque hæc quidem est eiusmodi fluxionum curatio. Quum uero purulenta & compacta exierint, harum quidem totum corpus non mouere oportet. Verum colluere, & per collutiones totam curationem facere. Colluere autem oportet cum ipsidem infusis, quæ prius dicta sunt eodem modo. Cōscribentur tamen etiam alia collutiones. Ulcera curatio. Ceruinum adipem recetem ac uiridem subdito. Omnia uero statim uino siccato siue sapa colluere oportet. Optimum autem est cerusæ, si ulcera fuerint, & oleo narcisino. Cibis autem mollissimis utatur, & non acris. Si uero sordida fuerint, & proserpant, ac proximum locum mordeant, purgato, & nouam carnem producto, & carnem ad cicatricem perducto, facile enim resoluuntur, & maligna sunt. et frequenter lauato. Si uero mulier ex abortu uulnus accipiat, aut ex medicamentis subditioribus uteros exulceretur: Qualia multa semper mulieres faciunt ac medicando excitat, & foetus corruptus fuerit, et mulier non purgetur, sed uteri inflammati fuerint uehementer ac conclusi, et purgatio nem emittere non poterint, nisi primum emittat sanguinem qui est in foetu. hæc si quidem curetur, breui sana euadet, uerum sterilis. Si uero puerperij purgamenta ipsi sua sponte eruperint, et ulcera sanata fuerint, etiam sic sterilis erit. Si uero purgatio quidem ipsi fiat, ulcera autem non purgantur, periculum est ea putredinosa esse. Si uero purgatio prodierit ipsi iam afflictæ ac extenuatæ, moritur. Quin et si in partu uteri ualde fuerint exulcerati, foetu non secundum naturam exeunte, eadem patientur quæ patitur ea quæ ex corruptione foetus uteros ulceratos habet

1 p
autum

Salsi Ven.

habet. Et transmutationes ac fines eorūdem morbus habet, siue ex foetus corruptione, siue ex partu uteri fuerint ulcerati, et si puerperij purgamenta omnia prodierint, minus dolebit, nisi magna ulcera fuerint. Et si curetur, breui sanescit. Oportet autē curam cito adhibere, si ulcera in utero fuerint. Nam ut quæ in terno loco sunt, cito augetur, & breui putrescunt. Curare uero oportet ulcera, uelut etiam ea quæ in reliquo corpore sunt, Nimirum ut inflammationem arceas, & repurges, & repleas, & ad cicatricem perducas. Danda est autē aqua in potum, uinū minime, cibos item paucos, ac minime multos exhibeto. Quicunq; abortus facti discedere non possunt, dum aut toti, aut partes foetū sunt maiores, aut minores & obliqui ac impotentes, tales siquidem secundum naturam siti fuerint, pharmaco aliquo dato ex his quæ ego referā expellito, ubi multa calida praelaueris. Et si prodire uolentes, non facile exeant, quū siti sint secundum naturam, talibus sternutatorium admoueto. Apprehendito autē nasum, & os comprimito, ac sic sternutet, quo sternutatio quæ maxime efficax sit. Utatur item concussionibus. Sic autem concussione facito. Lectum altum robustum ac infratū sumito, & mulierem supinā reclinato, pectus uero & axillas ac manus, fascia aut molli lato loro ad lectū alligato ac cingito, & crura incuruato, & malis leolis apprehensam detineto. Quum autem sic disposueris, sarmentorum mollium fascem, aut aliquid huic simile parato, tantum quantum sufficit, ut lectum non negligat excipiendo ipsum, dum in terram projicitur, quo non pedibus iuxta caput, terram contingat. Postea uero ipsam manibus lectum apprehendere iubeto, & lectum ad caput sublimem habere, ut decliuis sit in pedes, animaduersione habita ne pronua sit homo ipsa, ubi uero hæc facta fuerint, & lectus sublimis fuerit, retro sarmentum supponito, maxime autem dirigito, quo pedes terram non contingant dum lectus projicitur, & ut sint intra sarmenta. Eleuent autem duo uiri ex utroque pede hinc atque illinc, quo in directum lectus cadat, planè ac æqualiter, & conuulsio ne fiat. Concutiendum est autem maxime unā cum partus dolore. Et si quidem discedant, statim quietendum. Sin minus, interstitio facto rursus concutito, & in lecto gestatam attollito, ac agitato. Atque hæc quidem sic faciendū sunt, ubi rectè & secundum naturam discedāt. Oportet autem cerato liquido præillinare, quod in omnibus huiusmodi circa uterum affectionibus optimum est: & maluæ aquam affundere, & foenigræci, aut potius pitæ næ triticæ succum. Oportet autem usque ad inguina, sedem & pudendum fovere, & insidere, ubi partus dolores maxime infestant, & nihil aliud mente uersare, eā uero quæ medicatur, oscula mollibus aperire oportet, & leniter hoc facere. Umbilicum uero unā cum foetu attrahere. Quicunq; uero duplicati complicantur, & in osculo uterorum incumbunt, eos siue uiui fuerint, siue mortui, rursus retro protrusos uertere oportet, quo secundū naturam in caput exeant. Quum autē retrudere uoles aut uertere, supinæ ipsi reclinatæ mollè quiddam sub coxas substernere oportet, & sub lecti pedes, quo altiores sint hiæ pedibus, semper aliquid supponere. Sed & coxæ altiores capite sint, & ut nullum ceruicā sub capite sit prouideto. Quum uero retrusus fuerit foetus, & hinc atque illinc obuoluitur, ut secundum naturam constituatur, & quicquid sub lecti pedes supposuisti ac lapides, & quicquid sub coxas subdidisti, subtrahito. Capiti uero puluinar subijcito. Atque talia hoc modo curato. Quicunq;

uero

uero foetus uiui, manum aut crus foras præmittunt, aut etiam ambo: eas oportet quàm celerrime ubi exitum significarint, prædicto modo intro retrudere, & in caput uertere, & ad uiam reducere. Et quicumq; foetus complicantur, ad lateris mollitudinem, aut coxam in partu collapsi, eos dirigere ac uertere oportet. & in aquam calidam desidere facere, donec mulier resocilletur. Quicumq; uero foetus mortui, aut crus, aut manum, foras protendunt, eos optimū quidem fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas has partes in caput uertere. Si uero hoc fieri non poterit, uerum intumesceat, secare hoc modo. Diffectum per scapellum caput, cum contusorio instrumento, ut ne in ramenta findatur contundito, & ossa per ossium uollem, aut tractorium instrumentum, iuxta clauiculam immissum, prout habuerit extrahito, nō multis simul, sed paulatim exemptis, ac rursus ablati. Quum uero hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris fueris, ambas manus in articulis cum ipsis humeris secato. Et ubi hæc extraxeris, si quidem fieri poterit ut excant, etiam reliqua facile extrahito. Si uero non obediunt, totum pectus usq; ad iugulum findito. Verum caueto ne in uentrem feces, & aliquid de intestino denudes. Exit enim uenter, & intestina, & stercus. Si uero horum quid excidat, maioris negotij iam res fit. Contundito autem costas, & scapulas contrahito. Et facile postea reliquum foetus procedet, nisi iam uentrem tumidum habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est uentrem foetus leniter perforare. Flatus enim solum à uentre exit, & sic facile prodibit. Si uero exciderit manus, aut crus, immortui foetus, si quidem fieri poterit, ambas partes retrudito, & foetum rite dirigit. Hoc enim optimum fuerit. Si uero fieri nō poterit ut hoc facias, quicquid sanè foris fuerit quantum potes penitissimè ressecato. & reliquū profunditate intus explorata protrudito, & foetum in caput uertito. Quū autem uertere ac secare puerum uoles, ungues de manibus tuis ressecato. Scapellum uero quo diffecas, incuruū potius sit q̄ rectum, & huius caput occultato per indicem digitū, eodēq; interna explorato ac deducto, ita ut caueas ne uterum contingas. Ceterū molæ conceptus hæc causa est. Quū multi menses, modicum & morbosum semen conceperint, neq; conceptus rectus sit, & uenter plenus est uelut prægnantis. Nihil autem in uentre mouetur, neq; lac in mammis generatur. Mammæ aut turgidæ sunt. Hęc igitur ad duos annos, sæpe etiam tres, sic habet, & si quidem una caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest ut superstes maneat. Si uero plures, erumpit ipsi per pudendū sanguis carnosus plurimus. & si hoc moderate fiat, seruat. Sin minus, à fluxu correpta perit. & morbus quidem talis est. Iudicare uero oportet ex plenitudinis mole, & quòd in uentre non mouetur. Nam mas trimestris, foemina quadrimestris motum habet. Postquam igitur tempore hoc prætergresso nō mouetur, nimirum hic morbus est. est autem hoc magnum signum, quòd lac in mammis non generatur. Hanc igitur maxime quidem ne curato. Aut certe cū prædictione. Et primum quidem totū corpus foueto. Deinde per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim quod compactū est commoueris, id quod foetus esse putatur, muliere à pharmaco concalesceta. Sed & uteros collueto, quo sanguinē educaas. Sin minus, subdititjs utatur fortissimis è buprestis. Et dictamnum creticum in uino bibat, sin minus, castoris testem. Et retrò cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinē affigito, & plurimū sanguinem detrahito

detrahit. Atq; hoc maxime rerum ac uirium ipsarū coniectura facta facito. Et haec tenus quidem dictum est de morbis à puerperij purgamentis fientibus. Sūt autē pericula in ipsis non parua. Acuti enim sunt & cito transmutantur. & magis affliguntur primiparae, q̄ quae sunt partuum expertae. Prodeunt autē puerperij purgamenta sanae mulieri sufficēter, primū selquiheminā mēsurā, aut paulo plura, postea adhuc pauciora iuxta hanc rationē, donec cessent. Prodeunt autem uelut sanguis à uictima, si sana uelut dixi, mulier fuerit, & sana futura est, & cito congelantur ac purgantur. & post partum plerūq; sanae mulieri contingit ut post puellae partum, in quadraginta duobus diebus diuturnissima purgatio fiat. Extra periculum autē est etiam si uiginti quinque diebus purgetur. post masculi uero partum, purgatio diuturnior fit in triginta diebus, extra periculum est etiam quae in uiginti diebus contingit. & in his quae foetus corruerunt secundum horum dierum rationem purgatio contingit. & in iunioribus quae corruerunt paucioribus diebus. In senioribus aut, pluribus. Eadem uero sunt affectiones ex puerperij purgamentis, & ei quae corripit foetum, & ei quae peperit, si menstruum corruerit foetum, & quae corruerunt magis periclitantur. Corruptiones enim grauiorē sunt q̄ partus. Non enim fieri potest ut citra uolentiam foetus corruatur, aut pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititijs medicamentis, aut aliqua alia re. Violentia uero malum est. In huiusmodi enim periculum est ne uteri exulcerentur, aut inflammantur. Hoc autē est periculosum.

At uero lac quomodo fiat, dictum est à me in natura pueri in partu. Postq; autem praegnans fuerit mulier, menses non ualde prodeunt, praeterquam quibusdam pauci. Dulcissimus enim humor ex cibis ac potibus ad mamas uertitur ac exsugitur. Et necesse est etiā reliquū corpus magis euacuari, & minus sani guine plenum fieri. Atq; hoc ita contingit. Sunt aut quae natura sine lacte sunt, & quibus lac deficit ante tēpus. Hae uero natura solidae sunt, & densae carnis, & propterea sufficiens humor non penetrat à uentre in mammas, quum uia sit densa. Ad menses detrahendos. Elaterij poriones duas sumito, & adipem ouillum derhenibus, pari elaterij portione amisceto, & nō conterito, uerum duas glandulas subdititias facito. Aut melanthiū ex tritico terito, & aqua subigito, & duas glandulas formato, atq; has ante dies quibus affuturi sunt apponito. Si enim non prodeunt, rigores ac febres inducunt. Mollitoria, à quibus aqua & arena purgatur, ducunt etiā menses, si non fuerint diuturni, et oculum emolliunt. Narcissum, myrrham, cuminū, thus, absinthium, cyperū, singula aequalibus portionibus sumito, narcissi uero solum quatuor portiones: et puluillum stupae dum pectinatur crudum linum ammisceto, & haec cum aqua organi coctū terito, ac glandem formato & subdito. Aut cyclaminū magnitudine tali, & acris florem magnitudine fabae terito, & cum melle glandem formato, ac apponito. Aut pulegium, myrrham, thus, fel suis ac bouis, cum melle subigito, et glandem efformato. Si menses non prodeant, adipem anferis, & netopum, ac resinam permixta ac lana excepta apponito. Medicamentum subdititium, purgatoriu, mollitorium. Caricam percoctā ac expressam leuissime terito, et in lana subdito cum rosaceo ungueto. Aut acris brasicae & rutae, utriusq; dimidiū terito, ac utitor eodem modo. Purgatoriu. Medullam anferis aut cerui magnitudine fabae affuso unguento rosaceo et lacte mulie

*de corpore
purgationis
quod ab
ceteris partibus*

*vide de
ceteris
quod*

bri terito, uelut pharmacū teri solet, & cū hoc os uteri illinito. Aliud subdititium molle. Medullam anferis magnitudine nucis, ceram magnitudine fabæ, resinæ lentiscinæ aut terebinthinæ magnitudinē fabę. Hæc cū rosaceo unguento ad lentū ignem liquefacito, & uelut ceratū effcito. deinde ex hoc tepido os uteri illinito, & pectinem irrigato. Aliud purgatoriū. Farinam recentem, myrrhæ obol. iij. croci tantundē, castorij obolū, hæc trita cū unguento irino apponat. Aut urticæ semen, & maluæ succū, ac anferis adipem simul permixta subdat. Aliud subdititiū purgatoriū, si menses non cōpareant. Styracem & originū terito, & permixtis adipē anferinū affundito ac apponito. Aliud quod uteros expurgat, ac sanguinē euacuat. Absinthij radicē tritam, melle ac adipē anferino ammixtis apponito. Aliud purgatoriū. De buprestis caput & pedes & alas tollito, & reliquū ipsius terito, ac ficus internā partē ammisceto. Sit autē pinguitudinis ficus portio dupla. Hoc uteros inflat. Hoc etiā desperatis optimum est. Aut mercurialis folia trita subdito. Hoc tenuē biliosam purgationē ducit. Sed & artemisia facit uelut mercurialis, & melius purgat. Vesperatrum quoq; nigrum cū aqua tritum, uelut aquā à carnibus ducit. Sed & alumen ac resina idem facit. Cyperū, absinthiū, aristolochiam, cuminū, salem, mel. Hæc omnia simul terito ac apponito. Et ueratū cum uino dulci, & farina losij ac tritici, melle subacta in lana subdatur. Subdititia si catapotia non purgarint. Mercurialem, myrrham, uiolam albam, cepam acerrimam, & melanthium ac mentā, si sufferat, permixta apponito. Subdititia acria sanguinem ducentia. Cantharidas quinque demptis pedibus ac capitibus, & myrrham ac thus simul misceto, & mel addito. Deinde in oleum rosaceum aut Aegyptium tinctū per diē subdat, & ubi mordet, tollat. & rursum in lac muliebre ac unguentum Aegyptium tingat, & hoc per noctē apponat. & aqua odorata peruat, & adipem subdat. Cōduxerit & buprestis, si quidem parua fuerit, sine alis & pedibus ac capite. Si uero magna fuerit, nō cōmisceto eadem quæ cantharidibus, sed solam sumito ac similiter apponito. Si uero molliore opus habuerit, ad buprestem uinum & cuminū Aethiopicum ammisceto, uuam item passam & pollinem felis ac anisi, & uinū seruefacito, eoque affuso reliqua terito, & pastillos drachmales efformato, eosq; apponito myrrha ac thure ammixtis. facito autem eodem modo uelut cū cantharidibus. Aut melanthium ex tritico, tritum ac melle subactum apponito. Aut hoc ipsum melanthiū cum melle tritum: uelut glandē effcito, circū pennam autē obducto. Subdititiū efficax. Succū mandragoræ & cucurbitæ syluestris, cū lacte muliebris apponito. Aut fecem siccam ex uino ueteri albo urito, & uino extinguito ac subdito. Cucurbitā item syluestrem, mercurialem, nitrum & irionem. Citius detrahit et mandragoræ radix, cantharis, serpyllum, lauri fructus, unguentū irinum, laurinū. Thymali succū permisceto ac agitato, et detracto uisco, erui magnitudine exhibiteto. Optimum est et glandem subdititiū ex eo facere. Si uero amplius prodierit, uino proluatur. Aut æs ustum dissoluito, et tepidum lana excipito ac apponito. Medicamentū ad conceptum. Cedriæ acetabulum, adipis bubuli drach. iij. simul terito, et talorū figuras efformato, quas ieiuna apponat, et dum appositas habet per diem ieiunet. Apponat autē bis, mane et uesper, post meries. post cœnam uero lauatur, et cum uiro dormiat. Aut melanthium contundi

to, & in linteum illigato, & adipe anserino addito, subdendū dato. Aliud ad conceptum. Quo cures mulierē ut in uentre cōcipiat, urinā sumito ueterem, & ferri recrementū tantum, ut in fragmēta resoluerē possis. postea mulierem in sella collocato, & corpore & capite uelato, peluicę ad pedes supposita, ignita cremētī ferri fragmenta tria pro una uice inijcīto. Sit autē uetus hæc urina cōgij mēsurā. & cum his triginta fōmētis ipsam foueto. Dum autē fōmentū adhibes, caput lauato, ita ut donec fora fuerit rursus lapides illos cremētī ferri in urina inungatur. post cenā autē, ubi cepas melle tinctas comedit, & aquam mulsam tepidam quatuor heminarū mensura bibit, et paululū continuit, uomat, & supina reclinata, rutā habeat auribus & naribus inditam. Et panē fermentatū sexta chœnicis parte, in iufculum uolucris confringat, habeat autē hoc iufculum apij chemam, & sic assumat. & rursus tantundē in cōna dato. Et hoc per dies septē facito. postea uero uentri per dies septē clysterem adhibeto. Sit autē infusum clysteris, refinæ drachmæ quatuor, mellis acetabulū, olei plataensium tantūdem, fursurū recentū succus, spuma nitri, oua tenuia. Sit autem infusum heminæ octo, & ex his tres succi pīsanæ. Obliquæ uero clysterem adhibeto, & parum lauato. Apponat etiā glandes septē in die, & detineat donec fuerint liquefactę. Sint autē ex thure, nitro, galbano, melle cocto. Cibo uero eodem utatur. Suffiat autē asini albi pilos, & lupi stercus. De his plurimū prunis injice, ipsamq; circumlocatā ac contactam suffito, cauēdo ne cōburas. Si uero mulier parere nequeat quę prius peperit, nitrū & refinam, & myrrhā, & cuminū Aethiopicum, & unguentū simul terat, & apponat. Aut pulegium siccum in linteō subdat. Bibat autem pulegium ubi dormire uolet. Aliud ad conceptum. Victus ratio nem mulieri cōstituiere oportet, quæ prægnans fieri cupit, & ad edendum ac bibendum exhibere ipsi, quæ libenter admittit. Viro autē mulieris reliqua dato, præter alliū, & cepam, & legumina fresā cocta, & silphij succū, & quæ inflant. Ab his sanē abstineat. Medicamentū quod similiter infunditur si non concipiat. Lac mulieris masculū alentis, grana mali punici recētis terito ac succū exprimito, & testudinis marinę partē inter anum & pudendum cōburito ac terito, & hæc in pudendum muliebri infundito. Aliud quod similiter infunditur nō concipienti. Lac & refinam, & mali punici dulcis succum, Hæc omniā melle ammixto infundito. Aliud ad conceptum. Bulbi albi semen, aut florem, cum melle terito, et lanæ inuolutū per triduum ad uterū apponat. Quartā uero die, malam syluestre latifoliam terat, lacte muliebri ammixto, et lanæ inuolutam apponat. deinde cū uiro dormiat, præforbeat autē pulegium in farina coctum, et bibat pulegiū tenue in uino. Si uero huic nō obediat, conyzam odoratam cōtundat, & expressum succum uino mixtum iciuma bibat. Aliud.

Asparagi semen similiter in uino bibat. Aliud. Secūdam mulieris, & uerum carnū capita, et alumē Aegyptiū, cum adipe anserino diluito, & in lana ad os uteri apponat. Aliud. Aeruginē, florem æris, utrunq; oboli dimidij pondere, thuris masculi, aluminis scissi, fructus uitis syluestris, gallæ, myrrhæ, malicorij, refinæ, polij, singulorum obolū, in melle tritū, per triduum bis in die

apponat. Si uero fortassis acrius fuerit, anferis adipē ac nītrum tostum ammis-
feto. Vinum autē exhibeto, fortitudinē in ipso uitans. Aliud ad conceptum.

Vermem carnū qui caudam habet accipito, & de ipso tres aut quatuor par-
tes sumito. & origanum tenuem simul cū rosāceo unguēto terito. & hoc ad ute-
ri os apponat. Aliud. Portulacam cum adipe anserino, & myrrha, & por-
ri semine, & felle bubulo terito, et lanę inuoluta ad os uteri apponito. Si mē-
ses quidem fiant multi, non cōcipit autem, floris aris obolos duos, et aluminis
falsi tantundem, cum melle terito, & lana excipito. Illiget autem mulier lanam
in linteum cū filo, & sibi ipsi subdat, ita ut filum extra promineat. Deinde quum
probe purgata fuerit extrahat, & uino odorato myrti folijs iniectis seruelfacto
proluat, & uirum accedat. Subdititiū ad conceptum. Mel, myrrham,
myrticę fructum, resinam liquidam, adipem anserinum, omnia simul trita lanę
inuoluta apponat. Aliud, quod uterum ualde aperire potest, quū conclusus
est, & concipere non potest, & ad aquā expurgandam. Accipe anchusam par-
uam, & leniscum, & cuminū, & cyperum, & cucurbitam syluestrem, & nītrum
rubrū, & sal Aegyptium, & anchusam magnā. Hęc omnia trita per linteum ras-
rum excernito, & acceptum mel ad lentū ignem coquito. Postquam uero effere-
buit, ceram ac resinam ammisfeto. Deinde etiam alijs omnibus ammixtis oleū
affundito, ac ab igne tollito, & tepida lanę cōuolutę inuoluta utero apponito,
donec purgata fuerit. Aliud. Si mulierē concipere uelis, ad purgatoria qui-
bus utitur, etiam uirū accedere oportet. Et baccas lauri nigras decem, thuris pu-
gillos tres, & cumini modicū, cū melle trita in lanam succidam inuoluat, & ses-
mel in die subdat, & semel auferat, ad quatuor dies, & ijsdem diebus à cibo ab-
stineat. Conceptum impediens. Si uero cōcipere non oporteat, misyos
magnitudinē fabę aqua diluito, ac bibendam dato, & per annum ut ita dicam,
non concipiet. Partum accelerans ægre parienti. Lauri radicē derafam,
aut lauri baccas dimidij acetabuli mēsurā in aqua calefacta bibēdas dato. Aliud
partū accelerans. Dictamni obolos duos tritos in aqua calida bibat. Aut abro-
toni drachmā, & lauri baccas, & anisum, in uini dulcis ueteris cyatho terito, &
aquę cyatho affuso bibendū dato. Hoc bonum est si ante partus dolores fuerit
datum. Aut dictamni obolū, myrrhę obolū, anisi obolos duos, nitri obolum.
Hęc cū uini dulcis cyatho uno terito, & aquę calidę cyathis duobus affusis bi-
benda dato. Deinde calida lauato. Aliud partū accelerās. Resinam terebin-
thinam, mel, oleū duplum horum, uinum odoratū q̄ suauissimū. Hęc mixta te-
pelfacta sæpe ebibēda dato. Oportet autē, & uteros sedare, si fuerint inflammati.
Aliud. Cucumeris syluestris quicūq; albus fuerit semen cerę infarcito, dein-
de lanę rubrę inuolutū lumbis alligato. Si uero prægnans multo tempo-
re cohabeatur, & parere non possit, sed diebus pluribus ex partus doloribus la-
borer: Sit autē iuuenis, in uigore, et multo sanguine referta, secare oportet uenas
in malleolis, & sanguinē detrahare, uirū respectu habito. & postea calida lauri
corticibus incoctis lauato. Viticis autē semen, & dictamnū creticam, utriq; pari
portione, in uino albo aut aqua bibendū dato. Subdititiū autem medicamen-
tum facito, galbano, et baccis lauri, et oleo rosāceo, in lana inuolutis ac subditis.
Aliud. Filicis quercinę radicē tritam in uino bibendā dato, & adiantum tri-
tum in oleo dilutū illinendum, & in uino meraco bibendū dato. Aliud, quod
puerperę

puerperæ puerperij purgamēta melius purgat. Testudinis matinae hepar uide adhuc uiuētis, in lacte muliebri terito, & cū unguento irino ac uino subigito, & apponito. Aut mercurialem tritam in lana apponito. Aut artemisiā tritam similiter in lana subdito. Aut mercurialis & cucumeris syluestris parū terito, & uino ac melle subactū apponito. Purgatoriū puerperij purgamentorum ex partu. Triticū trimestre fractū ac frelum, dimidiæ chœnicis mensura, in aquæ heminis quatuor coquito. Quum autē efferbuerit ter aut quater, forbendum dato. Aliud. Sambuci folia in aqua coquito, & aquā bibendam dato. Edat autē & brasicas coctas, & porrū, & feniculum, & anethum, & polypos, & locustas pisciculos. Aut rhois folia & erysimū ex uino, aut polentę pollinem bibendū dato. Aut misy duorū obolorum pondere tritum ac uino subactū apponito. Purgatoriū mensium & puerperij purgamentorū. Ducit etiam aquā & alia. Radicis struthij tusi tritū quantū tribus digitis apprehēdi potest, melle subactū apponito. Nascitur autē in Andro in littoribus. Aliud similiter purgans. Erysimū in aqua coquito, & ubi ebullijt oleum affundito, ac bibendum dato. Comodum est etiam succū pro fomēto adhibere per suffitiū. & cibis mollibus uti. Aliud quod puerperij purgamēta purgat. Erysimū placide terito, & corticem diffrato. Quum autē purū feceris, leuiter terito, & aquā adstilato, salēq; ac oleum ammiscero. & ubi polentā insperferis coquito, ac forbendum dato. Aliud. Si nō descenderit purgatio, aut puerperij purgamēta nō prodierint. Cucumeris syluestris internā partem, trium obolorū pōdere sume, & artemisiā herbā, & thus oboli pōdere, & hæc trita, & melle ammixto, lanę inuoluta, ad uteri os appone. Et hoc semper noctū ac interdū per dies quinque facito. Aut uitis pampinos aut folia uiridia terito, & melle ammixto lana excipito. & eodē modo subdito. Aut cupressi fructū & thus simul trita, rosaceoq; ac melle diluta, & lana excepta apponat. Aut abrotoni drachmā, & cucumeris syluestris medullæ obolum, & thus cū melle terito, & in lana inuoluta apponito. Aut elaterij obolum, & myrrhā, cum melle terito, & lana excepta apponat. Aut cupressi fructū, & cucumeris syluestris internā partem, & thus, melle ammixto, in lana subdat. Purgatoriū si ex partu non purgetur. Trifoliū in uisno bibendū dato. Idem etiam appositū menses erumpere facit, & foetum ejicit.

Purgatoriū uterorum, quū puero mortuo sanguis in hoc manserit. Cucurbitam syluestrem tritam cū melle delingat, aut apponat. Ad omnia puerperij purgamenta si nō probe prodeant. Erysimū coquito cū polenta, & oleo affuso ubi coctū fuerit forbeat. & cibis mollissimis uratur. Aut scāmoniam cū lacte muliebri tritam, ac lana exceptā apponito. Aut radicē dulcem melle, & rosaceo aut Aegyptio unguento subactā, in lana subdat. Aut farinā lotam similiter apponat. Bibat autē crethmi, & seselis, & rutæ, & sulphij semen, ita ut de singulis obolos duos simul teras, & in uino meraco, si nō febricitarit, præbeas. Subdititiū quod secundā relictam ejicit. Ex sambuci foliorū decocto prius fomentum adhibeto, & id quod ex cātharide fit apponito. Hoc & ea quæ debilia sunt sanat. Si uero lancinet ac mordeat, statim tollito, & lanā rosaceo tinctā subdat.

Potiones quæ secundā educere possunt, & menses detrahere, itemq; foetū enectū. Cantharidas quinque, alis et cruribus ac capite auullis, & tribulum ad mare natū cū radice ac folijs tritū conchæ mēsurā, & euāthemī, ac seminis apij

tantundē, & sepia: oua quindecim, in uino dulci tēperato bibenda dato. Et ubi dolor habuerit in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & uinum dulce. Alia. Ranunculi foliorū ac floris tritū, stateris Aegini pondus, in uino dulci bibat. Si uero dolor habuerit, cicer albū & uuas passas, in aqua coquito, perfrigerato, ac bibendū dato, & ubi urinā stillicidiū uexarit, in aqua tepida desideat. Aliud quod ericit secundas. Cucumeris syluestris succū in mazam cōspersum apponat, ubi prius ad biduū ieiunarit. Hoc nullū aliud præstantius inueneris. Focēditatis experimentū. Caput allij integrū derafum appone, & uide an per os oleat. Aliud experimentum. Netopon modicū lana inuolutū apponito, ac uide an per os oleat. Alia subdititia. Scorpj marini fel, lana exceptū & in umbra siccātū appone. Aut pulegiū siccātum & tritū ac melle subactū, in lana apponito. Aut florē aris cum melle linteolo illigatū subdito. Aut cucumeris syluestris semen, & testam cōbustam, cū uino subigito, & leporinis pilis ac lana excepta subdito. Aliud subdititium. Alumen Aegyptiū lanae inuolutū apponito. Aut cantharidas tritas uinoq; subactas subdito. Aut artemisiam herbā uino subactam apponito. Aut melanthiū cum uino tritum in lana subdito. Aut bulbion ex tritico tritum & uino subactū apponito. Aut uini ueteris albi fecē comburito, & uino albo extinguito, teritoq; ac in linteolo apponito. Aut galbanū, & netopon, & misy cū rosaceo ungueto in linteolo subdito. Aliud. Elaterij portiones duas, & fauū cū uino in linteolo apponito. Aut butyrū & alumen melle subacta similiter. Aut scāmoniae succū & adipem cū maza misceto, & uino imbuta in linteolo apponito. Portiones quae possunt fecūdā in utero detentā educere. Colocynthis syluestris internā partem cū lacte muliebri tritā, in linteolo apponat. Ad idem. Silphij magnitudine fabae in uino bibendū dato. Aliud quod foetū expellit. Mulierē sub alis apprehensam foriter cōcutito. In potu uero dato, uiticis folia in uino. Aut dictamnū creticum oboli pōdere in aqua terito ac exhibeto. Aut conyzae graeolentis manus plenae mensuram cū porri succo diluito, & netopū chemae plenae mensuram addito, atq; haec trita in uino bibēda dato. Aut rādā pinguisimā cū uino dulci coquito, trium cyathorū mensura uini affusa, & galbani obolos tres, & myrrhā adijcito, & ubi cocta crassa facta fuerint, tepida bibēda dato. Aut porri succum, & myrrhā, & uinū dulce simul exhibeto. Aut portulacae semē terito, & in uino albo ueteri dato. Aut populi nigrae creticae grana nouē in uino trita bibat. Aut ranunculi herbae foliorum ac floris tritū, drachmae Aeginae pōdus, in uino dulci bibat. Si uero adhuc secūda in utero detineatur, Senectae anguiū obolum in uino terito, ac bibendū dato. Aut apij radicē, & myrri baccas coquat, & per dies quatuor bibat. Aut cuminū Aethiopicū, & castorij obolū, & cantharidis parū, haec in uino bibēda dato. Aut feniculi radicē, in uino & oleo ac melle feruefactā bibat. Si secūda non prodierit, conyzā tritam in lana subdito. Melius aut est ut bibat. Aut conyzae quantū manus capit, & porri succū, et netopū chemae mēsurā miscat, & haec in uino bibat. Aliud quod secūda ericit. Holoscontidis dulcis radicē, est aut uelut bulbos, & parua uelut oliua: Hanc in uino terito, ac bibēda dato. Et si quidem parua fuerit duas dato, Si uero maior, una sufficit. Ammisceto aut ex seminibus cuminū Aethiopicū, & felis malsiliensis. Aut silphij libyci semen siccū choenicis dimidia mēsurā, in uini heminis tribus coquat

coquat, & ad dimidias redigat, & de hoc bibat. Aliud. Vitis semen, & fese-
lis, pari portione simul cum myrrha terito, & cum aqua bibenda dato. Alia secundas
expellens. Vitis alba recens acetabulum, in uino albo odorato tritum bibendum
dato. Aliud. Castorei aut sagapeni obolum, bituminis drach. i. niri drach. ij.
Hæc omnia terito, & in uino dulci, ac olei hemina dimidia obolos duos ieiunans
bibendos dato. Et calida probe lauato. Aliud similiter habes. Herinaceos ma-
rinos tres rotos tenuiter tritos, in uino odorato bibendos dato. Aliud. Mæta
fasciculū paruum, & rutæ & coriandri, & cedri aut cupressi semina, in uino odora-
to bibendum dato. Et de herinaceis si habuerit, plurimum forbeat, postea uero simi-
liter calida lauato. Aliud. Anisum, cedri baccas, semina apij, cuminum Aethiopi-
cum, seseli, singulorum dimidium acetabulum, tenuiter tritum, ex uino albo bibendum
dato. Aliud. Dictamni fasciculū, & dauci feminis drach. ij. & melanthij tantun-
dem, tenuiter terito & in uino albo bibenda exhibeto. Et multa calida lauato. Da-
to aut iuxta corporis robur. Aliud. Galbanū oliuæ magnitudine, in oleo cedri
no tritum apponat. hoc corrumpere & eijcere morantes secundas potest. Aliud se-
cundarum expulsiuum quod uteris infunditur. Quum secunda à frigore mortifica-
ta cooptuerit, ubi uentus frigidus fuerit, crocū leuiter tritum drachmæ potere,
cum adipe anserino infundito, & ad plurimum tempus finito. Potus ad idem probe
cōferens. Conyzæ suauis olem, & mel, & resinā terito, in uino odorato, aut
in syrmaea portione moderate purgare bibenda dato. et calida lauato. Alius simi-
lis potus ad puerum & mala intus existens. Aeruginē tritam cum melle, & syrmaea
portione, bibenda dato. Aliud subdititiuum, ad eijciendum foetum immortuum. Ae-
ris ramē in molle linteum indita, ad os uteri apponito, & profueris. Aliud.
Testam recentē, & adipem anserinum terat ac apponat. Aliud. Nitrū cum resina
coctū, & in glandē efformatū, gallinaceo adipe tinctū appone. Aliud. Cha-
rien appellatur herba, huius radicē nō multo adeo tempore ad umbilicū apponito.
Aliud. Cucurbitā syluestre, et murium stercus, leuiter trita apponito. Aliud
quod alligatur. Resinā & adipem gallinacū, trita ac simul mixta, super umbilicū
cum ac uentre deliget. Aliud subdititiuum. Hederæ albæ semina, & cedri ramenta
terat, et glâdes hinc factas subdat. Aliud. Testudinis marinæ cerebrū, & cro-
cum Aegyptiū, et salem Aegyptiū terito, misceto, glâdes formato, ac subdito.
Suffimentū expulsiuum quod et sanguinē uentris expellere potest. Salicis fo-
lia in igne posita suffito, et mulierē circulo catam finito, donec fumus in uterū in-
trauerit. Abortus sanatio. Quum mulier abortū fecerit, et puer nō fuerit egres-
sus, siue putrefactus fuerit, et intumuerit, aut aliud quid eiusmodi passus fuerit.
Porri & apij succū per linteū expressum, de utrisq; colligito, & olei rosacei he-
minā, & adipis anserini quadrantē adijcito, resinæq; obolos tres in oleo lique-
facito, & ubi mulierē ad pedes altiorē feceris, in uteros infundito, ac decumbens
ad plurimum tempus cōtineat. deinde ad dies quatuor desidere iubeto, et egredi-
tur puer putrefactus. Sin minus, salē Aegyptiū et cucurbitā syluestre uiridē ac-
cipito, & melle ammixto trita edēda dato. Et postq̄ ederit, hinc & hinc mouea-
tur. Aliud. Salem Aegyptiū, et murium stercus, et cucurbitā syluestre sumito, et
mellis femicocti quadrantē affundito, et resinæ drach. i. in mel injcito, & cucur-
bitā ac murium stercus, omnia probe cōterito, & in glâdes efformato, easq; ad u-
terū subdito, q̄ diu oportunū esse uisum fuerit. Aliud expulsiuum, quod puerū

eneſtum eſcit. Helxinem in uino tritam bibendā dato. Aliud cicſtorū, quod puerū liuidū expellit. Veratri nigri radices tenues tritas, quantum tribus digitis apprehēdere potes, & myrrhā magnitudine fabę, in uino dulci bibēda præbe. Aliud expulſoriū. Coriandrū cum radice, & netopū apponat, ac deambulet. Aliud quod inſunditur, ſi mortuus fuerit puer, ut ipſum eiciat. Crocum terito, & anſerinū adipem affundito, & excolata in uteros inſundito, & ad plurimū tempus relinquit. Ad ſcētū immobilem corripendum ac expellendum. Aluminis ſciſi drachmā unam, myrrhæ tantundē, ueratri nigri obolos tres, in uino nigro leuiter trita, in glādes aſſormato, & apponito donec paulatim fuerit exolutus. Collutiones uteros purgātes, ſi ex partu aut inflammatione fuerint exulcerati. Groſſos hybernos aqua aſſuſa feruefacito, et excolato. Deinde oleo tepido aſſuſo miſce, & duas heminas ad ſummum inſunde. Omnes aut collutiones nō ampliōre tēpore hac mēſura uteris inſundantur. Malicoriū item & mannam thuris, in uino nigro aſſuſo coquito, & excolatū uinū inſundito. Alia collutio. Fecem uini uſtam liquefacito, & cū aqua inſundito. Deinde malicoriū, myrti baccas, iuncū odoratum, lentes, in uino coquito, et diſſuſum uinū inſundito. Alia. Butyrū, thus, reſinā, mel, ſimul liquefacito, & aſſuſo uino, tepida inſundito. Aut ſambuci fructū in aqua coquito, & excolata aqua, apiū, myrrhā, aniſum, thus, ſimul in ipſa terito, & uinū odoratum pari aquæ mēſura aſſundito, excolatoq; per linteū, & tepefactū inſundito. Alia. Braſſicā, & mercurialem, et lini ſemen, & linū uiride, in aqua coquito, excolato, ac inſundito. Aut foliorū myrti acetabulū, myrrham, aniſum, mel, reſinam, unguentū Aegyptium, omnia terito ac unito, aſſuſisq; uini albi odoratis ſimi heminis duabus, excolato, tepefacito, inſundito. Aut lauri fructū & pulegium in aqua coquito, & unguentum roſaceū aſſundito, & cū hoc tepido colluito. Aut anſeris adipem reſinā ammiſceto, aſſuſoq; ad hoc uino, tepefactum inſundito. Alia. Butyrū & oleum cedrinū, in modico melle tepefacito ac inſundito. Aut mel, butyrū, iuncum odoratū, calamum odoratū, muſcum marinum ſumito, & in uino coquito, excolato, ac inſundito. Aut apij ſemē, ſefeli, myrrhā, aniſum, melanthiū, in uino coquito, & excolatū unum inſundito. Aut cedrū in uino coquito, & cū uino colluito. Aut hederā in aqua coquito, et aquam inſundito. Aut elaterij, aut cneſtri potiones duas in aqua coquito, et duas heminas ex hac tepida inſundito. Aut cucumeris ſylueſtris interioris magnitudinem digitū, in duabus aquæ heminis coquito, et melle ac oleo ad aquā aſſuſo inſundito. Aut radicis thapſię potiones duas leuiter terito, aſſuſoq; oleo ac melle, in duabus aquæ tepidæ heminis diluito, ac inſundito. Aut ueratri nigri potiones duas, uino dulci et aqua dilutas inſunde. Aut grana cnidia ſexaginta terito, melleq; ac oleo & aqua aſſuſa inſundito. Collutio corroborās, ſi ulcera pura fuerint. Groſſos hybernos terito, et aquā aſſundito, & per totā diem macerato, & oleo aſſuſo colluito. Aut malicoriū, & loti ramēta in uino nigro coquito, & inſundito. Quum autem impura fuerint, & ſordes deferuntur, fecem uini uſtam, cum uino et aqua inſundito. Aut malicorium, rhoem coriariū, myrticę ac rubi folia, in uino nigro coquito ac inſundito. Collutiones quæ inſunduntur ad uetera ulcera. Succo braſſicæ cocto collue. Et mercurialē ſimiliter ac nitrū rubrum modicū ammiſce, et myrrhæ acetabulū, thus, ſefeli, aniſum, apij ſemen, netopum

netopum, resinam, mel, adipē anserinum, acetū album, unguentū album Aegyptium, Hæc omnia simul trita, & uini albi heminis duabus diluta, tepida infunde. Aut mercurialem in aqua coque & excola, & myrrhæ acetabulū, thus, fefeli, netopum, singulorū pares portiones adde, ac tepida infunde. Aut saluiam & hypericū in aqua coquito, & cum aqua colluito. Aut sambuci fructū, & lauri baccas, æquis portionibus in uino coquito, & cum uino colluito. Aut pulegij aqua colluito. Aut adipem anseris in resina liquefacito, & similiter oleum cedrinum modicū affundito, & cū melle liquefacito, ac tepida infundito. Aut argenti florem in uino & melle ac cera liquato, & cyperū, & iuncū odoratum, ac calamum (quæ sanè etiam in unguentū ammiscetur) & iridem ac muscum, in uino coquito & infundito. Aut apij semen, anisum, fefeli, myrrham, melanthium, in uino coquito ac infundito. Aut cedrum creticam in uino coquito, aut in aqua, & infundito. Aut hederā creticam in aqua coquito ac infundito.

Atq; hæc faciēda sunt si uulnus habet. & myrrham in aqua dilutam infunde. Aut elaterij portiones duas cum aqua infunde. Aut colocynthidas syluestres duas in uino aut in lacte cocto, quatuor heminarū mensura macerato, & excolato, ac infundito. Aut cucumeris syluestris interioris, palmi magnitudinem in aqua heminis quatuor coquito, & melle ac oleo affuso colluito. Aut radices thapsiæ duas portiones, in uino dulci dilutas, cū aqua heminis duabus, tepide infundito. Aut ueratri portiones duas, in uini dulcis heminis duabus dilutas infunde. Aut thlaspios acetabulū, melle ammixto in atq; heminis duabus dilue, & tepido utere. Aut cucumeris syluestris magnitudinem palmi, & cneori portione unam, in aqua heminis quinque coquito, & melle ac oleo affuso colluito. Aut grana cridia sexaginta, in melle aut in oleo diluta, cū aqua infundito.

Si ex partu alui profluuiū corripatur. Bibat uuam passam nigrā, & punicis dulcis malicorij, & internū nucleum, & coagulū hœdi. Hæc uino nigro diluta, & caseo caprino, ac polenta triticea in persis, bibenda dato. Triticū autem modice torreto. Si uero ex partu sanguinē uomat, huic hepatis fistula sciata est. Hæc lac asini bibat, deinde uaccæ nigræ, ad quadraginta dies. Et fescamum tritū donec probe habeat. Bibat aut lac ieiuna. Si ex partu sedem dolent, iuniperi fructū & apij radicem coquat, & ad dies quatuor bibat, et lactuæ semen cū anserino adipe tritū edat. Si uero ex partu uteri inflāmāti fuerint, solani succū infundito; aut betæ, aut rhamni. Si ex partu crus ab uteris claudum factū fuerit, & exurgere nō poterit, semen hyoscyami chemæ mensura, in uino nigro ad triduū bibat. Si uero mēte percellatur ipsa bibēs, lactis asinini potulum bibendū dato. Deinde pharmacū à quo pituita purgatur, ex sandaracha aut & cerato, & pillis leporis, per triduū suffitus fiat. De inflammatione ex partu. Si ex partu uteri inflāmāti fuerint, solani succū intra pudenda infundito. Aut apij, aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succū expressum. Aut sambuci medullā ac tenerissimam partē derasam, oblongam indito. Aut abinthiū in aqua terito, & lana exceptū subdito. Si uero horruerit tollito. Aut coryledonis folia, & porrū, in crassiore tritici farina coquito, & oleo ipsi affuso præbeto. Bilē ex utero purgātia. Cucumeris syluestris internā partē tritā ac melle subactā, in glandē efformato ac apponito, Pharmacū aut dare oportet, qd̄ sursum ac deorsum purget, et calida lauare, apponere uero anisum, aut melanthiū; aut colocynthidis

thidis sylvestris internam partē terito, & melle subactā apponito. Aut elaterij potiones quatuor, ammixto adipe asferino aut caprino, in oblongiore glandē redactas apponito. Aut nitrū, & cuminū, & allium, & ficū, omnia leuiter trita & melle subacta apponito. Calida uero lauetur, & à balneo bibat. Aut thlaspile uiter tritū, & melle subactū apponito. Aut ficus ueteris pinguitudinē de rasam elaterij portionibus duabus ammixtis, & nitro tantū quantū est elaterij, cum melle subigito ac apponito. Aut peucedani tres cyathos bibendos dato. Et ani sum ac melanthiū uino diluta bibēda dato. Aut elaterij potiones quatuor, adipe ouillo ammixto apponat. Et hoc ablato aqua odorata lauet, quæ leniter adstringat. Aut elaterij potiones tres cū ouillo adipe, in glādem circū pennā efformato, & ubi amouerit, sufficiēti aqua probe eluatur. Aut thlaspis portionē cum melle dato. Collutio si biliosa fuerit. Elaterij potiones duas aqua dilue, & oleū narcisī sinū affunde, & cū tepido collue. Aut colocynthides sylvestres duas in lactis asinini coctū heminis quatuor macerato. & unā excolato, ac oleū narcisī sinū ammisceto, & infundito. Alia collutio biliosa & pituitosa. Cucumeris sylvestris internā partē palmi magnitudine, in aque potabilis heminis quatuor coque, et melle ac oleo anthino ammixto infundito. Alia pituitā et bilē purgās. Grana cnidia sexaginta, melle ac oleo anthino ammixto, cum aqua infundito. Aut cneftrum in aquæ potabilis heminis quinq; coquito, & duabus excolatis, mel & oleū anthinū cum narcisīno ammisceto, ac colluito. Collutiones purgatorix. Grosi hyberni usti in aqua maceratur, & ad aquā excolatā oleum ammiscetur, ac infunditur. Postea uero collutio fiat ex malicorio, galla, loti ramens. Hæc aut in uino nigro coquere oportet. Aut fece uini uita utere cū aqua. Et postea hæc infundito, myrti folia & rhoem coriariū. Coquantur aut in uino nigro odorato. Et postea lentisci folia, & hypericū, & saluiā, cū uino nigro odorato cocta infundito. Aut cū brasiæ aqua, in qua mercurialis cocta sit, modico nitro adiecto, colluito. Aut elaterij portionē, cū oleo narcisīno aut anthino, tepidam infundito. Si uero biliosa fuerit, colocynthidas duas, in lactis asinini coctū quatuor heminis macerato, & cū excolato colluito, oleo narcisīno aut anthino ammixto. Aut cucumeris sylvestris internā partem palmi magnitudine, in aque potabilis heminis quatuor coquito, et melle ac oleo anthino addito, colluito. Hæc collutio pituitosæ ac biliosæ cōducit. Collutio pituitā trahēs. Grana cnidiū, & mādragoræ liquorē terito cū aqua, Nam purgatio multa & omnis generis ex hac collutione cōtingit. Aut allij caput integrū, nitrū, ficus internam pinguem partē, æquis portionibus trita ad gallæ magnitudinē efformato, ac apponito. Aut cumini folia cū uino trita, in lana subdito. Aut radicē albam terito, & melle affuso feruēfactā in glandē redigito, ac apponito. Aut silphij liquorē cum ficis emollito, & glandem efformato. Bonum est & cucumeris sylvestris semen similiter tritū ac preparatū. Aut fel tauri, & nitrū rubrum, & nepotum, ac cyclaminū, illorū quidem gallæ magnitudinē, cyclamini uero ampliorē portionē, melle ammixto mulier quæ curatur apponat. Aliud subditurium. Cyclamini caput purgatū aqua terito, & lana tenera exceptū apponito. Aut myrrham, salem, cuminum, fel tauri, cū melle eodem modo. Aut grana cnidia triginta, & Indici pharmaci oculorū, quod uocatur piper grana tria, decoratitico; & rotūdi item tria. Hæc autem terito, & uino ueteri tepido diluta, in starglandis

glandis circum uolucris pennā efformato, & sic adhibero. Aut tithymali succis melle subactum. Aut scillae radicem longitudine digitorum sex, duobus digitis lana obuolutis subdito. Aut ipsam scillam absq; radice terito, & similiter lana obuolutam apponito. Collutio si pituitosa fuerit mulier. Veratri potiones duas in uini dulcis heminis duabus diluito, et permixta infundito. Si purgatione opus habuerit, porrum coquere oportet, aut sambuci fructū, anisum, thus, myrrham, uinum. Haec omnia terito, & cum succo horum colluito. Aut brassicam in aqua coquito, & in huius succo mercurialem coquito, & nitri parum. & excolatum infundito. Aut cnestri potionem in melle dilutā immittito. Verum menses cōsiderare oportet, an biliosi sint, aut pituitosi. Ad hoc arenam siccam tenuem in solem subijcito, & quum menses prodierint, sanguinē superfundito, ac siccatū finito. Et si quidem biliosi fuerint, sanguis in arena siccatus uiridis euadit. Si uero pituitosi, uelut mucus cōspicitur. Si igitur pituitosi fuerint, cnestri potionem cum aquae mulsae hemina infundito. Purgatorium mole aquam ducit & pelliculas, ac faciem subruentā. Detrahit & menses, nisi diu turni fuerint. & uterorū os mollit. Vnguentum narcisīnū, & cuminum quod editur, myrrham, thus, abinthium, cyperum, unguentū rosaceum, Horum singulorum pares portiones, narcisīni uero quatuor partes sumito, & crudi lini puluillo dum à stupa depectinatur ammixto, omnia terito, & glandem circum pennam efformato, & linteo tenui circumdato deligato, & in oleum album Aegyptium tingito, ac apponito, & per totam diem finito. Et ubi lauit & amouit, aqua odorata perluatur. Aliud purgatorium. Ducit aquam & pelliculas, & mucos, & faciem subruentā. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, melle subacta & linteo indita apponito, & totum diem insita finito. Deinde ubi lauit & amouit, aqua odorata perluatur. Aliud. Salem, cuminum, fel tauri, melle subijcito ac subdito. Et silphium ficui ammisceto ac apponito. Deinde unguento rosaceo illinito. Aut grana cnidia decorticato, potionēq; ipsorum terito, ac in glandem efformato. Aut allium & nitrum rubrū, & ficum, paribus portionibus melle ammixto subdenda dato. Et ubi amouerit, cerui adipē apponat in uino liquefactum. Aut pipēris grana quinque cum modico elaterio, melle lacte instillato, in lana unguento tincta apponat, ac amoueat eodem modo. Aut pinguis simam ficus partē cum elaterij potione, & nitri rubri ac mellis aequali portione, eodem modo. Aut fel tauri, nitrum rubrum, netopum, cyclaminum, paribus portionibus eodem modo cum melle in glandem efformato. Aut fel tauri oleo Aegyptio tinctum apponat. Et eo amoro rosaceum illinat. Aut cucumeris sylvestris longi internam partem, exēpto femine, cum lacte mulieris masculū alentis, & myrrham purā, & modicum mel, & unguentum Aegyptiū, terito & apponito. Aut cucumeris sylvestris partē internā siccatū, & sine femine tundito, & adiecto melle seruefacito, & glandē oblongā efformato, atq; oleo albo tinctū subdito. Aut sylvestri cucurbitā eodē modo. Aut elaterij potiones tres cū farinae massa terito, & glandem formato. Aliud similiter faciens. Grana cnidia decorticata trium potionum mensura coquito, & melle affuso apponito. Deinde rosaceum illinito. Quaecūq; uero glandem subdunt, eas prius lanam in glandem infigere, deinde linteum tenue circumdare oportet, atq; sic oleo Aegyptio tinctam apponere. Ducunt autem

hæc maxime, & pelliculas auferunt. Subdititia purgatoria fortia, quæ aquâ ducere possunt, et mucos, ac pelliculas, magis quàm priora. Piperis grana quatuor maxima, aut etiam parua, si opus fuerit, ad elaterij potionem ammixta terito, & muliebri lacte infillato, cum modico melle subigito. Atque hæc in lanâ mollem circum pennam obuoluit, & linteo circumdato apponito, ubi prius in oleum Aegyptium tinxeris. Maneant autem subdita per diem, & ubi amouerit, adipem cerui apponat. Potiones, similiter purgatoria, quæ fecundas eijcere possunt, & menses detrahere, & foetum enectum educere. Cantharides quinque, alis & cruribus ac capite auulsis; & tribulum ad mare natum cum radicibus ac folijs tritum conchæ mensura; & euanthemi uiridem siue luteam internam partem, & seminis apij tantundem, & sepia oua quindecim, in uino dulci temperato bibenda dato. Et ubi dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & uinum dulce. Alia. Ranunculi foliorum ac floris triti, æginæ stateris pondus in uino dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album & uuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. Et ubi urinæ stulticidium uexarit, in aqua tepida desideat, & uinum dulce bibat. Subdititia purgatoria si potiones non purgarint. Mercurialem tritam ac myrrham apponito. Aliud ad omnem morbum, & aperire, & purgare potens. Myrrham modicam & saluiam, & anisum terito ac uitior. Purgatorium quod stentem purgare potest. Si os uteri non recte habuerit, stercus bubulum sicum tum sum ac cribratum quatuor chœnicum mensura, & aceti heminas decem, & urinæ bubulæ tantundem, & saluginis marinæ heminas uiginti, pro fomento adhibeto. & ad multum tempus hoc leniter facito. Deinde iota ubi lenticulæ decoctum, & mel ac acetum mixta bibit, uomat. Et farinam sorbendam dato. & uinum odoratum uetus sub dio per noctem expositum, insuper bibendum. Cibum autem ea die ne gustet. Sequenti uero granum cniidium deuorandum dato. Tertio uero pharmacum urinam ciens exhibeto, ita ut uuas passas & cicer album, duarum chœnicum mensura sumas, & aquæ semicongios tres affundas. Deinde facta coctura excoles, & sub dio per noctem exponas, & postera die bibendum præbeas. & subdititijs pharmacis utatur. Aliud purgatorium mensum. Stercus bubulum uelut conchæ testam efformato, & cupressi ramenta ammisceto ac subigito, & in sole sicato. & in hoc suffimeta inijcito, ac suffito. Aliud quod infunditur ad similem affectionem, si menses non prodeant. Spinæ albæ folia trita, & excolata ac tepefacta infundito. Illitio purgatoria, quæ uteros purgat. Porri & nasturtij semen tritum, & uino ac lacte cocto dilutum, imo uentri illinito. Illitio mollitoria. Ducit aquam, & mucos, et pelliculas. Et puer perij purgamenta detrahit, & non exulcerat. Myrrhæ optimæ dimidiam partem, & salis granum, & picem aromatibus conditam, contudito ac trita misceto. Sit autem myrrhæ dimidia pars, ad salem ac picem contusam, hæc in linteum ad galiam magnæ magnitudinem efformata immittito. Sint autem duo lintea, ut alterum in die, alterum nocte habeat, donec colliquefiant. Lauetur autem calida. Et deinde ubi amouit, aqua odorata perluatur. Si uoles mulierem concipere, ipsam & uteros purgato. Deinde ieiunæ farinam edendam dato, & uinum mearacum insuper bibendum. & nitrum rubrum, aut cuminum, & resinam, melle subigito, & in linteo subdito. & ubi aqua defluerit, nigros subdititijs talos ad emolliendum

liendum apponito, & cum uiro cōcumbat. Si uero os cōclufum fuerit, etiam fici fuccum apponat, donec fuerit apertū, & ftatim aqua eluat. Cæterum acci pitris ftercus in uiuo dulci terat, & ieiuna bibat, & tunc uiro condormiat. Aut ubi menfes defierint, anferis aut uulpis ftercus, in rofaceo unguēto terat, & pūdendum illinat, ac cōdormiat. Si ulcera fuerint acria & inflāmata, hac colūtionē utere. Adipem anferis & refinam mīſce, & aqua tepida diluta infunde. Aut butyrum mellis ammixtum liquefacito ac infunde. Aut bryoniae albæ conchæ teſtam paruam deradito, & myrrham ac mel ſimiliter. Hæc in uiuo nigro odorato diluito, ac tepidū infundito. Si ulcerata aut puſtulis plena fuerint ſumma labra, carnem bubulam fumito, & butyrum ſiue adipem anferinum, & aniſum aut crocum, aut ſpodium cyprium. Hæc omnia terito, & carni oblita apponito. Si ulcera ſiant ac mordeant, Bubulam carnē adipe illinito, & carnem ſubdito. Et ſi fordidā fuerint, eluito, & fomentū ex fici radice adhibeto. Et poſt ea etiam de pinguedine in uiuo dulci bibat. Si in pudendis ſiant ulcera, bubulum adipem illinito. Et myrtum in uiuo coquito, & cum uiuo perluar. Aut oleæ folia, & rubi, & mali punicæ, eodem modo. Sit autē uinum pramniū. Atq; hæc quidē ſic faciendā ſunt. Et perſeæ arboris uidelicet folia terito, & ad pudenda apponito. Aut anethi & apij ſemen tritum illinito. Si feruido ac ſuperficiario ulcere pudenda laborēt, ſic curare oportet. Carnem bubulam longitudine duorum palmorum paruorum, craſſitudine uero ligni quod in foramen bipennis immittitur, pudendi uidelicet uirilī forma, uſq; ad uelſeram apponat. Noctū uero auferat. Poſtera die autem rurfus apponat uſq; ad meridiem. & bibat uinum dulce, melle ad uinum ammixto. Collutio ſi ulcerati fuerint uteri, & ſi urinæ ſtillicidiū uexarit. Porrum, ſambuci fructum, ſeſeli, aniſum, thus, myrrham, & uinum æquali menſura ad horum ſuccum. Hæc mixta & feruefacta frigeſacito, & moderate colluito. Aut mel, butyrū, medullam, & ceram immittito, ac illinito. Ad ulcera quæ in pudendo ſunt ac enaſcuntur. Folia oleæ, & rubi, & hederæ, & mali punicæ dulcis terito, & uino ueteri diluta, noctū in lana pudendis apponito, & pro cataplaſmate adhibeto. Quum autē dies uenerit, detrahito, & myrti baccaſ in uiuo coquito, ac colluito. Aut anferis adipem & refinam liquefacito ac infundito. Aut butyrum & oleum cedrinū, modo dico melle ammixto infundito. Ad ulcera in utero reſiccanda. Argēti florē in uiuo terito ac infundito. Aut butyrum cū melle infundito. Aut bryoniam albam, & myrrham, & mel, uino diluta infundito. Poſtridie uero uino nigro tepido eluito. Aut lentifci folia in aqua coquito, et cum hac poſtea colluito. Si ulceratum fuerit os uterorū, Butyrum, thus, myrrham, refinam, medullam ceruinam infundito. Aut lenticulā in aqua coquito, & cum excolata aqua colluito. Quū uero aqua ex uteris fluxerit, & ulcera fuerint, & lancinarint, anferis adipem & ouū illinito. Aut ouillum aut ſuillum adipē, & lentem in uiuo coquito, & hoc pari aqua temperatū infundito. Quæ uero in pudendo ſunt ulcera, cum hoc perfundito, & mannam thuris, rubum, pini corticem inſpergito, & cum aqua horum lauentur. Expulſorium ſi mortuus fuerit foetus. Galbanum oliuæ magnitudine linteo inuolutū, ac oleo cedrino tinctum, ad os uteri apponat. Aliud. Calamum odoratū, & cucumeris ſylueſtris medullam, cum adipe anferino terito. Deliget autē umbilicum & pectūnem, & de hoc

modicum lanæ instillatū, ad os uteri apponat. Et ab hoc paulatim extrahetur.

Aliud. Rubiā & cedri ramenta cōtundito, & aqua affusa sub dio per noctem exposito. Deinde mane ad dolores partus exhibeto. Aliud. Silphij drachmam unam, & porri succi acetabulum, cedrini olei dimidio cyatho paruo ammixto, bibēda dato. Aliud. Tauri fel oboli unius aut semioboli ponderis, in uino terito ac exhibeto. Aut fermento oblitū, torrefactū deuorandum dato. Aliud. Cancros fluuiatiles quinq; & rumicis ac ruta radicem, & fuliginem de furno, omnia simul trita, et cum aqua mulsa unita, sub dio per noctem exponat, & ieiuna ter bibat. Aliud. Cucumeris syluestris medullam tritam, in cedrina picelā inuoluito, & cum filo ad pennam deligato, apponat autem intro, ita ut pennæ dura pars paululum foras prominat ex lana. Quum autem sanguis apparuerit, amoueat. Aliud. Veratri nigri uirgulam longitudine sex digitorum lana obuoluito, extremam uero ipsius partem nudam finito. Deinde quæ maxime intro apponat, & ubi extrema pars cruentata fuerit, amoueat. Aliud. Veratrū nigrum, & cantharidas, & conyzam in aqua terito, & glandulam mollem sex digitorum longitudine efformato, siccato, & ubi dura facta fuerit, lana inuolutam apponat. Summam autem partem cedria illinat, sicut ipsa nuda. Quum uero sanguis apparuerit, amoueat. Aliud expulsiuum. Si foetus mortuus aut syderatus intus fuerit, ranunculum & elatern parum in aceto meraco misceto ac bibēdum dato. Aut brassicę tener coliculus, in summa parte netopo illitus immittatur.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS MULIERIEVS LIBER II. IANNO COR

nario Medico Physico interprete.



LUXXVS albus in senioribus mulieribus magis fit, quæ in iunioribus. Fluxus fuluus in utrisque. Fluxus ruber in iunioribus. Et ruber quidem fluxus fit ex febre. Magis autem ex abortu. fit & ex mensium interceptione, quum conclusi derepente eruperint. Fit etiã ex partu & febris. & sanguis profluit ualde multus, & grumi excidunt. Et dolor fit clauicularum ac tendinū. & corporis torpor, & crurū perfrigeratio. Aliquando uero etiam nasus effundit ad dentes, si amplior sanguis discesserit. & sudor multus diffunditur. Ad hæc & stomachi morbus fuit, & perfrigerationes, & febris bilis meracæ ac pruriginosæ. & eadem die sæpe rigent, & rursus sudant. & aliquando à supernis locis conuulsiones ipsi fiunt, aliquando ab infernis. & ad inquina dolores acuti ac fortes irruunt, procedentes uelut dolores partus. Quum doctæ etiam urinæ stitilicidium adest, & os siccū est, & sitis premit, & lingua aspera est. & digiti pedum magni contrahuntur, & ad furas semper cū femore distenduntur. Et lumbi dolore uexantur. & manus impotentes fuit. Quum autem huiusmodi fiunt, tunc etiam neruorum antrosum ac retrorsum distentiones fieri solent, à clauiculis iuxta iugulum, ad maxillas & linguam. A talibus uero paulo post retrorsum, à tendinibus iuxta spinam, ad lumbos. atque sic per uolentiam pereunt. prædicere igitur oportet fluxibus inchoantibus, & diætam cōstitueret hoc

hoc modo. Mane quidem dandū est pharmacum ad fluxiones, ex his quæ ego describam, quocūq; maxime opus habere uisæ fuerint. Dandū autem & ter & quater, si multus sanguis discesserit. Diæta igitur cōstituat, si quidem sine febre fuerint, ex cibis. Si uero febricitarint, ex forbitionibus. Sunt autē ex forbitionibus hæc cōmodissima, panicū, lenticula, farina horni ac recentis tritici cocta, alica cocta forbilis, zea cocta. Ex potionibus uero polentæ pollen in aqua, &amenta à panibus derasa contusa. Et polentæ recetes tenues in aqua madefactæ, quas etiam insulas delingere prodest. Ex cibis uero panis exaffatus in cinere. Obsoniū autem sit leporis caro, & colūba, ac palūbis, & cocta, & affata. Et hoc di caro affata, nullo ascititio cōdimento addito, sed ut in acetiū saltem intingāt. Hepar item capræ aut bouis in cinere affatū. Qui tenue, aut ipsum luteum. Cæsfeus infulsus. Ex olenibus autē nullum gustent, neq; coctum, neq; crudum. Et à balneis abstineant. Et manus ipsi deligato, ita ut lana fordida ipsas circundes, & laqueū immittas supra cubitos, & ad poplites, supra genua. Et cū cucurbitis sub mammas affixis, ipsas eleuato, modo ad dextrā, modo ad sinistram partem translatis. Si uero spirādi difficultas oriatur ad cucurbitæ admotionē, cucurbitam amoueto, sanguinē autē ne detrahit. Verū subditū utere, quæ ego describam, & ad sistendū sanguinem in talibus sunt apta. Et si quidē ex fluxionibus mulier euaserit, ubi multus sanguis discessit: et color est exalbidus, et facies eleuata, & sub oculis tumores laxi, & crura turgida, & uterus humidus, ac semper præter rationē hians. Et quæ discedūt aquosa sunt, uelut à crudis carnibus succus. Talibus si robustæ fuerint, uomitus ciere oportet ieiunis, & post uomitus prandiū exhibere. His cōducit modicus cibus. Vinū nigrum meracius. Illu uies, aut frigidæ lotio. Deambulationes. Semel in die cibū capere, omnis refectio. Si uero ad hæc nō sedentur, neq; cōfidant uteri, neq; à fluxionibus liberentur, respectū uiriū corporis habito, si quidē robusta fuerit, ueratrū dare oportet. Si uero nō obediat, caput purgare. facta autē purgatione, per diætā reliquā curare eodem modo uelut circa steriles. Cōsiderare porro oportet etiam naturas mulierū, & colores, & ætates, & tempora, & locos, & uentos. Aliæ enim frigidae, aliæ humidae ac fluida. Aliæ calidae quidē, sicciore autē & stabiles sunt. Nam quæ superalbidæ sunt, humidiores sunt ac fluidiores. Nigræ uero, sicciore & acerbiores ac adstrictiores. Quæ uero uini colorē referūt, medium quiddam inter utraq; habent. Sic autē & in ætatibus cōtingit. Iuuentula enim humidiores sunt, et multo sanguine plerūq; refertæ. Anicula uero sicciore, & modicum sanguinē habetes. Mediæ uero mediū quiddam inter utraq; habet, ut quæ nunc æquales existunt. Oportet autē eū qui recte hæc tractare uolet, semper mulierum naturas discernere, & temporū occasiones, & ætates, & tempora, & locos, & uentos. Si fluxus in utero obortus fuerit, sanguis multus fluit, & grumi cōpacti excidunt. & dolor occupat lumbos, & laterū mollitudinē, ac imum uentri. & durus est uenter, & ad contactū dolet. & rigor ac febris acuta corripit, & debilitas oboritur. & omnia præter humeros ac scapulas dolet. & calor inuadit, & rubescit. & uenæ duræ sūt ac renitentes. Morbus hic maxime fit ex abortu. Fit & quū menses multo tēpore retenti derepente eruperint. Huic ubi sic habuerit, grossum siccū contusum ac cribratū in linteum alligato, ac apponito. & imo uentri perfrigeratā imponito, cauens ne horreat. Postq; autē fluxus steterit

rit, oleæ syluestris folia in acerrimo aceto coquat, eoq̄ pudēda perluat. Bibat autem uinaceā. & rhoem rubrū in aceti acerrimi hemina dimidia coquat, & eo pudenda perluat. Aut mora rubi rubra siccata ac trita, cū farina recentī, pari portione mixta, ieiunā bibēda dato. Si uero fortius facere uoles, duabus farinae partibus ammixtis, bibendum dato. Et ne lauetur. Cibis aut utatur ficcis, & uino nigro uinoso. Si uero intumuerit, fluxu iam sedato, pharmacū deorsum purgans bibendū dato, post pharmacū autē uteros grossorū decoctio colluito, & postea acerba infundito. Si uero his factis, humectā fuerit, suffitum faciat donec reficet. Ruber fluxus fluit talis, qualis sanguis uictimæ recēs maclatae, & grumi pellucētes. Aliquādo uero etiam fluxū rubrū emittit, & uenter imus attollitur, & attenuatur, & impotēs fit, & indurescit, et ad contactū dolet, uelut ulcere preffente. & febris habet, & dentiū fremitus, & dolor ad ipsa pudēda, & pubem, & lateris mollitudinē, & lūbos, & tendinē, & uentrē, & pectus, & scapulas irruit. Et alias omnes partes dolet, & impotentia ac pusillanimitas occupat, & color mutatur. In principio quidē morbi hæc corripit. Si uero hæc omnia morā trahant, adhuc magis debilitatur, & manifestus est morbus, & cauae partes attolluntur, & pedes intumescūt. Morbus hic ex partu maxime corripit, si quid in ipsa dilaniatū non prodierit, sed intus cōputruerit, & foetus exasperatus fuerit. Hæc si in principio cōtingeris, spōgiam humectā ipsi adhibeto, quū fuerit dolor. Aut linteu tenue molle rasum, aqua frigida madefactū, uentri imposito, & aqua perfundito, & lectū à pedibus altiorē facito, atq̄ sic infertito, & ad mēses ciendos medicamentū quodcunq̄ magis admiserit, bibendū præbeto. Aprij semē torreto, & triticeam polentam cōmolito: & erysimū similiter, & peplij semen cū polenta cribratū, & rutica semen similiter, & scabiam oleæ syluestris, & gallam, & rutā, & origanum, & pulegiū cum polēta cribrato ac misceto: polentā uero crassam torreto, & triticeam polentam cōmolito: & caseum caprinū sordibus derasis, & de alijs quidē singulorū æquales portiones misceto. Organi uero et rutæ, & scabiei, & gallæ dimidiū. Hæc ieiunā ante motū bibenda dato. Miscere uero etiā oportet ad usum, si aciora prodierint, & cyceonē exhibere. Et de pharmaco quidē pars una sit, & casei una, & una polentæ. Ad uesperā aut melle ammixto bibenda dato, & donec quidē principii morbi fuerit, & sanguis multus prodierit, et modico tempore intermiserit, & dolores acuti tenuerint, hæc facere oportet. Si uero sanguis paucior fluxerit, & per breuius tēpus, ea quæ deorsum aut sursum ducunt bibēda dato, & pudēda lenibus fomētis foueto, prout semper opportunū uisum fuerit, & zeam unā cū cortice fractam, & grossos siccatos, tusos ac cribratos, & oleæ folia similiter, singulorū pares portiones in cataplasmate adhibeto, & lac bubulū coctū, aut crudum bibendū dato, respectu ad id quod recte habet factū, & prout opportunū esse uisum fuerit. & uidetur morbus hic debilis ac lethalis esse, & paucæ ex ipso effugiūt. Quū mulieri sanguis ab articulis fluxerit, à paru aut à labore corrupte, quidā putāt ex medicis hoc fluxū esse. Est aut aliud. Nam hoc quod ex articulis, & ex lūbis, ac coxēdice aliud est, glutinosum est simul cū sanguine. Illud uero quod ab uteris & cauis uenis fluit, sanguis purus est. Hæc suffire oportet hoc modo. zeæ fractæ semodiū aceto modico subigito, ut ne per torū uteros humectēs: & sulphuris uiui semiobolum ad zeas tritas ammisceto, & aceto subacta per noctē finito. Mane uero multo igne accēso, ob-

turamen-

turamenta de dolijs olearijs imposito, & fordes officinae füllonũ, & serpentis semen ammifceto. Mox aut multũ ignem tollito, & nõ urito, sed maxime suffu migare facito. Oportet aut scellam perforatã adesse, et mulierẽ uestibus contactã insidere, ut ne quid præterspiret. In ignẽ uero medicamentũ cum aceto præparatũ inspergito, itẽq; de semine serpẽtis. Sed & myrrha ammixta efficax est, ut suffusa pudendorũ cruentationẽ sedet. Si uero fatis habuerit, erysimi semen torrefactum terito, & in uino exhibeto. Fluxus fuluus fluit uelut ex ouo uitiofo multus & graueolens. & uteri inflammãtur. & dolor ex lumbis & inguinibus emergit. & prodeũtia multa sunt, & si nõ liberetur, celeriter fluẽtia. At etiam si tempus accedat, quæ restãt putrefacit, q̃ maxime id fieri potest. Riget enim, & uelut à carnibus affatis humor defluit. et cũ his simul febres fortes ac rigores fiunt. Ex huiusmodi uero fluxibus multæ pereũt, pauca effugiunt. & si quidẽ in principio accesseris, sic curare oportet. Si sine febre fuerint ac robustæ, ueratrũ ipsiis dato, et intermissis tribus aut quatuor diebus, pharmacũ deorsum purgãs exhibeto. Post purgationẽ uero sic diætã cõstituire debes, quo fluxiones a quo sæ sint ac tenues. Mane quidẽ ieiunã pharmacũ aliquod ex his quæ ego describam ad fluxũ, ebibendũ dato in uinũ inspersum. Post pharmacũ aut, alia diætã curato. Vteros uero sic curato. Si quidẽ inflammati fuerint ac conclusi, fomẽta adhibere oportet mollia, donec os uterorũ molle fiat. Post fomẽta, infusis qualibus opus habere uisã fuerint, colluito, siue magis purgãtibus, siue mollioribus. Post collutiones, mollitoria apponito. Si uero nõ facile solubile sit osculũ, foueto & subdititijs mollito, quæ ego describã, donec apertũ fuerit. Quod si ad hæc fluxiones nõ sedentur, caput purgato, & sic uictus rationẽ cõstituito. Si quidẽ sine febre fuerit, asininũ lac bibat, & oleribus coctis hortẽsibus ac syluestribus utatur, excepto alio, porro, brãtica & raphano longo. Ex marinis aut, raia leui, scorpio, cõgro, torpedine, anguilla, passere, gobio: coquere uero oportet cũ cepis & coriãdro, in muria dulci ac pingui, ita ut probe percoquãtur. Ex carnisbus aut, maxime suilla, deinde agnina, aut ouilla, coctis potius q̃ affatis, & ipsã rũ iusculis. Vino uero albo mellei coloris, aut aquoso. Balneis aut nõ ualde calidis, neq; multis, excepto capite. Si uero ex hac diætã, abulceratione & inflamatione liberẽtur, humidũ uero sint uteri, pro balneis quidẽ, illuuiæ, pro fuluis aut uinis, nigris, & pro aquosioribus, meracioribus, et pro polenta panibus, & pro piscibus carnib. affatis, & omnibus cibis siccãtibus, quibus sanẽ in alui profluuijs utimur. à collutionibus aut omnibus abstineat, excepto uino et aqua. Suffitus aut fiat per adstringẽtia. Optimũ aut esset si cõciperet. Si uero iuuenula fuerit, frequẽter ieiuna uomat, & postea parũ praudeat. Atq; hæc harũ fluxionum diætã est. Fluxus albus fluit uelut alba asini urina, & in facie sunt tumores albi; & partes ambe sub oculis tumẽt. & hydropiformes ac nõ ualde bona specie præditi sunt oculi, & splendor abest. & lachrymosi sunt oculi ac hebetes. & color corporis exalbidus ac pustulosus. & ueterimus tumidus. & in maxillis pustulæ paulatim rubẽtes, paruæ, aquosæ ac malignæ. & in crurib. tumores laxi, & si presseris digito, notæ imprimuntur uelut in fermẽto, & os salua impletur. & stomachi morfus percipiunt quũ ieiunã fuerint, aut etiã uomuerint uelut acidam aquã, & si ad æcliuem locũ procedũt, anhelatio citius corripit, & strãgulatione, & crurũ perfrigeratio, et genũ impotẽtia, & in ore ulcera feruida ac super-

ficiaria. & uterus præter rationē aperitur, & ad osculum procidit grauis, ueluti plumbū. Et dolores per femora tendūt. & omnia inferna perfrigerātur, ab imo uētre inchoantia usq; ad pedes. & plantæ torpēt, ac ingredi nō possunt. Tales difficile est à morbis liberare. Nam & ætate prouecta sunt, & afflictiones consenscūt. Nisi casus aliquis spontaneus forte fortuna allapsus ipsas soluat. Has ex haurire oportet quū redūdarint, per pharmaca quæ bilē flauā non purgāt. Sed urinā cientia his pota cōferunt, & capitis purgationes, & illuuiēs, & epithymi albi potus, & deabulationes. et omnis reficcatio in uictu. Hęc ubi fecerint, sanæ quidē penitus nō fiunt, facilius autē degunt. Fluxus albi alterius curatio. Purgatur albū subluteū, & quū mingit, morsum percipit, & lancinatur, et uterus ulceratur. & febris corripit acuta, & calor multus, sitis, uigilia, & mēte mouētur. Et quū aliquid festināter egerit, anhelatio ipsam inuadit. & mēbra exoluuntur. Hanc mecona, hoc est peplum albū bibere oportet, & urtica semē, & quod præstat, mali punicæ dulcis radicē, & rhoem, ac gallam. Hęc in uino acerbo bibēda dato, & mali punicæ succū, aut caseum caprinū ammisceto. Subter autē suffito zeam, & grossos hybernos, et oleę folia, & scabiē eiusdem, & cucumeris syluestris cortices ex tertia parte, reliqua paribus portionib. Sorbeat etiam olera cocta, & forbitiōes ex amygdalis & scamo, & gestetur ac curru uehatur, & nō quiescat. Alius fluxus. Desluit multū uelut urina ouilla, color est albus, & tora intumescit, & in tibijs eminentiæ laxæ & rubicundæ emergūt. & si digito attingas, notæ foueas præ se ferētes tibijs ac pedibus imprimūtur. & si quid edat, impletur ac inflāmur. & ubi iter fecerit, & opus aliquod obierit, anhelatio & dolor ipsam corripit, & color albus, quādoq; subluteus. huic si robusta & iuuecula fuerit, & alia apparuerint, ab initio pharmacū sursum ac deorsum purgās bibendū dato. & caput purgato, si pituitosa est, per ea quæ pituitā purgāt. Si uero biliosa, per ea quæ bilem. & si tēpus anni fuerit, & à natura nō est lienosa, & si quid ex relictis fuerit, serū dato. Decoquat autē hoc & bibat q̄ plurimo tēpore. & ad uesperam uinū dulce aquosum, si opus habuerit. Cibū uero ne cōtingat. Si uero debilis fuerit, forbitiōne modica utatur. & nō lauet. Postq̄ autē tempēstiuū esse tibi uidebitur, à potu cesset. et post purgationē cibus utatur, ita ut abstineat à pinguibus, & acribus, & dulcibus, ac falsis. et ab oleribus acribus. Vtatur autē piscibus petrosis, & carnibus ouillis, aut uolucrū, aut leporinis. pane frumētaceo, aut ex ordeo fresco. & oleribus coctis utatur, & syluestribus quæ cruda edūtur, itemq; hortēnsibus, acribus exceptis, & deambulet mane & à cibo. Vbi uero his factis ficior esse uisa fuerit, uteros fece uini colluito, & tribus aut quatuor diebus interpositis, postea acerba infundito. & intermissione facta, si quidē sicca fuerit, quiescito. Et si à natura fuerit biliosa aut pituitosa, à uictu uero & pharmacorū portione attenuata, & se recolligere nō poterit, lac bubulū bibat per quadraginta dies, calidū de uacca. Præstat tamē pituitosam cibis q̄ paucissimis uti, quādiu lac biberit. Sit autē mensura sex heminarū Atticarū. Incipiatq; à duabus, et singulis diebus unā apponat, donec sex fiat. & inde paulatim ad duas rursus descendat. & post lactis potū, cibus reficito & per uictus rationē. & post lactis potum, mane ieiuna adiantū bibat. hoc siccatū, rufum, & exacte cribratū, in uino nigro odorato diluto exhibeto. Si uero reuertatur morbus, totā ipsam foueto. & rursus pharmacis infra purgato, & postea uteros colluito, si quidē natura fuerit pi

tuitosa, per cnidii granum, aut thapsiæ radicē. Si uero biliosa, scāmōniæ succo, aut colocynthide syluestri, hęc enim coniectā, duabus aquæ heminis affusis, coquere ad dimidias oportet, & huic mel, & oleū narcisīnū aut anthinū ammiscere. Sit autē mellis quadrās hemina, olei uero hemiolii mellis, hoc est mēsurā ipsius tota, in superę dimidia. Postea uero colluendū est melle, & uino, & oleo solo, & suffitus adhibēdi, & tribus aut quatuor diebus quiescendū. Bibat autē adiantū, & si in uētre non cōceperit, morbus reuertitur. & si morbus reuertitur, perit. Quū uero seniores morbus hic corripuerit, etiā uteri computrescūt. Valde uero pauca euadunt. Alius fluxus. Purgatur uelut ex ovo crudo luteū sub albidum, & ulcerat pudendū, & tument pedes ac tibia. & cauæ oculorū partes intumescūt. & oculi humidi ac lachrymosi sunt. & si iter faciat, anhelatio ipsam corripit, & debilitas oboritur. Si uero euaserit, morbus pituitosus fuerit, et si nō purgata fuerit, febricitat, bile uehemēter cōmota. Seniores autē hic morbus magis inuadit q̄ iuniores. Quū sic habuerit, si quidē uehementer intumuerit, pharmacū deorsum purgās bibendum dato, quod pituitā & bilē purgat. Si uero nō fortiter tumuerit, & pituitā ipsam prefferit, pharmacū sursum purgās dato. et si quidē potens fuerit, ueratro purgetur. Sin minus, pharmaco quod bilem & pituitā ducit. Post pharmaca uero serū coctum bibēdum dato, per plurimos dies, cum modico sale. Edat autē in super mentā. Ad uesperā cibum ne attingat, sed modicū forbeat, & uinū dulce in super bibat, si opus habuerit. Si uero nō affuerit serū, lac asininū coquito, et exhibeto per quatuor dies. Ad uesperā uero eadē faciat, nisi febris noctu corripiat. Si uero natura fuerit lienosa, aut flatuosa, et ex anguis, necq̄ serū, necq̄ lac bibat. Sed purgātibus inferne purgato. & ubi tibi rēs pestiui uisum fuerit, uteros colluito, primū quidē medicamēto ex uini fece, bis aut ter. Post hoc scāmōniæ succo. Affundito autē ad hunc, uinū dulce, hemina Atticæ mēsurā, & olei narcisīni maxime, quartā hemina partē. Postridie uero cū uini hemina colluito, et mellis quarta hemina parte, et resinę tertia mellis parte. Oleum autē sit mellis æquale. Si uero ea quæ ab infusa collutione secedūt prodierint pituitosa, etiam rursus colluito, interpositis tribus aut quatuor diebus, postea grani cnidii duas potiones decorticato, & ipsas infundito. Si uero non affuerit cnidium granū, radicis thapsiæ potione unam infundito. & postea ipsam colluito, postq̄ aut purgata fuerint ea quæ secedūt ad has collutiones, & si prodierit aliquid cruentum, uelut ab ulcere, per acerba postea colluito. & si post hæc ipsa interrogata, dixerit os uterorū durū esse, et dolorē habere, eodē modo eo quod paratur cū butyro colluito, donec uteri fuerint reficcati, & sana esse uidebitur. diebus uero inter collutiones intermedijs, sambuci fructū bibat, & leporis coagulū, & pepeli corticē, & urticæ semē, & mali punici dulcis corticē, ita ut de singulis pares portiones terat, & polentā ac adiantū ammiscat, & in uino nigro odorato ieiuna bibat. cibus aut utatur mollibus, nō salis, necq̄ acribus. Carnes aut præstāiores sunt pisciū, aut uolucriū, aut leporinæ. & lauetur calida nō multa. Si uero non quiescat fluxus, sed relinquantur, & uteri humescāt, medicamentū ex malicorio suffiro. & postea uirū accedat. & si in uentre cōceperit, sana euadit. At seniores à morbo leuari nō possunt, sed pereūt præ debilitate. Fluxus alius. Fluuit subluteū uelut ex ovo, & uiscosum, & uēter imus intumescit, ac durus fit. & si cōtingas dolet, & dentibus stridet, & febris occupat. & dolor

ad pubem, & ad pudenda, & ad inum uentrē, & ad lūbos irrūit, & animi deliquiū, & anxietates, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manum accelerātes, debiles, deficientes, & statim pereunt. Si uero superstes manserit, & color ipsi mutatur, & fit uelut fauus aut cera, & si corpus digito prematur, mollescit, & notā uelut in massa farina subacta fermēto imprimūtur; & pedes intumescunt ac crura. Hic autē morbus fit maxime, si in ipsis aliquid dilaniatum fuerit, aut intus computruerit in partu. Seniores autē magis afficiūtur. & huiusmodi morbus non est ualde leuis. . . Alius fluxus. Purgatur uelut à carnibus affatis humor, & pudendum exulceratur, & ad quācūq; aliam corporis partem destillat. Et rigor, & febris acuta, densa, magna, & simul horror corripit. Dolores autem quales in omnibus fluxibus. Hac tōta intumescit, & infra umbilicum, & cruribus, & color fit morbi arcuati. Talis autē fluxus ex hoc fit. Postquā sanguis exhaustus, subbiliosus factus fuerit, & nō fuerit purgatus. Quū sic habuerit, pharmacū bibere oportet, si quidē fortis fuerit, ex ueratro. Si uero debilis, radicē & elateriū, & posteriore tempore lac caprinum. Aut pharmacū deorsum purgans dato, quod bilem & pituitam ducit. Vteros autē medicamento cū brasicæ decocto parato colluito. Bibat autē saluiam, hypericum, apij semē, singula in uino nigro austero. Ieiunā autē hæc bibenda dato. Si uero ulceratū fuerit pudendū, postea buryro colluito. Deinde pharmacū bibendū dato, & ulcera buryro, resina, myrrha, flore argenti illinito. Perluantur autē myrri ac saluiæ ex aqua decocto tepido. Cibis utatur neq; salis, neq; acris, ut ne mordax urina fiat, & à marinis prohibeatur, & carnibus bubulis, & ouillis ac porcinis. Alijs autē carnibus utatur coctis. Edat etiā panē, & uinum uetus odoratum nigrum bibat. Si uero hæc fecerit, & sana nō fiat, totam foueto, & postridie pharmacū sursum purgans dato. Deinde intermissione facta, rursus quod infra purger, & si quidē manserit fluxus post pharmaca, decoctū serum quotidie bibendū præbeto. Vesperi uero forbitionibus, & uino dulci albo utatur. Si uero non affuerit serū, lac asininū coctum per dies quatuor bibat. Ad uesperā autē ipsidem utatur. Postea per dies quadraginta lac bubulū calidum bibat. & per diem nihil edat, ut ita dicā. Optimū enim hoc est. Nam & purgatur, & nutritur, & fluxus obtunditur ab huiusmodi lacte. Vesperi uero cenet carnē uolucris modicam assatā, & panem modicū subcineritiū. Bibatq; in super uinum nigrū uetus uino sum, quādiu lac biberit, si multa prodierint, & acrimonia uexarit, & si his factis in utre coneeperit, sana fit. Quācūq; uero seniores sunt, in his morbus quādoq; reuertitur, & pereunt. Iuueniculis autē nō est lethalis. Diuturna porro est saniosi fluxus curatio, fluit autē talis subcruentus, uelut à carnibus affatis humor, & mordet uelut muria, & corrodit ac exulcerat pudenda. & uterus exulceratur circūcirca, et femora, & alia partes, & ubi super uestes destillat, tinguntur & egre elui possunt, & ueter attollitur ac durus fit, & ad contactū dolet. & calor corripit, & dolor ad pudēda, & sedē, & in uentrē, & laterū mollitudinē, & coxas, & lūbos irrūit, & impotētia adest, & color mutatur, uelut morbi arcuati. Si uero tēpus & morbus producat, hæc omnia amplius corripit. & caua partes attollitur, & pedes tumēt, & crura à lūbis. At hic morbus corripit ubi quid de fetu dilaniatū fuerit, aut in abortu, aut in partu. Oportet autē fomēta adhibere, & suffire, & bibēda præbere omnia eā quæ fluxū sistūt. & lac asininū et alia bere

bere. et uomere si opus fuerit. Si uero sine febre fuerit, & debilis febris habuerit, siccum fomētum adhibere melius est. Quū ad caput cōuersi fuerint uteri, & hac parte suffocatio desinit, caput grauat. Verū alijs alicubi aliās finis habetur. Signū autē hoc est. Venas in naso, & partes sub oculis dolere dicūt. & sopor alior tenet, & spumat, ubi leuius habuerit. Hāc multa calida lauare oportet. Si uero nō obediāt, frigida etiā circa caput, ita ut laurū et myrtum in aqua coquas, ac frige facias. Vnguento autē rosaceo caput illinatur, & odorata subter suffiantur. graeolentia uero sub nares. & brasicā edat, & succū sorbeat. Si uero ad cōgressū uteri suffocent, & aer impeditus uiolenter attrahatur, anxia est & uomit, & quibusdā statim tractus deorsum cedit, & flatus exit, & aliqua quidē uomit spumosa, alicui uero quies cōtingit. Quibus autē non decedunt, his porri semina, & peplū, trita & tribus aquae cyathis diluta, bibēda dato. Auxiliatur & acetū albi cyathus potatus. Aut iuniperi fructū & saluam dato, aceto aut uino ad has species ammixto. Oportet autē ipsam calefieri. Aut adipē fumere anserinū, & ceratū refinatū ac picem, in ipso liquefacere, & subdititias glādulas efformare. Quū autē ad praecordia allapsi strāgularint, ubi hic fuerit affectionis soliditas, & uomitus feruidus acris corripit, & modico tēpore mitior fit, & dolor ad caput & ad collū penetrans. Tepefactoria igitur apponito, si sursum strāgularint. Sub nares uero graeolentia sufflito, sensim progrediēdo: Si enim aceruatim uteri infra decedūt, turba oboritur: Odorata uero inferne. & castoriū ac conyzam bibēda dato. Quū uero deorsum tracti fuerint, abomināda subter sufflito, sub nares autē odorata. Si uero dolores quieuerint, pharmacū deorsum purgans bibendū dato, & postea lac asininū aut serum bibendū praebeto, si nō leuosa fuerit à natiuitate, aut exanguis, aut decolor, aut aurū sonitus habuerit, uelut haec quibus propter cognationē morbi à iuētute sunt familiares. At supernum uentrē ne moueto, cæcutiēt enim, aut circa fauces turbationes, & alia instabūt. Verū prisanæ succū dato. Si uero etiā ualde facilis sit ad uomitū, uomat. Collutio autē optima est ex narcisso. Subdititium uero id quod ex cātharidibus praeparatur. Quū uteri apud praecordia cōsiterint, suffocatur uelut à ueratro, & recta ceruice spirat, & stomachus fortiter uellicatur. Quaedā etiam uomunt quandoq; saluā acidam, & os aqua impletur, & crura perfrigerātur. Tales si nō breui à praecordijs uteri discedant, loqui nō possunt, & partes circa caput ac linguam torpor occupat. Proinde ad uteros quidem lanam q̄ maxime fieri potest ad foramē apponito, ita ut pennā obuolutā, unguento albo aut Aegyptio, aut Bacchario, aut amaracino tingas. In nares uero, de pharmaco nigro ad caput praeparato, specillo exceptū infarcias. Si uero hoc nō fuerit, silphij succo nares illinas. Aut pennā aceto tingito, & immittito, naresq; illinito. Aut sternutatoriū apponito. Quū autē conclusum fuerit osculū & internus trames, castoriū in uino bibendū dato. Nares uero phocæ adipe illinito. Lanā autē appositā sinito, donec cōsident. Quū autē quieuerint, aufferre oportet. Si uero ea ablata rursus recursarint, lanā rursus eodē modo apponere. Sub nares uero cornu caprē nigrū, aut ceruinū suffire, scalpum & in cinerē calidū inspersum, quo maxime suffus migetur, & nidorē sursum per nares q̄ maxime potest trahat. Sufflito etiā phocæ adipe, prunis testāe impositis, ipsaq; obuoluta, et capite imminēte, quo odor maxime ingrediatur, ita ut de adipe instilles, & ipsa odorē sursum trahat, os ue

ro clausum habeat. Et si quidem sursum allapsi fuerint uteri, hæc facere oportet.

Si uero ad hepar cõuersi fuerint uteri, mulier derепente uoce destituitur, et dentes cõferti sunt, & color liuidus fit. Derепente uero hæc patitur sana existēs. Contingit autē maxime uirginibus antiquis, & uiduis quæ pepererūt aliquando, & uiduitatem agūt. Maxime uero contingit omnino nõ ferentibus uterū, & sterilibus ex partu. Non enim prodit puerperij purgamentū, & non intume scit uterus, neq; mollitur, neq; uomūt. Quum sic habuerit, tumorē ab hepate cū manu infra leniter detrudito, & præcordia cū fascia deligato, & os aperito. *Vi*num uero odoratissimū dilutum infundito, quādo sanē etiā graueolētia ad nares adhibere ac suffire cõuenit, ad uteros uero odorata & suffimēta. & postquā sic curaueris, pharmacū deorsum purgans bibendū dare oportet, si quidē bilio sa fuerit, quod bilē purgat. Si uero pituitosa, quod pituitā. Et postea lac asininū coctum bibendū præbeto, & uteros odoratis foueto, & medicamentū quod cū bupresū præparatur apponito, postridie uero netopum. Interpositis autē duobus diebus rursus uteros odoratis colluito, & postea intermissio die, aromatis suffito. Atq; hæc uidua faciat. Optimū autē in uentre habere. *Virginē* uero per suadero ut uiro cohabitaret. Ad nares autē nihil adhibeto, neq; medicamentū *ies* uena bibat. Verū castorium & conyzā in uino odoratissimo bibat per dies uiginti, & caput odorato aliquo ne ungat, neq; aliquod odoratū olfaciat. Si uero uteri inflammati fuerint circa latus, si cõtigeris durū apparet. & quum ad præcordia allapsi fuerint, strāgulant. & uomit pituitam acidam, & dentes stupe scūt. & ubi uomuerit, melius habere uidetur. Quū uero deorsum processerint, discedunt de uentre aliās alio, Maxime uero ad laterū mollitudinē quandoq; incidunt, & ad uescicā, & urinæ stillicidiū corripit. & ad sedem, & cacare sibi uidetur. & mēses prius aut posterius solito fiunt, aut nõ statim huic apparēt. In hoc morbo si sursum strangularint, tepefactoria apponito, & graueolentia ad nares suffito, ad uteros autē odorata, & conyzā fceminam, & castoriū, in uino ieiuna bibat, postq; uero ad naturā suam cõfederint, placide suffito. Bibat autē urinam cientia. Atq; hæc faciat q̄ diu dolores tenuerint. Vbi uero quieuerint, totā foueto. Deinde pharmacū deorsum purgans bibendū dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat; si pituitosa, quod pituitā ducit. & lac asininum bibendū dato, aut serum caprinū decoctum. Si uero lienosa fuerit, lac ne bibat, neq; serū, & in purgationibus, cibus utatur mollibus, & per aluum fecedentibus, pisces autē meliores sunt carnibus, & uteros foueto, aut subdititijs purgato, ipsosq; colluito. & ubi suffitum admisit, ad uirum accedat. Solutio uero morbi cõtingit, ubi in uentre cõceperit. Si uteri ad latera allapsi fuerint, tulsis obtinet, & dolor sublabatus, et in sidet uterus durus uelut pila. & ad contactū dolet, uelut ab ulcere, & cõtabescit, & uidetur ipsi peripneumonia esse, & cõtrahitur, & gibbosa fit, & mēses non apparēt, Aliquibus autē quibus prius apparuerūt, etiam pereūt. & si tūc prodeāt, imbecilles sunt, & pauci, ac deteriores, & genitura nõ fit hoc tempore. Quū sic habuerit, pharmacū deorsum purgās bibendū dato, & multa calida lauato, & ex tepefactorijs quecūq; admiserit adhibeto, et à quibus sanguis purgatur ea apponito. Et lini semē torreto, tūdito, ac cribrato; & peplū albi, & saluā cū tenui polenta, et caseum caprinū muria derasa. Hęc misce, ut casei sint partes duæ, reliquorū uero, et polētæ nõ salfæ pars una, et ieiunæ in uino bibēda dato.

Vesper

Vespero uero cyceonē crassum melle affuso exhibeto, & ex potibus quencūq; admiserit bibendum dato. Et frequenter fomentum adhibeto. & calidam aspergito. & per ceratum leniter mollito, ac à latere detrudito. & latus fascia lata deligato. Et lac bubulum q̄ plurimum ad dies quadraginta bibendū præbeto. Cibis autem utatur q̄ mollissimis. Morbus hic uehemens est & lethalis, & pauca etiā sic curentur effugiunt. Si uero in lumbis fuerint uteri, aut in lateris mollitudine, & spiritus sublimis iuerit, et suffocatio habeat, et anhelatio denfa ipsam corripit, & moueri non uult: sulphur, aut bitumen, aut cicutam, aut myrrham terito, & melle cocto affuso, glandulam longā efformato ac crassam, eamq; in sedem indito. Si uteri deuoluerint seipsas ad intermediam lumborum ac coxarum partem, dolor habet imum uentrem, & crura cōtrahuntur, & iuncturas coxarum ad sedem dolet. & quū aluum exonerat, dolores emergunt acuti, & stercus cum uiolētia prodit exiguum, & urina destillat, & pusillanimitas ipsam corripit. Quū sic habuerit, fistulam ad uescicam alligare oportet, & oleum calidum in uteros infundere. Et fomentū adhibere, aut multa calida aqua lauare. & in oleum & in aquam desidere. Suffire autem subter pudenda, graueo lentia. sub nares uero odorata. postquam autem dolor quieuerit, pharmacū surfum purgans dato. Infernum uero uentrem turbare non oportet. Vbi uero uteri considerint, pharmacum deorsum purgans bibendū dato, & lac asininum, si non fuerit lienosa. Postea fomēta adhibeto uterosq; aspergito. et subditū purgatorium quod cum lauro præparatur, & non mordet, apponito. Deinde aromatis suffita, ad uirum accedat. & si in uentre habuerit, sana fit. Verum plerūq; steriles & cruribus mutilatæ fiunt. Quibuscunq; osculum aliò inclinatur, & ad coxam allabatur. Contingunt enim & hæc, quæ uterū purgari prohibēt, & geniturā suscipere, & liberos gignere. Hanc odoratis fouere oportet. & post fomentum, digito reuellere & à coxa disparare. & postea tædulis ac plumbeis fistulis immisis dirigere. Nō enim uelociter cogi potest, uelut dictum est. Quū autem ad naturalem situm redierit, & uteri aperti fuerint, subditij mollibus purgato, & alia cōuenienter facito. Quibuscunq; uteri ad coxam collabuntur, si non breui discedant, & rursus in locum suum redeant, ad coxam resiccantur. Necessarium est autem osculum auersum esse, & in supernis detineri. Quū uero auersum fuerit, conclusum esse. Ex auersione uero ac conclusione, durum fieri, & mutilatum esse. Vbi uero uteri conclusi fuerint, menses sursum ad mammam delegare, & ad pectus ascendere facit. & imus uenter attollitur, & inexperatæ in uentre se habere putant. Talia enim patiuntur, qualia prægnantes, usq; ad septem aut octo menses. & uenter pro temporis ratione crescit. & pectora eleuantur, & lac innasci uidetur. Quum autē hoc tempus præterierit, & mammæ graciles cūt ac minores fiunt, & uenter idem perpetitur. & lac euanescit. Venter item eo tēpore in quo se paritura sperabat, euanescit ac concidit. His uero contingentibus, uteri modico tempore fortiter contrahuntur, et osculum ipsorum reperire non datur, adeo omnia contrahuntur ac resiccantur. & in mammis tubercula fiunt dura, partim maiora, partim minora. Hæc autem non fiunt suppurata, sed semper duriora. Dein de ex ipsis nascuntur cancri occulti. Quum autem cancri futuri sunt, prius ora amarescunt, & quicquid ederint, omnia amara esse uidentur, & si quis plura dederit, accipere renuunt, & compescenda faciunt.

Mente

Mente uero percelluntur, & oculi duri fiunt, & non acute uident. & ex mammis dolores ad iugulum transiunt, & sub scapulas. & fitis tenet. & mammae graciles, & ipsae per totum corpus attenuatae sunt. & nares siccae ac obstructae sunt, & non leuantur. Spiritus est imminutus, & nihil omnino olfaciunt. & in auribus dolor quidem non oboritur, uerum aliquando callosa concretio. Quum igitur ad hoc temporis progressae fuerint, sanae fieri non possunt, sed pereunt ex his morbis. Si uero priusquam huc perueniant curatae fuerint, & menses soluti fuerint, sanae fiunt. At uero curare tales oportet hoc modo. Primum quidem omnium si adhuc fortem assumpseris, reliqui corporis respectu habito, quacunque tandem purgatione opus habere uideatur, medicamentum exhibeto. Vbi uero corpus praeparaueris sic ad uterorum medelam procedito. Si uero totum corpus minime mouendum esse uideatur, neque morbi causae hinc proficisci, uerum uteri a seipsis morbum habeant, curam hoc modo auspicare. Primum quidem uteros sic foueto. Ollae duas sextulas capiendi, operculum imposito ac adaptato, ut nihil praeterpiret, deinde uero operculi fundum pertundito ac foramen facito. In foramen autem arundinem indito longitudine cubitalem. Oportet autem arundinem operculo probe adaptari, ut penitus nihil praeterpiret. Quum autem haec praeparaueris, operculum ollae obdito, lutoque oblitito. & ubi haec feceris, fossam duorum pedum altitudine effodito, ea magnitudine quae ollam capere possit, postea uero ligna immissa urito, donec fossa ab igne excandescat. Quod ubi factum fuerit, ligna ac prunas quae crassissimae ac ignitae fuerint eximito. Cinerem uero ac fauillam in fossa relinquito. Quum autem olla efferbuerit, uapor sursum processerit, si quidem ualde calidus fuerit uapor, abstineat. Si uero non, summam arundinis parti insideat, ipsamque in uteri stomachum indat. Atque sic fomentum admittat. Si uero perfrigeretur, prunas ignitas adijcito, cauendo ut ne acutum fomentum facias. Si uero adiectis prunis, acutum fiat fomentum, magis quam conuenit, prunas detrahit. At uero hoc fomentum clementi caelo parere oportet, ubi uentus non afflarit, neque perfrigeret. Ipsam autem indumentis obuolutam esse oportet. Ceterum in ollam allium siccum injicere oportet, idque magis cominum quam ea quae sunt contusa, & aqua affundere, quo ipsum permadescat, & aqua tribus digitis ipsum excedat. & phocae oleum superfundere, atque sic calefacere, ac fomentum adhibere per multum tempus. post fomentum uero si potens fuerit, laeuetur toto quidem corpore ad uoluptatem, lumbis autem & partibus infra umbilicum, amplius. In cenam porro dato mazam, panem, & allium coctum. Post die uero si quidem exoluta fuerit a fomento, eam diem intermittito. Sin minus, rursus fomentum adhibeto. A fomento uero si considerare hoc potest, osculum contingere iubeto, num fomentum ipsum uteros flatu implet. Si enim flatu implentur, osculum ex ualida auersione, & ad coxam allapsu magis dirigunt, ac aperiantur. Tanquam igitur tale sit fomentum, & haec facere possit, sic fouere oportet. Quum autem fomentum adhibebis, allium injicere oportet, & phocae adipem superfundere. Atque hoc faciendum est, donec uteri uidebuntur inflati, & osculum fortiter sursum tractum. Nam ad hoc fomentum talia contingunt. Post fomentum uero dietam constituito, uelut priusquam fouebatur. Quum uero commoti fuerint uteri, ac facile solubiles fiant, foeniculi radicibus foueto, & aliam ollam eodem modo praeparato. Radices autem foeniculi elotas contundi-

to, & in ollam mittito, & affusa aqua eodē modo fomentū facito. Postea uero la-
uato. & ad uesperam mazam coenat. Si uero panem uoluerit, & bolbidia parū
polyporum generis, & sepiolas paruas, in uino ac oleo coquito, & edēda dato.
At inter fomenti adhibitionem, ofculum contingere coneris, an fomentū ute-
ros propinquissime adducat. Hos fouere oportet ad dies quinq; uel sex, homi-
nis consideratione habita. & si quidem exoluatur ac debilis fit, differre ad suffi-
ciens tempus. Si uero non exoluatur, fouere per omnē diem. Post fomenta ue-
ro, subdititia apponere conare, ex albicante tæda pinguisima. Illitio autē sit
oleum, facito autem hæc lōgitudine quidem digitorū sex, numero uero quinq;
uel sex. figura uero in angustum abeunte. Sit autem alterū altero paulo breuius.
crassitudo uero eius quod crassissimū est, sit digiti indicis, & forma similis di-
gito, summa parte tenuissima, in processu uero crassior. Hæc autē leuissima ac
rotundissima facito, cauendo ne ulla ad sit fissura. Apponat autem primum id
quod tenuissimum est, & ubi apposuit quiescat, obseruans ne excidat. Appo-
natq; primum summā partem, deinde semper amplius, simulq; obtorqueat ac
circumcirca tædam intro trudad. & ubi parum susceperit, in hoc paruo se conti-
neat, cauēdo ne excidat. postea rursus eodē modo intro trudad, donec quatuor
digitorum mensura intra ofculum uterorum recipiatur. Quum autē hoc susce-
perit, alterum postea apponat simul ut prius in situm aufert, quo priusquā ofcu-
lum conuiueat recipiatur, dum adhuc rectum est & apertū. Hoc autē ita contin-
get, si alterū eximatur, alterum autē indatur. Oportet autē & plumbū simile figu-
ra crassissimæ tædæ formatum intrudere, quod cauum sit, quo continere quid
possit, plumbi uero amplitudo sit talis fabricata, qualis in ulcera impellitur, ita
ut os ipsius leue sit, & non fauciet. formato autem hæc uelut etiam subdititia ex
tædis. Quum autem factus fuerit huiusmodi plumbeus penicillus, adipe ouillo
trito ipsum expleto, & ubi ita preparatus fuerit, tædam quidē subtrahito, plū-
bum autem indito. Si uero plumbum appositum ardorē exhibeat, plumbū qui-
dem detrahito, tædam uero rursus apponito. Et plumbum in aquam frigidam
immersito, & postea rursus apponito, ac tædam eximito. Semper autē aliquid
appositum esse oportet, & interdū quidem melius est tædam habere, noctū au-
tem plumbū. Si uero surgere uoluerit, cū cautione hoc faciat, quo penicillus in-
tus quiescat. Sin minus, statim rursus subdatur. Si uero ex tædis appositis nul-
lam suscipiat, tenuiorem facito, donec suscipiat, ex his ad illa trāsendo, & obe-
dientes uteros faciendo. Si uero neq; ofculum aperiri poterit, neq; uteri pro-
pe accesserint, rursus ad ueterem medicinam redito, à prima ad secundam, donec
mollescant, & propinquissime accedant. Et postquā apertū fuerint subdititia fa-
cta apponito. Sint autem magnitudine oliuæ. Horum autem alterum appositū
sit donec liquecat, & deinde alterum apponito. Quum autem apponere uoles,
ipsum subditium medicamentū ex resina preparatū, in oleum rosaceum aut iri-
num tingito. Nam aliās ab ofculo uterorū recedit. Prius tamē plumbum appo-
situm esse oportet, quo recto ofculo, in internam ofculi partē attrahatur. Post-
ea uero mollitoria apponito. Lauet autem calida, & ante, & post subdititia me-
dicamēta. Et in cena exhibeto quid ex relatis marinis. Exhibeto autē duobus
aut tribus diebus ab appositione, considerationē habita an ofculum uterorum
bene habeat, & purum sit. Quod si est, ab hoc subditio quiescito. Postea uero

mollitoria apponito. Quum uero inflammatū fuerit os uterorum, rursus eodem modo pharmaca apponito, reliqua q̄p̄ facito iuxta relatum modum. Vbi uero probe habuerit corpus, uelut dictum est sufflato. Sed & osculū, & uteros sufflare oportet sic. Subditiū factū cum sicu apponito, duo autē subditiū facito, & antequā subdas fomentū adhibeto ex foeniculo prius relatum. post tridie uero post fomentum, apponito medicamentum. & quum apponere uoles, præ omnibus subditijs ubi prius laueris ipsam ita apponito. postera autē die mollitoria auxiliantur quandiu inflammati fuerint. post inflammationem uero, alia facito iuxta priorem rationē. facito item de hoc subditiū talia, qualia de priore. Et si quidem in mēse semel appositū, satis uidebitur inflasse uteros, quie scito. Si uero aliqua opus habuerit, rursus apponito eodem modo quo prius. Postea uero ubi bene habere tibi uisa fuerit, et tempestiuū esse, fomentū ex suffi mentis præparato, præparatur autem hoc modo. Cyperū tusum præparato testæ conchæ mensura, & calamum unguentariū eadem mensura, & iunci unguentarij tantundē, cardamomi tantundē. Cumini item Aethiopicī, & anisi, & rutæ sicca, & hyperici ac foeniculi feminis. Quū autē hæc præparaueris, uini aut steri albi odoratissimi heminas sex in ollam infundito, & de cōtus quadrantē inspergito ac permisceto. Deinde unguētī Aegyptij optimi, aut amaracini, aut irini, triū obolorū pondus affundito, permisceto, & molli fomētō plurimo tem pore foueto. Ante fomentū uero lauato, & duos aut tres dies foueto. Quū autē foueri desierit, operculū quoddam fomento imponere oportet, ut ne trāspiret. postea uero tædis & plumbis utere. Quū autem duobus aut tribus diebus fomentū adhibueris, alias duas aut tres intermittito. Intermedijs autē diebus bis in die lauato. Edat autē porrum coctū & crudum, & raphanos, & nasturtium, & allium assatum ac coctum. & potus sit meracior, & marinis prædictis utatur. Quum uero intermedij dies præterierint, rursus fouere oportet, ita ut modicū de singulis contusis ad prius fomentū inspergas, & uinum insuper affundas, si opus esse uidebitur, itemq̄ oleum, atq̄ cū hoc foueas. Postquā autem fomenta bene habere tibi uisa fuerint, & osculum molle esse ac apertū, uelut conuenit, & ipsi uteri prope postera die à fomento, pharmacū quod cum myrrha præparatur apponito. Sunt autē appositiua duo. postridie uero post purgationem, mollitoria subdito, quandiu uteri fuerint inflammati. postea uero tædis ac plumbis penicillis utere. Post hæc intermissis diebus quotquot uisum fuerit respectu ad inflammationes uterorū habito, & uiriū corporis coniectura facta, rursus uelut scriptum est refoueto. Si quidem prius fomentū adhuc sufficiens esse uidebitur, cōiectis ad hoc suffimētis uelut prius, & uino ac oleo affuso. Si uero inutile esse prius illud fomentū uideatur, aliud ex integro præparato. Oportet autem hoc pharmacū renouare in singulis adhibitionibus, quādiu subruenta purgātur. Si uero talia purgata fuerint, quiescat. Dieta porro hoc modo consu tuatur. Interrogato in quibus diebus menses ipsi prodierint, & ab his initio factō, hanc dietam præscribo. Primū quidem multa calida lauatur, capite excepto. Quum aut cessauerit, cafeum acrem, & rutam, uino nigro pari aqua temperato diluito, & postea polenta insperfa, statim ex balneo bibenda dato. Deinde prandium tempestiue exhibeto. Edat autē mazam aut panem, & porrū coctum aut crudum, & de huiusmodi omnibus acribus præscriptis, & aliquando legu minis

minis fracti decoctum: spumam autē ne detrahit, & silphiū multum derasum addito, ac multa allia incoquito. Obsonijs autē utatur pisciū, chartilagineis omnibus coctis aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto: bolbidij, polypodij, in uino & oleo, & silphij semen tritum bibat. & q̄ plurimum in pradio, tum in cœna edat. Lauetur autē post cenam, quum quiescere uolet. Hac diæta ad dies quinque uel sex utatur, post hos dies, mane ieiung sambuci fructus baccas sex, in uino meraco dato, & sepia ova decem aut duodecim. Hęc trita simul mane ieiunæ bibenda præbeto, post hoc uero pharmacū, potionē dato. At ubi interquieuit lauetur. Sit autē potio, ruta & caseus, atq; sic prandeat præscripto modo. Serius autem cœnet, & semper bis in die lauetur. Hac aut diæta ad dies tredecim aut quatuordecim procedat. Quū uero hi dies præterierint, catapotia ex succo silphij fabæ magnitudine formato, atq; hæc primū dato, postea uero alia præscripta facito. Quum aut dies trāfacti fuerint uiginti quinque in hac diæta, reliqua quidem facito eodē modo. Ante prandium uero ubi prandere uolet, alij legnēta quatuor, & caseum acrem tali magnitudine, terito & polentā modicam ammiscero, ac massam efformato, eamq; primū edendam dato. Ante cœnam uero meracū abforbeat, atq; ita cibum capiat. De cætero uero eadem diæta utatur. Quum autē nouem dies reliqui fuerint ad tempus mensū, primum hoc dato. Cum ouis & sambuco, cuminū Aethiopicū, et castorij obolum. Vbi uero duo dies reliqui fuerint, ab his omnibus potionibus ac catapotijs abstineat. Verum pharmacū cum tæda præparatū ieiuna ubi lauit, sumat. Post medicamentū uero potum, mercurialem & brasicā simul in aqua cocta dato, cū aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto, sale, silphio & oleo cōdita. Atq; hæc in pradio edenda præbeto, & succos sorbendos, & potum metaciorem bibat. Obsonijs autē utatur polypodio cocto aut sepiolis, & hæc quidem in pradio. In cœna uero sumat carnem caprinā, aut ouillam, aut agninam percoctā, & porrum, & alia acria, quæcūq; uouerit. A cœna uero lauetur, & hæc sit diæta postremis duobus diebus. Si uero ex hac diæta menses non fuerint detracti, sequēti mense eandem diætam ab initio repetito, usq; ad postremos duos dies. In quorum priore appositita facta apponat, iuxta superiore rationē, ex pharmaco in aqua facto. Apponat autē prælota. Verum cōsiderare oportet etiā uteros quomodo habēt, quo semper omni tēpore bene habeant, & os rectū ac apertum sit, & sita uisum fuerit ante appositionē fomenta adhibeto. Quod si eruperint menses, si quidem frequentes fuerint, paucioribus lauacris utendum est, & reliquā diæta ac curatione. Si uero pauciores, pluribus. Si uero significationē de se præbuerint, rursus eadem diæta utendū est, ac curandū donec menses apparuerint. Quum autē semel talibus prodierint, optimum fuerit in uētre concipere. Atq; hæc est omniū huiuscemodi morborū curatio. Si uteri contingat coxani, & incubant, dura ac solida sit coxa ad lateris mollitudinē, & dolores imi uentris, & ad ipsam lateris mollitudinē, & lumbos, ac crura dolor incidit ac extenditur, & suppurantur, & linamentis opus habent, et pereunt, nisi quid feces aut uras. Quū sic habuerint, pharmacū deorsum purgans bibendū dato, & multa calida lauato, & uteros foueto, ita ut urinā ueterem in peluim infundas ac feruēfacias, & supra ipsius cavitatē mulierem colloces uestibus cōtectam, ut ne præterspiret, & si frigēfiat urina, ferri igniti frustra in urinā immittas, et fomentū facias do

nec se obscure uidere, & animo deficere dixerit. Lauato autem calida aqua, & postea digito cōiungens os uterorū ad sanam coxā trahat. Et noctu mollitoria apponat. Postq̄ autē dixerit directū esse, factio prius cū odoratis fomento, rursus mollitoria quaedam apponito. Imō & plūbeos penicillos per triduū, singulis diebus unū, post hos uero bryoniā albam, aut scillam per triduū, postea uero cōsideratis mensibus disce, an bilio si sint, aut pituitosi, aut an sanguis sit corruptus, & si opus fuerit ipsi sanguinē purgare, quocūq̄ maxime opus habere tibi uisa fuerit, id apponito. Et postea cū eiusmodi colluito. Apponito autē subditiua medicamēta, donec sanguis purus educatur, & hoc per triduū facito. Deinde ceruinum adipem liquatū, molli lana eo imbuta apponat. postea per diē purlegium subdat. & aromatis suffita sic ad uirū accedat. Si uero ex partu morbus fiat, ubi ex urinæ fomēto penitus purgata est, statim ad odorata accedat. & postea lota, oleum albū Aegyptiū ad sanam coxā apponat, & super hanc decūbat. Si uero neq̄ ad hęc trālmoueātur uteri, ieiuna p̄coniæ grana nigra quinq̄ in uino odorato bibat. Et in cibo sumat allia cruda, & assata, & cocta. Obsonijs autem utatur paucissimis. Si uero sana nō fiat, similiter ipsam purgato uelut in priore dictum est. Cæterum in hoc morbo si nō statim in uentre habuerint, steriles fiunt. Si uero sic habuerint, mensesq̄ non fiant, neq̄ febrilis calor corripiat, primū pharmaci sursum maxime purgato. Si uero debilis fuerit, deorsum. Et post pharmaci potionē, si pituitosa esse uisa fuerit, uomat ieiuna, & accepto cibo. & plerunq̄ sana fiet. Si uteri ad coxam decurrerint, menses crassi existentes non prodeūt. Verū dolor ad imum uentrē procedit, & ad lateris mollitudinem, & morsum percipit. Quū sic habuerit, multa calida lauato, & allia plurima edenda dato, & lac conuenienter bibendū. deinde uinum meracum. & totam foueto, & pharmacū sursum purgans exhibeto. Si uero debilior fuerit, infra. Si uero curata fuerit, uteros cū foeniculo foueto, & absinthium ammīsceto. Postquā autē recens fora fuerit, os uterorū sensim cum digito ad sanam coxam detrahit, ita ut & ipsum os, & partes circūcirca affectas leniter mollias, & mollitorū quoddam apponas, & postea plumbeos penicillos, & mox scillam, deinde narcisīnū una die interposita. Quum uero pura esse uisa fuerit, netopū apponat in lana. & postridie oleum rosaceū. At mensibus prodeuntibus, melius est nō apponere. Si uero nō prodeant, cantharidas quatuor sine alis, sine pedibus, & sine capite, & p̄coniæ grana nigra quinq̄, & sepiæ oua, & apij semē modicum, in uino bibat. Et si dolor affuerit, & urinæ stillicidiū uexarit, in aqua calida desideat. & aquā mulsam aquosam bibat. Si uero nō purgetur, rursus pharmacū bibat. Si autem purgatio prodeat, ieiuna cum uiro coeat. Si uero nō prodeat, dato quod detrahat ipsam, respectu ad uires mulieris habito. & nūc tutum est ut ad uirū accedat. Si enim in uētre habuerit, sana euadit. In purgatione uero si multa prodeat, mercurialē edat, & polypos teneros coctos. & cibis mollibus utatur. Si puerperæ uteri in coxam incubuerint, aut ad lateris mollitudinē, ad alteram coxam oleum Aegyptiū album, aut rosaceum apponito. Sed & in sanam coxam decūbere melius est. Bibat autē p̄coniæ grana nigra quinq̄, & sam buci fructus in tēdis cōchæ testam maiore, & castoriū magnitudine fabæ. Et cibus utatur mollibus. Cōuenierit autē mercurialis ante cibum, cocta uelut brasiaca. Sorbeat autē & ipsam decoctū aquā. & acria comedat, exceptis raphano & cepia

cepis ac nasturtio. Optima est & lactuca. Quot uero morbos ex uteris fieri contingit: Dico autē quum uteri ex loco moti fuerint, aliō aliās allabuntur. Ad quēcūq; uero locum allapsi fuerint, dolores ingētes incumbunt. Et si quis uescam cōtingat, dolorem exhibēt. & urinam nō suscipiunt, neq; geniturā in se ipsos trahunt. & ambo dolent. & si nō celeres solutiones fiāt, uteri postea suppurant iuxta eosdē locos, si ad ipsos decurrerint. Cōtingit autē hoc & in laterum mollitudine, & in inguinibus, & super pectine. Ceterū in principijs quum dolor habuerit, sic curare oportet, & tepefactoria adhibere, & in aqua calida sedere. Bonum enim & hoc est: aut spōgij ex calida aqua expressis fouere. & phar maca uteris cōmoda bibere. Si uero ad hęc nō soluatur, pharmaco sursum aut deorsum purgare, utro tandē opus fuerit, cognosces autē id hoc modo. Si enim ad inguina, & pectinē, & uesticam irruerint, hęc purgatione sursum opus habēt. Si uero ad laterum mollitudinē, & pręcordia, hęc pharmaco deorsum purgātē indigēt. At uero huiuscemodi morbi omnes senioribus magis q̄ iunioribus fiunt, ad mēses suppressos. fiunt etiā iuueniculis, ubi multo tēpore uiduæ manserint. Si uero ad sedem cōuertantur uteri, secessus recremēta impediuntur, & dolores occupāt lumbos, & imum uentrē, & intestinū rectum ac podicē. Quū sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, & lumbis fomentū adhibere, et postea graueolentia subter suffire, & apponere quæ purgāt & impellunt uteros. & bibenda dare quæcūq; libētē admiserit ex maxime cōferentibus. Si uero incumbant in inguina, & urinæ meatus, dolores fiunt fortes, & torpor in cruribus. & urinæ meatus obruratur, & urinā nō emittit. Curare uero oportet hoc modō. Ad nares quidē odorata apponito, & unguēta. Ad uteros uero graueolētia suffito. Porro omnis occasio uteros propellere potest, si quid mali habeāt. Nam & à frigore pedum ac lumborū, & à saltatione, & terrore, & lignorū sectione, & cursu ad accliuē ac decliuem locū, & ab alijs multis propelluntur. Proinde hęc cōsiderare oportet, ad totū corpus respectu habito, quū præsentes morbi affuerint, propter talia enim omnia necesse est plus aut minus ægrotare. & postq̄ hęc reluxerint, maxime hac parte repētini morbi manifesti fiūt. Quū igitur hęc aduenierint, penitius ex tota homine deprehēdere oportet. Nam quæcūq; perfrigerationes crurū, aut stupefactiones ex frigore fiunt, hęc omnes etiā in uterorū morbis uteros eleuāt. In talibus itaq; aquā calidam affundere oportet uteris & circūstitis locis. & ipsos ac crura excalfacere, quū allapsi fuerint. Si circūuersi fuerint uteri ex partu ad dextrā partem, et puerperij purgamēta nō fiant, & dolor imum uentrē habet, & lumbos, & laterum mollitudinē. & dextrū crus grauuatur, & torpor occupat, & nō tremit, & osculum uterorū contingere non potest, sed ipsos leues ac fortiter planos deprehēdet. Quū sic habuerit, pharmacū bibēdum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis uero deorsum. & totum corpus foueto, & præsertim uteros leniter. & calida bis in die lauato. & ex potibus quēcūq; libētē admiserit, experimēto factō præbeto. & uiro frequēter cōdormiat. & brassicā edat. Si uteri ad sinistrā partem, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac uehēmēs habet lumbos, & laterum mollitudines, ac ipsū crus. & claudicat. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet, & postera die suffire hoc modo. Ordei chcenices duas, & olea folia parum cōfringito, & gallam cōtundito ac cribrato, & hyoscyami ternā chcenicis partem. Hac mixta & olei hemina dimidia subacta in olla noua, per dies

quatuor suffito. Nocte uero lac bubulum, & mel, & aquam bibat, & calida lauauerur. Si uteri tranſuerſim ſitū habeant, & obliqui fuerint, itemq; os ipſorū, menſes ipſi partim occultātur, partim prius cōſpiciui euaneſcūt, & non ſimiles ſiūt, ſed deteriores & pauciores q̄ antea, & genitura nō ſit hoc tempore, & dolor habet imum uentrē, & lumbos, & coxā, & ipſa attrahitur. Quum ſic habuerit, pharmacū infra purgans bibēdum dare oportet, & calida lauare, ac fouere. Vbi uero recens ſora & lota fuerit, digito immiſſo os uterorū corrigat ac dirigat, & odoratorum ſuffitum admittat, & ex potibus dato iuxta experimentū, quē libenter ſuſceperit. Cibis autē utatur mollibus, & allia edat cruda ac cocta, & cum uiro dormiat, et in ſanam coxam decumbat. Alteri uero fomētum adhibeat. Morbus autē hic agre cedit. Si uero propinquiffimi fuerint uteri freſquenter uomat. Vteros autē graueolentibus ſuffiat, donec in locū ſuum firmati fuerint. Diæta uero uentrē non emolliente utatur. Si uteri extra naturam progreſſi fuerint, febrilis calor habet pudendū & imum uentrem, & urina freſquenter ac paulatim deſtillat, & pudendū uehementer mordetur. Patitur autē hæc ſi recens ex partu uiro cōdormierit. Quum igitur ſic habuerit, myrri baccas, & loti ramēta, in aqua coquito, & aquā per noctem ſub dio exponito, atq; ſic frigidiffimā pudendo affundito, & leuiter trita hæc apponito. Poſtea aquā lentium cum melle & aceto bibens uomat, donec uteri fuerint retracti. Sed et lectum à pedibus altiorē facere oportet, & pudēdum graueolentibus ſuffire, nare aut odoratis. Cibis uero utatur molliſſimis ac frigidis, & uinū aquoſum album bibat, & ne lauetur, neq; cū uiro coeat. Si penitus ex pudendo exciderint uteri, dependent uelut ſerotū, & dolor corripit imum uentrē, & lūbos, & inguina. & quum tempus proceſſerit, nō uolunt in ſuum locum redire. Morbus autē hic corripit, quū recens ex partu laborarit, aut fatigata fuerit, ut uteros cōtactū leſerit: aut cū uiro coiuerit in puerperiorū purgatione. Quū ſic habuerit, frigefactoria mitigantia apponere oportet ad pudendū, & quod extra propendet deſpurgatum, malo punico in uino nigro cocto abluere, & intro protrudere. Deinde mel & reſinam pari utriuſq; portione colliquare, & in pudendum inſundere. Et decumbat ſupina pedes ſurſum extētos habens. Poſtea ſpongias apponat, & ad lumbos deliget. Quandiu uero ſic habuerit, à cibis quidem abſtineat, potu uero parciffime utatur, donec ſeptem præterierint dies, & ſi quidem ſic obedire uoluerint & redire, ſatis ſit: Sin minus, ſummas uteri oras deſaſas & ablutas, picato cerato illinito. Deinde pedes ad ſcalam deligato, ut caput deorfum pendeat, & manu intro detrudito. Poſtea lauato, & crura ipſius uiciſſim colligato, atq; ſic per noctem ac diem finito, & modicum piſanæ ſuccum frigidum dato, aliud autem nihil. Poſtera uero die reclinato, & cucurbitam quam maximam ad coxam affigito, & multo tempore trahere finito, & ubi ipſam deſtraxeris ne ſcarificato, ſed reclinatā finito, & nihil præter ſuccū piſanæ exhibeat, donec ſeptē præterierint dies. Si uero ſitis ueuet, modicū aquæ bibat. Quū autē ſeptē tranſierint dies, cibis molliſſimis ac pauciſſimis utatur. Vbi uero uentrē exonerare uoluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim prætereant dies. Deinde tepidis fomentis colluatur, melius autē eſt calida uelut ex ſole, & q̄ parciffime deambulet, & ne lauetur. Ventrē autē ne ſolueris. Cibis uero pauciſſimis utatur, neq; acribus, neq; ſaliſis, & pudendū graueolentibus ſuffiatur, & poſtquam obambulare inceperit, ſubligar geſtet. Si uero extra pudendum

os uterorū exciderit, utpote ceruice uterorū prope pudēdum sita, & ampla exi-
 stente: fit autē hoc magis sterilibus, contingitq; maxime ex fatigatione, quū mu-
 lier laborarit, & uteri calefacti fuerint ac exudarint: tūc euertitur os ipsorum per
 ceruicē ut quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē sit loco, q̄ in priori tēpo-
 re. & ubi hoc cōtigerit, procedunt uteri foras ad frigus, & osculum ipsorū euer-
 sum prodit. Et si quidem breui curata fuerit, sana fit. Verū sterilis penitus relin-
 quitur. Si uero non breui, osculū durum semper ipsi extra erit, & si uerū illic aliās
 atq; aliās saniosus humor uiscosus ac graueolens. Et si menses prodierint, si ad
 huc eius ætatis fuerit, in lecto decumbet. Temporis autē progressu huiusmodi
 morbus incurabilis fit, & consensit uteros foris habētes. Si uero uteri ex-
 tra prominuerint, ablutos ipsos aqua tepida, oleoq; ac uino illitos rursus indit-
 ro ac deligato, & graueolentia subter suffito. Sub nares autē odorata. Si uero
 multo tempore uteri promineant, & stupide perfrigerentur, multam calidam
 aquam affundito, quo resocillentur. Si uero iam infletur, etiam aceto ad aquam
 ammixto foueto: Sitq; hæc aqua aut lauri aut myrti decoctum, & leniter pro-
 trudito, & cerato unguento illinito, & si paruerint, satis est: Sin minus, cum a-
 qua abluito, & aceto modico tepesfacto perfundito. Deinde illinito. Vbi uero
 cōfederint, ablutos uelut dictum est indito, & alia prædicta facito. Oleum uero
 ne adhibeto, neq; aliud pingue, aut pinguitudinem habens. Si quid ex os-
 sculis uteri complicatum fuerit, menses non fiunt, aut pauci & prauī ac dolori-
 fici, & quum uiro condormierit, dolet, & quicquid uir immiserit ex coitu exit,
 & contingi nō uult, neq; attrahit genituram. Et dolor habet inum uentrem ac
 lumbos, & os uterorum ad contactum non comparat. Quum igitur sic ha-
 buerit, urina ueteri foueto. deinde uomat à lentis decocto, melle & aceto ammi-
 xto. postea aqua calida lauetur. Deinde oleo albo Aegyptio in phialā argēteam
 aut aneā infuso, & sale addito cōrecta phialæ infideat, & si quidē odor olei per
 os ipsi penetrarit, ipsam parituram esse, & postera die sanam fore pronūcia, ac
 cōfidere iube. et ubi dormire uolet, oleum Aegyptiū in lana apponat. Postridie
 uero cōsideret an os uterorū magis sit directum, & si esse dixerit, per tridū os
 doratis foueto, & subdititia quæ nō mordeāt apponito, purgatoq; & cū odora-
 tis ac mollibus postea colluito, totidem diebus uelut prius. Quum autē menses
 prodierint, ieiuna, & illota, aromatis suffita, ad uirum accedat. Pleraq; uero ex
 hoc morbo steriles fiūt, si nō curatus fuerit. Si ulcerati fuerint uteri, & extres-
 me foras processerint, oleo illitis manibus indito, & myrrhæ puræ pilulas tres
 deuorandas præbe. & laurū uiridem tritam bibat uino dilutam. & sic sana fiet.

Si in arcūm contracta fuerint pudenda, subdititiū apponito. Anisi uidelicet
 semen & apij tritum pudendis subdito. Si uteri nō in loco manserint, sed mo-
 do huc, modo illuc trāsierint, ut dolores exhibeāt, & nunc incōspicui fiant, nūc
 exeat uelut sedes, & quum quidem supina fuerit, in loco maneant, quū uero sur-
 rexerit, aut ex somno expergiscatur, aut se inclinauerit, aut aliū quēdam motū
 fecerit, exeunt. sæpe uero etiā dum quiescit. Hanc q; maxime quiescere, & non
 moueri oportet. & lectū à pedibus sternere altiore, & uominibus uti. Oportet
 enim ipsos sursum reuellere, & acerbis perfundere. & graueolētia subter suffi-
 re. Sub nares autē odorata. & ex malis punicis quodcūq; maxime cōuenit &
 nihil impedit, in medio per umbilicū perforatū, in uino tepesfactū q; penitus
 sime subdito, deinde lata fasciā deligato ac circūdato, ut ne elabatur, sed maneat

& quod opus est faciat. & de peplo, cū caseo, & polenta bibendū dato; quemadmodū supra in allapsu scriptū est. et de potionibus experimēto facto, quancūq; maxime admiserit, bibēdam præbeto. Cibis autē mollissimis utatur. & cū uiro ne dormiat, donec ad locū suum redierint. Si uteri exciderint, hederā ficitissimam tritam, ac linteo illigatā apponito. & nihil pingue adhibeto. In potu autē exhibeto triticum recēs, & pepulum albū, & saluam, & cyperū, & anisum. Hæc trita uino diluta, cū fursuribus ordeī bis in die dato, pro uice heminā dimidiā.

Si ad crura & pedes uteri cōuertantur, cognosces sic. Magni pedū digiti cōuelluntur sub unguē, & dolor habet crura ac femora, & in cūbit ac premit uos circa femur. Quū sic habuerit, multa calida frequēter lauare oportet, & fomentū adhibere si ferre poterit, & graueolētia subter suffire. Et femora rosaceo oleo inūgat. Si uero loqui nō poterit, crura derēpēte frigida repereris, & genua, & manus, & si uterū contigeris, nō in suo mundo est. & cor uibratur, & dentib. frendit, & sudor est multus, & alia quæ à sacro morbo correati patiūtur, et quæ ab aure exsudāt. His frigidā aquam multā affundere oportet super crura & manus, & alia facere uelut prius dictū est. Si cōmoti uteri aliquo allapsi fuerint, & dolorē exhibuerint, oleæ scabiem, & lauri ac cupressi ramenta in aqua cocta, lana excepta subdito. Quū uelut recens enixa, onus maius q̄ pro natura le uarit, aut timuerit, aut ligna fecuerit, aut cucurrit, aut alia quædā huiusmodi fecerit, uteri excidunt ob hæc maxime: aliquādo uero ad sternutationē. Non enim uiolatur, si per uim sternutans, nō apprehēderit nares. Proluere itaq; aqua tepida uteros oportet. Deinde betæ succo feruefacto similiter. postea uino nigro meraco. Si uero non obediat, mollitoria facere oportet. Verū hæc facere oportet priusq; perfrigerētur, & leniter intro indere. Deinde crura extendere, ac subalternatim ponere, & molle quiddā ipsis supponere. à potu uero coerceri oportet tales q̄ maxime, & uentrē custodire, ut ne exturbetur. Naribus autē odorata adhibere. Huiusmodi uero postea si nō quieuerint, sed moueantur, ueratro purgare oportet. Et si nō sanis fuerit, etiā uomitus facere, & non lauari, tacereq; ac quiescere. Si inflati fuerint uteri, uēter attollitur, & inflatur, ac sonitū edit. & pedes & cauæ faciei partes intumescūt, et color iniucūdus fit. Et mēses occultantur, & genitura hoc tēpore non manet intus. & anhelat, spumascq; ac anxia est. & quū experscitur è somno, recta ceruicē spiratio ipsam corripit. & quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, & suspirat, ac tristatur magis q̄ priusq; edit. & suffocatur, & nerui cōtrahuntur. Et uteri ac uelicæ dolent, & manus cōtactū non admittunt. Neq; lotiū emittunt, neq; genituram suscipiunt. Quum sic habuerit, pharmacū deorsum purgans bibendum dato, & calida lauet, ac frequenter infideat toto corpore. Quandoq; etiā usq; ad umbilicū fomentū adhibeto. & interposito tempore ea apponito à quibus purgetur, & nō mordeatur. Suffumiget autē odorata subter pudenda: sub nares uero graueolentia. Et portiones dato quæ uteros purgāt, & ad locum impellunt. Et mercurialem edat, & postea lac bibat, uelut de latere scriptū est. Morbus autē hic non est diuturnus. Si uelut in callū indurati fuerint uteri, & osculū exasperatur, & mēses occultantur. Quum autē proderint, asperi apparēt uelut arena. Si uero etiā digito cōtingerit, os uteri asperum cōperiet, & semper uelut callus accrescit. Quū sic habuerit, cyclaminū terere oportet, et salē ac ficū simul miscere, & cū melle glandulā efformare ac subdere, & fomētō adhibito, purgātibus eluere. Edat autē mercurialem & brasīā

& brasicā coctam, & succum forbeat. Itemq; porrū, & calida lauetur. Si uero uelut in callum indurati fuerint, & menses obtorquētur, & osculū ipsorum clauditur, & non cōcipit, & uelut aliud quid est, & si contigeris, uelut lapis illic esse uidetur, & est os asperum ac multis radicibus præditū, & nō leue aspectū, & qui ipsum cōsiderat, digitū intrmittere non potest, & febris circūfrigerans corripit, & fremitus, & dolor uteros habet, & inum uentrē, & laterum mollitudinē, ac lumbos. Patitur autem hæc, si ipsi corrupti mēses cōputuerint. Quandoq; uero etiam ex partu, & frigore, aut mala diæta, & aliter. Medicamentū igitur bibendū dare oportet, & multa calida aqua lauare. Oleo itē utere, & fomentū adhibe. Quum autē recēs lota aut fota fuerit, specillo immisso aperito, & os ipsorū dilatato, idemq; cū digito similiter efficitō, & mollitoria uelut dictū est apponito, & potiones similiter bibēdas dato, & eodē modo curato. Si uero obdurerint uteri, osculū ipsorum durū fit, & clauditur, & menses non prodeūt, sed pauciores & deteriores, & dolor incidit, & febris & rigor corripit circa imū uentrē, & lumbos, & laterū mollitudinem. Quū sic habuerit, multa calida lauato, & tepefactoria adhibeto, si dolor habuerit, & uteros multo tēpore cū aqua decoctū cucumeris sylvestris foueto, deinde mollitoria apponito. Atq; hæc per tridū facito, & si ex contactū osculum uterorū molle apparuerit, ex crudo linō tres penicillos suppuratorios indito, primū tenuem, secūdum paulo crasiorē. Crassissimus autē sit magnitudine digiti parui, lōgitudine uero quinq; digitorum, ita ut hos adipe anserino illitos subdas. Sed & ubi fomentū adhibueris ex odoratis, glandē mollitoria apponito: Aut nitrū tali magnitudine illitū, ut ne fauciet. Non enim pungere oportet, & appositū sit ad duos dies. Decedit autē uelut cortex & pellicula crassa. Intermissis uero tribus diebus, cyclaminū cum narcisino subdito. Si uero hæc nō purgarint, cum multa cōsideratione apponito id quod cū buprestī paratur, & appositū maneat per diem. & ubi forriter momorderit, glandē extrahat, & pudendū colluat cū aqua calida, & in oleo infideat, post die uero lota, ceruinū adipem liquatū, & mollī lana exceptū apponat. & si tibi adhuc purgatiōe opus habere uideatur, tribus interpositis diebus, id quod cū narcisino paratur subdito, post die autē netopū. Deinde rursus tribus diebus interpositis, uteros odoratis & pinguibus colluito, post die uero pulegiū per unū diem apponito, & sequēti die cū aromatis suffito ac foueto. Vtatur autē cibis acribus, marinis, aut carnibus. In mensibus uero castorū bibat, & ieiuna illita suffita, & cyceonē bibens ad uirū accedat. Si uero os uterorū non suscipiat geniturā, sed durum fuerit ac cōclusum, plumbeū penicillū apponat, uelut dictū est per tridū, ubi calida lota est, & mollitorijs utatur, & supina decubat & in aquā calidam infideat, & lanam unguētō imbutā apponat. Verū noctū magis apponere oportet, luxta coxas uero uestes laneas aut lineas molles supponat, ut ne corpus in alterutrā partem dilabatur. Vtatur & subdititijs mollibus, ex myrrha pinguisima, pice, cera, & adipe anserino. Sit autē myrrhæ dimidiū, reliquorū uero duplū, et in lana subdat. duo uero sint subdititia quorū alterū lota per diē subdet, alterū per noctē, donec molle factū fuerit. & ubi hoc detraixerit, aqua odorata colluat. Aut grana cnidia decorticata quindecim, & Indici medicamēti aliquantulū, si ita uisum fuerit, in lacte mulieris masculum lactantis terito, & cerui medullā, & alia quę dicta sunt, ac modicū mellis ammiscet

to. Sit autē lana qua hæc excipiuntur mollis & pura, & ad diem subdat. Si uero fortius facere uoles, myrrhæ parū quid ammisceto. Optimum autē est oui candi dum, & adeps caprinus, & mel, & oleum rosaceū: his ammiscere farinam, & tes pefacere ad ignē oportet, & quod destillar lana colligere ac apponere. Aut adipem rubrum anferis aromatibus conditum, & unguentū rosaceum, permixta & lana excepta apponito. Prestat autē anferis adipem, & adipē ouillum, ceram albam, refinam, netopum, oleū rosaceum, hæc simul liquare ac miscere. Vbi uero lota est, hæc tepida intro ad uterorū osculum apponat. Aut cerui medullam, & anferis adipem liquato, & rosaceo aut irino oleo ammixto, in ualde molli lana apponito. Quum mulieri uteri duri facti fuerint, & ad pudēda exierint, dura sūt in uagina, & ardor in uaguinibus est, & omnia cancerantur. Quū igitur sic habuerit, cucumeris syluestris internā partem, & fauū terito, & aquæ hemina affusa in sedem infundito, & purgatur. Si os uterorū durum fiat, & ceruix, præ siccitate, & morbus leuiter hæserit, ex digiti cōtactu cognosces. & si ad coxam deuoluatur, nihil acre adhibeto. Si enim exulceretur aut inflāmetur, periculū est ne penitus sterilis fiat. Verū apponito ea quæ non mordent, à quibus purgetur. Quū uero duri fuerint uteri, & sic doluerint, subdititia apponito, uelut est cerui medulla, aut anferinus uel suillus adeps. & unguentū irinum cum melle. & ouiluteum, ac ceram albā, uelut cataplasma emollito, et ordeaceam cum triticeam farinam, cū aqua & ruta coquito. Si uteri conclusi fuerint, oscula ipsorum dura fiunt, & genituram non amplius suscipiūt, sed statim ubi cum uiro cōdormierit, dum crura mouet, exit, & dolores in uentre, & lumbos, & in uagina occupant. & mēses omnino non prodeūt. Si uero eant, pauci & prauī ac decolores prodeunt. Quū sic habuerit, multa calida lauato. post balneum uero castorium cum pæonia radice, in uino nigro odorato permixta bibenda dato. Cibis autē uelut puerpera utatur. & si manifesti fuerint menses, diem unā intermittito, & totam foueto, & pharmacū potandum dato, si aduertæ fuerint, sursum purgās, aut si egere uisa fuerit, deorsum. Lac itaq; aluminū, aut serum exhibeto. & leniter foueto, & mollitoria utero apponito, & cyclaminū, & narcissinum. Cucumerū uero paruorū syluestrium internam partē sumito, & ex diuulsis semen eximito, ac lacte mulieris masculū lactantis affuso terito, myrrha pura & melle optimo ammixtis, oleoq; Aegypto albo, & ne liquidū facito medicamentū, sed siccum, atq; hoc in lanā mollem purā infarciat, & in oleo Aegyptio albo tingat, & lota apponat. Subligetur autē & sub tecto maneat quū purgatur. Postiq; autem sufficēter habere tibi uisa fuerit, quiescat. Sin minus, rursus aliud apponat, postea uero obuolutam lanam mollem, rotūdā faciat, & netopū in mittat, & diem unā subdat. posttridie uero oleum rosaceū itidem in lana. Deinde rursus cerui adipem, etiam ipsūm liquatum in lana. Lauetur autē calida aqua semper ante subditiorū appositionē. Et odoratis leniter foueatur multo tempore. Postea uero una interposita die, colluito. si quidē pituitosa fuerit, eo quod cū grano cnicio paratur. Si uero biliosa, eo quod cū scāmonia. post hæc ambo, posttridie etiā narcissino cū uino dulci colluito. Si uero narcissinū non fuerit, cū anthino aut irino q̄ optimo. Sit autē olei tertia uini pars. deinde interpositis duobus diebus, id quod cū pulegio præparatur unū diem apponat. Si uero prodierint mēses, ieiuna per triduū bibat castoriū, cū uino odorato albo; ubi uero desierint

uerint menses, & stabiles fuerint, lauetur. & aqua frigida perluta, cyceonē bibat non salum. Cibum autem ne cōtingat, et cum uiro dormiat duobus aut tribus diebus. Quanto uero tempore purgatur, mercurialem in aqua coquens, ubi cocta fuerit exprimat, & aliū ac cuminū, & salem subterat, & oleū his ammisceat, & modico succo affuso seruefaciat. Atq; hoc edulium ante cibos edat. Allium item coctū ac affatum q̄ plurimum accipiat. Si uero mercurialis non fuerit tenera, tritam cū brasiā coquere oportet, & condire, & lenis erit. & si in uentre conceperit, sana euadet, & omnia ipsi iuxta ornatum procedent. Si os uterorum conclusum fuerit, fit forte uelut grossus. & si digito cōtigeris, deprehendes durum ac cōuolutum, & digitū non admittit. & menses occultantur, & genituram non suscipit hoc tempore. & dolor habet imum uentrem. & lumbos ac laterum mollitudinem. Quādoq; uero etiam sursum ascēdit & suffocat. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dare oportet, & multa calida lauare, & apponere ea quæ os molliunt. & specillum immittere ac aperire, itemq; digitum, & similiter leuigare. Quum autē molle fuerit, apponere ea quæ sanguinem purgant. & potiones exhibere, & experiri ut præbeas quodcunq; aliud libenter susceperit. Brasiā autem edat, & succum sorbeat. Si uteri conclusi fuerint, & menses non apparuerint, colocynthidem syluestrem, & silphij semen, & cuminū Aethiopicum, & nitru, & salem thebaicū, & adipem thealem, & farinā, & myrrhā, & resinam, omnia simul seruefacito, & trito mixta, & in glandē efformata apponito. Si grumosi facti fuerint uteri, os ipsorum uelut eruo plenum fit, & si contigeris, uidebis ita habere, & menses nō sunt, neq; genitura intus manet. Quādiu sic habuerit, cyclaminū cortice detracto, & alium, & salem, & ficum, ac modicum mellis, terito, misceto, ac glandem formato, & ad os uterorum apponito. Itemq; alia subdititia, quæ acria sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur. & de potionibus dato eas quæ uteros purgant. Si uteri præter naturā hiarint, menses plures prodeit & uiscosi, & frequenter, & genitura intus nō manet, & osculum hians est. & fieri nō potest ut genituram attrahat. & febris ac rigor corripit infernū uentrē, & lumbos. Morbus autem corripit ex fluxu sanguineo. fit & quum menses suppressi derepente eruperint. Diætæ itaq; ratio prius relata est. Oportet autē subdititijs curare, in principio quidē purgatorijs simulq; mollibus. Deinde leniter adstringentibus, & partes infra umbilicū per spōgias fouere, cū myrti aut rubi aqua, aut ex oleæ aut rosarum, aut cenanthes, aut uitis foliorū decocto. Si os uterorū hiarit amplius q̄ in mensibus solet, menses ita fiunt plures & deteriores omnes, & liquidiore, & per longius tēpus, et genitura nō attingit, neq; manet, sed rursus exit. & si permāserit, osculum cōperies disparatum, & impotētia præ mensibus obtinet. & leuis est ac debilis uterus, & ulterius procedit. & uires laxantur. & febris debilis, ac rigor, et dolor habet imum uentrem, & laterum mollitudinem ac lumbos. patitur autem hæc maxime, si quid in ipsa corruptum computruerit ac compactum fuerit. Quædam uero etiam ex partu patiuntur. aliæ etiam aliter. Quum itaq; sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, & facilius iudicabitur. & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto. & frigida lauato, ac in remissione facta colluito. & ex potionibus dato quamcunq; maxime libenter admiserit. & suffito ea quæ resiccant. & polypos edat ac mercurialem. Si uer-

ro non conclusi fuerint uteri uelut oportet, in aqua desideat in qua cocta sit myrtus, aut lentiscus, aut uitis aut oleæ folia, aut rosarum. Diæta uero sit quæ relata est in rubro fluxu. Optimum uero ipsi auxilium est sitis, frequētes uomitus, & prohibitiones balnearum. Quum uteri magis quæ cõuenit fuerint aperti, & non conclusi, & purgatione opus habent, & collutionibus, & suffimētis. Si uero menses effloruerint, plures fiunt & deteriores, & liquidiores, & frequentes. Et genitura non manet intus, sed quando illi prodierint, perit. Et si os cõringas digito, comperies ipsum leue. Et impotentia ipsam præ mētibz corripit. Et febris ac rigor obtinet. & dolor in uentre, & lumbos, & laterū mollitudinem corripit, maxime si quid in ipsa corruptum cõputruerit, item quæ ex partu, & aliter. Quum igitur sic habuerit, curare oportet, ubicumq; tandem dolor fuerit, uelut in superioribus scriptum est. Si uteri inflammati fuerint, menses obtorquentur, & ceruix multis tenuibus uenulis, ad telarum aranæ similitudinē uariatur. Et febris est acuta, & mentem percellens, & menses prauī ac paucī ipsi comparent. Et quum ieiuna fuerit, uomitus quidam ipsi superuenit. Quū uero quid comederit, reuomit. Et dolor occupat in uentre & lumbos, & animo linquitur. & per totū corpus perfrigeratur. Venter autē nunc durus, nunc molis est, & incenditur & attollitur. & putat se in uentre habere. Quandoq; uero uētris moles uacua apparet, & aluus aqua impletur, & umbilicus prominēt. & osculum gracile fit. & derepente apparent menses stridentes, & paucī ac prauī. & attenuatur circa clauiculas & collum, & pedes intumescunt, & præsertim pedum extremitates. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendū dato, & subdititijs utatur, & fomentis uteri foueāt odoratis. Per diem uero plūbeis penicillis utatur. & ante appositionem, aqua calida nō mordenti colluito, & post appositionem hoc infuso colluito. Cnestri duas potiones in aquæ hemina coquito, & aquam excolato ac infundito, oleo narcisino aut anthino ammixto. Post hæc tres dies intermittito, deinde cum eo quod cū aceto paratur colluito. & ante cibum, mercurialem cum aliquātulo uino coquēs edat uelut brassicam, & succum sorbeat. Si uero permanserit, pharmaca bibēda dato à quibus aqua de uteris purgatur. Cibis autem utatur panibus, & oleribus coctis, flaccidis. Marinis autem potius quæ carnibus. Aut extremis partibus coctis, flaccidis. & laboret quæ plurimum, & ante & post cibum & quæ minimum laetur frigida. & à dulcibus ac pinguibz omnis generis arceatur. Diebus autem purgationū intermedijs, adlatum bibat ieiuna in uino diluto. At morbus hic lethalis est, & pauca effugere possunt, si non in uentre conceperint. In uterorum inflammatione menses obtorquentur, & quū ieiuna est uomit. Vbi uero comedit, dolor habet in uentre & lumbos. Et totus uenter modo durior, modo molis fit, & non ualde confidet. Aluus magna fit, & non purgatur, & sibi prægnās esse uidetur, & patitur quæcunq; prægnantes perpeti solent. Et si uentrem contigeris, leuem comperies tumorem uelut in utre. & quum partus tēpus esse uisum fuerit, uteri concidunt, & menses paucī ac deteriores fiunt. Huic pharmacum deorsum purgans bibendum dare oportet, & purgatoria apponere. Purgata uero sana euadit. Si inflammatus fuerit uterus, uellicatur. Si uero quid corruptum fuerit, ac uitiatū recruduerit, febris corripit acuta et magna, et horror durus, partes circa pudenda, & horribiliter afficitur, & mordetur, & concitatur

tatur. & si quis digito contingat, rursus peius habet. & pūgitur, & caput dolet acincipit. & caligo adest, & sudor frontis. Extremæ partes perfrigerantur ac tremunt. & sopor profundus aliquando occupat, & audire nō potest. Neque reliquus sensus operatur. fastidium cibi est multum, & stomachus & uenter omnino nō continent cibum. & uociferatur, & exilit, & pectinem dolet, & inguina, & lumbos, & occultos pudendi locos. & cito moriūtur. Si uero dolores ad extremam debilitatem deduxerint, spōgijis calidis ex aqua & oleo expressis foueto. & subdititia mollia apponito, medullam cerui, adipem anserinū, & ceram albā, & oui luteū. Aut ceratum picatū cum resina subdito. Vino uero aut lacte caprino purgato, aut uolucris iusculo. Vinū autē ne bibat, & ptisanā succū foveat. Ad dolorem uterorum medicamentū infusile. Si dolor solum fuerit uehemens & uiolentus, caligo in uteris inest, & flatus non exit, sed isthic manet malum. Oportet igitur sic curare. Atriplicis syluestris semen, & betas simul trita ac reperfacta, in uteros infundito. Aliud dolores uterorū sedans. Vini suauissimi pari aqua temperati tres semicongios Articos sumito, & sceniculi radices ac feminis eiusdem triētem, & olei rosacei heminā dimidiā. Hæc in ollam nouam immittito, & uinum superfundito, deinde foueto. Apponito autem & scillam, donec osculum molle factū fuerit & ad lationē idoneum ac aperitum. Et quum in purgatione pustulæ circa osculum uteri exortæ fuerint, sic curato. Carnem bubulam, cum butyro aut adipe anserino & aniso tritis illine, & ipsam carnem in pudendum inde. Si ignis facer habuerit uteros, intumescunt pedes, & mammae, & corpus. & dolor ipsam corripit. & recta ceruice spiratio fit, & dolet iaterum mollitudinē, & partes sub uentre, & pectora, & caput. & tremor occupat, & torpor manus, & inguina, & poplites tremūt. Quādoquē uero & in poplitibus liuidæ sūt, & modico tempore melius habent ex hoc colore. Maxime uero mammae attolluntur iuxta gentilitatis cognationē. Attamē nō ualde dolet. & febris ac rigor corripit. et facies rubicūda fit. & situs fortis est. & hepar reficcatur. Hæc si prægnantū acciderint, moritur, & nō poterit effugere. Si ignis facer in uteris fiat, tumores sūt liuidissimi, à pedibus exorsū usque ad crura tota, & ad lumbos. Quanto uero tempus amplius progressum fuerit, etiam pectus percipit, & intumescit, & tota perfrigeratur. & febris habet magna, & rigor superuenit, & spiritus densus, & animi deliquium, & debilitas, & dolor totius corporis, & tristatur, & mente uariatur. Et affectio ascendit ex inuerno uentre ad lumbos, & ad dorsum, & præcordia, & pectora, & collū, & caput, & stomachum, & mortua esse uidetur. Quum autē dolor solutus fuerit, torpor habet lumbos, & inguina, & crura. & in poplitibus liuores fiunt, & modico tempore melius habere sibi uidetur, deinde rursus affligitur. & corpus pustulis completur, & rubores cōspicui ac manifesti faciem occupant. & guttur siccū est, & lingua aspera. Hic morbus si prægnantē inuaserit, occidit. Sin minus, melam adhibere oportet, & lac asininum bibendum dare ac purgare. Si uero sic non soluitur, uentrem mollibus frigefactorijs perfrigerare, & subdititijs non molestis & leuibus paulatim purgare, itemque uomere. Ad hoc commodum est sambuci folia sumere cocta, cum origano, aut thymo, aut ruta. Si uero febris dimiserit, etiam uinū ac cibos dulces dato. Verūtamen pauca curātur. Aqua intercus si in uteris fiat, menses procedunt arenosi & aquosi, & non ualde cruen-

ti. Intumescit & uterus, & uenæ, & propinquissimæ partes. & prægnans fit, de inde suffocatur, & mammæ fluunt, & imus uenter durus est, ac intumescit, & omnis circum circa locus, & dolet si quis ipsum attingat. Et febris ac stridor dentium corripit, & dolor uehemens laterum mollitudinē ac lumbos. & semen in fornibus effundit, & peius habet. Hanc calida lauare oportet ac tepescere. pharmacum autem bibendum dare, & cum debilibus fouere. & cyclamini obolos tres in linteo deliget ac apponat. Et cupressi succum in aqua madefaciat, ac cantharidas eadem terat, & modico tempore apponat, & per multum temporis interuallum. Efficax est.

Subditium. Cuminum chemæ mensura, uua passa alba. Aliud. Vrticæ semen, ari radix. Horum quodcumque uoles leuiter apponito, ubi uero expurgaueris colluatur, ita ut detrahas & cum infuso pudenda colluas. & simul cum uiro dormiat. & si foetum ad partus tempus gestarit, tota expurgatur, & sana fit. Alia aqua intercus uterorum. Suberuentum quiddam fluit saniosum, & purgatur, & mordet ualde, & ulcerat pudenda uelut muria, & circumscitas partes. & quocumque defillarit ulcerat, & color est morbi arcuati. De cætero uero purgatur copia uelut in alijs fluxionibus. Morbus autem hic & debilior est, & aliquando lethalis fit, si uteri egressi fuerint. Hanc curato uelut eam quæ à fluxu albo uexatur. & lac asinum bibendum dato, & extenuato, & prædictis pharmacis curato. Eclegma.

Quod delingitur ad aquam intercurat. Si aqua ex uteris fluat, sulphur & anseris adipem delingat. Si uentus in uteris fuerit, flatus exit, & stridet, & tota intumescit. & febris habet & ardor. & ad hanc ualde exilit præ dolore. & uirum non admittit, & ualde ægre fert coitum, & erigi non potest, & uelut onus graue ipsi in uteris iacet, & caput dolet, & anxia est, & loqui non potest. Si uero dolor accesserit, clamat, & dolet omnia, & lumbos, & pubem, & sedem. & urina supprimitur, & uenter suffocatur. & mori cupit. & præcordia distenduntur. & stomachus mordetur. & os amarum est. & uomit acida & pura ac meraca. & frequenter ructat, & melius habet. Sin minus, intumescit. & si attingeris, renititur & dolet. Proinde uterum cum aqua mulla, & aceto mullo ac oleo colluere oportet. Et cum minum aut anisum tritum, sumere, & lini folia terere, & uolucrinum adipem cum ouis in aqua infundere. Subdititij uero ac potionibus utere, quæ ego describam. Desideat autem in oleo calido, & aromata in ipsum immitto, iunci odorati flores. Aut in aqua lauri, aut marina desideat. Optimum autem est mollibus infusis uentrem purgare, aut glandem apponere quemadmodum puero uenter soluitur; lanam illotam cum melle. Si uero antiquior fuerit, cepam in oleum aut mel tinctam apponito. Aut taurinum fel, aut nitrum cum melle. Aut mali punici acidi nucleum, cum melle & ordeacea farina. Si mola ipsa innaicitur ac crassa genitura intus retenta, thymbram tritam in aceto & aqua, liquidam bibendam præbeto. Aut hyocyami semen tritum. & cum muria ac silphij succo & aceto colluito. Aut si opus fuerit cum aqua. Optimum uero est aquam mullam infundere, cum aqua lentium, aut erui, aut floris uiolæ. Si uero purgata fuerit à talibus quæ sunt uelut igne ambusta, myrrum coquito ac perluito, & myrrham ac netopum cum lana apponito. Si uentus in uteris fuerit, ac momorderit, & qua transit colorem facit, & præ ardore intumescit, & dolet, & uirum auerfatur, & coitum ualde ægre fert. & tenditur ac intumescit pectus, & erigi non potest, nec dirigi. Quum sic inuenis, scito quod uentus & genitura in uteris est, & propterea nunc ægrotes. Accipe itaque mel

mel, ceram, lini folia trita, & adipem uolucrinū, & hæc in uino odorato tepefa-
 cta per clysterem in uteros infunde. Apponat autē folia lini. Aur semen lini teri-
 to, & in lanam inuoluito, & ad os uteri apponito. Sin minus, effiaciore utere.
 Irinum & crocū, & lini folia, & adipem uolucrinū terito, & lacte muliebri dilu-
 ta, rasura de tenuibus linteolis derafa excipito ac illigato, & ad uteri osculū ap-
 ponito. Et si pinguitudo carnosior enascatur, quod cōsumat indito, & medio-
 criter attenuato. Quæ enim ualde attenuatur, raræ fiunt & abortiūt. Si uero ge-
 niturā non suscipit uterus, sed dimittit, & calorē in seipso nō habet, instrumen-
 tum parere oportet, cui insidens uaporem intra uterū recipiat, ita ut uestes cir-
 cū circa ponatur. Suffire autē oportet cassā, cinamomū, myrrham, singulis pari
 portione uino sirao siue sapa subactis, et super prunas cōiectis. Modice uero la-
 uetur, & modice cibū sumat. Opitulatur & subdititiū huiusmodi. Myrrhā mol-
 lem cū melle efformato. Sit autē oblonga uelut glans, & sæpe hæc facito uirium
 respectu habito. Profunt & pelecini in frumento nascētes, cū myrrhā triti. Mel
 quoq; coquito, & cū tædis agitatū permisceto, & fabæ Aegyptiæ magnitudi-
 nem apponito. fel item taurinū, & rhoem rubrū pari portione. Conyza herba
 est similis apio crispo, nascitur autē prope mare in locis arenosis, odor uero eius
 agre tolerari potest. Hanc cū melle & uino apponito. Aut bulbion, cōspicitur
 aut in tritico, maxime Aegyptio, acre simile cumino Aethiopico: hoc & allium
 & nitrū simul apponito. Verū antea lauetur. Quū mulier caput dolet, &
 sinciput ac collum, & uertigo præ oculis obuersatur, & timet, & tristis fuerit, &
 urinæ nigra, & similia etiā per uterū prodeunt, & anxietas ac mæror ipsam te-
 nuerit: atra bilis in uteris inest. Curetur autē sic. Cucumeris syluestris anniculi
 internam partē, fel tauri, florē æris, cū bacchare terito, & subdititiā formato, &
 pharmacū bibendum dato, ac lauato. Quū uero mulier uteros mordetur, &
 dolet, lancinaturq; & bilem flauam mingit, & uterus hiarit, & oculi fuerint ue-
 lut morbo regio affectorū: scito quod bilis in uteris est. Quapropter optimum
 est expurgare totū corpus, & ipsos uteros subdititijs, quæ bilem educit. Quū
 uero perfrigeratur uterus, & onus in situm esse uidetur, & color non est clarus,
 & cōpactus est uterus. Quum sic habuerit, purgare oportet cum eo quod pitui-
 tam ducit, & attenuare, ac frequēter uomere. Quum mulieri male oluerit ex
 ore, & gingiua nigra fuerint ac praue, caput leporis, & mures tres seorsim exu-
 re, & ex duobus muribus uentrē exime, hepar autē & rhenes non, & in pila la-
 pidea marmor, aut lapidem album tere ac cribra, deinde singulorum pares por-
 tiones miscere, ac dentes confricare oportet & locos in ore, & postea lana succi
 dissima fricet, & cū aqua colluat. Tingat autē lanam succidam in melle, & con-
 fricet dentes ac gingiuas, & internas ac externas partes. Terat item anisum, &
 anethi semen, & myrrham pondere duorū obolorum, atq; hæc in uini albi me-
 raci hemina dimidia diluat, & cum his os colluat, & multo tempore in ore con-
 tineat. Hoc autē frequenter faciat, & ieiuna gargarisset, & post cibum. Optimū
 uero est modico cibo uti, & optima quoq; ingerere oportet. Hoc pharmacum
 dentes purgat, & bene olentes facit. Vocatur autem Indicum medicamentum.

Quum mulieri mamma aspera facta fuerit, stœbes aut rubi fructum, cum
 aqua & oleo coquito, & cataplasmate facto mammas integito, & betæ folia sus-
 perponito. Deinde ex linteo uelut pileum consuito, & magnitudine ut mam-

mam capiat, atq; sic mammam indito. Si uero suppuretur, secato, & ex lana succida linamētum siue penicillum immittito, & eadem superponito. Postea uero ex lenticula cocta cum polenta permixta, cataplasma adhibeto. Si in pudendo mulieris, aut in testino recto ascarides nascantur, uiticis semen aut folia, cum felis bubuli obolo permiscetur, & oleo cedrino subiguntur, & lana succida molissima excipiuntur. Induntur autem tertio quoque die, per noctem ac diem. Post tria die uero ubi amouit, calida laetur. & allium coctum ac crudum edat. & Ascarides exeunt ac moriuntur. Muria uero etiam colluere oportet. Ad faciem ornandam. Hepar tauri terito cum oleo, illinito autē cum uino meraco. Fel autē fur fures exerit. Sed & trifanæ fuccus similiter illustrat, & ouorū candidum. & farina lupinorum, & erui, cum ficis in cataplasmate adhibita. Et brassicæ radix ac semen. Hæc etiam lentigines tollunt. Itemq; alcyonium. Et si puluis faciem læserit, ceratum liquidum ex rosaceo præparatū sublinito, & aquam frigidā affundito. Et rugas leuigat hoc. In pila lapidea plumbaginē terito, & mēstrua ex situ aqua affusa pastillos formato, qui ubi reficcati fuerint, oleo diluto rugosæ faciei illinito. At si capilli defluant, ladanū cum rosaceo aut anthino unguento terito, & cū uino illinat. Aut terrā cimoliam cum uino, aut rosaceo, aut omphacino, aut acacia. Si uero calua facta fuerit, cum inum impone, aut sterus columbinum, aut raphanum tritum. Aut cum cepa confricet, aut cum beta, aut urtica.

Cæterum solares appellatas maculas tollit, erui decoctum, betæ fuccus, ouorum candidum, puſana, cucumeris syluestris radix sicca, cum uini fece trita, ac illita. Aut fici folia adhibita. Itē sesamo trito fricari, aut amygdalis amaris, & urticæ semen, & allij cortex superligatus, & lepidium. Impetigines omnes extrahit. Acetum, manna thuris, pumex, sulphur cum aceto, nasturtium syluestre uftum & in cinerem redactum, uiperæ exuuium, rumicis syluestris radix. Teratur autē cum aceto uinoso. Si uero pustulæ emergant, etiam spuma argenti utere. Potio ad fluxum rubrum cōmoda. Cornu cerui uftum, ad duplū crudæ ordeacæ farinæ ammisceto, atq; hæc in uinum pramniū in spersa bibat, & sistitur. Alia. Adianti radicē tritam, & cicer torrefactum, & lentium farinam ex melle bibat, aut uelut potum exhibeto. Aut farinæ tritici recentis acetabulum, gummi albi dimidiam, mannæ thuris tertiam partem, & iunci odorati parum. Aut de pinu, uel cupressu aqua dilue, & bibendū præbe. Bibat autem in die. Aut cornu cerui comburito ac terito, & crudam ordeaceam farinam cum cedri baccis quinq; & uinum aufterum nigrū cum tædis ammisceto. Aut mali punici dulcis affati fuccū, cum uino nigro bibat. Aut cupressi baccas tres aut quatuor. & myrti baccas nigras, & simul, & ipsas per se ipsas, ad robur corporis mulieris respectu habito. Cum uino uero potio fiat. Aut castorij obolum in uino nigro auftero terat, ac bibat. Potio ad fluxum, & omnes morbos qui ab utero fiunt. Pæoniæ semen & radices, cum inum Aethiopicum, & melanthium in uino albo exhibeto. Aut ferulæ rasæ acetabulū, & porri succum, in uino albo diluto. Hoc etiā ex naribus manantē sanguinem sistit. Aut malū punicum in uino nigro coquito, ac decorticato, et interna in uino nigro terito, & cū polentæ farina exhibeto. Aut linū, uel erysimū tostum, & oleæ folia uiridis, & radicem nigrā aspalathi, & peplum plenum, hæc trita in eodē uino diluto bibēda dato. Aut coagulū afininū & mali punici dulcis radicē, & gallā, omnia æquis

portionibus, & mali punici dulcis succū, cū uino bibat. Aut rumicis semen, cū galla parte externa circūrafa. Hæc simul terito, & postea cyceonē facito ac exhibeto. Si sanguis largus ex uteris fluat, uiticis folia cum uino nigro dato. Acer ba item omnia fluxū sistunt, uino nigro ammixto. Ad fluxum & dolorem.

Canchryos radicē in uino nigro bibat. Si uero amplior fuerit, terebinthi fructus tritus prodest. Oportet autem uino & aqua diluere ac bibere. Si fluxus fiat, cancos fluuiatiles in uino suffocato, & de tali uino cū aqua bibendū dato. Si uero adhuc feratur fluxus, promalon siue myricam torreto, et tritam in uino dato. Aut porri succū. Si uero multus defertur fluxus, muli stercois cōburito, terito, & cū uino dato. Si autē diurnus fiat fluxus, spongia combusta auxiliatur. Terēda est autē spongia, & cū uino odorato exhibenda. Cataplasma ad fluxus. Allium & portulacam, & apiū, & loti ac cedri ramenta trita simul misceto. & cū aqua multā diluito, & cataplasma facito. Aut rubi, & rhamni, & oleæ folia trita simul misceto, & in aqua multā diluito, & cū polenta in cataplasmate adhibeto. Aut sambuci & myrti folia in cataplasmate adhibeto. Aut loti ramenta, & mori folia, ac rosæ folia, cū uua passa ad cataplasma redigito. Fomenta ad fluxus. Loliaceam farinā torrefactam in posca meraciore coquito, & linteo illitam pro fomēto adhibeto. Aut lentes torrefactas ac decorticatas in crasiore instar alicæ farinā redigito, & in aqua coquito, ac similiter adhibeto. Aut eruum eodē modo. cōmoda est & saluia. Aut paleas ordeī in saluiæ & hyserici decocto coquito, & imponito. Aut loti ramēta & cupressi, in uuæ passæ cremore cocta, linteo inducito, ac pro fomēto adhibeto. Aut oleæ folia, aut hederæ, aut myrti, in aqua coquito, & cū his etiam ordeī paleas coquito. Aut fures triticeos in aromatum aqua coquito. Aut fures triticeos in uuæ passæ cremore coquito. Aut uiolæ albæ semen, uel radices coquito, & ad aquam decocti fures triticeos injicito, ac foueto. Aut cum eo decocto fures triticeos subigat, & panē faciat, eoq; calido lanæ inuoluto foueatur. Aut in serpilli decoctum fures triticeos injicito, & eodē modo foueto. Sed & fomentū adhibendum est cū spongijs calidis, & cū mollibus lanis, si dolore uexetur, & cum uasis testaceis aqua infusa, & cū uescicis oleo calido plenis. Collutiones ad fluxus.

Myrti folia, & lauri, & hederæ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito. Sambuci & lentisci folia in aqua coquito, & cum excolata leuiter tepida colluito. Aut cenanthen, & cyperum, & uuas passas in aqua multā coquito, ac colluito. Aut cum scenogræci aqua, aut rubi decocto, aut oleæ uiridis, aut cupressi, aut serpilli, aut mali pumicæ, aut radices uiolæ albæ, aut lentisci decocto leuiter tepido colluito. Aut medicamentū ex butyro, et resina, & adipe anserino infundito. Aut id quod ex medulla & adipe suillo preparatur. Suffitus ad fluxus. Ordeum tostum prunis inspersum suffito. Aut cerui cornu cum oliuis immaturis. Aut rhoem rubrū, & polentā torrefactam, cum oleo & uino duplo. Aut paleas ordeī, & stercois bubulum similiter. Aut loti ramēta, aut rhoem, aut cupressum siccam, cum uino nigro austero suffito. Aut galbanū, aut mannā thuris, aut resinam uino subactam. Aut capræ cornu, & gallam. & sistetur fluxus. Alij suffitus. Effodere oportet scrobem, & uinaceorū uuæ duarū chœnicum Atticarū mensuram torrefacere, & de cinere in scrobem mittere, & uinū odoratū irrorare. Mulier autē circūinsidens, ac seipsam cōregens ac cōuoluens,

suffitum admittit. Aut sordes pilorū circa sedem capræ ficcas tundito, & torreto, atq; cū ordeo fracto, & oleo subactas suffito prunis insperfas. Aut ordei paleas iisdem prunis inijcito. Aut cupressi ramenta ungueto subacta suffito. Aut cicutam, aut myrrham, aut thus, ungueto affuso suffito. Aut bitumen & ordei paleas similiter. Aut cupressi radicē rosaceo oleo perfusam suffito. Aut ad calasium, iuncum odoratū, cyperum, apij semen, anisum, oleo rosaceo affuso suffito. Similiter autē & resinā, prunis inijcito. Et cinamomū, & myrrham, cū rubi folijs, aut rosarū folijs, aut menta, addito modico croco & styrace. Hæc omnia si mul terito ac suffito, oboli Attici pōdere, in cinere farmentorū uitis, aut in stercore bubulo instar acetabuli formato. Sit autē ignis ex farmentis uitis. Mulierē uero imposito prius, ut ne odorē percipiat. Nam si odorem senserit, melius est non suffire. Subdititia ad rubrū fluxum. Myrrha & bulbion cū melle tritum, optimum præstant subdititiū. Aut rosæ in aqua coctæ, quas sanè cū rosaceo ungueto tritas, ac lanæ inuolutas apponito. Aut loti florem in aqua coquito, & deinde cū rosaceo ungueto terito, & in lana ad uteri os adhibeto. Aut cyperum, & irim, & anisum, singula pari portione, cū rosaceo ungueto trita, intro in uteri osculū detrudito. Aut myrti nigrae folia, in uino albo terito, & pini corticem ammisceto, & similiter facito. Aut cupressi fructū, & thus, pari portione simulambo in ungueto terito, & apponito. Si resiccare fluxū opus fuerit, calamintham in uino nigro coquito, et linteo inuolutā apponito. Aut hyoscyami folia, & cicutā simul coquito: Similiter porrū, & maluā; & ceram ac anseris adipem ammisceto. Deinde tepida ad pudenda subdito. Aut uinū meracum, cum resinā & malicorio cocto terito, ac similiter apponito. Aut cnicum cū uino tritum subdito. Aut loti ramēta similiter. Aut lēnisci folia. Aut rhoem melle cocto ammixto apponito. Si uero nō cesserit, Suisinum, aut blitum herbā, quæ uelut lingua est, in lana ad subdititiū efformato. Ad fluxum aquæ subdititiū & infusile. Si mulieri aqua fluat ex pudendis, resinā siccā, & myricæ folia, & lini semen, in uino terito, & uolucrinū adipem ammisceto, & per clysterem in pudenda infundito. Aut farinā purissimæ chemam, siue cōchæ testam cauiorem, aut amyllum in lana ad uteri stomachū apponat. Aliud similiter infusile. Quum aqua ex pudendo fluxerit, myricæ folia, & thus, & resinam, cum anseri no adipē terito, & per clysterē in pudenda infundito. Si pectē præ fluxu quoq; doleat, uiticis semen cū melle terito, & in cataplasmate peccini probe adhibeto. Si fluxus sanguinolentus, aut albus, aut qualiscūq; fuerit, Sulphur & mandragorā in uino meraco terito, & lana excepta apponito. Et supina dormiat, & immota maneat. Aut malicoriū siccū in uino pramnio terito, ac bibēdum dato. Ad fluxū album porus. Hederæ albæ semē, & pini corticem, in uino aufero exhibeto. Aut cornu cerui usti partē unam, crudæ ordeacæ farinæ partes duas, & cedri baccas quinque, aqua terat ac bibat. Quum ab uteris frangulatur, castoriū & conyzam in uino, & seorsim, & simul utranq; bibat. Aut bituminis obolos tres. Aut phocæ adipis quantū duobus digitis apprehēdi potest. Aut radicis pæoniæ dimidiā potionem, in uino odorato bibendam dato. Quū uero uteri suffocant, & simul tussierit, sandarachæ obolū, & sulphuris uiui tantūdem, & amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, misceto & in uino odorato exhibeto. Si uero adhæserint uteri, ordeū terito, & unā cum paleis

paleis, & cornu cerui, oleo subigito, & sufflito. Quum aut sursum ascēderint, & cor ac stomachus prematur, & subfiterint, myrrhā aut resinā, aut netopū, aut castoriū, aut silphij succū bibendū dato. Quū uterus strangularit, spiritus autem aceruatim sursum cōmotus fuerit, & grauitas incubuerit, & mens percussa fuerit, & loqui nō potuerit, & perfrigeratio adest, ac spiritus offendens, & oculi obscuratur: caput q̄ citissime radito, & per fasciā supra umbilicū, si opus fuerit, deligatā detrudito. Dato aut castoriū, & conyzā, & rutæ aquā, cuminū Aethiopicū, raphani semē, sulphur, myrrhā. Ad nares graueolētia, ad uteros benevolentia adhibeto. Si uero sustinuerit, etiā grani cnicij internā partē, albā illam, melle subactā ac mixtā, naribus illinito. Aut schinū scillae specijē quæ mordeat. Quū aut dolor habuerit ac suffocatur, maluae radicē, aut acetū mullum, aut feniculi corticē, aut crethmū in aqua bibendū dato. Optimū uero est eructare, & sedentē collocare, & sternutationē facere, aut ueratū naribus admouere. Si uero sub septo trasuerso ac praecordijs uteri sedere uideatur, derepente uoce destituitur, & praecordia dura fiūt, & stragularit, & dentes cōserit, & uocata non audit. Oportet igitur sub nares suffiri lanā accēsam, bitumen in ignē coniectū, & castoriū, & sulphur, & picē. Inguina uero & femora unguēto odoratissimo intus inungere. Aut stellas marinas nigras, & brasicā uino odorato misceat, ac bibat. Aut myrrhæ obolos tres, coriādrī parū, resinam, paeoniae radicē, cuminū Aethiopicū, hęc in uino albo & aqua trita, aut cū aqua mulla diluta, leuiter tepida bibat. Auxiliatur & peucedanū, aristolochia, cepæ lachryma, panaces in uino aut aqua leuiter tepida datū. Vteros ad locū suum reducit, crotonis radix pota, aut cuminū Aethiopicū, aut apiū, aut feniculi & anisi semen, aut piper, aut myrrha, et papaueris succus potus. Si cor strangulatur, ab utero reprimatur, & spiritus habet, et anhelatio: Viticis, & paeoniae semē in uino bibere oportet. Aut abrotonū, & panaces, & ammoniacum. Aut rutam, aut somnicū papaueris succū. Rursus igitur si similiter habet, melanthiū terito, & melle subigito, & uelut glandulam efformato, ac pennæ circūdato, & apponito. Aut philiastion similiter subdito. Aut telephiū, aut anemones folia trita, in linteū indito, & modica myrrhā ammixa apponito. Si in lumbos uteri incubuerint, suffocatio uero caput nō contigerit, polypos cōctos edat, & uinum nigrū odoratum meracum q̄ plurimum bibat. Quū uero uelut ad uiscera conuersi strangularint, uinum cedrinū, & uinum Aethiopicū bibat, & calida lauetur, & odoratis fomentis utatur. Si uento inflati fuerint uteri, aromata omnia in unguentū immittuntur, & laurus, & myrtus, & saluia, & cedri ac cupressi ramenta. Hæc cōtundito, & trita cribrato, & in uinū odoratum inspergito, & oleum rosaceum superfundito. Quum uero transuosi uteri presserint, ordeum unā cū paleis, & myricam, & cerui cornu, uino subigito, ac sufflito. Quū assistētes strangularint, funiculū lucernariū accendito, & prę naribus extinguito, quo fuligo & nidor ipsas ingrediantur. & picem, & castoriū, & peucedanū, & myrrhā, unguento irino diluito, & subacta apponat. Bibat autē resinam oleo dilutam. Si ualde strangularint, Aut testudinis iuxta mare natae obolos tres, in uinū albi hemina, uel cyathis tribus tritos, bibendos dato. Aut cedro in lucernam infuso, lucernam accendito, & ubi extincta fuerit, ad nares adhibeto. Aut cœnum foetidissimum similiter. Aut lanam incensam sub nares mulieris sufflito.

Aur bituminis parū tritum in uino albo bibat. Aut erysimi conchæ testam, & castoriū in uino albo bibenda dato, & lauato. Si uero etiā tussiat, sandarachæ obolū, sulphuris uini obolos duos, amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, & castorij obolum, cum uino odorato misceto, & bibenda dato. Si uero strangularint uteri, & strangulatio cor contigerit, & os condusum fuerit, acetum calidum sorbendum dato, & os paxillo aut radio aperito, & uinū in odorū similiter exhibeto, & cum aceto mulso. Si uero ualde strangularint, & uoce destituta fuerit, cepam in uino tepido tritā, in nares instillato & excitato. Si uero usq; ad hepar ascenderint, & suffocatur, uoce destituitur, & nihil uidet, & dentes conserit, & dura fit, & nihil sentit, & frequēter respirat, & nō audit. Hæc sub præcordijs manibus comprehensam frequēter inungito. Et dentibus cum paxillo diductis, uinum meracū tepidum infundito, si nihil prohibuerit. Et per unq; statim melius habet. Si ad inguina incūbant ac innitantur, caprini stercoreis pilulas, & leporis pilos, phocæ adipe subigito ac suffito. Aut hederæ frustum, aut folia, aut corticem siccato, et quercus folia ac resinā ammisceto, oleoq; subigito ac suffito. Aut coaguli phocæ pellem cōterito, & spongiam ac muscū, cum phocæ adipe ammisceto ac suffito. Aut stercoreis caprini pilulas, & phocæ pulmonem, ac cedri ramenta suffito. Sed & bubulum stercus suffito. Aut cornuum bouis ramenta, & bitumen. Aut spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramenta, & myrti folia sicca. Hæc molli unguēto subacta suffito. Multa uero aromata in unguētum injicito. Aut uinacea uisā trita, & cedri baccas, & resinā pineam, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta à quibus discedunt.

Stercus bubulum cōrsum, aceti dimidia mēsurā, & decocti erui ex aqua marina aut dulci similiter dimidia adiecta, pro fomētō adhibeto. foueto aut leuiter & lenticulæ decoctū bibendū dato, ac reuomendū. Et farinā sorbendā, & insuper uinū. Postridie uero granū enidiū dato. Sed & quod urinā ciet. Ciceris partes duas tritas, uisā passæ optimę tertiā partē, affuso aquæ cōgio coquito, dein de excolatā aquam per noctē sub dio exponito, & postridie bibendā dato. et de cætero saluā, & lini semē, & polentā, bis per diē in uini diluti heminis quatuor dato. Aut olei heminas dimidias tres, foliorū sambuci manus plenæ mensurā, hæc coquito, & cū calidis foueto. aut testis calidis immixtis fomentū facito, muliere in sella collocata, & uestimētis cooperta. Aut sambuci folia cum myrto coquito, & in excolata aqua paleas ordeī coquito, & fomentū facito, si calorē fuisse poterit. Aut acetum, oleum, mel, aquā. Hæc permixta ac ualde feruefacta, in uesticā infundito. Aut pini corticē, et rhois folia in aquā injicito, & fortiter coquito, & in excolatā aquā etiā ordeī paleas immittito ac coquito, & affuso oleo foueto. Aut lori & cupressi ramēta, aqua et oleo affuso, probe coquito, ac foueto. Aut cū aromatis unguētū infundito, & gallā injicito, & rhamnī corticē, & polentā triticēā cū aqua. Si uero uteri extra prominuerint, & dependēt uelut scrotū, myrti baccas, lori ramēta, rubi & oleę folia, simul coquito, & leuiter tepido foueto. Aut cū uino unā cū illis & cū graueolētibus, similiter. Externas aut partes cū oui candido oblitito. Quū uero perfrigerātur, & liuida factæ fuerint, cū aqua calida. Mollitoria uteri. Adipem ouillū, ouorū uitellū, mel, oleū rosaceū sumito, & cū his farinā subigito, & ad lentū ignē tepefacito, & quod destillat lana exceptū emollito ac apponito. Aut adipē ouillū aromatis conditū, et nitrum

nitrum rubrū, anferis adipem, & oleum rofaceum colliquata & lana excepta apponat. Aut anferis adipem, ouillum adipē, ceram albam, netopū, rofaceum oleum. Hæc q̄ optime permisceto, & tenuibus linteis excipito, & statim ubi lota est, apponat tepida osculo uterorū. Aut cerui medullam, & anferis adipē, in rofaceo oleo liquefaciat, & molli lana excepta subdat. Mollia subdititia, quæ a quam ducit, & mucos, & pelliculas, & non exulcerant. Myrrham q̄ optimā, & salis granū, & picem aromatis imbutā, terito & apponito. Aliud. Grana cnidia decorticata triginta, Indicum quod Persæ piper uocāt, & in hoc inest rotundū, quod appellant myrtidanū, cū lacte muliebri simul terito, & melle diluato. Deinde lana molli ac pura excepta, & pennæ obuoluta subdito, & per diem finito. Si uero fortius facere uoles, modicū myrrhæ ammisceto, tertiā uidelicet partem, siue trientē, & lanam mollem purā semisuccidam. Ex uteris educit, & osculū molliūt, narcissus, cuminū, myrrha, thus, abinthiū, cyperis. Hæc ipsa per seipsa, et cū oleo rofaceo, aut albo, aut Aegypto. Apponantur autē ubi lota est. Aliud quod saniem cruentā educere potest. Cū tēdis misceto myrrhā, falem, fel taurinum, cuminū, mel, & in lana subdito. Aut cumini folia similiter in uino trita. Aut silphij succum ad ficum ammisceto, et glandulam inde factā subdito. Idem facit & mori radix cū melle, & postea rofaceo illinito. Efficax est & alij caput integrū, & nitrū rubrum, & ficus pinguis, pari portione, misceto autem & gallam paruā, & glandē facito, eamq̄ liquore aliquo tinctam subdito. Et postea lota cerui adipem in lana subditū habeat. Aliud quod cruenta omnia magis prioribus ducere potest, & mollire. Piper, elaterium, & lac muliebre misceto, & cū his terito etiā mel, & oleum albū, & cerui adipē, & linteo excepta subdat. Vehemēter uero ducit omnigena hoc. fici pingue, elaterij portiones duas, nitrum rubrum quantū elaterij, mellis parum, cū linteo aut cū lana glandem facito. Aliud. Netopum, fel tauri, nitrū, cyclaminū, gallam, cū melle terat. Postea uero lota adipem cerui subditū habeat. Aut pulegiū & fel tauri tritum pennæ obducit, & in oleum Aegyptium tinctū subdat. Aut cyclaminū magnitudine tali cum æris flore. Aut anemones caput cum farina tritū pennæ obducit, & in oleo albo tingito. Aliud quod omnia ducit. Cucumeris syluestris oblongi internam partē, exempto semine, cū lacte terito, & myrrhā puram unā cum ipsis, adiectoq̄ modico melle, & oleo Aegypto, molli lana excipito. Aut cucumeris syluestris internā partem siccato, & melle affuso terito, ac glandē formato. Postq̄ aut lota fuerit, adipē subdat. Aut elaterij portiones tres cum aqua.

Mollitoria. Oui candidū, farinā, mel, ceram albam, hæc simul tepefacito, & quod defillat lana exceptū apponito. Aut adipē anferis, ceram albam, resinam, unguentū rofaceum, cerui medullā liquefacito. Aut ouillū uel caprinū adipem, oui candidū, unguentum rofaceum. Ex his aut glandē facito, aut lana excipito.

Fomēta per quæ uteri purgātur, si duri fuerint. Vinū suauissimū pari aqua tēperare oportet, triū semicongiorū Atticorū mēsurā & foeniculi radices ac feminis eiusdē quadratē, & olei rosacei heminā dimidiā, in ollam mittere, cuius operculū foramē habet, & uinū superfundere, et arūdinē indita fomentū facere, & postea scillā apponere. Si dolores repētini irruerint, et animi deliquia affuerint, rosarū folia, cinamomū, myrrhā purā, netopū, papaueris succū, hæc in passillis drachmales efformato, & super fructo amphoræ candēti ponito, & pro

suffia

suffimento utitor. Aut styracis modicū in oleum mitto, ac utitor uelut priore. Omnia quæ in unguenta injiciuntur tundito ac cribrato, & super sterco bubulū mitto, itemq; styracē, & netopum, rosacē oleum q̄ optimum, & Aegyptium albū affundito, & post purgationes suffito. Aut lauri & myrri folia tundito, & cyperi fructū, cum unguento albo Aegyptio subigito, addito etiā netopo, & super stercore bubulo suffito, Auxiliatur & manna thuris, & cupressiamenta, & cyperi radix tusa. Sed & iuncū odoratum aromaticū, & cardamomū, & iridem nudito ac cribrato, atq; hæc omnia misceto, & rosacē oleum ac netopum ipsis affundito, & utitor in crassiore tritici farina. Aut resinā in recens formato sicili suffito, castorio, aut aliquo ex aromatis adiecto. Caput uero oleo rosaceo tingito, in aures autē myrteum, aut melinū oleum infundito. Et cicer album, & uuas passas coquito, ac decoctū bibendum dato, & in aqua calida desideat. Et oliuas albas priuquam oleum remittunt lancinato ac siccato, & in uino odorato terito, & acetabulum Atticum præbeto. Aut cantharidū uentres, aut adiantum, & nitrum rubrū Aegyptium, & ferulæ radicem, & apij semen tritū, hæc exhibeto. Si uero urinæ stillicidium corripat, in aqua desideat, & uinū dulce bibat. Si maxime strangulatur in uterorū dolore, uinum suauißimū pari aqua temperatū, trium semicongiorū Atticorū mensura, & feniculi radices, & feminis eiusdem trientē, & olei rosacei heminam dimidiā. Hæc in nouam oleam mitto, & uino superfuso foueto. Et scillam apponat, donec osculū molle & ampliū esse dixerit. & si exulceratū fuerit, ac pustulę ubiq; in ipsis fuerint, præstat adipe anserino cū thure curare. Ad uterorum dolorem. Peucedanū, aristolochiam, panaces, hæc simul in uino dulci misceto, & tepesacta bibēda dato. Et peplum album forbeat, & urticæ semen. Aliud fomentū siue suffimentum. Si dolor habuerit, malicoriū punici dulcis, loti ramēta oleæ folia sicca tusa. Hęc cū oleo subigere oportet, & super ignitū sterco bubulum mittere. Aut galbanum, myrrhā, thus, oleum albū Aegyptiū, super uitis farmēta. Aliud fomentū fortius ex bitumine. Bitumen, radicē xanthij, pilos leporis, rutā, coriandrum siccū, hæc omnia terito, & formatas inde placētulas siue pastillos suffito. Aut ad picem, & sandarachā tusam tritā, cupressi ramēta ammisceto, & unguento affuso placētulas formato, & in ignē missas suffito. Aut cornu capræ in ramēta confectū oleo subigito, & in ignē missum suffito. Aut effossa scrobe, uinacea uas torreto, & cinerē in scrobe mittito, & uino odorato inperfo, mulieri circūinsidenti fomentū facito. Sint autem uinaceorum choenices duæ, atq; hæc ipsa quàm maxime sicca. Si uero uterus doleat usq; ad uesticam, porti semen cum aqua tritum bibat. Aut cyclamini radicem, in uino albo ieiunæ bibendam dato, & calida lauetur, & subcalidam ieiuna bibat, & tepesactoria apponat. Aut alij caput integrū, & nitrū tostum, & cuminum, trita ac melle subacta apponito, & calida lauetur, & subcalidam bibat. Ad omnem uterorū morbum curandū. Lini scissi unā cū stipula pugillū tenuiter tulum, in uino albo q̄ suauißimo per noctē madefacito, deinde excolatū in ollula tepesacito, & in eolanā mollissimā tinctā apponito, & uicissim priore detracta aliam subdito. Opitulatur autem & crocus, & myrrha, & ponticæ nuces, alba & pura lana excepta, & cum adipe anserino ac unguento irino apposita. Si dolor uexarit ex subdititjs purgatam, myrrhæ acetabulum, thuris tantundem, melanthium, cyperum

cyperum, fefeli, anifum, apij semen, netopū, mel, refinam, adipem anferinū, oui candidum, unguentū Aegyptiū, ſingula paribus portionibus in uino albo dulci, duarum heminarū menſura terito, & tepidis infuſis colluito. Si dolor uehemens habuerit, cantharides, cyperus, calamus, iuncus odoratus, & iris profunt. Hæc in uino nigro coquito, ac utitor. Alia collutio. Si dolor & urinæ ſtillicidiū uexarit, porri ſuccum, ſambuci fructū, fefeli, anifum, thus, myrrhā, uinum, in ſuccum redigito, miſceto, ac infundito. Aut myrrhæ acetabulū, thuris tantundē, melanthij & cyperi tantundē, fefeli, anifum, apij semen, netopū, mel, refinam, anferis adipem, oui candidū, unguentū Aegyptiū, ſingula paribus portionibus in uino albo dulci diluito, ac infundito. Aut mercurialis aquā decoctā cum myrrhā, thure, netopo. Aut ſaluia, & hypericū, in aqua coquito ac infundito. Aut apij ſemen, anifum, melanthiū, fefeli, myrrham, caſiæ fructū, in uino coquito ac colluito. Alia collutio. Si dolor fuerit uehemēs poſt purgationem. Sambuci fructum, & lauri baccas, in uino nigro coquito ac colluito. Aut ſambuci in aqua coquito, et aquā excolato, et uino dulci aſuſo colluito. Si poſt collutionē inſuſam dolor oboriat, aromata quæ in unguēta inſiciuntur coquito, & de aqua duas heminas excolato, miſceto autem adipem anferis, & oleū roſacū, & tepida infundito. Amplius autē in ſuſum nulli, ut ſemel dicam, cōpetit quæ duarum heminarū. Aut mercurialem in aqua coquito, & ad ſuccū, myrrham ammiſceto, aut thus, & netopū pari menſura, & tepidum infundito. Si uero uterus doleat cyclamini radicē in uino albo ieiunæ bibendam dato. Et calida lauetur. & ſubcalidam bibat. Si ex feruido & ſuperficiario ulcere pudēda fuerint exulcerata, myrti baccis in uino coctis colluat. & meliorū apponat. Et mali punici dulcis putamina in uino coquito, & myrrhā ac refinam ſimul mixta uino diluito, & intinctū in his linteū ſubdito. Et ſi urinæ ſtillicidium corripiat, fomentū adhibeto, & pectinem illinito. Deſideat aut in decocto roſarū, aut ruſbi, aut myrti, aut oleæ, aut pampinorū uitis, aut iuniperorū baccarū, aut ſaluia.

Si uentus in utero obortus fuerit, & dolor uehemens, & flatuſ nō exit, cuius minimum apponat. Et ſaluia ac cyperū tuſa madefacito per noctē, & mane excolato, & lucidum ac clarum cremorē in uas infundito, et craſſiorē tritici farina cum uino albo ammiſceto, & ſilphij ſuccū magnitudine fabæ, cū farina coquito, & crudius forbenda dato. Si columella in pudendis naſcatur, dolor obſtinet. Et doloris quidem medela eſt apij ſemen. Columellam uero reſecare oportet. Si ulcera in pudendis oboriantur, & pruritus corripiat, oleæ folia, & heræ, & rubi, & mali punici dulcis trita, & uino ueteri diluta, cum recenti carne apponito, ita ut folia carni oblinas. Et habeat ſubditā per toram noctem. Mane uero eximies, & myrtum in uino coquens, cum uino pudenda colluat.

Notha ad ſuam primilibri De morbis muliebribus adiecta.

Ad ſuſim pueri. Thapſiam in polenta edendam dato. Aliud. Ex ouo aſſato uitellum acceptum terito, & ſefamū album toſtum, et ſalem, cū melle delingēda dato. Ad aluū pueri ſoluendam. Lanam illorā melle tinctam indito. Si uero antiquior fuerit puer, ceparū internas partes tritas cū melle indito.

Si lac nō fuerit. Recentis tritici farina eloram, melle ac oleo ammixto, tepidam forbendā dato. Ad anhelitū pueri facit. Thus in uino dulci, & illi uies.

Purga

Purgatorium. Glandulas facito ex mellis hemina, anisi acetabulo, bitumi nis drachmis duabus, felle bouis, myrrhae drachmis tribus, elaterij portioe. Hęc in uase aeneo coquito, & anseris adipem ammisceto. & ubi uti uoles, glandulis anserino aut ouillo adipe illinito. Iana autem utere molli. Vomitum soluit.

Ocyini succus in uino albo. Aliud. Farinae tritici recentis exsuccatae aqua. Aut de malis punicis dulcibus & acidis succum exprimito, & deinde mel ammisceto. Corrosiuum sic paratur. Veratrum nigrum, sandaracham, squamam aris, singula paribus portionibus seorsim terito. Quum autem trita fuerint, ad unam partē, duplam calcem ammisceto, & cedrine subacta illinito.

Aliud corrosiuū pharmacū sic paratur. Florem aris pure cōbustum donec ruber fiat, terito ac utitor. Pharmacū nigrum. Squamā aris, & florē aris, seorsim ambo terito. Vbi uero contriueris, ita misceto. Duas aut tres pharmaci species facito. Vnam fortissimam quae habet ad squamam, tertiam floris partē. Alteram, quae quartam. Tertiam, quae quintam. Hoc pharmacū ad omnia conueniens est. Illitio ad anginam. Roris marini semen, staphis sylvestris, absinthium, elaterium, mel. In doloribus podagricis. Abcessus nitro trito aqua diluto, cataplasmatris modo integito, & tribus diebus non lauato. Vbi uero laueris, rursus nitrum rubrum crudū cum modico melle terito, & hoc semper utitor. Inflammata illine portulaca cum farinae massa, & lactucae rubrae drachma, ex aqua dissoluta. Medicamenta occulatoria. Aes ustum, ærugo, fel caprae, myrrha. haec dissoluuntur, & omnia simul trita uino albo diluuntur, postea in arundinem coniecta, sicca in usum ueniant. Puluillus. Misy preparatum in pila terito, & spumae argenti chrysitidis appellatae cinerē lotum ammisceto, Sint autē cineris partes tres, misyos una. At misy in maza comburito uitans ne diffuat. Nam dum torretur liquefcit, ubi uero probe tostum fuerit, puniceum fit. Alius puluillus. Cerusa eodem modo cum misy tosto miscetur, uelut chrysitidis cinis. Alius puluillus fortior priore. Spodium cyprium ex fuligine lota, & cerusa; & misy torrefactum. Sunt autem duae partes cerusae de spodio, una uero misyos. In haec anemona folia cōtusa exprimito, & in aris rubri uase ad solem exponito, & ut nihil illabatur cōtegito. Quum uero crassa facta fuerint, pastillos formato, deinde siccato, & siccato q̄ maxime fieri potest comburito, & postea perfrigeratos leuiter terito, & de spodio ex fuligine loto parem portionem misceto, deinde netopon instillato, & parum terito, deinde melle diluito, & resiccata in uase aereo asseruato, ac utitor. Puluillus mollis. Spodium cyprium, chalcitis non lota leuiter trita, flos aris. Hęc paribus portionibus misceto ac terito. Alius. Spodium cyprium, chalcitis leuiter trita, & cinis chrysitidis illotus. Hęc inter se terito. Alius. Spodium lotū, chrysitidis, & aris flos, paribus partibus trita. Alius. Vuæ acerbæ succus, & spodium cyprium. Vuam immaturam in vigore constitutā sume, & succum per linteū, in uas aris rubri exprime, & aceti albi acerrimi tertiam partem ammisce, atq̄ sic in sole coque, & quinquies in die agita ac cōturba. Et ubi crassus factus fuerit succus, spodium cyprium tritum adijce ac permisce, ita ut ubi sex aut septem dies in sole positus steterit, ad heminam succi Articam, spodij drachmas octo immittas. Si uero acrius efficere medicamentū uoles, minus de spodio: sin mollius, plus. Postea uero siccato haec, donec in pastillos formari possunt

possunt. Deinde domi siccato, sursum in fumum suspensa, atq; hoc tandiu donec testacea fiant, ut inter terendū non adhæreāt. postea sic utere. Reponito autem in loco humiditatē nullam habentē. Alius. Spodium, chalcitidem, aceto albo subigito. deinde factos inde pastillos siccato, & ubi oculū sublinire uoles, q̄ optime terito, & uino ueteri dulci concalefacito. Ad argemon oculi ulcus. Populi nigrae lachrymam, lac muliebre, misce ac utere. Si oculus lachrymetur, & dolor uexet. Mali punici dulcis succum expressum in aëro uase coquito, ut niger fiat instar picis. Si uero æstas fuerit, ad solem exponito, deinde liquidum sublinito. Si uero dulci lachryma fluat oculus, quum uua fuerit alba, ualde matura, & gracilis in uite, decerptam exprimito ac excolato, deinde in sole siccato, & ubi ficcus factus fuerit succus deradito, & æruginis dimidiū obolum atticī ponderis ammisceto. Deinde hoc sublinito. Puluillus insperfilis. Plumbum & spodium, æquis partibus, myrrhæ decimam partem, succi papaueris parum, uinum uerus, arida tere ac utere. Alius. Accipitur foria siue recrementū plumbi, & spodij tertia pars, & cerusæ tertia, & chartæ uisæ tertia, & myrrhæ pars decima. Si pilos ex corpore extirpare uoles, uitis lachrymā cum oleo illinito. Si uero etiam circa oculum tollere uelis, euellito & illinito, & cum tenui cuticula discedet, et locus rubicundus ac boni coloris erit.

Ad intestinorum leuitatem. Lentis ac triticum recens duarū chœnicum mentura aqua macerato, & ubi mollia facta fuerint, in pila aut mortario fortiter conterito. deinde aquæ heminis sex affundito, ac fortiter cōmoueto. & ubi purgamēta discefferint, in ollam infundito, & modico melle affuso coquito, & ualde cocta torrefacito, ac edenda præbeto. Si uero sitierit, uinū uetustissimum bibat, atq; hoc utatur donec sanus fiat. Ad grauedinem. Si quis grauedinem habeat, myrrham tritam ammixto melle, linteo excipiat, & nares cōfricet.

Infusum sedis pituitam ducens. Thapsiæ potionem, & uas passas quadraginta: aut grani cni dij, aut cnesfri potionem sumito, & mellis dimidiam heminam, ac olei tantundem ammisceto, & aqua marina diluito, in qua surfures cocti sunt, aut pitūana, donec pinguis facta fuerit. Aut adipē betæ succo ammisceto, & nitri drachmas decem. Aut salis heminam plenam aquæ marinæ ammisceto. Si uero bilem ducere uoles, succi silphij portionē, elaterij drachmam unam & dimidiam, colocynthis drachmā, terito & iisdem quibus prius diluito. Si autem uehementius ducere uelis, cucumeris syluestris internam partem quarta drachmæ parte in dimidia aquæ hemina macerato, & per sedem infundito, & si in egressu mordeat, pitūanæ succum postea infundito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in betæ succi heminis tribus, internā cucumeris syluestris partem macerato, & salem, mel, ac oleum ammisceto. & postea pitūanæ succum infundito. Aliud. Colocynthis drachmam terito, & in lacte asinino macerato, eademq; misce. Aliud. Cucumeris syluestris interioris drachmam, elaterij potionem, salis quantum tribus digitis apprehendi potest, mel, oleum, aqua marina diluito. At si stercus educere uoles, nullum pharmacū bibito, sed alijs utere. Infusum ad dysenteriam. Punici dulcis malicorium in uino ad dimidias coquito, & olei, quartam heminæ partem ammisceto, & thuris quartam drachmæ partem. Aliud. Vnguenti rosacei dimidia hemina, pitūanæ fucus, aqua marina cocta. Aliud. Veratri potiones duas tritas, in aquæ di-

midia hemina diluito, & olei tantundem affundito. Potio. Mala coto-
nea difsecato, & in aqua macerato, & ubi aqua odorem acceperit, bibendam da-
to. Alia. Pifanae farinam in congruam aquae miffam, coquito donec pinguis
fiat. Alia. Mala concifa ficcata, & fauam mellis, in aqua macerato, ac fimul te-
rro, & ubi fubdulcis facta fuerit excolato, & apij folia inijcito. Alia. Vuam
paffam albam, & calaminthen, & fauam mellis, in aquam mittito ac terito, do-
nec aqua fubdulcis fiat.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE STERILIBVS, IANO CORNAE

rio Medico Phyfico interprete.



De his quidem quae accidunt mulieribus in fingulis affectioni-
bus, prius dictum est. Nunc autem ostendam ob quas causas
mulieres omnino steriles fiunt, & cur non pariunt antequam
sanentur. Causam uero hanc esse dico, si os uterorum omnino
auerfum fuerit à pudendo, non concipiunt. Non enim fuscipiunt
uteri genituram, sed statim foras exit, contingit autem
hoc etiam si parum distortum fuerit os uterorum praeter naturam
à pudendo. Et si omnino conclusum fuerit os uterorum, neque sic fuscipiunt.
Neque si recens conclusum fuerit magis quam oportet. Singula uero relata manifesta sunt.
Etenim si omnino auerfum fuerit, aut conclusum, menses non prodeunt omnino,
aut prodeunt uiolenter cum morbo, si sanguis coegerit uteros pro more conuerti.
Et si purgata fuerit mulier, aliquando os uterorum ipsi à pudendo auertitur. Si uero
parum distortum, aut recens conclusum fuerit, prodeunt quidem menses, prodeunt
autem uiolenter, & paulatim per multos dies. Haec autem omnia manifesta fiunt,
si sic habent, contingenti mulieri. & si horum aliquid fuerit, curata mulier foecunda
fit. Quandoque uero etiam sua sponte. Haec autem singula cur fiant, dixerunt. Di-
ctum autem est & in muliebribus morbis. Si leues fuerint uteri, contingit
autem hoc & ex natura quibusdam, & si ulcera innata magnas cicatrices relique-
runt. Si leues igitur uteri fuerint, mulier in uentre non concipit. Nam genituram
fuscipiunt quidem uteri, si non alia aliqua causa obstiterit, non autem concipi-
unt, sed semen foras emittunt. Hoc autem maxime clarum fit contingenti, & si
interrogetur an aliquando ulcera in uteros ipsi oborta fuerint. Menses uero saepe
non quidem modo prodeunt in hoc morbo. Verum talis plerumque incurabilis est. &
haec causa est, ut in uentre ne concipiat. Si ulcus in uteris factum fuerit ab af-
fectione quadam ex relatis, & non statim sanatum, sed impurum factum fuerit,
permanet ulcus ad multum tempus, quemadmodum & id quod in aure existit,
& male olet mulier, & quandoque sanies male olens ipsi ex pudendo fluit. & qua
diu sanie ulcus habuerit, in uentre non concipit. Non enim concipiunt uteri ge-
nituram. Huic autem menses sano modo procedunt. Verum ex contactu, & in-
terrogatione, maxime clarum fit de relatis. Curata uero foecunda fit, exigua tamen
menipes est. Si quid ex mensibus in uteris remanens scissuram ac segmen-
tum habeat, quod circa osculum aut paulo penitius calefaciat, et rursus frigefcat,
neque sic in uentre concipit. Impedimentum enim hoc incumbens, genituram quod
oportet

Io bibat. & brasicā cōctam, & uinū album in super bibat. & ne cōcnet. & bis in die lauetur. A cibus uero hoc tēpore abstineat. Postea uero si procefferit secundum stomachū, & purgationē aliquam foras ostenderit, de potionē aliquid bibat, per unum atq; alterum diem, & à specillorum usu cesset. & conetur uteros purgare subdiutius, & medicamentis. Cuiuscūq; uero, stomacho recto, & molli & sano, & probe habente, & in debito loco sito, menses omnino nō apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani: morbum pericrutatus quem uteri habēt, et an corpus etiam aliquid conferat, comperies causam à qua prāgnans non fit. & quū quidem sic habet, curationē facito adhibens id quod conuenit, si admiserit, curationē incipiens à fortibus, prout tempestiuū esse uidebitur. desinens autē in molliora, donec uterus probe purgatus esse uisus fuerit, & stomachus consistere recte habens in sufficiente loco situs. Si uero à pharmaco & à potionē non procefferit, neq; ubi ipsum bibit moderato tempore, à potionē quidem hac cesset. Quum uero probe habuerit, per usum specillorum os stomachi mollito, & ut hiet facito, ad uiam subditio prāstandam, tum à medicamentis suffumigabilibus, tum à mollitorijs. Postquam autem probe mollitum ac suffitum esse uidebitur, appositis pharmacis uteri purgationem facito, donec probe habere uisum fuerit, incipiens à mollibus ad fortiora, desinens autem rursus in mollia odorata, pleracūq; uero ex fortibus medicamentis stomachum exulcerant, & prohibent ne rectus cōsistat, & probe habeat ad generationē susceptionē, & uterum siccum faciunt. Si uero mulier à pinguedine uteros sibi laesos esse putet ad cōceptionē, attenuato ipsam cō maxime, & ad reliqua gracilem facito. Vernū autē tempus optimū est ad conceptū. At uir nō sit ebrius, neq; uinū albū bibat, sed fortius ac meracius, & cibos edat fortissimōs, & calida ne lauetur. & robustus sit ac sanus, & à cibus abstineat qui ad rem non conducunt. Quum autē mulier purgata uisa fuerit, & stomachus uteri recte habere, lauetur, & caput fricetur, & nihil omnino illinatur. Postea linteo inodoro loto capillis circumdato, reticulo loto nihil olente deliget, linteo primū supposito, quiescat. Postea mane exoluto reticulo ac linteo, caput suum alicui olfacientium exhibeat. & si probe fuerit purgata, olet, sin minus, non olet. Verū hæc à cibus abstinens faciat. Si uero nō fecundæ appoueris, nunq; olet, neq; purgata, neq; aliās. & si prāgnati appoueris, neq; sic olebit. Quæ uero sepe concipit, & fecunda est ac sana, ei si appoueris, etiam si nō purgaris, olebit ipsius uertex, alibi uero non. Quum uero cognoueris ipsam recte habere, ad uirum accedere iubeto, & mulier quidem à cibus abstineat. Vir autē non sit ebrius. Verum frigida lotus, & cibus paucis cōducentibus pastus, & si mulier geniturā se cōcepisse cognouerit, primo tempore non amplius ad uirū accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem uir dixerit se emisisse, Mulier autē præ siccitate ignorat. Si uero uterus rursus reddiderit geniturā eadem die, humidus erit, & si humidus factus fuerit, rursus cū uiro miscetur, donec concipiat. Alia curatio. Vbi fomentum toti corpori adhibueris, medicamentū bibendum dato sursum ac deorsum purgans. Deinde lacte asinino postea in potu exhibitio, uteros per fistulam duobus diebus foueto, cū urina muliebri putrida, nitro iniecto. Tertia uero die, cū urina bubula. Quarta autē & quinta, feceniculi semen tritū, & sambuci

an mulier cōcipiet, anifum in aqua tenuissime tritū bibat, ac dormiat. & si quidem pruritus ipsam circa umbilicū corripuerit, cōcipiet. Sin minus, non. Prægnantem mulierem si nō ex alio cognofcas, ex hoc cognofces. Oculi uidentur diftracti ac cauiore. & candidū in oculis, albedinis naturam non habet, fed liuidius apparet. Quæ in uētre habent, maculā folarem in facie habēt. & postq̄ conceperunt, uinū odio habent, & cibos auerfantur, & oris uētris morfu, ac faſtulia plenæ fiunt. Mel & anifum tenuissime terito, deinde in aqua diluito, ac exhibeto, & dormire finito. & si quidē tormen ipſi fiat circa umbilicū, prægnās eſt: Sin minus, non eſt. Poſt hæc autē omnia, farinam bibat, & mel, & origanū, in uino & oleo. Quæcunq̄ in utero habentes, maculam folarem in facie habent, fœcellam geſtāt. Quæ uero bene coloratæ permanēt, maſculum plerūq̄ geſtant. Si papillæ ſurſum cōuerſæ fuerint, maſculū geſtat. Si deorſum, fœcellam. Accipe de lacte, & farinam miſce, & paſtillum forma, & ad lentum ignem aſſa. Et ſi quidē comburatur, marē geſtat. Si uero diffundatur, fœcellā. Aut idem hoc lac ſuper folia emulctum cōtemplare. Et ſi quidem condenſatur, maſculum geſtat. Si uero diffuſum fuerit, fœcellam. Curationes ad conceptionem experimēto cognitæ. Si qua liberorū generationē experat, quæ ſine liberis ſit, & ſi qua iam antea prægnās fuerit, nunc autē non pariat. Quum ſtomachus uteri durus fuerit totus, aut ſumma parte, & cōcluſus ac nō reſtus fuerit, ſed ad alteram coxam auerſus, aut ad inteſtinū reſtum inclinatus, aut in ſeipſum contractus, aut labium ſtomachi ſibi ipſi incubuerit. Vnde cūq̄ igitur aut aſper fuerit, aut calloſus. ſit autē durus & à cōcluſione, & à calloſitate. Hiſ meſes non apparent, aut multo pauciores aut peiores q̄ oportet apparent, & per longius tempus, Et meſes quidem iuxta ſanitatem corporis & uterorū, exitum inueniūt. Itemq̄ iuxta naturalem ac iuſtum modum, & à calore & humiditate menſium, & ſtomacho non ualde læſo. At genituram rurfus non ſuſcipit, propter læſionem, quæcūq̄ tandem impeditur ſuſceptionē à ſtomacho non bene habente. Huic poſt fomentū toto corpori adhibitu, pharmacum bibendū dare oportet, & corporis purgationem primum facere, ſiue ſurſum & deorſum, ſiue deorſum ſolum. Et ſi quidē ſurſum purgans pharmacū dederis, ante purgationem fomentum ne adhibeto, ſed poſtea. At fomēto prius facto, pharmacū deorſum purgans bibendū dato. Si uero ſurſum purgante nō opus habere uideatur, præmiſſo fomento, deorſum purgans bibendum dato. Quum autem corpus probe habere uiſum fuerit, poſtea fomentū adhibeto, ita ut uteros frequenter inſidere facias, in fomēto quod maxime cōferre uiſum fuerit. Inſicito autē in fomēta, cupreſiſ ramenta, & lauri folia cōruſa. & multa calida ſepe lauato. Quū uero recens lota & fota fuerit, uteri oſculū dilatato, ſimulq̄ dirigito ſi opus fuerit, cū ſpecillo ſtanneo aut plūbeo, à tenui auſpicatus. Deinde cū craſſiore ſi admiſerit, donec probe habere uidentur. Tingito autē ſpecillum in mollitorio diluto, quodcūq̄ liquidum factū conferre uidebitur. Specilla uero retro lata facito. Deinde lignis longis adaptato, ac ſic utitor. At uero hoc tempore, in uino albo dulci q̄ ſuauiſſimo, tædam pinguiſſimā in tenuia fruſta conciſam coquens bibat, & apri ſemen cōtuſum, & cumini Aethiopiici ſemen, & thus q̄ optimum. De hoc ieiuna bibat moderata copia, per quot dies bene habere uiſa fuerit, et edat carulos pingues percoctos, & polypū in uino dulciſſimo coctū, & de iuſcu

lo bibat. & brasicā cōctam, & uinū album in super bibat. & ne coenet. & bis in die lauetur. A cibus uero hoc tēpore abstineat. Postea uero si proceſſerit secundum stomachū, & purgationē aliquam foras ostenderit, de potionē aliquid bibat, per unum atq; alterum diem, & à specillorum usu cesset. & conetur uteros purgare subdititijs, & medicamentis. Cuiuscūq; uero, stomacho recto, & molli & sano, & probe habente, & in debito loco sito, menses omnino nō apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani: morbum perſcrutatus quem uteri habēt, et an corpus etiam aliquid conferat, comperies causam à qua prāgnans non fit. & quū quidem sic habet, curationē facito adhibens id quod conuenit, si admiserit, curationē incipiens à fortibus, prout tempestiuū esse uidebitur. desinens autē in molliora, donec uterus probe purgatus esse uisus fuerit, & stomachus consistere recte habens in sufficiente loco situs. Si uero à pharmaco & à potionē non proceſſerit, neq; ubi ipsum bibit moderato tempore, à potionē quidem hac cesset. Quum uero probe habuerit, per usum specillorum os stomachi mollito, & ut hiet facito, ad uiam subdititio prāstandam, tum à medicamentis suffumigabilibus, tum à mollitionijs. Postquam autem probe mollitum ac suffitum esse uidebitur, appositis pharmacis uteri purgationem facito, donec probe habere uisum fuerit, incipiens à mollibus ad fortiora, desinens autem rursus in mollia odorata, pleraq; uero ex fortibus medicamentis stomachum exulcerant, & prohibent ne rectus cōsistat, & probe habeat ad generationē susceptionē, & uterum siccum faciunt. Si uero mulier à pinguedine uteros sibi laesos esse putet ad cōceptionē, attenuato ipsam q̄ maxime, & ad reliqua gracilem facito. Vernū autē tempus optimū est ad conceptū. At uir nō sit ebrius, neq; uinū albū bibat, sed fortius ac meracius, & cibos edat fortissimōs, & calida ne lauetur. & robustus sit ac sanus, & à cibus abstineat qui ad rem non conducunt. Quum autē mulier purgata uisa fuerit, & stomachus uteri recte habere, lauetur, & caput fricetur, & nihil omnino illinatur. Postea linteo inodoro loto capillis circumdato, reticulo loto nihil olente deliget, linteo primū supposito, quiescat. Deinde ubi galbanū ad ignem aut solem calefactū, ac probe mollitū subdit, quiescat. Postea mane exoluto reticulo ac linteo, caput suum alicui olfacientium exhibeat. & si probe fuerit purgata, olet, sin minus, non olet. Verū hæc à cibus abstinens faciat. Si uero nō fecundæ appoueris, nunq; olet, neq; purgata, neq; aliās, & si prāgnati appoueris, neq; sic olebit. Quæ uero sepe concipit, & fecunda est ac sana, ei si appoueris, etiamsi nō purgaris, olebit ipsius uertex, alibi uero non. Quum uero cognoueris ipsam recte habere, ad uirum accedere iubeto, & mulier quidem à cibus abstineat. Vir autē non sit ebrius. Verum frigida lotus, & cibus paucis cōducentibus pastus, & si mulier generationē se cōcepisse cognouerit, primo tempore non amplius ad uirū accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem uir dixerit se emisisse, Mulier autē præ siccitate ignorat. Si uero uterus rursus reddiderit generationē eadem die, humidus erit, & si humidus factus fuerit, rursus cū uiro miscetur, donec concipiat. Alia curatio. Vbi fomentum toti corpori adhibueris, medicamentū bibendum dato sursum ac deorsum purgans. Deinde lacte asinino postea in potu exhibitio, uteros per fistulam duobus diebus foueto, cū urina muliebri putrida, nitro iniecto. Tertia uero die, cū urina bubula. Quarta autē & quinta, feniculi semen tritū, & sambuci

folia ac lauri, & cupressi ramenta. Hęc coquito aqua affusa. Oportet aut post fo-
mentū, multa calida lotā, apponere adipē aromatis imbutū, statim à fomēto, &
ad noctem. Postea uero hoc præparato. Myrrham stacten, butyrū, adipē anseri-
num, medullā cerui, resinā, & neropū. Horū singulorū æquales portiones per
mixtas ac liquefactas apponat in lana Milesia molli q̄ optima. Deinde plūbeis
penicillis quinq̄, ad octo digitorum longitudinē fabricatis, uterū aperito. Pri-
mus ex his sit tenuis, alter crassior, & reliqui alius alio crassior sit. Aperiantur
aut per dies quinq̄, & semper lota apponat, & ex lūbis deliget, ut ne excidāt, &
semper ulterius intrudat. Postremū uero q̄ penitissime. Postq̄ aut aperueris,
purgatoriū appone, cātharidas tritas quinq̄, et colocynthidis lōge internā spō
giolam partē, & myrrham. Hęc melle cocto subacta, & in glandē efformata, la-
na inuoluta, excepta summa parte. Deinde in oleū suauissimū tingito ac appo-
nito. Vtere aut & hoc purgatorio, felle tauri, et flore eris affiato, et nitro, & myr-
rha modico melle dilutis, ac linteo tenui deligatis, & linteo superne pharmaco-
obducto apponito. Vtere & buprestis cū myrrha. & elaterio cū melle cocto. &
cantharidibus cū elaterio & myrrha. Postq̄ aut purgata fuerit, postridie ubi la-
uir uterū colluito. Cuminū Aethiopicū tritum, & melanthiū, & resinā, & oleū,
& mel, ac uinū dulce. Hęc mixta & tepesacta infundito. Postq̄ uero infuderis,
erectā obambulare iubeto, quo collutio infusa cōcuriatur. Subdito aut crocū, et
myrrhā, et thus, singula paribus portionibus sicca linteo illigata, ita ut anserinū
adipē ammiscas ac linteo oblinas. Atq̄ hęc apponito per dies septē. Octauo
uero suffitū facito, cum myrrha, bitumine, & ordeo, oleo odorato subactis: his
lento igni iniectis, ac suffitū per fistulā factū. Postq̄ aut suffitum feceris, postri-
die castoris testē terito, uino albo affuso, & ipsum melle oblitū, & lanæ inuolu-
tū, apponat in noctē. Mane uero eo sublato ac emollito, ad uirū accedat, & ubi
condormiēt quiescat. & si nō prima uice cōceperit, eodē rursus apposito, uirum
adeat. Ceterū hunc medicacionis ductū incipere oportet ubi mēses prodierint.
Deinētibz aut mensibus, cōceptorio medicamēto apposito cōdormire. Prio-
re uero tēpore neq̄ mulier ad uirū accedat, neq̄ uir ad mulierem. Quum aut
mulier nō conceperit, prius cōcipere solita, uteri uero uiri geniturā in seipsofū
scipiūt: penitus necesse est mulierē, serosam hanc facere. Quādoq̄ enim in ute-
ris pus innaescitur, pus aut in uteris à tuberculis fit. Et sanē ob hoc genitura ui-
ri, quādo cū uiro coit, uteros nō contingit, quo uidelicet ipsa uiri genitura com-
pingatur. Nam pus ipsam dissipat, ut ne afferatur. Mortificat enim pus, & pu-
trescit geniturā, proinde & pus ex uteris expurgare oportet. et tuberculū in u-
tero sedare, quo de cætero ne impediatur geniturā compingi ac afferri. Festinare
itaq̄ oportet ad expurgandū, priusq̄ pus in uteris in callū cōcrescat. & uteros
colluere hoc modo. Lac equinū coctum exacte colato, ut tenuissimū & purissi-
mū euadat, & hoc infundito, clysteris instrumēto idoneo factū. Et summa qui-
dem clysteris pars leuis sit, argētea uelut specilli, & statim modico intercedente
spacio foramē perforetur. Sint autem & alia foramina, nō magna, sed angusta.
hinc atq̄ hinc, ex trāuerso clysteris æquali interstitio distātia. et clysteris quidā
apex solidus sit. Reliquū uero totū cauum sit, uelut fistula. Alligare aut oportet
ueticā suis scemina: atq̄ hęc probe radere ac cōfricare. postq̄ aut alligaris, lac ir-
ueticā infundito, foramina uero tenui linteo obstruito, ne lac affluat. Vbi uero
obstraueris

obturaueris, uesicā deligato, & ipsi mulieri dato, cui collutionē infūdere paras. Illa uero exēptis obturamentis, in uterū indat. Ipsa em̄ sciet ubi indere oportet. Postea aut̄ tu uesicā manu premito, quādiu pus foras effluerit. Manifestū aut̄ hoc erit, ubi nō amplius pus simul cū lacte exierit, palām em̄ clarū est, quod nō amplius inest. Atq̄ tūc cessare oportet. & post hoc ubi paululū recreata fuerit, ad modicū tēpus, cucurbitę siccę fundū refecato, itēq̄ apicis summā partē, quo perforata sit, ita ut similit̄ efficias in reliquis, excepto apice, uelut clysterē: crassitudine uero paulo tenuior sit q̄ uirile pudendū. Hęc cucurbitā sic formatā uasi circūponito, uale uino impleto. Sit aut̄ uinū odorū fragrantissimum, & siccissimum ac uerutissimū. deinde lapidē nigrū pellucidū in uinū injicito, deinde cucurbitā ex aere albo factā circūponito, & mulier circūinsideat, pudendū circum cucurbitā glandē adhibens qualiter oportet, quo cucurbita uera super aeream emineat, duorū digitorū intra pudendū mensura. Quū mulier geniturā suscipere nō poterit, necesse est mēbranam superexcreuisse in osculo uterorū. Oportet igitur aeruginē aeris, & fel tauri, & serpētis adipē, simul miscere, deinde phar maco hoc lanā imbucere, & in bysinū lintēū inuoluere, linteo melle subito, & facere subdititiū magnitudine maximā oliuæ, & apponere ad pudendū per totam noctē. Supina aut̄ iaceat. & in die auferat, & calida aqua lauetur q̄ plurima ex myrti decocto. Apponat autē & postea singulis noctibus. & deinde cū uiro coeat. Alia curatio. Marrubij foliorū manus plenæ mensurā, in uas Atticū injicito, & aquæ potabilis heminas Atticas quatuor affundito, & ubi per nouē dies præmacerauit, per alios nouē dies ieiuna, lota, duos cyathos de hoc bibat; pari mēsurā pasci albi ammixa. Quum aut̄ tertiam diē potando trāsegerit, fomentū adhibeatur, cicutæ folijs in ignē misis, per nouē dies. & post fomentū lauetur. Atq̄ sic rursus de hoc bibat. Quū uero per triduū fomentū adhibuerit; marrubiū ipsum tritū in die apponat per triduū, & mercuriale tritam in melle Attico bis in die, præmaceretur autē in uini albi cōgio, hippomarathi & foeni culi radix, et tædæ pinguisimæ ramuli, & rubiæ quarta pars, & sceniculi semē, & uerbenacæ radices multæ, præmacerentur q̄ diebus non minus q̄ nouem. & postea loto capite, in balneo heminā per diē de meri cremore bibat, et postea reclinata se ipsam cōcalefaciat. Atq̄ hinc post potū, alternis diebus id quod ex felle paratur, per diē ad dies sex apponat. Quū autē iam uirū accedere uult probe purgata, hysocyami folia ac radices in aqua feruefaciat, & ex his q̄ calidissimis per triduū ad noctem fomentū adhibeat, & lota uirum accedat, post hoc uero fomentū, etiā cerui pudendū siccum sufficit; & de hoc in uinū album dilutū de radēs, per triduū bibendū, & quū partus dolor infiterit, bibendum dato. Nam hoc partū accelerat. Alia curatio. Fel tauri feruefacito, & alumē meliū, & cornu cerui ustum terito, & permixtis ac in glādulas efformatis uitior. Aliud curatiū. Cuminū in uino nigro coctū tritū, in glandē efformato, & ad noctē apponito, post hæc uero fecem uini albi, tenuissimā uidelicet fecis partē, comburito, & cōbustum in penna auferas, linteo q̄ illigatā, ad noctē subdas, & porrū coctū edat, post hoc tragiū terat, & melle dilutū in noctē apparet, & deinde tragij fructū tritū, in uino albo dilutū, tædæ ramētis adiectis bibendum dato. & postea organū alternis suffito, et sic ad uirū accedat. Alia curatio ad mulierē parere nequeuntē. Si mulierē parere nequeuntē, puerperā facere uelis, in mētib.

considerare oportet, an biliosa sit, siue pituitosa. cognosces autem utrū horū magis sit, si ubi mēses prodeunt, arenam tenuem & siccam in sole substraueris, & de sanguine infuderis, & si quidē biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus, luteus sit. Si uero pituitosa, uelut mucus. Vtrū igitur horū fuerit, uentrem purgabis, siue sursum siue deorsum opus habere uideatur. Deinde intermissis tribus diebus, uteros purgato, & si humidius uterorū osculum fuerit, acria apponito, quo cōmorsum & inflammatū os uterorū durū euadat. Si uero mulier internis partibus non febricit, neq; prae uteris concipiat, neq; uiro misceri queat, sed dormiat, & cibū auerferat, uinū melle ammixto pudēdis infundatur, et myrrhā sufflato. In sedē uero glandes indat, & uinum adipe anserino ammixto, in pudēdum infundat. Deinde etiā oleum pari melle mixtū infundat. Si mulieri uteri gracile scāt, & osculū ipsorū exasperetur, & cōcludatur, & mēses ipsi nō appareant, neq; cōcipiat. Sed febris corripit lenta, & dolores incidunt ei in lūbos, & inū uentrē. Morbus autē hic maxime fit, quū quid in ipsa fuerit corruptū, sit autē & ex partu. Hanc calida lauare oportet, & fouere. Quū autē lota ac fota fuerit, os uterorū dilatare cū specillo, & myrrhā tritam eū pari netopo apponat. Aut unguentū, aut oleū rosaceū in linteo, & plumbū instar glandis formatū apponat, felle bubulo illitū. Et in quatuor diebus infœcundas cognosces, & fomentū adhibeto, & pharmacū bibendū dato. Si uero præter naturā mulier fuerit crasse facta, in uentre nō concipit. Nam omentū crassū ac multū incumbens, os uterorū deprimit, & geniturā non suscipiunt. Hanc attenuare oportet, & pharmacum deorsum purgās bibendū dare, & ad uteros apponere quod purgat, ac flatum inducit. Si os uterorū durū fiat, aut ceruix, ex digiti cōtactu cognoscer. Itemq; si ad coxam auerſi uteri fuerint. Quū sic habuerit, nihil acre adhibeto. Si enim os uterorū exulceraueris, quū inflammatū fuerit, omnino periculū est ne sterilis fiat. Verū apponito que nō mordent, à quibus pituita purgatur. Quū menses mulieri prodierint, & præterierint, primū quidem caput purgare oportet, Deinde ueratrū exhibere, siue semel siue bis opus fuerit. Postea uero fomentum adhibere, fomētatorio ex cucurbita cōstructo, sic autē factio. Aquam marinam in uas infundito, & porro immisso, fistulam cucurbitis imponito, & cū luto q̄ optimo illinito, ut ne transpiret. Deinde per sellam erectam quadrangularem, transmittito ipsam fistulam, quo duorū digitorū mensura emineat ultra sectionē, deinde prunas subaccendito, & in desectu caueat, & quū desidet, & quū surgit, ut ne cōburatur. Sed desideat dum adhuc frigidum est fomētatorium, & surgat dum fistula est perfrigerata. In hoc uero fomento plurimam diē partem cōsumat, & in huiusmodi fomentū usu ad quinque dies perseueret. Per decē uero dies pro porro, alliu in fomentū immittito, & huius fasciculū cōtusum in aquā marinam inijcito. Postea uero reliquis diebus, ipsa sola aqua marina foueatur, ut ultra ne procedat per totam curationē. Cæterū postremū fomētum quū à curatione desistere uoles sic facito. Catulū recentissimū refecato, & aromaturū omnis generis odoratissimorū ac siccissimorū species cōtundito, et interaneis caru li exepriis, aromata indito ac expleto. Subiectis autē lignis, & catulo in uas miso fo uinū odoratissimū affundito, & fomentū per fistulā facito, & si uires permittit, totā diē cū hoc fomento ipsam foueto, ac interrogato, an odor aromaturū per os olere uideatur, nō enim exiguū hoc signū est ei quæ curatur, ad cōceptionē.

Subditū

Subdititijs uero utere, croci quantū uoles, & myrrhæ magnitudinē fabarum duarum, & salem sufficientem permisce illorū respectu, & fellis taurini fabarum duarum magnitudinē. Si uero mitiore uti uoles, minus fellis ammiscet. Si fortiore, plus. Hæc trita melle in stillato tere, donec id quod teritur fiat tale, ut digito efformare possis. Quāto aut magis trueris, tāto siccius, & uicosius, ac melius erit. Vbi aut efformaris crassius quā glandē, & summā partem acutā, & mediū crassius, & deinde cōsequenter quo ad uterū apponatur, in hoc ipsum furculos origani duos leuigatos infigito. Sint aut longitudinis sex digitorū. Deinde lana mollissima furculos inuoluito, & filo tenui superne deligato, & præmineat filum quatuor digitorū longitudine præ furculis infixis, postquā aut perfudit & purā seipiam fecit, ipsum ad uteri os apponat, linteū sub coxas subiiciēs, & per noctem appositū sinat. Erit autem ipsi purgatio aquosa, posttridie ubi surrexit, lauetur, & ea die super fomentū ne infideat. Quū autem fomentū adhibuerit, & de fomēto surrexerit, ceratū sit quō optimū prima illa die factū, & in ipsum ceruū maxime medullam cōmisceto: Sin minus, adipē anserinum, & quū a fomēto surrexerit, quotidie ubi se perfudit, & purā circa uētre fecit, cerato uterū inungat. Aut reliqua quidem omnia superioribus ammisceto, excepto felle, organū uero leuissime tritū in glandem permisce, & apponat. Aliud. Reliqua quidem omnia ad eundem modū facta, uerum pro origano absinthiū ammisceto, & eodem modo efformata apponat. Aliud. Ex tritico melanthium deligito, & probe terito, melle quō ammixto in pilæ formam redactū apponat. Verum febres inducit, & articulū tumefacit, & uehementer mordax hoc est. Aliud. Mel, & ueratrū nigrum tenue non multū, coquito. Vehementer enim mordax euadet. Sed & hoc febrificum est. Eodem modo mel coctū, & elaterij potione coquito, & factā inde glandē subdendam dato, & hoc febrificū est. Ducit autē & sanguinē. Quædā uero ex his etiam pelliculas. Si uero uoles, etiā draconium derade (Est aut lene) & hoc cū melle coctio aut crudo, in pilæ figurā uelut magnam gallam efforma. Cæterū conare ut phycus sis, ad hominis habitū ac robur respiciēs. Ex his enim nullus est qui nō omnia ad amulsim faciat. Proinde ex his ipsis coniecturā faciēs, totius corporis, & capitis purgationibus, medicamentis, & uteri fomentis, ac apposititijs uti conare. Hæc autem elemēta tibī sunt. Verū medela horū unicuique particularis est. Et ubi horū quid nō feceris, semper in fomēto perseueret. Hoc em est quod mollit, & ducit serofos ac sanios humores. Postquā uero ab hac curatione desueris, his quæ secundū naturam sunt definitibus, sanguinem de manu detrahare oportet, si quidē fortis fuerit, de ambobus brachijs. Si uero debilior, de altero sufficit. At uero diæta qua in his curationibus uti oportet, alibi à me indicata est. Si uero suffire uoles, Iolū ex tritico deligito, & molito, factoque igne farmēticio lentissimo, in catinū mitto, & mulierē super sellam impostā, mollibus linteis instratā, sedere iubeto, cruribus quō maxime diductis. Atque hæc curatio si quidē sufficiēs tibi fiat in quatuor mensibus, bene est. Sin minus, ad hæc præcipe etiā ut ad uirū ne accedat, eo tēpore quo curatur. Inter curandū autē, taxdam in aqua macerato, & ieiunē cyathū bibendū dato, & penicillū stanneum afsidue subditū habeat, & coryledonas siue umbilicos ueneris, unā cū sale & cumino, in aqua coquito, & tepidā forbendā exhibeto, Et latæ quidē coryledones scemellas gignere uidentur: parū uero & conclusæ

conclusæ, masculos. Conceptoriū summum. Melanthium mulieri in uero nigro acerbo bibendum dato. Mulierem iuueniculam fluxus ruber infestabat, & medicamentis datis, & capite purgato, ac uena secta, nihil melius habebat. Videbatur autem hæc causa ipsi esse, ut ne conciperet. Dabam itaq; ipsi uinum album, in quo aspalathi radices efferbuerant, mane & ante cœnam. & fluxus coloratus est, & nō longe post cōcepit, & peperit masculum. Erat autē corpore coloris candicantis, & probe carnosā. De mola. Molæ porrō cōceptus causa hæc est. Quū multi menses, modicum & morbosum semen conceperint, neq; foetus rectus fit, & uenter plenus est uelut prægnantis. Nihil autē in uentre mouetur, neq; lac in mammis generatur. Mammæ autē turgidæ sunt. Hæc itaq; & ad duos annos, sæpe etiā tres sic habet. Et si quidem una caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest ut superstes maneat. Si uero plures, erūpit ipsi per pudēdum sanguis multus ac carnosus. Et si hoc moderate fiat, seruatur. Sin minus, à fluxu correpta perit, & morbus quidem talis est. Iudicare uero oportet ex plenitudinis mole, & quōd in uentre non mouetur. Nam mas trimestris, foemina quadrimestris motū habet. Postquā igitur tempore hoc prætergresso non mouetur, nimirum hic morbus est. Est autem hoc magnum signum, quōd lac in mammis non generatur. Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum prædictione, Et primum quidem totum corpus foueto. Deinde per se dem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim quod compactum est commoueris, id quod foetus esse putatur, muliere à pharmaco calefacta. Sed & uteros colluito, quo sanguinem educas: Sin minus, subdititijs utatur è buprestī. & dictamnum creticum in uino bibat: Sin minus, castoris testem, & retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito, et plurimū sanguinem detrahitō, atq; hoc maxime coniectura uirium ipsius facta. Ad uteri purgationes, quum non fiunt, siue ex partu, siue etiā aliās. Tædam pinguisimam contusam in uino albo coquito, & trium cyathorū mensura utatur. Aut pæonia grana quatuor, cūmini Aethiopici parū, & felis paulo plus. Aut cedri baccas. Si uero suffocationes affuerint, castorij parum. Si uero purgatione moderata ex partu facta, uenter maneat, aut etiā flatu conclusus, & dolore uexetur, siue cum febre, siue citra febrem, succi scammonia quintam portio nis partem, aut felis, aut aliud quoddam ex odoratis, & rutam in uino albo bibendam dato. Si autem bibere nolit, illitionem ad sedem facito, uelut uerbi causa, ex felle taurino, & melle, ac litro. Si uero ex purgationis corruptione dolore uexetur, & odoratis exhibitis nihil cedat, & febris adsit, lactis caprini heminas duas decoquito, deinde eo perfrigerato pinguedinē detrahitō, excolatoq; & aquæ mulsæ tertiam partē ammisceto, quo dulcius fiat. Bibat autem hoc ter ieiuna. Si uero dolor non quiescat, neq; uenter subeat, ad uesperam in calidam aquam in folio insideat. Quum autem perfota fuerit, ubi inde surrexit, cum uino nigro austero aqua diluto, olei dimidia partē addita, tepide colluito, & inde dormiat. Subdititiuum uterorum. Si conclusum fuerit, aut durū osculum uterorū. Ficū albam expurgato, & nitrum Aegyptium purissimū tritum ammisceto, & subdititiū facito magnitudine gallæ non magnæ, quod in lana molli in unguentum irinū tinctum apponat, per tres aut quatuor dies, prout uisum fuerit. Post hoc cōducit fomētum odoratum, postea uero molli quodam opus est

est subditio, quod saniosa maxime ducat. Deinde mercuriale, si tenera fuerit, cum unguento rosaceo, in linteo ad diem ac nocte subdat. Ad idem. Fel taurinum & salem feruefacto, & sulphure trito ammixto, in oblongam spiram ac tractum efformato, & ad duos dies ac noctes nudam, ad ipsos uteros apponito. Et deinde rursus mercuriale. Post hoc myrrhā puram inspergito, & rosaceo ac irino ungueto ammixto diluito, indeq; uteri osculum q̄ penitissime illinat.

Ad idem. Iridem odoratam contusam ac cribratā seorim, et cyperi tantundem, & crocomagma magnitudine massæ manū implentis, uino odorato diluito, & ad ungueti formam redigito, & splenis palmi longitudine inducā ac illita, in paruam pyxidem reconde, ut ne transparent, & apponat. Si uero ulcerati fuerint uteri, aut osculū exasperatum fuerit, aut ab aliquo subditio comamorsi fuerint, adipē in lana illinito, & rosaceum ac ceræ parū inungito. Quū pragnans corruerit foetum menstrui, & ad finem perferre non poterit, & tenuis præter naturā fiat, huius uteros purgare oportet, & ipsam medicamentis curare, & crassefacere. Non enim ad perfectionē gestare poterit, donec seipsam refecerit, & uteri robusti facti fuerint. Si uero concipiat quidem, corruat autem foetus bimestres, exacte eodē tempore, & necq; prius necq; posterius, & hoc perpessa fuerit bis aut ter eodē modo. Aut etiam ad amplius tēpus progressum corruat eodem modo. Huius uteri nō amplius extenduntur, foetu in ipsis augete, & ex bimestri aut trimestri, ad ampliorē modum excedente. Verū foetus quidem augetur. Uteri uero nō crescunt, & propterea multæ eodē tempore corruunt. Huius uterū colluere oportet, & subditio q̄ maxime inflare, aut hūc medicamentis. Colocynthis internā partē tuam cribrato, & silphij parū, cum paulo ampliore melle cocto ammisceto. & hæc circū specillum obducito, ea crassitudine quantam stomachus ad uteri os suscipere potest, et semper ultra protrudito, donec ad internā uteri partē penetrarit. Quū autem pharmaca cum colliuerit, specillum eximito, & rursus eodē modo paratum elaterium, & colocynthis syluestre, similiter uelut prius medicamentū apponito. Edat aut hoc tēpore allium multū, & silphij caulem, & reliqua diæta utatur, quæ statim maxime in uentre inducere potest. Apponat aut subditio tertio quoq; die, donec bene habere uisa fuerit. Quandoq; uero pluribus diebus interpositis, & in summa, prout libet admiserit. Interiectis aut diebus, utatur mollibus, postquam uero per emollitoria osculum uteri præparauerit, & menses apparuerint, paulum remorata, ubi iam sicca fuerit, cū uiro coeat. Quū autē flatum in uterū inducere uoles, allij caput integrū, & silphij succum, ad subditio ammisceto. Quod si qua pragnans decē mēses perficere nō possit, sed corruat, & hoc saepe patitur, ex huius utero aquam purgato, & ipsam medicamentis curato, quo aqua purgetur. Si uero genituram continens, non pragnans fiat, id quod multis contingit, stomacho uteri præter naturam hiante: menses plures quam conuenit, & humidiores prodeunt, ut & id quod à femina prodit semen, ad fecundationem non concipiatur, & uiri genitura insuper accedens corrumptur. Contingunt autem hæc, & corpore, & uteris ægrotantibus. Verum oportet huius medicamenta deorsum purgantia dare, & interposito aliquo tempore, totum corpus fouere, & uteros cum aceto & aqua marina, specillis ac ferramentis ignis immisis. Conijciantur autem in fomentū cupressi ramenta, & lauridis

uiridis folia contusa, & polycnemi folia. faciendum est hoc fomētum tempore opportuno. post hoc uero lauetur, & fomētum adhibeatur ex loti ramentis, & rosis, ac polycnemi folijs aceto incoctis. Ad finem autem suffitus fiat, ex uerbasci folijs contusis ac loti ramentis. Verum ante lotionē suffito myrrhā & thus, utraq; æquis partibus trita, & myrti ac lauri folia. His permixtis & in lentum ignem coniectis, recens adhibito fomento suffito, bis in die, fomentū autem adhibeatur recēs lotæ. Sed & post suffitum lauet, & uteri stomachū ad pristinam naturam reducat. Et si uires sufficiant, ante hæc omnia uenam in manu sinistra secato, atq; ita reliqua facito. Si uero stomachus sic habeat, menses aut nō prodeant, aut uitiose, aut minus, ad reliqua omnia ampliorē purgationem adhibeato, & sic curato, substititij etiam utens si opus habeat, & ex prioribus lauās, & suffitum faciens, ac siccans. Si mulier inuita abortū faciat, nec ita eijcere uelit, triticum torrefactum & molitū, & uuam passam albam cōtusam, aqua multa dulci diluta, modico oleo affuso, ieiunæ bibenda dato. postea raphani semen tritum, & acetum ac adipem anferinum, permixta bibat, et lauri folia trita apponant. Deinde bibat organum, & pulegium, & polentam ex aqua, ita ut lauri folia rufa ac trita ammixto gummi, aquę inspergat, diluat, ac bibat. Aut adipem ouillum, & anferinum, & mel simul mixta ac trita delingenda præbeto. Aut pastinacæ semen leuissime terito. & lacti superstantem cōcretionem ammisceto, & adipem anferinum eliquatum. Hæc feruefacta sorbenda dato. Aut origani folia uiridia, si haberi possunt, sin minus, sicca leuissime trita, ex aqua bibenda dato. Aut lauri baccas leuissime terito, & suis foeminæ adipē liquatum, & mel ammisceto, & simul omnia trita delingenda præbeto. Aut pastinacæ semē leuissime tritum ex uino diluto bibendum dato. Si uteri genituram non continent, plumbum, & lapidem qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, et linteo illigato, quo in muliebri lacte tincto, substitutio utatur. Aut æris florem tritum ac melle dilutum subdat. Quum uteri genituram uiri eructant tertia die, necesse est mulieris, quæ hæc patitur, uteros callo repletos esse, & non potest uiri genitura intus in utero manere, sed excluditur, & propterea concipere non potest, quandiu callus in utero fuerit. At calli expulsiō sic fit. Pennas fumito minutissimas ac mollissimas, hisq; simul colligatis uteros illinito, quemadmodum oculos illinere solent, ita ut pennas exæques, ipsarūq; summas partes tenuissimō filo deliges, & multo rosaceo illinas. Sic autē facito. Supinā reclinato, et sub medios lumbos puluinar subijcito, & specillum immittito, ita ut cruribus mulieris extentis, & hinc atq; illinc diductis, specillū sursum ac deorsum uertas donec promineat. postquā autem uideris in osculo uteri callum, optimū quidem hoc fuerit, si non adhæreat in coxa, sed ultro sequatur. Si itaq; in osculo uteri in hæret, uolsella tenuissima prehensum extrahere conare, prouidus ut placide hoc fiat, & non uiolenter. Et postea uiro condormiet. Si prægnanti menses comparent, stercus asininum siccum, & rubricam, & sepia testam terito, & linteo illigata apponito. Aut pæoniæ semina nigra, in uino diluto trita bibenda dato.

Si uero à coitu, inum uentrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen rufum, & muscum mollem, & adipem anferinū, mixta ac molli lana excepta imponito. Si uteri extra naturam progressi fuerint, calor habet maxime pudenda, & sedem: & urina paulatim destillat & pudendū mordet, patitur autem

tem hæc si recēs ex partu uiro condormierit. Quum sic habuerit, myrti baccas & loti ramenta in aqua coquito, & aquā per noctem sub dio exponito, atq; sic frigidissimam pudendis affundito, et trita hæc apponito. Postea aquam lentū bibens, melle & aceto ammixtis, uomat donec uteri fuerint retractū. & lectus a pedibus altior sit, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata uero sub nares. Cibis utatur q̄ mollissimis ac frigidis. & uinum aquosum album bibat, & non lauetur, neq; cū uiro dormiat. Si uero omnino ex pudendis exciderint, dependent uelut scrotum, & dolor corripit. Hoc autē contingit quum ex partu laborarit, ut uteros cōcusserit, et cū uiro dormierit in puerperij purgatione. Quū sic habuerit, frigefactoria apponat, & quod foris est depurgatū, ac cum uino nigro uinoso, in quo malum punicum coctū est ablutum, intro detrudat. Deinde mel & resina, pari mensura eliquata, in pudenda infundantur, & decumbat supina pedes sursum extētos habens, postea spōgias apponat, & ad lumbos deliget. Quandiu uero sic habuerit, a cibis abstinerere oportet. Potu uero q̄ paucissimō uti, donec septem dies prætereāt. & si quidem sic redire uoluerint, bene est: sin minus, summas uteri partes deradito, lauato, & cerato picato illinito. Deinde pedes ad scalam deligato, scalamq; iuxta caput pulsato, & cum manu intradito. Postea crura ipsius alternatim colligato, & diem ac noctem finito in quiete, & modicum prisanæ succum frigidū dato, aliud aut nihil. Postera die ipsam reclinato, & cucurbitam q̄ maximam ad coxam affigito, & multo tempore trahere finito: & quum detraxeris, reclinatā iacere finito, & nihil aliud præter prisanæ succum exhibeto, donec septē præterierint dies. Cibis autē tunc mollissimis ac paucissimis utatur. Si uero uentrem exonerare uoluerit, decubens id faciat, donec quatuordecim dies prætereant. postea surgat, & q̄ parcissime deambulet, & ne lauetur, & cibis modicis utatur, sub pudenda uero suffitus per graueolentia fiat. Et postquam obambulare inceperit, subligar gestet.

HIPPOCRATIS COI DE MOR

BIS POPVLARIBVS LIBER I. IANO COR

nario Medico Physico interprete.

SECTIO PRIMA.

Constitutio temporis prima.



In Thaso autumnī tēpore, circa æquinoctiū & sub pleiadas, aqua multa, asidua, molles, uelut in austrinis. hyems austrina, parui uēti aquilonares, squalores, & omnino hyems quale uer fieri solet. Ver autē austrinū, frigidum, pluuiæ parua. Aestas plerunq; nubila, aquarū inopia. Estiæ parum, modice, sp̄s spirarunt. Quum autē rotus hic aeris status ad austrina uergeret, ac cum siccitatibus fieret: ante uer quidem ex priore statu, sub contrario & aquilonio fiente, paucis obortæ sunt febres arden-tes, atq; his omnino boni status. & paucis sanguis erupit, neq; ex his moriebantur. Tubercula uero circa aurem alteram multas erant, plurimis ex utriq; citra febrem erecte obambulantibus. Quibusdam uero etiam parum incalecebant.

L Extincta

Extincta sunt omnibus absq̄ nocumento. Neq̄ cuiquā suppurarūt, quē admo-
 dum ea quæ ex alijs causis sunt oborta. Erat autē natura ipsorū hæc, laxa erāt,
 magna, diffusa, nō cum inflammatione, doloris exortia. omnibus obs̄cure eua-
 nuerūt. Fiebant autē hæc adolescentibus, iuuenibus, in uigore cōstitutis, & ex
 his plurimis qui circa palæstram & gymnasia exercebantur. Mulieribus uero
 paucis fiebant. Plurimis uero tusses siccæ, qui tussiebant & nihil reieciabant, &
 uoces non longe postea rauosæ. Quibusdam uero etiam interposito tempore
 inflammationes cū dolore, in altero testiculo, quibusdam in utroq̄. Et alijs qui
 dem febres, alijs non. Hæc aut plurimis laboriose fiebāt. De cætero uero, quan-
 tum ad ea quæ in officina medica ad chirurgiā pertinentia fiunt, sine morbo de-
 gebant. At uero ante æstatis initium, & per æstatem ac hyemē, multi ex his qui
 longo iam tempore subcorrupti erant, tabidi decubuerunt. Nam & multis qui
 ambigui erant, tunc tabes cōfirmata est. Quibusdā uero primum cœpit. Et his
 natura ad tabem uergebat. Moriebantur aut multi, & plurimi ex his. Et de his
 qui decubuerūt haud scio an quis etiam modico tempore superuixerit. Morie-
 bantur autem citius q̄ tales morbi transigere solent. Nam alios & iōgiore, &
 cum febribus cōiunctos, facile ferebant, & nō moriebantur. De quibus paulo
 post scribitur. Solus enim & maximus ex his qui tum uigebant, tabidus mor-
 bus multos occidit. Erant aut plurimis ipsorum affectiones huiusmodi: febres
 horridæ, continuæ, acutæ, in totū non intermittentes. Modus aut erat semiter-
 tianus, una die leuiore, altera amplius exacerbescens, & in summa acutiores
 increbescens. Sudores uero semper, non per totū, frigiditas extremitatū mul-
 ta, & quæ uix recalesceret. Alui turbata, biliosæ, ex paucis, puris, tenuibus, mor-
 ta cibis. frequenter ad exonerandos se surgebant. Urinæ tenues, & crudæ, &
 decolores, & pauca: Aut crassitudinē habentes, & subsidentiam paruum, non
 probe desidentes, sed cum cruda quadam ac intēpestiua subsidētia. Tussiebāt
 autem, pauca, condensata, concocta, paulatim uix educentes. Quibus uero uio-
 lentissima accidissent, his neq̄ modice concoctio aderat, sed cruda spuere per-
 feuerabant. Fauces autem plurimis horum ab initio, & perpetuo dolebāt, rubo-
 rem habentes cum inflammatione. fluxiones paruæ, tenues, acres. Breui collis-
 quecebant, & affligebantur, omnes cibos perpetuo fastidientes, sitis exortes,
 & pleriq̄ circa mortem delirii. Et circa tabidos quidem hæc. Cæterū æstati iam
 & autumnō, febres multæ, continuæ, nō uiolentæ, diu quidem ægrotantibus,
 non autē aliās ita male habentibus oboriebantur. Plurimis alui turbata, ita ut
 ualde toleranter ferrent, & nihil memorabile lædebāt. Urinæ item plurimis bo-
 ni quidem coloris & puræ. Verum tenues, & post tempus circa iudicationem
 cōcoctæ. Tussiebant autem non ualde, neq̄ ea quæ per tussim reieciantur dis-
 ficulter exhibebant, Neq̄ cibum fastidiebant, sed etiā ualde licebat ipsis offer-
 re. In summa subægrotabant tabidi, nō tabido modo, febribus horridis parum
 insudantes, aliās aliq̄, ut qui erroneo modo exacerbarentur, febribus quidem in
 totū non intermittētibz, sed quæ iuxta naturā febris tertianæ morem exacer-
 barentur. Iudicabantur aut quibus inter hos breuissimæ essent, circa uigesimū
 diem plurimis circa quadragesimū. Multis circa octogagesimū. Quibusdā neq̄
 sic, sed uago modo & circa iudicationē deficiebāt. horum autē plurimis febres
 rursus non multum tempus intermittentes reuersæ sunt. Ex recidiuis autem in
 ipsidem

ijdem circuitibus iudicabantur. Multis uero ipforū producebatur, ut sub hyemem agrotarent. Ex omnibus porrò in hac temporis cōstitutione descriptis, solis tabidis lethalia acciderunt. In alijs autem febribus, non.

SECTIO SECVNDA.

Constitutio temporis secunda.

IN Thaso ante autumnū tempestates non tempestiue, sed derepente in aquilonijs & austrinis multis, humidæ & præerumpentes. Huiusmodi uero durabant usq; ad pleiada, & sub pleiade. Hyems autem aquilonia. Aquæ multæ, largæ, magnæ. Niuës. Plerūq; mixta aeris serenitas, et hæc quidē fiebāt omnia. frigora uero nō admodum intempestiua. Iam uero post brumale solstitium, & quando fauonius spirare incipit, posterior hyems magna erat, aquilonia multa. Niuës & aquæ assidue multæ, & cœlū procellosum ac nubilum. Hæc autē durabant & nō remittebāt usq; ad æquinoctium. Ver autē frigidum, aquiloniū, aquosum, nubilum. Aestas nō ualde æstuosa fiebat. Estiæ assidue spirarunt. Mox circa arcturū in aquilonijs, aquæ ualde multæ. Quū autē annus torus humidus & frigidus et aquilonius esset, per hyemē sano modo plerūq; habebant. Ante uer autē multi quidā, & plurimi morbide degebāt. Primū igitur ceperūt sippitudines fluidæ, dolorosæ, humidæ, crudæ. Lemæ paruæ & multis difficulter erumpētes, plurimis reuertebātur, defecerūt sero ad autumnū. Aestate iam & autumnō, lientericæ, & dysentericæ, & tenesmi, & alui profluvia ex biliosis, tenuibus multis, crudis, & mordacibus; quibusdā uero etiā aquosis. Multis autē & urinæ fluxiones cū dolore biliosæ, aquosæ, rametosæ, purulente, cum stiliçidio, nō rhenales, sed his alia pro alijs. Vomitus pituitosi, biliosi, & ciborum erutorum reiectiones. Sudores. Omnibus undiquaq; multa humiditas. Fiebāt autem hæc multis erecte obambulantibus, nō febricitantibus. Multis itē febricitantibus; de quibus paulo post scribetur. In quibus autē omnia hæc præscripta apparebant cum dolore, tabidi fiebāt. Iam uero autūno & sub hyemē, febres cōtinuæ, & quibusdā ipforū paucis ardētes, diurnæ, nocturnæ, semitertianæ, tertianæ exactæ, quartanæ, erroneæ. Singulæ uero prædictæ febres multis fiebāt. At ardentes & paucissimis obortæ sunt, & ex ægrotis hi minimum laborauerunt. Neq; enim sanguis erupit, nisi ualde parum, & paucis. Neq; delirabant, aliq; omnia tolerabilia erāt. Iudicabantur autē plurimis ualde bono ordine, cum intermittētib; in septē ac decem diebus. Neq; mortuum aliquem tunc in febre ardente noui, neq; phrenitim tunc cuiquā factam scio. At uero tertianæ plures quidem q̄ ardētes febres erant ac grauiōres, uerū ordinate in his omnibus, à primâ accessione quatuor circuitus habebāt, in septem autem perfecte iudicabantur, neq; ulli horum reuersæ sunt. Quartanæ uero multis quidē ab initio ex ordine quartanæ ceperunt. Quibusdā autē non paucis, ex alijs febribus ac morbis abcessus ad quartanas fiebant, atq; hos diu, quemadmodum solent, & adhuc diutius tenebant. Diurnæ uero quotidianæ, & nocturnæ, & erroneæ multæ, multis & multo tempore permanebāt, & erecte obambulantibus, & decumbentibus. Plurimos horum sub pleiada, & usq; ad hyemē, febres cōsequēbantur. Multos cōuulsiones, magis autē pueros ab initio, & febricbāt. & in febribus cōuulsiones fiebant. & erant hæc plerūq; diuturna, uerum innocua, nisi ad hæc, etiā ex alijs omnibus perniciēs adesset. At continuæ in totum, &

nihil intermittētes, exacerbescētes autē omnibus ad naturæ tertianæ modum, una die subleuantes, & una exacerbescētes, omniū quæ tunc fiebant uiolentissimæ erāt, & longissimæ, ac cū maximis doloribus, leniter auspicātes, & in totū semper augescētes, & in iudicatorijs diebus exacerbescētes, & in peius procedentes, parū alleuantes, & statim rursus ex intermissione uiolentius exacerbescētes, in iudicatorijs plerumq; diebus peiores sientes. Rigores uero omnibus quidē inordinate & erroneo modo fiebāt, parcissimè autē & minime his. Verū in alijs febribus maiores. Sudores multī, his minimi, nihil alleuātes, sed contrario modo damna inferentes. Frigiditas extremitatū his multa, & uix recalescens. Neq; somni in totū, maxime uero hi etiā rursus soporosi. Ventres autē omnibus turbati & mali, his autē longe pessimi. Urinæ uero plurimis horū aut tenues, & crudæ, & decolores, & post tēpus parum cōcoctę iudicatorio modo. Aut crassitudinē quidem habētes, uerum turbatæ, neq; cōsistentes, neq; subsidentes neq; cōcoctæ. Aut paucæ, & crudæ, ac malæ, & subsidētes. Pessimæ autem hæc omnes. Et tussis quidē ad febres comitabantur. Verum non habeo quod scribam, an detrimentū aut utilitas tunc ex tussi cōtigerit. Diurna igitur & molesta, & ualde inordinate ac erroneo more, & citra iudicationē, plurima horum perseverabant, tum his qui perniciose habebāt, tum his qui non. Si enim aliquos ipsorum paululū relinquerent, statim rursus reuertebantur. Quibusdā uero paucis ipsorū iudicabātur, quibus breuissimè adessent, circa octoagesimam diem, & horū aliquibus reuersa sunt, ut plurimi ipsorū per hyemē adhuc aegrotarint. plurimis autē citra iudicationē defecerūt. Hæc uero pariter acciderūt, & his qui superstitēs manserunt, & qui non. Quum autē multa & uaria fieret iudicationis impeditio ex morbis, maximū etiam ac pessimū signum perpetuo comitabatur, quod pleriq; omnes cibos fastidirent, & ex his maxime his, quibus etiā alia exitialia erant. Sicculosi uero nō adeo intempestiue in his febribus erāt. Quū uero tēpus produceretur, & dolores essent multī, ac colliuatio mala, his abscessus succedebant, aut maiores q̄ ut ferre possent, aut minores q̄ ut quicquā prodesse: sed statim recurreret & ad peius courgerēt. Erāt autem quæ his fiebāt hæc: dysenterię, tenesimi, lienterię & alui profluuia. Quibusdā etiā hydropes, partim cū his, et partim absq; his. Quicquid autē ex his uiolenter accedebat, statim uires deiciebat: aut rursus nihil proderat. Papulæ paruæ, & nō pro dignitate rationis excretionis morborū, & statim rursus euanescentes. Aut iuxta aures tumores, qui nō soluebantur, & nullā de se significationē præbebāt. Quibusdā in articulis, maxime uero in coxendicem, paucis iudicatorio modo cessantes, & statim rursus ad habitū ab initio inualescentes. Moriebātur autē ex omnibus, & plurimi ex his pueri iam ablactati, & maiores natu, octennes ac decēnes, & nondū puberes. Fiebant autē hæc his, non sine prius scriptis. Priora uero multis, sine his. Solū uero bonū & maximū inter ea quæ fiebant signum, & quod plurimos in maximis periculis constitutos liberauit, quibus ad urinæ stilliciū conuertebātur, & ad hoc abscessus fiebāt. Accidit autē pleriq; urinæ stilliciū, maxime his ætatibus. Fiebat & alijs multis, tum erecte obambulantibus, tum in morbis. Statim uero etiā magna quædā mutatio omnium, his fiebat. Alui enim etiam si humectæ essent, maligno modo mox sistebātur, & bosq; omnes libēter sumebāt. Et febres postea mites erāt. Verum urinæ stilliciū

diūm his diuturnū & laboriosum erat. Urinæ uero his erāt multæ, crassæ, uariæ, rubræ, purulentæ cū dolore. Atq; hi omnes superstites manserūt, & nullū ex his mortuū noui. Quæcunq; uero nō periculosæ fiunt, concoctiones ex cremētorum omnes undiquaq; tempestiuas aut bonas, & iudicatorios abscessus, cōsiderare oportet. Concoctiones celeritatē iudicationis, & securitatē sanitatis significant. Cruda uero & incōcocta, & in malos abscessus cōuersa, aut iudicationis sublationē, aut dolores, aut diuturnitatē, aut mortē, aut eorundem recidiuas. Quod uero ex his potissimū futurum sit, ex alijs considerandum est. Præterita dicto, præsentia cognoscito, futura prædico. Hæc tractato. Exerce to circa morbos duo, ut uiues, aut non noceas. Ars ex tribus cōstat, morbo, ægrotō, & medico artis ministro. Ægrotū cum medico aduersari morbo oportet. Capitis & colli dolores ac grauitates cū dolore, cum febribus, & sine febribus, Phreniticis quidem cōuulsiones, Sed & uirofa uomunt, et quidā ex his subito moriūtur. In ardentibus aut & alijs febribus, quibus colli dolor, & tēporum grauitas, & caligo uertiginosa circa oculos, aut etiā præcordiorū distentio, non cū dolore sit, his sanguis per nares erumpit. Quibus aut grauitates quidem totius capitis, oris autem uentriculi morsus adfunt, & nauseabundi sunt, hi biliosa & pituitosa uomūt. Plerunq; uero pueris in talibus afflictionibus cōuulsiones fiunt. Mulieribus autem tum eadem, tum ab uteris dolores. Senioribus autē & quibus iam calor superatur, paraplegiæ uocata, leues siderationes, aut infania, aut oculorum priuationes.

Constitutio temporis tertia.

IN Thaso paulo ante arcturum, & sub arcturo, aquæ multæ, magnæ, in aquis Ionijs. Circa æquinoctiū autē & usq; ad pleiada, austrinæ pluuie paucae. hyēs aquilonia, siccitates, frigidi uenti, magnæ niues. Circa æquinoctiū hyemes maximæ. Ver aquiloniū, siccitates, pluuie paucae frigida. Circa solstitium æstiuū aquæ paucae, magna frigora usq; ad canem. Post canem usq; ad arcturum, æstas calida, æstus magni, non ex accessione augescentes, sed continui ac uiolenti. Aqua non delapsa est. Etesiæ spirant. Circa arcturū pluuie austrinæ usq; ad æquinoctium. In hac autē constitutione, per hyemem quidem receperunt resolutiones ex sideratione, & multos inuaserunt, & quidā ex ipsis subito moriebantur. Nam hic morbus satis popularis erat. Cætera incolumes debebant. Ante uer autem cœperunt febres ardentes, & usq; ad æquinoctiū, & ad æstatem durabant. Quicunq; igitur uere & æstate ineunte statim ægrotare cœperunt, plerimi seruabantur. pauci uero quidam moriebantur. In autumno iam & quū pluuie fierent, lethales erant, & plures peribant. Erant autem februm ardentium affectiones. Quibus quidē bene ac large sanguis per nares erupit, per hoc maxime seruabantur. & nullum noui qui in hac constitutione mortuus esset, si recte ipsi sanguis profluxisset. In Philico enim & Epaminone ac Sileno, quarta ac quinta die parum de naribus stillauit, & moriebantur. Pleriq; igitur ægroti circa iudicationē rigeabant, maxime hi quibus sanguis nō erupisset. Idem uero etiam postea in super riguerunt, & exsudarunt. Quibusdam morbus regius accidit sexta die. Verum his purgatio per uescicā, aut aluus exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio. Velut Heraclides qui decumbebat apud Aristoclydem, nam huic & ex naribus sanguis erupit, & aluus turbata est, & per uescicam

purgatus est. Vigesima die iudicatus est. nō uelut Phanagoræ seruus, cui nihil tale factum est, & mortuus est. Sanguis autē plurimis erupit, maxime adoleſcētibus & in uigore cōstitutis, & talium pleriq; perierūt, quibus sanguis nō erupit. Senioribus uero ad morbum regiū res deuenit, aut alii ipſis turbata sunt, aut dyſenterici facti sunt. Velut Bioni apud Silenum decūbenti contigit. Populariter graſſabātur etiam dyſenteria per ætatem. & quibusdam qui ægrotarunt, quibusq; etiam sanguis erupit, ad dyſenteriam transitus factus est. uelut Eratonis filio & Mylo, qui multa sanguinis eruptione facta, in dyſentericū statum delapſi ſuperſtites manſerunt. Multis igitur maxime hic humor redundauit. Nam & quibusdam circa iudicationē sanguis non erupit, ſed tubercula iuxta aures excitata euanuerunt. Quæ ubi euanuiſſent, iuxta ſiniſtri lateris molitudinem, & ad ſummā coxam grauitas fuit. Quum autē dolores poſt iudicationem fierent, & urinæ tenues prodiiſſent, parū sanguinis profundere cœperūt. Verum circa quartā & uigeſimam, abſceſſus ad sanguinis eruptionem fiebant. Antiphōti Critobuli filio, quæ ſedata eſt, & perfecte iudicatus eſt circa quadageſimam. Mulieres porro multæ quidem ægrotarūt, pauciores autē q̄ uiri, & pauciores etiā mortuæ ſunt. Plurimæ uero grauius ex partu laborarunt, & poſt partus in ſuper ægrotarunt, & hæ maxime perierunt. Velut Telebuli filia, quæ ſexta à partu die mortua eſt. Plurimis itaq; in febris meſes apparebant. Quibusdam uero ex naribus sanguis erupit. & uirginibus multis id primū factum eſt. Quibusdam & ex naribus sanguis, & meſes proruperūt. Velut Dætharſei filia: uirgini apparuerūt tunc primū, & sanguis largus è naribus fluxit. Neq; ullam mortuā noui, ex his quibus aliquid horū probe factum eſſet. Quibus autē prægnantibus cōtingit ægrotare, omnes foetus perdiderūt, quas ego noui. Urinæ uero plurimis boni quidem coloris, uerum tenues & ſubſidentias modicas habētes, ex recrementis tenuibus ac biliolis. Multis autē alijs iudicatis ad dyſenterias res deuenit. Velut Xenophani & Critiæ. Urinæ aquoſæ, multæ, puræ, tenues poſt iudicationē, & ſubſidentia bona facta, & alijs probe iudicatis. Mentionē faciam eorū quibus factæ ſunt, Bioni qui apud Silenum decūbebat. Cratiæ quæ apud Xenophanē. Aretonis filix uxorī Mneſiſtrati. Poſtea uero omnes hi dyſenterici facti ſunt. Quod urinas minxerūt aquoſas, cōſiderandum eſt. Circa arcturū autē multis undecima die iudicatio facta eſt, & his recidua: nō pro ratione ſientes reuerſæ ſunt. Erant autē ſoporofi circa tēpus hoc, plures aut pueri, & hi omnium minime moriebātur. At uero circa æquinoctiū, & uſq; ad pleiada, & ſub hyemē, comitabātur quidem febres ardētes. Sed & phrenitici plurimi tūc fiebant, & pleriq; horū moriebātur. fiebant autē & per æſtatem pauci. Quū igitur febres ardentes inciperēt, ſignificationē de ſe præbebāt quibus perniciēs immineret. Statim enim ab initio febris acuta, parum in ſuper rigeabant, uigiles erant, ſiticolofi, anxij, parum exudantes circa frontem & clauiculas, nullus per totū, multum delirabant, tumores, triſtitia, extremitates ſubfrigida:, pedes ſummi & maxime manuum ſummæ partes. Exacerbationes in diebus paribus. Plurimis autē quarta die dolores maximi, & ſudores plerunq; ſubfrigidi, & extremitates non amplius recalcſcentes, ſed liuida:, ſubfrigida:, & neq; ſiebant. Ad hæc urinæ his nigra:, pauca:, tenues, & alii ſiſtebantur. neq; sanguis è naribus erupit ulli ex his quibus hæc accidiffent, ſed parum ſtillauit.

Necq;

Necq̄ ad recidiuam ulli horū res deuenit. Sed sexta die mortui sunt cū sudore. Phreniticis autem acciderunt præscripta non omnia. Iudicabantur autē his ple-
 runq̄ die undecima, quibusdā uigefima. Quibus non statim ab initio phre-
 niticis cœpit circa tertiam aut quartā diem, sed moderate habebāt primo tempo-
 re, his circa septimam morbus ad acumen transit. Magna itaq̄ erat morbo-
 rum multitudo. Ex ægris autē maxime moriebātur adolefcētes, iuuenes, in uigo-
 re ætatis cōstituti, leues, subalbicante cute, rectos itemq̄ nigros capillos habē-
 tes, & oculos nigros, & qui in quiete & ocio uixerant, & alta uoce, aut gracili,
 aut aspera præditi, balbi, iracundi, & mulieres plurimæ ex hac specie morieban-
 tur. At in hac constitutione ex quatuor signis maxime seruabantur. Quibus
 uidelicet sanguis è naribus probe erupisset. Aut urinæ multæ, & multam subst-
 dentiam habentes per uescicam prodijissent. Aut per uentrē turbata, biliosa tem-
 pestiue processissent. Aut qui dysenterici facti essent. Acciditq̄ multis ut non
 ex uno præscriptorum signorum iudicarentur, sed per omnia percurrerent. &
 grauius quidem habere uidebantur, cōseruabantur autem omnes quibus hæc
 accidissent. Mulieribus autē & uirginibus accidebant item præscripta signa o-
 mnia. Quibus autem uel horū quippiā bene accideret, aut menses large appare-
 rent, per hæc seruabātur ac iudicabantur, neq̄ ullam interijisse noui, cui ex his
 aliquid accidisset. Philonis enim filia: sanguis ex narib. large fluebat. Septima
 autem die intēpestiuius cœnauit & mortua est. Quibus in febribus acutis, ma-
 gis ardentibus, lachrymæ inuitæ defluūt, his sanguinis à naribus eruptionem
 expectare oportet, si etiam alia perniciose non habeant. Nam his qui male ha-
 bent, non sanguinis eruptionem, sed mortem significant. Tubercula iux-
 ta aures in febrientibus cum dolore oborta, quibusdam febre iudicatorio mo-
 do deficiente, neq̄ sedantur, neq̄ suppurantur: hæc biliosum alui profluuium,
 aut dysenteria, aut crassarum urinarū subsidentia soluit. Velut Hermippo Cla-
 zomenio. Iudicationes autē ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut
 dissimiles. Velut duo fratres qui simul eadem hora ægrotare cœperunt. De-
 cumbebant autem iuxta theatrum Epigenis fratres. Horum seniori sexta die
 iudicatio facta est, iuniori uero septima. Recidiua facta est utriusq̄ simul eadem
 hora. Intermitit dies quinq̄. Ex recidiua iudicatio facta est utriusq̄ simul in to-
 tum, die decima septima. Plurimis autem sexta die iudicatio facta est, intermis-
 sit sex. Ex recidiuis autem iudicatio facta est quinta die. Quibusdam uero septi-
 ma iudicatus est morbus, & septem diebus intermisit. Ex recidiua uero iudica-
 tus est tertia. Quibusdam autem iudicatus est quinta, intermisit septem, redijt
 per tres, intermisit unam, in superq̄ unam rursus occupauit. Aliquibus uero iu-
 dicatus est sexta, intermisit sex, redijt per tres, intermisit unā, & una iudicatus
 est: Velut Euagonti Daipharris filio. Quibusdam autem iudicatus est sexta, in-
 termisit septem: ex recidiua uero iudicatus est quarta. Velut filia Aglaida: ple-
 ricq̄ igitur ex his qui ægrotarunt in hac constitutione, hoc modo ægrotarunt.
 & nullum noui ex his qui superstites manserunt, cui nō redijissent recidiuæ se-
 cundum rationē fientes, & seruati sunt omnes quos ego noui, quibus hoc ge-
 nus recidiuæ factæ sunt. Necq̄ ægrotantiū hoc modo ullum aliquē noui, quem
 recidiua iterum repetijset. Moriebantur autem in morbis his plurimi sexta
 die: uelut Epaminondas, & Silenus, & Philiscus Antagoræ filius. Quibus

autem tubercula iuxta aures facta essent, his iudicatio facta est uigesima die. R& stincta autem ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad uescicã conuersa. Craissonacti qui apud Heraclium habitabat, & Scymni fullonis ancillæ suppurauerunt, & mortui sunt. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit nouem, reuersus est morbus. Iudicatus est ex recidiua quarta die. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit sex, deinde redijt, & iudicatus est septima uelut Phanocrito, qui decubebat apud Gnathonem pictorẽ. Sub hyeme circa solstitium hybernũ, & usq; ad æquinoctiũ, perseverabant quidem & febres ardentes, & phrenitides, & multi moriebantur. Iudicationes tamen transmutatæ sunt, & iudicatio facta est plurimis ab initio die quinta, intermisit quarta, recidiua facta est, ex recidiua uero iudicatio facta est quinta die. In summa quatuordecim diebus. Sic autem facta est iudicatio pueris plurimis, immo etiam senioribus. Quibusdam uero morbus iudicabatur die undecima. Reuertebatur decima quarta, iudicabatur perfecte uigesima. Si uero aliqui insuper riguissent circa uigesimali, his iudicabatur quadragesima. Superriquerunt autẽ plurimi circa iudicationẽ ab initio. Qui uero circa iudicationẽ ab initio riguerunt, et tã in recidiuis unã cũ iudicatione riguerunt. Riguerunt autẽ paucissimi uere, astate plures, autũno adhuc plures, hyeme longe plurimi. At sanguinis eruptiones cessabant.

SECTIO TERTIA.

Morbos dinoscimus edocti, ex cõmuni omniũ natura, & ex uniuscuiusq; propria, ex morbo, ex ægroto, ex his quæ offeruntur, ex eo qui offert. Ex his enim & breuiores, & grauiores redduntur: ex tota ac partiali constitutione coelestium, & uniuscuiusq; regionis, ex uictu, ex uitæ studijs, ex ætate cuiusq; sex monibus, moribus, taciturnitate, cogitationibus, somnis, uigilijs, infomnijs quibusdã & quando, uellicationibus, pruritibus, lachrymis, exacerbationibus, secessibus, urinis, sputis, uomitibus, & quæ ex quibus, in quos, successiones morborum: & qui abcessus ad perniciem, & ad iudicationem: Sudor, rigor, frigiditas, tussis, sternutationes, singultus, spiritus, ructus, flatus silentes, strepentes, sanguinis eruptiones, hæmorrhoides, ex his autẽ, & quæ per hæc sunt, cõsiderandũ. Febres quædam cõtinuæ sunt, quædam interdiu tenent, noctu intermittunt. Aut nocte tenent, die intermittunt. Semitertianæ, tertianæ, quartanæ, quintanæ, septimanæ, nonanæ. Sunt autẽ acutissimi, & maximi ac grauissimi morbi, & maxime lethales, in cõtinua febre. Securissima uero omniũ, et facillima ac lãgissima est quartana. Non enim solũ ipsa à seipsa talis est, sed etiã ab alijs magis morbis liberat. At in semitertiana appellata, contingit quidem & acutos morbos fieri, & est hæc præ cæteris maxime lethalis. Sed & tabidi, & quicunq; ex alijs lãgis morbis ægrotat, ex hac maxime ægrotat. Nocturna nõ admodũ lethalis est, uerũ lãga. Diurna lãgior. Quibusdã autẽ & ad tabem uergit. Septimana lãga est, uerũ nõ lethalis. Nonana adhuc lãgior, & nõ lethalis. Tertiana exacta cito iudicatur, & nõ est lethalis. Quintana pefsima omniũ est. Nam & ante tabem, & iam tabidis superueniens, occidit. Sunt autẽ modi, & constitutiones, & exacerbationes singularum harum febrium, æque cõtinuarum ac intermittentium. Velut uerbi causa, Cõtinua quibusdam ab initio floret, & uiget maxime, & ad deterius procedit. Circa iudicationem uero & unã cum iudicatione, imminuitur. Quibusdam uero molliter incipit & submisit, augetur autem

aut & exacerbatur quotidie, Circa iudicationē uero & unā cū iudicatione, acerrimam elucet. Quibusdā leniter aufpicata augetur & exacerbatur. & ubi aliquādiu in uigore fuit, rursus remittit usq; ad iudicationē, & circa iudicationē. Atq; hæc contingere solent in omni febre, & in omni morbo. Oportet autē uictus rationem ex horū consideratione offerre. Multa uero etiam alia signa his sunt cognata, de quibus partim scriptū est, partim scribetur. Ad quæ ratiocinari oportet, examinaretq; ac cōsiderare, cui horū acutus ac lethalis sit morbus, aut a quo superstes sit futurus. & cui offerendū sit, aut non, & quādo, & quantū, & quid offerendū erit. Quæ uero paribus diebus exacerbantur, paribus iudicantur. Quorum autē exacerbationes in imparibus fiunt, ea in imparibus iudicantur. Est autē primus iudicatorius, ex circuitibus diebus paribus iudicantibus, quartus dies. Deinde sextus, decimus, decimusquartus, decimus octauus, uigésimus, uigésimus quartus, uigésimus octauus, trigésimus, trigésimus quartus, quadragesimus, sexagesimus, octogésimus, & ceteris uigésimus. Ex circuitibus uero in imparibus diebus iudicantibus, primus est dies tertius, deinde quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, uigésimus primus, uigésimus septimus, & trigésimus primus. At uero nosse expedit, si aliter iudicatio fiat, extra præscriptos dies, recidiuas fore significat, & fuerit sane perniciofa. Oportet autem animaduertere nosse, in his temporibus iudicationes futuras esse, ad salutem, aut perniciem: aut inclinationes ad melius, aut deterius. Erroneæ potro febres, & quartanæ, & quintanæ, & septimanæ, & nonanæ, in quibus circuitibus iudicentur considerandum est.

ÆGROTI QVATVORDECIM.

PRIMVS

Philiscus prope muros habitabat, decubuit. Primo die febris acuta, sudauit, noctem laboriosam habuit. Secūdo die omnia exacerbata sunt. Vesperī ab infuso per clysterē adhibito bene habuit, noctē quietā. Tertio mane & usq; ad meridiem, uisus est ad febre liber esse. Ad uesperā febris acuta cū sudore, siticulo sus erat, lingua resiccabatur, nigra minxit, noctē molestā habuit, nō dormiuit, omnino delirauit. Quarto omnia exacerbata sunt, urinæ nigra, nox tolerabilior, urinæ melioris coloris. Quinto circa meridiē parū de naribus stillauit nō mixtum. Urinæ uaria, quæ habebat innantia quædā rotunda, genituræ similia, dispersa, nō subsidebāt. Subdita glande, statiosa pauca prodierūt. noctē habuit laboriosam, somni parui, sermōnes, deliramēta, extremitates undiq; frigida, et nō amplius recalescētes. minxit nigra, dormiuit parū, ad diē uoce destitutus est, frigidū sudauit, extremitates liuidæ. Circa meridiē sexta die mortuus est. Huic spiritus ad finē usq; uelut reuocātī, rarus & magnus. Splen eleuatus est orbiculari gibbositate. Sudores frigidi perpetuo. Exacerbationes diebus paribus.

ÆGROTVS II

Sllenus habitabat in Platamone, prope filios Eualcidis. Hūc ex lassitudinibus & potationibus, ac exercitijs intestinis febris corripuit. Cœpit autē agrotare ex libis, & caput grauitas tenebat. & colli distētio erat. Ab aluo prima die biliosa, mera, spumosa, abūde colorata, multa prodierūt. Urinæ nigra, nigram subsidentā habentes, siticulosus, lingua resiccata, noctē nihil dormiuit. Secūda die febris acuta, feces plures, tenuiores, spumosi. Urinæ nigra, nox molestā, parum delirauit. Tertiā omnia exacerbata sunt, præcordij distētio utrinq; oblonga

obligata ad umbilicū submollis. Seceffus tenues, subnigri. Urinæ turbatae, subnigrae. Noctē nihil dorminit, sermones multi, rufus, cantus, continere se nō potuit. Quarta per eadem. Quinta seceffus meri, biliofi, leues, pingues. Urinæ tenues, pellucidae, parū refpicebat. Sexta circa caput parum fudauit, extremitates frigidae, liuida. Iactatio multa, ab aluo nihil prodijt. Urinæ fuppreffae sunt, febris acuta. Septima die uoce deftitutus est, extremitates non amplius recalerecebāt, nihil minxit. Octaua fudauit frigidū per totū fudorē, papulae cum fudore rubrae, rotunda, paruae, uelut uari permanebant, nō abfcedebāt. Ab aluo uero cū parua irritatione, ftercora tenuia uelut incōcocta, multa prodibāt cū dolore. Urinā reddebat cū dolore mordacē. Extremitates parū recalerecebāt. Somni tenues, foporofi. Vox intercepta. Urinæ tenues, pellucidae. Nona per eadem. Decima potum non fufcipiebat. Soporofus erat, fomni autem tenues. Ab aluo fimilia. Minxit aceruatum fubcralfum, deponitum fubfidens, fubfidentia craffae farinē fimilis, alba. Extremitates rurfus frigide. Vndecima mortuus est. Ab initio huic & ad finem ufq; fpiritus magnus rarus, praecordij palpitiō afsidua. Aetas erat circa annos uiginti.

AEGROTVS IIII

Herophonti febris acuta. Ab aluo pauca ab initio uelut in tenefmo. Postea uero tenuia prodibant biliofa, frequētiōra. Somni nō aderant. Urinæ nigrae, tenues. Quinta mane furditas. Exacerbata fuit omnia. Splen eleuatus est. Praecordij diftentio. Ab aluo pauca, nigra prodierūt, delirauit. Sexta delirabat, ad noctē fudor, frigiditas, delirus permanebat. Septima perfrigerabatur, Siticufofus, delirabat, noctu refpicebat, obdormiuit. Octaua febricitauit, splen minuebatur, intelligebat omnia, doluit iuxta inguen, tumor primū ē directo fplenis. Deinde dolebat utraq; tibias, nox tolerabilis. Urinæ coloris melioris parua fubfidentia habebant. Nona fudauit, iudicatus est morbus, intermifit. Quinta reuerfus est. Statim autē fplen eleuatus est, febris acuta, furditas rurfum. Post recidiuā tertia die fplen minuebatur, furditas minor erat, crura dolebant, noctu fudauit, iudicatus est die feptimadecima. Neq; delirauit in recidiua.

AEGROTVS IIII

In Thafō Philini uxorem, quae filiam pepererat, quum purgatio fecundū naturam facta effer, & aliās leuiter degeret, decimaquarta à partu die febris uerhemens corripuit cum rigore. Ab initio uero cor dolebat, & circa praecordium dexterū, muliebrium partū dolores, purgatio ceffauit. Vbi uero glandē fubdiaphragmatis differ, haec quidē leuiora facta fuit. Capitis autē colli & lumborū dolores permanebant. Somni nō aderant. Extremitates frigidae. Siticulofa erat, aluus combufta, pauca egerebat. Urinæ tenues, ab initio decolorae. Sexta die ad noctē multū delirauit, et rurfus refpicebat. Septima siticulofa, seceffus biliofi, abūde colorati. Octaua fuperriguit, febris acuta, cōuulfiones multae cū dolore, multū delirabat. Glāde fubdita exurgebat, multaq; cū fluxione biliofa prodibāt. Somni nō aderāt. Nona cōuulfiones. Decima parū refpicebat. Vndecima dormiuit, omniū recordata est. Statim autē rurfus delirauit. Urinā autē reddebat cū cōuulfionibus, aceruata, multa, illis autē parū admonētib; craffam albā, qualis est ex his quae fubfiderūt, ubi multo tēpore fita, fuerint cōfurbata, non fubfidebat, color & craffitudo talis, qualis est in urinis iumētōrū. Talia mingebat, quae & ego uidi

di. Circa decimum quartū diem palpitationes per totū corpus, sermone multū, parum resipiscebatur. Verum statim rursus delirabat. Circa decimū septimū uoce destituebatur. Vigesima mortua est.

ÆGROTVS V

EPicratis uxorem, quæ decumbebat apud Archegetem, partu iam propinquam, rigor fortiter corripuit, non in caluit, uelut dicebant. Et postridie eadem erant. Tertia die peperit filiam, & alia omnia iuxta rationē uenerunt. Postridie à partu febris acuta eam inuasit, cordis dolor & muliebrium partū. Vbi uero glandem subdidisset, hæc quidem leuiora facta sunt. Capitis autē & colli ac lumborum dolor. Somni nō adcerant. Ab aluo modica biliosa, tenuia, pura prodibant. Urinæ tenues, subnigræ. Sexta die à quo febris ipsam corripuit, ad noctem delirauit. Septima omnia exacerbata sunt, uigilans delirauit, siticulosa, secessus omnes biliosi ab uide colorati. Octaua superriquit, plus dormiuit. Nona per eadem. Decima crura laboriose dolebat. Cordis dolor rursus, capitis grauitas, non delirauit, magis dormiuit, aluus restitit. Undecima sudauit, minxit melius colorata, multam subsidentia habentia, leuius degebat. Decimaquarta superriquit, febris acuta. Decimaquinta uomuit biliosa, flaua, fatis multa. Sudauit sine febre. Ad noctē febris acuta. Urinæ crassæ subsidetiam albam habentes. Decima sexta ad noctem exacerbata est, & cum molestia non dormiuit, delirauit. Decima octaua siticulosa, lingua combusta est, non dormiuit, multū delirauit, crura dolebat. Circa uigesimam mane parū riguit, soporosa, quiete dormiuit, uomuit biliosa, pauca, nigra. Ad noctem surditas. Circa uigesimā primam lateris sinistri grauitas, per totū cum dolore, parum insuper tuisijt. Urinæ crassæ, turbata, subrubra, quæ depositæ non subsidebant, cætera leuiora, non sine febre. Statim ab initio fauces dolebat, rubor aderat, columella reuulsa, fluxio acris, mordax, salia, perpetuo perseuerabat. Circa uigesimā septimā febris libera, in urinis subsidentia, latus dolebat. Circa primam & trigessimā febris corripiebat, aluus ex biliosis turbata est. Quadragesima die uomuit pauca biliosa. Iudicata est perfecte libera à febris die octogesima.

ÆGROTVS VI

CLeanaetiden qui supra Heracleum decumbebat, febris corripuit erroneo modo. Dolebat autē caput ab initio, & latus sinistrū, & aliarū partū dolores aderant, lassatorū modo, febres exacerbabatur aliis aliter inordinate. Sudores quādoque, quādoque nō. Exacerbationes ut plurimū in indicatorijs diebus magis accedebat. Circa uigesimā quartam summas manus dolebat. Vomuit biliosa, flaua, fatis multa. Paulo post aut æruginosa. Ab omnibus alleuatus est. Circa trigessimam sanguis ex utriusque naribus erupere cepit, atque hoc erroneo modo paulatim usque ad iudicationē. Nō autem fastidiebat cibum, neque siticulosus erat per totū tempus, neque infomnis. Urinæ tenues, non decolores. Circa quadragesimam minxit subrubra, subsidentia multam ualde rubram habentia, alleuatus est, post hæc autem urinæ uarie, quandoque subsidentiam habebat, quandoque non. Sexagesima urinis subsidentia multa, & alba, & leuis. Remiserunt omnia, febres intermittebant. Urinæ tenues quidem, uerū boni coloris. Septuagesima à febre liber permansit diebus decem. Octogesima riguit, febris acuta corripuit, multū sudauit. Urinis subsidentia rubra, leuis, perfecte iudicatus est.

MEtone febris uehemens corripuit, lumborū grauitas dolorosa. Postridie ubi aquam bibisset satis multā, ab aluo probe prodijt. Tertia capitis grauitas. Secessus tenues, biliosi, subrubri. Quarta omnia exacerbata sunt. Fluebat à dextra nare bis sanguis modicus. Noctē moleste tulit. Secessus similes tertiæ diei. Urinæ subnigræ, habebant quiddam in medio innatans, subnigrū, diuulsum, non subsidebāt. Quinta effluxit ex sinistra nare sanguis largus, merus. Sudauit. iudicatus est. Post iudicationem infornis, delirabat. Urinæ tenues, subnigræ. Capitis lotionib. usus est. dormiuit. respicebat. Huic recidua facta non est. Sed sanguis erupit sæpe etiam post iudicationem.

Rasinum qui habitabat circa Bootæ torrentem, febris uehemēs corripuit post cenā. nocte turbatus fuit. diem primam quiete, noctē laboriose trāsegit. Secunda omnia exacerbata sunt, ad noctē delirauit. Tertia dolorose, multum delirauit. Quarta molestissime, ad noctem nihil dormiuit. Infornia & ratiocinationes. deinde peiora, & magna, & periculosa, timor, molestia. Quinta mane respicebat ac intelligebat omnia. Verum ad meridiem multū insanijt, continere se non potuit. Extremitates frigidæ subliuidæ. Urinæ inconcoctæ. Circa solis occasum mortuus est. Huic febres perpetuo cum sudore. præcordia sublimia, distentio cum dolore. Urinæ nigræ habentes quædam in medio suspensa innatantia rotunda, non subsidebant. Ab aluo stercora prodibant. Sitis perpetuo non ualde. Conuulsiones multæ cum sudore, circa mortem.

Ritoni in Thaso erecte obambulanti, pedis dolor fortis à magno digito cepit. Decubuit eadem die. horridus, anxius, parū subcalescens. nocte desipuit. Secunda die tumor laxus per totū pedem, & circa malleolum subrubens cum distentione. Puscula nigræ febris acuta. insanijt. Ab aluo uero mera, biliosa, satis multa prodibant. Mortuus est altera ab initio die.

Lazomenium qui ad Phrynichidæ puteum decumbebat, febris uehemēs corripuit. Dolebāt autem caput, collum, lumbos ab initio. Statim aut surditas. Somni nō aderant. Febris acuta inuasit. Præcordium eleuabatur cum tumore, distentio non ualde. lingua sicca. Quarta ad noctem desipuit. Quinta laboriose omnia exacerbata sunt. Circa undecimam parum remisierunt. Ab aluo uero ab initio & usq; ad decimā quartam, tenuia multa aquei coloris prodibāt. Toleranter ea quæ ad secessum pertinent ferebat. Postea aluus restitit. Urinæ perpetuo tenues quidem, uerum boni coloris, & multa in medio suspensa habebant diuulsa, non subsidebant. Circa decimā sextam minxit paulo crassiora, habebant subsidentiam paruum, paululum alleuarūt, respicebat magis. Decima septima rursus tenuia. Circa utraq; aures tubercula extiterunt cū dolore. Somni non aderant. delirabat. Circa crura dolebat. Vigesima à febre liber iudicatus est. nō sudauit. omnia intelligebat. Circa uigesimā septimam coxæ dextræ dolor fortis, cito quieuit. Tubercula uero iuxta aures neq; sedata sunt, neq; superata, uerum dolebāt. Circa trigessimā primam profuuiū alui ex multis aquosis, cum eiusmodi quæ in dysenteria prodire solent. Vrinæ crassas mingebat.

Tubercula circa aures sedata sunt. Circa quadragesimū oculum dextrum dolebat, obscurius uidebat. Restitutus est.

AEGROTVS XI

DRomeadæ uxorem quæ filiam pepererat, & alijs omnibus secundū rationem factis, secunda die rigor corripuit, febris acuta. Cœpit autē prima die dolere circa præcordia fastidiosa ac nauſeabūda, horrida, anxia, & sequentib. nō dormiuit. Spiritus rarus, magnus, statim reuulsus. Altera à rigore die, stercora ab aluo bene prodibant. Urinæ crassæ, albæ, turbatæ: qualis sit ex his quæ subsiderunt, ubi multo tempore sita, fuerit conturbata: nō subsidebant. nocte non dormiuit. Tertia circa meridiem superirruit. Febris acuta. Urinæ similes, præcordij dolor, fastidiosa ac nauſeabunda, nox molesta, nō dormiuit. Sudauit per totum subfrigida. Statim autē rursus recalefacta est. Quarta die circa præcordia parum alleuata est. Capitis grauitas cum dolore, in soporem incidit, parū de naribus stillauit. lingua sicca, siticulosa. Urinæ tenues, oleosæ, parum dormiuit. Quinta siticulosa, fastidiosa. Urinæ similes, nihil ab aluo. Circa meridiem multum delirauit, & statim rursus parum resipiscebat, exurgēs in soporem incidit, frigiditas parua, nocte dormiuit, delirauit. Sexta mane superirruit. Statim autē recalefacta est. Sudauit per totum. Extremitates frigidæ, delirauit. Spiritus magnus, rarus. Paulo post conuulsiones à capite cœperunt. Statim mortua est.

AEGROTVS XII

HOmo quidam calefactus cœnauit, & bibit amplius. Vomuit omnia noctu, febris acuta. Præcordij, dextri dolor. Inflammatio submollis ex interna parte, noctem moleste tulit. Urinæ ab initio rubræ, crassæ, depositæ nō subsidebant. Lingua sicca, non ualde siticulosa. Quarta febris acuta. Dolores omnium. Quinta minxit leue, oleosum, multum, febris acuta. Sexta uesperis multum delirauit. Nec nocte dormiuit. Septima omnia exacerbata sunt. Urinæ similes, sermones multi, continere se non potuit. Ab aluo cum irritatione prodierūt litquida turbata, cum lumbricis. Nox laboriosa. Mane riguit, febris acuta. Sudauit calidum. A febre liber esse uisus est, non multum dormiuit. A somno frigiditas, sputatio. Vesperis multum delirauit. Paulo post uomuit nigra, pauca, biliosa. Nona frigiditas, multum delirabat, non dormiuit. Decima crura dolebat. Omnia exacerbata sunt, delirauit. Vndecima mortuus est.

AEGROTVS XIII

MVlierem quæ decumbebat in litore, trimestri fœtu grauidam febris uehemens corripuit, statimq; lumbos dolere cœpit. Tertia dolor colli, capitis, iuxta clauiculam, & manū dexterā. Statim lingua uoce destituta est, dextra manus resoluta est cum conuulsione, uelut his qui aliqua siderantur parte contingere solet. Delirabat penitus, noctem moleste tulit, nō dormiuit. aluus turbata est, ex biliosis, meris, paucis. Quarta die lingua uoce soluta est. Cōuulsiones eorundem, dolores omnium permanebāt. Iuxta præcordia tumor cum dolore, non dormiebat, penitus delirabat, aluus turbata. Urinæ tenues, non boni coloris. Quinta febris acuta, præcordij dolor, planè delirabat, secessus biliosi, ad noctem sudauit, à febre libera. Sexta resipiscebat. Ab omnibus alleuata est. Verū circa sinistram clauiculam dolor permanebat, siticulosa. Urinæ tenues, nō dormiuit, Septima tremor, in soporem incidit, parum delirauit, dolores iuxta clauiculam

culam, & sinistrum brachiū permanserunt. Reliqua alleuata sunt. Omnia intel-
ligebar. Tres dies à febre libera māsit. Vndecima reuera est, superriquit, febris
uehemens corripuit. Circa decimam quartam uomuit biliosa, flaua, latis multa,
sudauit. A febre libera iudicata est.

ÆGROTVS XIII

MElidia, quæ decūbebat iuxta lunonis templum, capitis & colli, & pecto-
ris dolor fortis cœpit. Statim autē febris acuta corripuit. Mēsēs pauci ap-
parebant. Dolores omnium horum cōtinui. Sexta die soporosa, anxia, horrida,
rubor in maxilla, parū delirauit. Septima sudauit, febris dimisit. Dolores perma-
nebant. Redijt, somni pauci. Vrinæ perpetuo boni coloris, uerū tenues. Seces-
sus tenues, biliosi, mordaces, ualde pauci, nigri, graueolentes prodibant. In uri-
nis subsidentia alba, leuis. Sudauit. Iudicata est perfecte undecima die.

HIPPOCRATIS COI DE MOR-

BIS POPVLARIEVS LIB. II. IANO COR-
nario Medico Physico interprete.

SECTIO PRIMA.



ARBVNCVLI in Cranone æstiuū, pluebat in ardorib. aqua
larga. Cōtingebat hoc per totū, & maxime ab austro. & sub-
naſcebantur quidem in cute ſanies. dum autē intro concipie-
bantur, caleſcebant, & pruritū inducebant. Deinde puſtulæ
uelut ab igne inuſtæ excitabantur. & ſub cutem uri ſibi uide-
bantur, in ardoribus ſiccitatis. Febres plerūq; citra ſudorē.

In his uero ſi minutæ imbris guttæ deciderint, magis ſudato-
ria ſunt ab initio. At hæc difficiliora iudicatu manent, q̄ aliter: Attamen mi-
nus, ſi non propter hæc fuerint, ſed propter morbi modum. ¶ Febres ardētes
in æſtibus magis ſunt, & in alijs temporibus. Reſiccantur autem magis æſtate.
Autumno maxime ſeriuū, & oris uentriculi dolor, quanquā & ipſe minus ma-
leſicus fuerit, ipſo morbo tali exiſtente. Aſcarides ueſperi ſimiliter huic. & illæ
tunc inſeſtant in die plerunq; nō ſolum ideo quod magis affligūt, ſed etiā ipſæ
per ſe ipſas. In autumno acutiſſimi morbi & maxime lethales. & omnino ſimiliſ-
tudine habent, eo quod ueſperi exacerbantur: tanq̄ annus ipſe habeat circuitū
morborū. Quale eſt dies morbi, quale eſt ueſperinū tempus ad exacerbationē:
Tale eſt morbi, & uniuſcuiuſq; cōſtitutionis inter ſe, ubi non quid in ſuperiori
ſpecie fuerit in nouatum. Sin minus, alia ſanè cōſtitutione hæc imperiū obti-
nerint. Quare etiā annus ad ſeiſum hoc modo ſe habet. In quietis ac conſtan-
tibus temporibus, & annis tempeſtiue tempeſtiua præbētib; boni ſtatus &
iudicatu ſacillimi morbi ſunt. In incōſtantibus uero, incōſtantes & qui diffi-
culter iudicantur: quum ſanè in Perintho defecerit aut abūdauerit quid, ut aut
uenti ſint, aut non uēti: aut aquæ, aut ſiccitates: aut ardore, aut frigora. Ver au-
tem omnino ſaluberrimum, ac minime lethale. Circa principia morborum con-
ſiderandum, an ſtatim florent. Clarum autem hoc fit ex incremento. Incremen-
ta uero ex circuitibus, & iudicationes quoq; hinc manifeſtæ ſunt, itēq; ex acer-
bationibus

*Adæſſencia
loq. ultra
exacerbant
exipit
ſilicet
p. p. p.*

*ſiue p. p. p.
u. u. u.*

bationibus in circuitibus, si citius accedant, aut non: & si diutius durent, aut non: & si magis affligant, aut non. Ex omnibus autem continuis aut intermittentibus, & diuturnis, & uulneribus, & sputis, & doloribus. Itemq; tuberculorum inflammationes, & quæcunq; alia posterius apparēt, fortassis autem & ex alijs communibus rebus, quæ quidem citius fiūt, breuiores sunt: Quæ uero tardius, longiora: quum etiam in circuitibus citiorem recursum, ac reliquum augmentum, morbus neget. Nam & eorum qui statim pereunt, uelociiores sunt iudicationes, quoniam & dolores, & continui ac fortes. Quæ uero ad melius iudicant, non statim apparent. Iudicatoria non iudicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis iudicationis. Quæ præiudicata sunt, si crude iudicata fuerint, recidiuæ fiunt: Sin minus, iudicationis impeditiones aut mala iudicationes. Possunt etiam fieri perniciosæ, ea quæ non parua sunt. Quæcunq; iudicatoria signa fiunt, eadem hæc si non fiunt, difficilis sunt iudicationis. Quæ uero contraria significant, malum: non solum si recurrant, sed etiam primariæ naturæ contraria repentia. Quemadmodum etiam malorum signum, ea quæ ad contraria repunt. Considerare uero sic oportet, in cibis, compressionibus uenarum, tumoribus præcordiorum, sursum uergentibus, deorsum uergentibus. Sed & multa sunt eiusmodi, uelut abortientium mammae graciles fiunt, neq; enim contrarium est. Neq; iussus diuturnæ, quoniam ubi testis intumuit cessant: & testis tumor à tussi cessat & alleuatur: quæ res commonefacit nos communionis pectorum, mammarum, geniturae, uocis. *signi aborti.* (Abscessus aut per uenas, aut per ossa, aut neruos, aut cutem, aut alias emotiones. Boni autem sunt qui infra morbum fiunt, uelut uarices, lumborum grauitates ex supernis.) Optimi uero potissimum sunt inferni, & longissime infra uentrem, & remotissimi à morbo: & qui per effluxionem fiunt, uelut sanguis è naribus, pus ex aure, sputum, urina, quæ per effluxionem fiunt. At abscessus quibus hæc non fiunt, sunt uelut dentes, oculi, nâsus, sudor. Sed & quæ sub cutem abscedunt foras tubercula, uelut putrescentia, & quæ suppurantur, aut ulcus, aut eiusmodi pustulae, aut squamæ, aut desluuuii capillorum, uiriliginis, lepræ, aut eiusmodi quæ abscessus sunt acruatiim fluentes, & non semirepêtes, & quæcunq; alia dicta sunt, & si non pro rationis excretionis morbi dignitate fiant, uelut Temeni nepti, ex morbo forti ad digitum decubuit, qui quum non sufficeret ad suscipiendū morbum, recurrit, Mortua est. Abscessus aut per uenas, aut per aluum, aut per neruos, aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalem medullam, aut secundum alias effluxiones, os, pudendum, aures, nares, ex utero menses. Iudicationes posttridie fiunt, uelut ad lumbos, aut ad femur, & ad testes: Quadoq; ex tussi, & testis ipse à seipso. Tusculosi abscessus, qui supra uentrem fiunt, non similiter perfecte liberant. (Sanguinis eruptiones largæ ex naribus plerunq; liberant, uelut Heragoræ, quod medici non animaduertunt.) Qui uoces asperas natura habent, his etiam linguæ subasperæ sunt, & quæcunq; asperitates à morbis similiter. Quæ igitur duræ sunt linguæ à natura, etiã sine morbo hoc habet. Molles uero tardiores sunt, & ad peccatum, & ad bonum, quam prior natura. Consideranda sunt etiam longa capita, ex uiuendi ratione, & ceruices longæ, ab inclinationibus, & uenarū amplitudo & crassitudo, ab eadem, & angustia, ac latitudines, & breuitates, ac tenuitates, ex contrarijs.

Quorum uenæ amplæ, & uentres, & ossa ampla, hi sunt qui tenues sunt. Pingues uero his contraria habent. & in his qui fame macerantur, mediocritates. Ab his consideranda ea sunt quæ præpropere incrementa unicuique detrahunt, & quæ diminutiones adaugent, & ea quæ incrementa coadugent, & quæ corroborant. Et quæ sint communes uenarum dissectiones. Pectinum ruptiones quæ quidem circa pubem fiunt, ut plurimum statim sunt innoxia. Quæ uero paululum supra umbilicum in dextera parte, hæc dolorosæ sunt & anxiosæ, & stercoris uomitum inducunt, uelut etiam Pittaco accidit. Fiunt autem hæc, aut à plaga, aut uulsura, aut alterius insultu: Quibus id quod medium est inter abdomen & cutem inflatur, & non sedatur. Color est uelut qui multum pallidus est, & qui ex candicante pallet: quoniam omne huiusmodi ab hepate est, & ex hoc sunt hepatici in his morbi. & morbi regij ab hepate, ad subalbidum colorem uergunt, & qui ex aqua inter cutem, & ex pituita alba laborant. Qui uero à splene sunt, tum hydropes, tum morbi regij, nigriores sunt. Sed & ulcera quæ ægre perlanantur ex albidorum sunt, qui ferè lentis colorem referunt: & cutis diffringitur ac labia, uelut Antiochus habuit & Aleuas, ab humoribus ex corpore saluuginoso, quod sub cute maxime, & à capite contingit, quam à pulmone fuerit calefactum. Occasiones unde quis ægrotare cœpit, considerare oportet, siue capitis sit dolor, siue auris, siue lateris. Signum autem sunt in quibusdam dentes, & in quibusdam inguinum tumores. Vltima sententia ac iudicantia febres, & tubercula: Quibus hæc non fiunt, iudicatio sublata est. Quibus intus relinquuntur, certissimæ recidiuæ ac celerrimæ. Crudos ac liquidos secessus, milium solidum in oleo coctum sistit. Exemplo est nauta puer, & Myriochaune.

SECTIO SECUNDA:

Mulier cor, hoc est os uentriculi dolebat, & nihil remittebat dolor. Huic polentæ pollen in mali punici succum inspersus, & semel in die acceptus in cibo satis fuit, & non reuomebat, uelut Charioni contigit. Mutationes profunt, si non ad praua mutantur, uelut his qui à medicamentis uomunt febrim gratia. Fines in meraciora desinentes, putrefactionem significant, uelut Dexippo. Serapis ex liquida aluo intumuit. Pruritus autem haud scio quor diebus, non ultra. Habebat autem & abscessum quendam in lateris molitudine, qui nigrefactus occidit. Et Strymargi uxor ex uentris per paucos dies turbatione, ubi multum in sistendo laborasset, & post pueri sexus foemine quadrimestris ex corruptione discessum sana facta esset intumuit. Moscho è calculo laboranti fortiter, in superna palpebra ordeolum obortum est magis ad aurem. Deinde intro exulceratum est. Quinta & sexta die ex intermis pus erupit. Infernas affectiones soluit. Glandularum tumor ac inflammatio circa aurem erat, itemque inferne in collo, è directo superni tumoris. Aristæi uxoris frater fatigatus in uia incalecebat. Deinde in tibia tumores fiebant terebinthi fructui similes. Postea febris continua fiebat, & postridie sudor factus est, & alijs paribus diebus semper idem fiebat. Adhuc autem febris tenebat. Erat autem sublienosus. Ex sinistra nare sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Iudicatus est. Postridie iuxta sinistram aurem tumor. Sequenti die etiam circa dextram, sed hic minor, & in super tepecebat. Hi euanuerunt, &

non suppurati sunt. Qui ab Alcibiade uenit, ei ex febris modicis ante iudicationem testis sinister intumuit. Habebat autem splenem magnum. & sanè tunc iudicata est febris uigesima die. Deinde aliàs atque aliàs subincallescibat, & subfloridum spuebat. Cuidam manus dextra, & crus sinistrum, quum ex tussi parum & nihil memorabile cecisset, fiderationis modo resoluta sunt; alia uero nulla re alterata est, neque facie, neque mente: Nec uero adeo fortiter illis partibus. Cœpit ad melius procedere circa uigesimalam diem. Factum autem hoc est illi ferè circa mēsiū eruptionem, & fortassis tunc primum apparebant. Erat enim uirgo. Apocemantus & pater fabri illius qui caput fregit, & Nicostratus non extulsiebant quicquam. Erant autem alibi circa rhenes dolores. Interrogationes factæ sunt, dicebant ipsos semper repleti potu aut cibo. *(Dolores fortissimos quo modo dinouerit quis conspicatus, fuga, tolerantia, experientia, & timiditates indicant.)* *(Aqua quæ cito caleleat, & cito frigeat, semper leuior est.)* *(Cibi & potus experientia opus habent, an ad æqualitatem maneant.)* Dicendum quòd ubi sanguis effluxit, excallescunt, & quæcunque alia huiuscemodi. Abortus masculus sexaginta dierum, in partu suppressionibus salubris. Hercules intumescibat mali ipsius die octaua. Magis ex dysenteria laborat, quisquis sanè etiam è tenefimo uexatur. *(Quædam lactans pustulas per corpus ubique habebat. Postquam autem lactare cessauit, sedatae sunt per æstatem.)* Coriarij illius qui coriacea præparabat, uxori, quum peperisset & perfecte exoluta esset, uisum est de secunda membranofum quiddam remanere: discessit autem quarta die male. Nam urinæ stillicidio uexabatur. Statim concipiens peperit masculum. Habebat autem iam multos annos, & postremum neq; menses prodibant. Quando autem peperisset, urinæ stillicidium paululum intermittebat.

Quædam priusquam conciperet, coxam dolebat. Postquam autem concepit, non amplius dolebat. Vbi uero peperit, uigesima die rursus doluit. Peperit digitum masculum. Prægnanti in tibia inferne dextera, tertio aut quarto mense pustula, ad quas manna thuris utimur, itemq; in manu dextera iuxta magnum digitum: haud scio an peperit, reliqui enim ipsam semestrem, habitabat autem uelut ego puto, in ædibus Archelai ad rupem. Antigenis uxor habitabat iuxta Nicomachum, peperit puerum carnosum quidem, uerum qui haberet maximas partes discretas, magnitudine uero esset quatuor digitorum, & sine ossibus, deinde crassus ac rotundus. Hæc autem anhelosa erat ante partum. Deinde simul cum partu pus reuomuit modicum, uelut ex furunculo uocato tuberculo. Quæ filias peperit gemellas, & difficulter peperit, & non ualde purgata est, tota intumuit. Deinde uenter ipsi magnus fiebat. Reliqua uero reprimebantur. & rubicunda prodibant usque ad sextum mensem. Deinde alba ualde per omne iam tempus. Atque hæc fluxiones ueneri officiebant, & mera rubicunda ipsi profluebant. In diuturnis intestinorum leuitatibus ructus acidus fiens, antea nūquam factus, signum bonum, uelut Demænetæ contigit. Fortassis autem licet etiam arte parare. Nam turbationes eiusmodi alterat. Fortassis autem & ructus acidi intestinorum leuitatem soluunt. Sanata est ueratri potione Lycia, postremum splen mag-

gnus, & dolores, & febris, & ad humerum dolores. Et uena quæ in splene est, in cubito secabatur. & saliebat quidem sæpe, Aliquando uero etiam non est secta, sed unâ cum sudore sanguis penetrauit, aut sua sponte. Ex quo autem prodibat, Splen dextera parte intendebatur, spiritus intus duplicabatur, non tamen magnus. mente mouebatur, contegebatur, flatu inerat, non prodibat inferne quicquam, nec mingebat. Mortua est ante partum. Quæ circa fauces ad alterutram partem repentia processerunt, exulcerata non sunt, ad sinistra transuerunt, ad splenem dolor uenit citra iudicationem. Hæroni iudicatio facta est decima quinta die. Cui forori hepar eleuatum est splenico modo. Mortua est secunda die. Bion simul multum mingebat quod non subsidebat, & sanguis ex sinistra nare manabat. Erat enim & splen fursum in gibbum eleuatus, ac durus, superstes mansit, recidiua. Erant autem anginosorum affectiones hæc. Colli uerticula intro uergebant, quibusdam amplius, quibusdam prope. Et collum forinsecus conspicuam cauitatem intro habebat, & hac parte ad contactum dolebat. Erat autem & cuidam infra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est: quibusdam uero etiam ualde rotundum, maiore circumferentia. Si non cum dente appellato, fauces non inflammatae, uerum iacentes. Partes sub maxilla tumida, non inflammatis similes. Neque glandulae ulli intumuerunt. Sed magis secundum naturam. Linguam non facile uertebat, ipsiq; & maior esse uidebatur, & prominentior. & sub lingua uenæ conspicuæ. deglutire non poterant, aut ualde difficulter. Immo ad nares fugiebat, si ualde cogerebant. & per nares loquebantur. Spiritus autem his non ualde sublimis. Quibusdam uero uenæ in temporibus, & in capitibus ac ceruicæ eleuatae. At recrudescentibus, ex his, parum quiddam tempora calida, etiam si alias non febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quum deglutire cupiebant, aut saliuam, aut aliud quiddam. Neque oculi intus desidebant. Quibus igitur tumor erat rectus, nec in alteram partem uergebat, hi neque leuiter sideratorum modo resoluebantur. An uero aliquem periisse uiderim, in memoriam reuocabo. Quos autem nunc noui, superstites manserunt. Erant autem partim celerrime alieuantia. Plurima uero ad quadraginta dies deueniebant. & in hoc plerique etiam sine febre. Multi uero etiam ad ualde longum tempus, partem aliquam tumoris habebant. Et deglutitio, & uox indicabat. & columellæ liquescentes significationem quandam prauam exhibebant, quamuis nullum grauius malum habere uidebantur. Qui uero tumores ad alteram partem uergentes habebant, hi unde uerticula inclinata fuerunt, isthic resoluebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie maxime conspicua, & in ore & intersepto iuxta gurgulionem. Sed & maxime inferne pro ratione immutabantur. Cæterum resolutiones leuiter sideratorum modo, non per totum corpus fiebant ueluti ex alijs, sed usque ad maximum, ab anginosa affectione. Atque hi & matura expuebant, eaque pauca ac difficulter. Quibus autem in rectum tumor tendebat, itidem expuebant. Quibus uero etiam cum febre, hi multo magis & difficulter spirabant, & aliena loquebantur, & uenæ his magis eleuatae. Et pedes omnibus quidem

quidem frigidissimi erant, maxime autem his. Et hi ad erecte standum impotentiores erant. Et quidam non statim moriebantur. Quos autem ego noui, omnes mortui sunt.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis.

IN Perinthum circa solstitium ferè æstiuu uenimus. facta autem est hyems. I Clementi celo, austrina. Ver & æstas ualde sine aquis usq; ad pleiadum occasum. Nam si etiam quid aquæ cecidisset, id erat uelut minutæ roris guttæ. Et Etesia non ualde spirarunt. Et qui spirarunt, diuulse id fecerunt. Æstas te febres ardentes populariter grassatæ sunt multæ. Erant autem sine uomitu. & alui turbatæ ex tenuibus, aquosis, non biliosis, spumosis, multis, quæ aliquando deposita etiam subsidetiã habebant, ex quibus sane etiam id quod sub dio noctu exponebatur, simile erat. Aequales specie alui secessus semper, malum. In his multi soporosi erant, & mente moti. hi uero ex somnis tales fiebant. Quum autem suscitati essent, omnia intelligebant. Spiritus sublimes, non tamen ualde. Vrinæ tenues quidem plurimis & pauca, aliàs autem non decolores. Sanguinis eruptiones è naribus non fiebant, nisi paucis: neq; parotides iuxta aures, de quibus postea scribam: neque splenes attollebantur, neque dextrum præcordium, neq; dolorosum ualde, neque fortiter intentum erat. Erat tamè quid quod iudicationem faciebat. Et maxime iudicabantur omnia plerūque circa decimam quartam diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore. & ualde paucis recidiuæ fiebant.

At uero sub minutas uelut rotis guttas quæ in æstate fiebant, apparebat sudor. In febricitantibus etiam quidam sudores statim ab initio fiebant, non tamen maligno modo, & quibusdam sub hoc tempus etiam iudicatio facta est cum sudore. Fiebant autem in febribus æstiuis, circa septimam, octauam & nonam diem, aspretudines in cute miliaceæ, culicum moribus maxime similes, nõ ualde pruriginosæ. Hæ perseverabāt usq; ad iudicationem. Nulli equidem masculo tales erupisse uidi. Mulier autem nulla mortua est, cui hæ fiebāt. Et graui auditu præditæ & soporosæ erant. Prius autem non ualde soporosæ erant hæ, quibus illæ affuturæ essent. Non tamen in totum durabant, Verum soporosæ & somnolentæ erant per æstatem, & usque ad pleiadum occasum. Postea uero magis uigiliæ aderant. Sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur.

Alium igitur per cibos sistere non dabatur, immo præter rationem putasset quis mederi conducere, etiam si minus multa quibusdam prodirent, per hoc quod in frigore quis iaceret strato supposito. Nam ulcerat quidem frigidum, calefacit autem eiusmodi species sensim progrediendo adhuc magis, etiam si nulla afflictio naturæ accedat, & in quibus, & qualia signa, & plura aut pauciora sentia, oscitatio, tussis, sternutatio, distentio cum oscitatione, eructatio, flatu: omnia talia corrumpunt. Quibus in febribus anxiosis, horridis, rubescunt facies, lassitudines, oculorum dolores, capitis grauitates, resolutiones leuiter sideratorum modo, & menses si apparuerint, maxime quibus primum, sed & uirginibus & mulieribus, quibus per tempus: Sed & qui aibus non in quo solet tempore, aut uelut oportet apparent. Deinde pallidæ

fiunt. Magnum autem in omnibus, id quod & cōsequenter fit, & in quo tempore, & in quibus. Valde bilioſis, in febribus maxime, omnino quibusdam ad crura purgatio. Medicamentorum modos ſcimus, ex quibus qualia, & quæ ſunt. Non enim omnes ſimiliter, ſed alij aliter componuntur. Et alibi citius, aut ſerius, in manuum traſtiones aſſumuntur, uelut eſt aut ſiccare, aut tundere, aut coquere, & eiufmodi. Omitto plurima, quæ unicuique, & in quibus morbis, & quo tempore morbi, ætatem, ſpeciem, uictum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & huiufcemodi. Zoilo iuxta murum ex tuſſi matura, febris acuta, & faciei rubor, & alius intercepta, præterquam ad neceſſitatem coactè, lateris ſiniſtri dolor, & auris è directo ualde doloroſa, & caput non uſque adeò. Spuens ſemper ſuppuratum ægrotabat. Sed alia iudicata ſunt, & iuxta aurem pus multum erupit, circa octauam aut nonam diem. Principia uero noni diei ex dolore auris. Haud ſcio quomodo ſine rigore iudicatio facta eſt. Sudauit caput ualde. Et hic fudor firmus erat, quod quidem ardor etiam ſiniſtri lateris eſſet. Superne unà cum aure dolor ſedatus, maxime circa ſcapulas. Sed & ante ſputa multa, ab initio florida reiecta, & circa ſeptimam aut octauam diem. Deinde laborioſa. Alius reſtitit uſque ad nonam & decimam diem. Dolor extinctus eſt. Tumor remittebat, & ſudores fiebant parui, non autem iudicabant. Maniſta autem erant hæc tum ex alijs, tum ex ſecceſſu. Nam incipiente auris dolore, etiam uenter turbatus eſt. Erupit autem ex aure nona die, & iudicatus eſt morbus decima quarta ſine rigore eadem die. Sed & ſputum largius ibat, & maturius, poſtquam auris erupit. Sudores autem, & ſerpentia ulcuſcula ad multum tempus, in capite fiebant. Reſiccata ſunt tertia die. Quæcunq; ſine ſigno iudicationis iudicatorio diſſerent, male iudicata ſunt, uelut Eryſipelas ancillæ Polemarchi. In glandularum tumoribus febres, malum, exceptis diarrijs. Et in febribus glandularum tumores, deteriores, qui in acutis ab initio uigorem reni ferunt. Spiritus, præcordijs eleuatio mollis, & intentio neutra, in iſtis ſuperne rotundum, in dextris uelut circumferentia ſuppuratoria, aliud longius magis, aliud diſſuſum, aliud deorſum repens, & hinc atq; hinc diſtentio uſq; ad umbilicum. In omni ſurſum uerſus è directo latione, ſi reuocetur, & in rotunditatem concludatur, quatenus quidem ſpiritus fuerit, extra iudicationem calore attenuatur. Si uero hinc eſſuſerit, ad ſuppurationem procedit. Spiritus denſi, parui: magni, rari, parui, rari: extra magnus, intra paruius, alius quidem extendens, alius uero urgens, dupla intro reuocatio, uelut ſuperinſpirantibus, calidus, frigidus. Medela aſſiduarum oſcitationum ſpiratio longa. Non potantibus, & uix, ſpiratio breuis. E directo etiam laterum intentio doloroſa, & præcordiorum intentiones, & ſplenis eleuationes, è naribus eruptiones. Quæ relinquuntur poſt iudicationem, recidias uas facere ſolent. Primum itaque lienis eleuationes, ſi non ad articulos fuerint, ſanguinis è naribus eruptio ſit, aut præcordijs dextri intentio, ſi non penetrauerint urinæ. Hæc enim eſt interceptio utrorunq; & recidiuæ horum merito ſiunt. Abſceſſus igitur horum facere oportet ſi non ſiant, eos uero qui iam ſiunt declinare. Eos autem excipere, ſi prodierint iam, & qualia oportet.

Diagnos eſt ſp. sine

oportet, & qua parte oportet. Qui uero non ualde, eos coadiuuare. Eos uero auertere, si omnino incommodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt: sin minus, si iam ueniunt.

Quarta die fientes sanguinis è naribus eruptiones ægre iudicant. Febres quæ una die intermittentes, altera superigent, unâ cum iudicatione, ad septimum circuitum durant. Scopo ex mucosis, biliosis, & faucium inflammatione, malo uictu ufo aluus suppressa est, & febris acuta facta, & lingua florida, & uigil sine somno. Pectinis intentio fortiter, æqualiter, paulatim ad infernam partem in dextris. Spiritus subdensus, præcordia dolebat, & respirans, & quum uerteretur. Sine tussi uero excrebat subcrassa.

Peplus ipsi data, à præcordio quidem depulsi, transiit autem nihil. Postridie glandes duæ appositæ non apparuerunt. Vrina crassa & turbata. Subsidentia leuis & plana. & restitit aluus in turbulentia, uenterq; mollior erat. Et splen eleuatus, & deorsum uergens factus est. Potu utebatur aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto. Decima sanguis ex sinistra nare aquosus paucus uenit: non autem ualde infirmus erat ob hoc ipsum: & urina subsidentiam habens. In subsidentia uero subalbum quiddam adhaerens uasi, tenue, neque genitura simile, neque dissimile. Defluxit hoc breui. Postridie iudicatus est, à febre liber, & subijt subuiscosum undecima die. Hoc uero circa defluxum erat quid biliosum. Vrinae uero purgatio multa, tum copia, tum subsidentia. & priusquam uinum bibere inciperet, ferè pituitæ similis. Penetrauit autem undecima die, ut quæ non esset multa. Viscosa uero erant stercorea & turbata. Huiusmodi autem iudicatorio modo fiebat. Nam & Antigenis in Perinthotale erat.

Quæ circa linguas eleuantur collectiones, & humiles calculi, & quæ podagricis sunt, circa debiles illorum articulos sunt. Nam ossium natura causa est, ut hæc & indurentur, & distendantur. Collectio Hippostrati uxori ex quartana annua ad fastigium eleuata est, quum subfrigida palam esse uideretur, impetus in totum corpus factus est, & sudor. iudicata est hoc modo. & postea menses plures copia & tempore. Tunc enim suppressi fuerant.

Abcessus non consistere uisus est. In pulsantibus sanguinem fundentibus figura ampla, & in totum si ex omnino decliui accliuæ fiat. Quapropter etiam deligationes in uenarum sectionibus impetum faciunt, fortes uero sanguinem impediunt. *Sanguineum & subbiliosum, ructum acidum facit. Forsaisis autem ad atræ bilis morbum his desinet.* Rigores incipiunt mulieri, bus quidem magis à lumbis, per dorsum ad caput. Sed & uiris posteriore corporis parte magis quam anteriore, uelut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarsa. Indicat autem pilus animantium. Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus uitales sunt.

Apparentia in quibus mensibus sunt. Labores in circuitibus, quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitatibus perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per prodeuntia, requirit dietam siccissimam. Quod citius motum est ac discretum, rursus augetur etiam tardius, & ad longius tempus. Labores, circa quinquagesimum tertium diem, & circa centesimum sextum.

Labores tertio, quinto, septimo, nono mense, & secundo, ac quarto. Quæ nosse oportet ad septimum mensem, aut à mensium fluxu numerandi sunt nouem menses, aut à conceptione, & ad septuaginta ac ducentos dies, græci menses fiunt. & si

quid

deligant in uen

quid amplius ultra hos est, & aut masculis, aut etiam femellis, hæc sunt, aut contraria. A cibis & potibus humeri ac mammæ inflantur, & impotentia, & inflationes in capite, incrementa faciunt, donec ossa fuerint solida facta.

Menstruarum purgationum circuitus est. Quæ ante has sunt grauitates, similes sunt laboribus octimestribus. Primipararum lac, alimento quidem transmutatione accipiente, octimestri uero perficiente. Si in uulneribus fortibus, tumor non appareat magnus, malum. Laxi bonum: fursum pascentes, peius. Menstruæ purgationes similes octimestribus, in tendentibus ad decimum mensem sentes, malum. Quibus tumores in ulceribus, non ualde cõuelluntur, nec infaniunt. His autem derepente dissipatis, quibus quidem ad posteriores partes, conuulsiones cum doloribus, quibus autem ad anteriores, aut infania, aut dolores lateris acuti, & dysenteria rubra. Tumores præter rationem alleuantes, prauum: uelut Andronici filio Erysipelas recurrit: si non ad eundem locum rediens, bonum quid significet. Hoc ex natiuitate circa aurem, ad pubem distributum est. Alteri tertia ex natiuitate die factum, suppuratum est nona. Hic septima die sanus euasit, Maligniora sunt quæ derepente disparent.

SECTIO QUARTA.

De uenis.

HEpatitis in lumbis usque ad magnum uerticulum, inferne etiam uerticulis se ingerit: hinc subleuata per hepar, & per septum transuersum ad cor. & quæ quidem recta est, ad clauiculas: hinc alia quidem ad collum, alia uero ad scapulas, alia deorsum descentes, ad uerticula & costas declinant. Et ex sinistris quidem, una prope clauiculas. Ex dextris uero ad quandam ipsarum locum. Alia uero utrinque deflexa. Alia paulo inferius deflexa, ubi quidem illa deficit, costis se ingerit, donec ad uenam in ipsum cor accesserit, ad sinistras deflexa. Infra autem decuruata ad uertebra descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari ingerens se costis reliquis omnibus, hinc atque hinc singulis ramulos præbens, quem sit una: a corde quidem ad locum quandam à sinistris magis procedens. Deinde infra arteriam, donec consumpta fuerit, & uenerit eò unde hepatitis subleuata est. Priusquam autem eò uenit, circa extremas duas costas diuisa est, & partim ab hac, partim ab illa uerticulorum parte progressa consumitur. Quæ uero recta à corde ad clauiculam tendit, supra arteriam est: & ab hac, uelut etiam iuxta lumbos infra arteriam, ad hepar insilit, partim in portas & pinnas, partim in reliquum deinceps procedit paulo infra septum transuersum. Septum autem transuersum adhæret hepati, nec facile est ipsum separare. Duplices porro uenæ à clauiculis, alteræ hinc alteræ isthinc, sub pectus ad pectinem procedunt: quod uero hinc, nondum scio. At Septum transuersum infra iuxta uerticulum quod est infra costas, qua rhenes ex arteria, ea parte consurgunt: Venarum arteriæ ex ipso rhene oriuntur, hinc atque hinc ab arteria neruum habentes. Atque hac parte alicubi in recurrente à corde Hepatitis desinit. Cæterum ab hepatide per septum transuersum maximæ duæ, altera hinc, altera isthinc, sublimes feruntur, multitudine per septum sunt, & circa ipsum consistunt in superiora parte, atque hæc magis sunt conspicuæ. Duo uero nerui à cerebro sub os magni uerticuli, ex superioribus & ad gulam magis, ab utraque arteriæ parte descendunt, & uterque in seipsum incidens, uni similis, ubi uerticula & septum sunt, ibi

ibi definiūt. & quidam ambigui, ex hac societate ad hepar & splenem ipsos tendere putauerūt. Alius neruus ab utraq; uerticulorum parte iuxta clauiculam ad spinam procedit, ex obliquo uerticulorū, & ad costas distribuitur, & quemadmodum uenæ, sic hi per septum, ad mesenterium mihi tēdere uidentur. Vbi autem hæ deficiunt, rursus hinc ubi septum exoritur, ab eo coherentes ac continui existentes, iuxta medium infra arteriam, deinceps ad uerticula distribuuntur, quemadmodum uenæ, donec ad sacrum os progressi consumuntur. In Aeno ex assiduo leguminum esu, scemina & masculi, crurum impotētes facti sunt, ac uitam degerunt. Sed & his qui eruo uescuntur, genua dolent. Diligentia adhibenda est ut ex candescencia inducatur, & coloris reparandi, & sanguinis in uasa subter cuticulam colligendi gratia: itemq; laticia, & timor, & huiusmodi. & si quidem reliquum corpus simul ægrotarit, simul curare: Sin minus, fatis est. Strymargi famula Idumæa erat, quæ ubi filiam peperisset, cōuersum est ei uteri osculum, & dolor ad coxam & crus. Iuxta malleolum sc̄ta uena liberata est, & quidem quum etiam tremores totum corpus detinerent. Verū ad causam deuenire oportet, & ad causæ principium.

SECTIO QUINTA.

Naturæ indiciorum notio.

Quicumq; fului, naso acuto, oculis paruis, mali. Quicumq; fului, simi, oculis magnis, boni. Hydrofici rauos oculos habent, & calui sunt. Vocis gracilitatem soluit uarix, ad sinistrum & dextrū testem, absq; horum altero fieri non potest ut soluat. Magni, calui, balbi, gracili uoce præditi, boni. Morbos autem habent, balbus, aut caluus, aut gracili uoce præditus, aut hirsutus, fortiter atrabiliarios. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potentes, eos necesse est dum illa soluantur, suppuratos fieri. Dolorem in locis infernis fortē, surditas soluit, itemq; sanguis multus ex naribus erumpens. Insania magni morbi ex more sientis solutio. Si puerperis conuulsio fiat, febrem excitato: & cerato multo tepido in uescam immisso, ac per clysterem in fuso colluito.

Si capitis os confractum fuerit, lac, & uinū ammixta aquæ pari mensura, bibenda dato. Si uero ulcus fuerit, internas uenas secato, si non febricitet. Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fuerint eleuata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde ad præcordia, postea ad coxam, Omnia uero ut dolent fieri non potest. Ventositatem flatuosam uenæ sectione, fluxionem pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex uena magna est. Si uero sua sponte multum fluat, ieiunet: aut aquæ partes duas, lactis quatuor bibat. Infecundas fomentis ac medicamentis curato. Quicumq; derepente uoce destituitur, si sine febre fuerint, ipsis uenâ secato. Piruitæ fluxiones ex mammis trahunt oculi, & eructant per nares ad pulmonem. Quibus tussis sicca est, his non soluitur, nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat.

Si hydropticum tussis corripiat, siquidē statim animo linquatur, calicis omnibus utatur: Sin minus, inebriato, ac cibus ipsum impleto. Venas autem internas secato, dum morbus magnus in intentione est. Solutio coxarum doloris, oculorum distortiones, cæcitas: testium tumoris, mammarum eleuatio.

Si febre tenente, partes circa faciem graciles fuerint, in die impari, sequenti die soluetur. Hydropticus si tumorem in cruribus habens tussiat, malum.

Si aurea

*quid facere solbit
Si pirit. uentris sui
dolor fuerit.*

de hydropticis ay

Si auris doleat, lacte uratur. Si non in die impari febris dimittat, recidiuare necesse est. Cui uena in cubito pulsarit, infanus & iracundus est: cui uero quie uerit, stupidus. Vulnus si sanguinē fundat, ulcus ne madefacito, uerum caput calida rigato. Si os uentriculi doleat, panē calidum cum uino meraco exhibeto. Vomitus solutio, aquam calidam bibendam dato, & uomat. Quæ cūq; corrupta torpescunt, euulsa uena ulcerato, ac sanato. In conuulsione digitorum manus citra febrem, uenam secato, si non caput doleat: Sin minus, aquam calidam affundito. Ad oculos. Spodij partem duodecimam, croci quin tam, nuclei oliuæ unam, cerusæ unam, myrrhæ unam. Aquam frigidam super caput fundito, & allia cum maza edenda dato. Varices caluorū si nō magni fuerint, furiosi sunt. Ad uiriliginem & lepram. Calcem in aqua adhibeto, ut ne exulceres. Secundarum purgatio si non discedant. Sternutatorium ad nares apponito, ut sternuet. & sternutantis nares ac os apprehendito.

SECTIO SEXTA.

Naturæ indiciorum notio.

Caput magnum, oculi parui, balbi, iracundi sunt. Qui longæ uitæ sunt, plures dentes habent. Balbi, celeri lingua præditi, atræ bilis humori obnoxij, biliosiq; sunt, oculis non nictantes, iracundi. Magnum caput, oculi nigri & magni, nasum crassum & simū habentes, boni. Oculi raui, magni, caput magnum, ceruix tenuis, pectora angusta, cōgrue adaptati hominis sunt. Caput paruum habens, neq; balbus esse poterit, neq; calius, nisi fuerit glaucus. In conuulsionibus si uox in die impari soluitur, à magno morbo liberat. Puer peræ febricitanti & dolenti aquam affundito, & psanam crassam ter in die calidam dato. Puer nutritur septimo mēse, aut nono, aut decimo, & uoce firmatur, & robur sequitur, & manibus ualidis fit: dum uox soluitur, omnia soluuntur. Solutio enim similis est uoci. Soluitur autem in die impari. Si uenæ pulsauerint in manibus, & facies sana ac robusta fuerit, & præcordia non fuerint mollia, diuturnus fit morbus, qui sine conuulsione non soluitur, aut sanguinis multi ex naribus eruptione, aut dolore ad coxas. In gutturis dolore, aquam calidam super caput fundito, si non frigus fuerit: Sin minus, farinam q; calidifimam dato, & uinum meracum. In turbatione uentris, fabas coctas dato, si non supernæ partes abunde fuerint biliosæ. Aut cuminū cum fabis edendū dato. At interceptio morbi fieri nō poterit, nisi in die impari. Neq; principij fieri poterit, nisi in die pari, itemq; mense ac anno pari. Nitrum autem Aegyptium, & coriandrum, ac cuminū cum oleo terito, & uentri illinito. Qui moriuntur eos necesse est die impari, & mense impari, & anno impari mori. Bonū autē fuerit prædicere mortem, aut dolores fortes. Quorū oculi robusti non sunt, his mors breui imminet. Si uero in impari anno fiat, ab utrisq; impares fieri necesse est. Si aut in anno pari & die pari, necessariū est in impari die mori. Ex numero tertia fortissima est. Anginā & lippitudinē uenæ sectio. Vulnerato in testino, respiratio prodit inferne incōspicua iuxta uulnus, & euacuatur pectora. Dato igitur lac & uinū, pari aq; mēsurā ammixta. Quorum pectora bilem generant, balbi, furiosi, & calui sunt. Quicumq; horum ex natiuitate etiam fra bones, hi imprudentes sunt, aut calculosi aut insanientes. Quibus autem non, alterius mali solutio fit. Circa naturam plurimam uim habet mamma dextera, oculus

oculus dexter, & quæ infra sunt hac parte. Nā & masculi dextris inharēt. Mulieribus menses ut sistas, cucurbitam maximam ad mammam affigas. *Tris menses ut sistas* Si multum fluat lac, necesse est foetum debilem esse. Si solidiores fuerint mammae, sanior est foetus.

Vena crassa est in utraq; mamma: quapropter maximam habent prudentie partem. Vrinae stillicidium soluit uenae sectio. Si superni lociurgent qui sunt circa caput, ulcerum purgatio, uomitus, hydrops. Auentris turbatione, aut à tussi, si cancer fiat, os amarescit. Dato aut elaterium bibendum bis aut ter, si non balbus fuerit. Deligare uero oportet florem grisei uisum, donec fuluus euaserit, & spongiam, si non balbus fuerit. In anxietate, horrore, oſcitatōne, dato uinum pari aquae mensura ammixta. Ad aures dolorē cucurbitam affigito. Quicquid supernarū partiū doluerit, dolor ad coxas, aut ad genua, & anhelatio fiens, omnia hæc soluit. In uoluulo molli, frigidum uinū multum meracum pro ratione dato, donec somnus, aut crurū dolor fiat. Soluit autem & febris, & dysenteria citra dolorem. Si præcordia distenta fuerint, manu comprimito ac lauato. Ad paronychiam unguium abcessum, galla nigra cum melle. Aqua secedente, lactis heminas octo bibendas dato. Si uero uomat, & non bibat, allij aut ceparum in tritum dato. *Vt mulier in utero concipiat, polypos paruos super flamma calidissima assatos, & ferē semiambuſtos, edendos dato.* Et nitrum Aegyptium tritum, coriandrūq; ac cuminū, in pastillos efformato, in pudendumq; subdito. Si ex crapula caput doleat, uini meraci heminam bibat. Si uero aliter caput doleat, panem q̄ calidissimum cum uino meraco edat. Si hominem calor corripiat, nō à bile, necq; à pituita, sed aut à lassitudine, aut aliàs febriat, aquam multam calefacito, deinde ea superinfusa caput rigato, donec pedes sudarint: & farinam crassissimā coquito. Postquam autem pedes sudarint, farinam plurimam & calidissimam edens, ac uinum meracum in super bibens, uentris contactus facile quiescat. Aut naricifsi duo aut tria capita in coena edat. *Qui insania corripietur, ei hoc signū præſagit, sanguis colligitur ipsi ad mammas.*

HIPPOCRATIS COI DE MOR

BIS POPULARIBVS LIB. III. IANO COR
nario Medico Phifico interprete.

SECTIO PRIMA.

AEGROTVS I.



PYTHION qui habitabat iuxta telluris templum. Cœpit tremor à manibus prima die, febris acuta, delirium. Secunda omnia exacerbata sunt. Tertia eadem. Quarta ab aluo pauca, mera, biliosa prodierunt. Quinta omnia exacerbata sunt, tre mores perseverabant, somni tenues, aluus restitit. Sexta sputa uaria, subrubra. Septima os distractum est. Octaua omnia exacerbata sunt. Tremores perseverabant. Vrinae ab initio quidē, & usq; ad octauā tenues, decolores, in medio pendens nubilosum quiddam habebant. Decima sudauit. Sputa aliquantulū matura, iudicatus est. & urinae

N nā

nae subtenues circa iudicationem. Post iudicationem uero, quadraginta diebus postea suppuratione circa sedem, & abscessus factus est cum urinae stillicidio. P. M. V. Q. S. hoc est, probabile multitudine urinae quadraginta sanatum.

ÆGROTVS II

Hermocraten qui ad nouum murum decumbebat, febris uehemens corripuit. Ccepit autem dolere caput, lumbos. Præcordij distentio molliter. Lingua ab initio adusta est. Surditas statim. Somni non aderant. Siticulosus non ualde. Urinae crassae rubrae, depositae non subsidebant. Ab aluo uero non pauca combusta prodibant. Quinta minxit urinas tenues, habebant quid in medio pendens, non subsidebant. Ad noctem mente motus est. Sexta morbo regio correptus est. omnia exacerbata sunt, non resipiscebat. Septima molestia fuit. Urinae tenues similes, similiter etiam sequentibus diebus. Circa undecimam omnia uisa sunt alleuata esse. Sopor ccepit. Urinae crassae subrubrae, infra tenues, non subsidebant. Placide resipiscebat. Decima quarta à febre liber, non sudauit, dormiuit, intelligebat omnia. Urinae consimiles. Circa decimam septimam redijt, calefactus est, sequentibus diebus febris acuta. Urinae tenues. Rursus autem uigesima die iudicatus est, à febre liber, non sudauit. Cibum fastidiebat per totum tempus. resipiscebat, loqui non poterat, lingua arida, non sitiebat. dormiebat soporosus. Circa uigesimalam quartam calefactus est. aluus lubrica multis tenuibus fluens. & sequentibus diebus febris acuta. lingua combusta est. Septima & uigesima mortuus est. Huic surditas perpetuo perseverabat. Urinae crassae & rubrae non subsidentes. Aut tenues decolores, & in medio quid pendens habentes. gustare autem non poterat. P. S. S. V. S. M. hoc est, probabile secessibus suppressis uigesima septima mortuum.

ÆGROTVS III

Qui in Dealcis horto decumbebat, capitis grauitatē, & tempus dextrum dolorosum habebat multo tempore. Cum occasione uero febris corripuit, decubuit. Secunda die ex sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Ab aluo stercorea probe prodierunt. Urinae tenues, uariae, in medio pendens quidam habentes minutim dispersum, uelut farinae crassiores, & geniturae similes. Tertia febris acuta, Secessus nigri, tenues, spumosi, subsidentia secessibus liuida. somno grauiore aliquantulum premebatur, moleste surgebat. Urinis subsidentia liuida, subuiscosa. Quarta uomuit biliosa, flaua, pauca, paulo post æruginosa. De sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Secessus similes. Urinae similes. sudauit circa caput & clauiculam. splen eleuatus est. femoris dolor è directo. Præcordij dextri distentio submollis. nocte non dormiuit. parum mente motus est. Quinta secessus plures, nigri, spumosi, subsidentia secessibus nigra. nocte non dormiuit. mente motus est. Sexta die secessus nigri, pingues, uisco si, graueolentes. dormiuit, intelligebat magis. Septima lingua sicca, siticulosus, non dormiuit, mente motus est. Urinae tenues, non boni coloris. Octaua secessus nigri, pauci, compacti. dormiuit. intelligebat. siticulosus non ualde. Nona riguit. febris acuta. sudauit. frigiditas. mente motus est. dextro oculo distortus est. lingua arida, siticulosus, insomnis. Decima circa eadem. Undecima intelligebat per totum omnia, à febre liber. sudauit. urinae tenues circa iudicationem. Duobus diebus

diebus à febre liber fuit, decimaquarta redijt. Statim autem nocte nō dormiuit. penitus mente motus est. Decima quinta urina turbata, qualis ex his quæ subfi-
derunt fit, quum fuerint agitata. febris acuta. penitus mente motus est. non dor-
miuit. genua & tibias dolorosa habebat. ab aluo subdita glande, stercora nigra
prodierunt. Decimasexta urinæ tenues, habebant quid in medio uehens nu-
bilosum. mente motus est. Decima septima mane extremitates frigida, conte-
gebatur, febris acuta. sudauit per totum. alleuatus est. intelligebat magis. non à
febre liber, siticulosus. Vomuit biliosa, flaua, pauca. Ab aluo stercora prodie-
runt paulo post nigra, pauca, tenuia. Urinæ tenues, non boni coloris. Decima
oçtaua non respicebat. soporosus. Decimanona per eadem. Vigesima dormi-
uit, omnia intelligebat. sudauit. à febre liber. non sitiebat. Vigesima prima pa-
rum mente motus est. paululum sitiebat. præcordij dolor, & circa umbilicū pal-
pitatio perpetuo. Vigesimaquarta urinis subsidētia. intelligebat omnia. Vige-
sima septima coxæ dextræ dolor. Urinæ tenues, & subsidētia habebant. in
reliquis commodissime habebat. Circa uigesimam nonam oculi dextri dolor.
Urinæ tenues. Quadragesima egressit pituitosa, alba, aliquanto plura. multum
sudauit per totum. perfecte iudicatus est.

SECTIO SECVNDA. AEGROTVS IIII

IN Thaso Philistes caput multo tempore dolebat. & quādoq; etiam aliquan-
do grauiore somno pressus decubuit. Quum autem ex potationibus febres
continua oborta essent, dolor exacerbatus est. nocte excalectus est primum.
Prima die uomuit biliosa, pauca, flaua primū. postea uero plus æruginosa. Ab
aluo autem stercora prodiebant. noctem habuit molestant. Secūda die surditas,
febris acuta. præcordium dextrum distētum est, declinauit ad internas partes.
Urinæ tenues, pellucidæ, habebant quiddam in medio pendens genitura si-
milit. Parum insanit circa meridiem. Tertiam diem molestant habuit. Quarta
conuulsiones. exacerbata sunt omnia. Quinta mane mortuus est.

AEGROTVS V

Charionem qui decūbebat apud Demenetū, ex potu febris corripuit. Sta-
tim aut capitis grauitas dolorosa. nō dormiuit. aluo turbata ex tenuibus
biliosis. Tertia die febris acuta. capitis tremor, maxime autem labij inferni, pau-
lo post rigor, conuulsiones, penitus mente motus est. Noctem moleste tulit.
Quarta per quietem, parū dormiuit. parum delirauit. Quinta laboriose omnia
exacerbata sunt. delirū. noctem moleste tulit. non dormiuit. Sexta per eadem.
Septima superriguit. febris acuta. sudauit per totum. iudicatus est. Huic per-
petuo ab aluo secessus biliosi, pauci, meri. Urinæ tenues boni coloris, in me-
dio nubilosum quiddam pendens habentes. Circa oçtauam minxit urinas
melioris coloris, habentes subsidētia albam, pauca. respicebat. febris in-
termisit. Nona redijt. Circa decimam quartam febris acuta, sudauit. Decima se-
xta uomuit biliosa, flaua, satis multa. Decima septima superriguit. febris acuta.
sudauit. à febre liber, iudicatus est. Urinæ post recidiuam & iudicationē, melio-
ris coloris, subsidētia habentes. Neq; mente motus est in recidiua. Decima
oçtaua parum calecebat. in super sitiebat. Urinæ tenues, quod in medio pende-
bat nubilosum erat, parum mente motus est. Circa decimā nonam à febre liber,
collum dolorosum habebat. Urinis subsidētia. perfecte iudicatus est uigesi-

ma. P. M. E. V. V. S. hoc est, probabile multitudine biliosarum urinarum uigesima sanatum.

AEGROTVS VI

EVryanaētis filiam uirginem febris corripuit. Erat autē sine siti perpetuo, nihil ad gustandum admittebat. Ab alio pauca prodibant. Vrinæ tenues, paucae, non boni coloris. Incipiente autem febre circa sedem dolebat. Sexta die à febre libera, non sudauit. iudicata est. Quod uero circa sedem erat, parum sup puratum est. erupit unà cum iudicatione. Post iudicationem septima die *triguit*, parum incaluit, sudauit. post iudicationem octaua die, riguit nō multum, postea uero extremitates frigidae semper. Circa decimam post factū sudorem, mente mota est. & rursus breui respiscēbat. Dicebant autem ex gustato botro ipsam hęc pati. Die uero una intermissa, rursus duodecima multum delirabat. alius turbata est ex biliosis, paucis, meris, tenuibus, mordacibus. frequēter furegebat. Die septima ab ea qua mēte mota fuit, mortua est. Hęc incipiente morbo fauces dolebat. & perpetuo ruborem habebat. & gurgulio reuulsus. fluxiones multæ, paruae, tenues, acres. Tulsiebat, maturum nihil educebat. Omnes cibos per totum tempus fastidiebat, neq; ullum aliquē appetiuit. sine siti erat. neq; quicquam memorabile bibit. Tacens nihil loquebatur. Tristitia desperata rursus corripiebat. Erat autem & innata quædam tabes.

AEGROTVS VII

Anginosa illa quæ apud Bitonem erat, primum à lingua ccepit. Vox non clara, lingua rubra resiccata fuit. Prima die horrida, incaluit. Tertia rigor, febris acuta, tumor subruber, durus, colli & pectoris ex utraq; parte. extremitates frigidae, liuida. Spiritus sublimis, potus per nares fundebatur, deglutire nō poterat. alui secessus & urinæ suppressa erant. Quarta omnia exacerbata sunt. Mortua est anginosa. P. S. S. Q. M. hoc est, probabile secessibus suppressis quinta mortuam.

AEGROTVS VIII

Adolentem qui decumbebat in mēdacium foro, febris corripuit, ex lassitudinibus, & laboribus, ac cursibus insolitis. Prima die alius turbata ex biliosis, tenuibus, multis. Vrinæ tenues subnigræ. nō dormiuit. siticulosus. Se cunda omnia exacerbata sunt. Secessus plures, intempestiuiores. nō dormiuit. Mens turbata, parum sudauit. Tertia moleste habuit, siticulosus, anxius, multa iactatio, desperatio. mente motus est. Extremitates liuidæ ac frigidae. præcordij intentio submollis utrinq; Quarta non dormiuit. Malum in peius procedebat. Septima mortuus est. Aetate circa uigesimalium annum erat. P. N. S. M. hoc est, probabile nouationibus septima mortuum.

AEGROTVS IX

Quæ apud Tifamenum decumbebat mulier, ei uoluulosa moleste procedebant. uomitus multi. potum continere non poterat. Dolores circa præcordia. Et in infernis partibus iuxta uentrem dolores, tormina continua, non siticulososa. incalcescebat. Extremitates frigidae perpetuo. anxia. infomnis. Vrinæ paucae, tenues. secessus crudi, tenues, pauci, prodesse non amplius quicquam poterat. Mortua est.

AEGROTVS X

Mulierem ex his quæ apud Pantimedem degebāt, ex abortu infantis, prima die febris corripuit. Lingua arida, siticulosa, anxia, infomnis. Aluus turbata ex tenuibus, multis, crudis. Secunda die superriquit, febris acuta, ab aluo prodire multa, non dormiuit. Tertia die dolores maiores. Quarta mēte mota est. Septima mortua est. Aluus semper lubrica, ex fecesib, multis, tenuibus, crudis. Vrinæ pauca, tenues, febris ardens.

AEGROTVS XI

Alteram ex abortu circa quintum mensem, febris corripuit. Ab initio soporosa erat, & rursus infomnis. lumborum dolor, capitis grauitas. Secūda aluus turbata est paucis, tenuibus, meracis primum, Tertia plura, deteriora, nocte non dormiuit. Quarta mente mota est. Timores. Tristitia, dexter oculus distortus est, sudauit circa caput sudorem modicum, frigidum, extremitates frigida. Quinta omnia exacerbata sunt, multū delirabat, & rursus breui resipiscebat. Sitis, infomnis. Ab aluo multa, intempestiua, perpetuo prodibant. Vrinæ pauca, tenues, subnigra. Extremitates frigida, subliuida. Sexta per eadem. Septima mortua est phrenitide.

AEGROTVS XII

Mulierem quæ decumbebat in mendacium foro, primum tūc enixam dolorose malculū, febris corripuit. Statim ab initio siticulosa, anxia, cor dolebat, lingua arida, uenter turbatus est tenuibus, paucis, non dormiuit. Secūda die parū riguit, febris acuta, parum circa caput, sudauit frigidū. Tertia laboriose ab aluo cruda, tenuia, multa prodierunt. Quarta riguit. Omnia exacerbata sunt. Infomnis. Quintā laboriose tulit. Sexta per eadē. Ab aluo uero prodierūt liquida, multa. Septima riguit, febris acuta, sitis multa, iactatio. Circa uesperā frigidū sudorem per totū sudauit, frigiditas, extremitates frigida, nō amplius recalescebant, & rursus ad noctem riguit, Extremæ partes nō recalescebāt, non dormiuit, parum mente mota est, & rursus breui resipuit. Octaua circa meridiem recalescēta est. Siticulosa, soporosa, fastidiosa ac nauſeabunda. Vomuit biliosa, pauca, subflaua. Noctem moleste tulit, non dormiuit. Vrinā minxit multam aceruatam infcia. Nona remiserunt omnia, soporosa. Ad uesperam parum riguit. Vomuit pauca, biliosa, Decima rigor, febris exacerbata est, nihil dormiuit. Mane multam urinam subsidentia habentem minxit, extremitates recalescētae sunt. Vn decima uomuit uirosa, biliosa. Nō ita longe postea superriquit, & rursus extremitates frigida. Ad uesperā sudor, rigor. Vomuit multū, noctem laboriose tranſegit. Duodecima uomuit multa, nigra, graueolentia, singultus multus, sitis laboriosa. Decimatertia nigra, graueolentia, multa uomuit, rigor. Circa meridiem uoce destituta. Decimaquarta sanguis per nares. Mortua est. Huic perpetuo aluus lubrica, horrida. Aetas circa annum decimūseptimum.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis pestilens.

Annus austrinus, pluuius. Venti perpetuo quiescentes. Quum squallores fuissent superioribus temporibus ad annum, in austrinis circa arcturum aquæ multæ. Autumnus umbrosus, nubilus, aquarum copia. Hyems austrina, humida, mollis. Post solstitium longe postea, prope æquinoctium seræ hies.

mes. Et iam circa æquinoctium aquilonares venti niuosi non multo tempore. Ver rursus austrinum, sine uentis. Aquæ multæ perpetuo usq; ad canem. Aestas serena, calida. æstus magni. Etesia parum dispersum spirarunt. Rursus circa arcturum in aquilonaribus aquæ multæ. Quæ autem esset annus austrinus, humidus, & mollis, per hyemem quidem sani degebant, exceptis tabidis, de quibus scribetur. Ante uer autem simul cum sientibus frigoribus, sacri ignes multos, quibusdam cum occasione, quibusdam non, atq; hi maligni multos peremerunt. Multi fauces doluerunt. Voces uitiatæ, febres ardentes, phrenitici, ora ulcere feruido affecta, in pudendis tubercula. Lippitudines, Carbunculi. Alui turbata. Ciborum fastidia. Aliqui siticulosi, aliqui non. Vrinæ turbata, multæ, malæ. Diu soporosi, & rursus infomes. Multæ iudicationes penitus interceptæ. Quædam ægre sientes. Hydropes, tabidi multi. Atq; hi quidæ erant populares morbi. In singulis autem relictis speciebus ægroti, & moriebantur multos. Acciderunt autem singulis horum hoc modo. Multis equidem ignis facer cum occasione, ex uulgaribus & ualde paruus uulnusculis, in toto corpore, maxime sexagenarijs, circa caput si uel parum neglecta essent. Multis uero etiam in ipsa curatione, inflammationes magnæ fiebant, & facer ignis multus, breui, undiq; depalcebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus ad suppurationes contigerunt, carniæ & neruorum ac ossium elapsus magni. Erat autem & fluxio collecta non puri similis. Sed alia quædam putredo, & fluxio multa ac uaria. Quibus igitur circa caput horum quid fieri contigit, his glabrics totius capitis ac menti fiebat, & ossium denudationes ac elapsus, & multæ fluxiones, & hæc in febribus, & sine febribus. Erant autem hæc horrenda magis quam mala. Quibus enim ad suppurationem talium maturatio peruenit, horum pleriq; seruabantur. Quibus uero inflammatio quidem & ignis facer discessit, talem autem nullum abscessum fecit, horum multi perierunt. Similiter autem & si alibi in alia corporis parte horum quid oberraret, hæc acciderunt. Multis enim brachium, & totus cubitus defluxit. Quibusdã uero hæc affligebant latera, aut anteriorem aut posteriorem aliquam partem. Quibusdam autem totum femur, uel tibiam denudabantur, & totus pes. Erat autem ex talibus omnium grauissimum, ubi circa pubem & pudenda accidisset, & circa ulcera quidem, & cum occasione, huiusmodi erant. Multis autem in febribus, & ante febrem, & ex febribus ignes sacri inciderunt, & qui quidem horum abscessum fecissent per suppurationem, aut per alium turbatio quædam tempestiua, aut urinarum bonarum excretio contigisset, per hæc soluebantur. Quibus autem nihil horum accidisset, uerum obscure disparuisset, hi lethales erant. Plerumq; igitur plurimis accidit facer ignis uere, consequebantur autem & per æstatem, & sub autunnum. Multa uero turbatio quibusdam, & circa fauces tubercula, & lingue inflammationes, & abscessus circa dentes. Vocesq; multis significationem de se præbebant, quod essent uitiatæ ac impeditæ & inuolutæ, primū quidem, tabidis incipientibus, immo etiam ardenti febre correptis, & phreniticis. Cœperunt igitur febres ardentes ante uer, itemq; phrenitis, post facta frigora, & plurimi tunc ægrotarunt. Acuta uero & lethalia symptomata his aderant. Erat autem constitutio februm ardentium hoc modo. Ab initio soporosi, anxij, horridi, febris acuta, non ualde siticulosi, non deliri. De naribus parum stillauit. Exacerbationes

bationes plerisque diebus paribus. Circa exacerbationes obliuio, exolutio, & uocis priuatio. Extremitates manuum ac pedum semper his frigidiores, præfertim circa exacerbationes. & rursus tarde ac non bene recalescebant: rursusq; & intelligebant & loquebantur. Detinebat etiam ipsos sopor continuus, non somniculosus. Aut uigilia cum doloribus. plurimis horu alui turbulentæ, secessibus crudis, tenuibus, multis. Vrinæ multæ, tenues, nihil neq; iudicatorij, neq; boni habentes. Nec uero aliud aliquod iudicatorium ita habētibus fiebat. Neq; enim sanguis bene erumpebat, neq; alius aliquis abcessus iudicatorius fiebat. Moriebaturq; unusquisq; prout contigit erroneo modo, plerunq; circa iudicationes. Quidam uero diu uoce priuati. Multi sudantes. & his quidē qui perniciose habebant, hæc accidebant. Consimilia uero etiam phreniticis. Sine fiti autem hi erant. Neq; quisquam phreniticus infaniuit, uelut ex alijs, sed alia quadam mala ac lenta in somnum delatione grauiter peribant. Erant insuper etiam aliæ febres, de quibus scribetur. Ora multis ulcere seruido affecta, ulcerosa. Fluxiones circa pudenda multæ, ulcerationes. Tubercula foris, intus, circa inguina. Lippitudines humidæ, longæ, diuturnæ, cum doloribus. Eruptiones palpebrarum foris, intus, multorum oculos corruptentes, quas ficus uocant. Erumpebant etiam in alijs ulceribus multa, & in pudendis. Carbunculi per ætatem multi, & aliæ quæ seps uocatur, pustulæ magnæ. Herpetes multis magni. At uero circa aluum multis multa & nociua acciderunt. Primum quidem teneſmi multis dolorose, plurimis autem pueris, & omnibus qui erant ante pubertatem, & plurimi horum peribant. Lienterici, multi, dyſenterici, neq; hi ualde dolorose. Secessus autē biliſi, & pingues, & tenues, & aquosi. Et multis quidem ipse morbus ad hoc decubuit, & sine febribus & in febribus. cum doloribus, tormina, & uoluuli maligni, multorum quæ in corpore erant, & suppressa erant exitus. & exeuntia progressa dolores non soluentia, & his quæ offerebantur difficulter cedentia. Nam purgationes plurimos amplius lædebant. Ex his autem qui sic habebant, multi quidem citro peribant. Multi uero longius uitam degebant. & in summa, omnes & qui longis morbis ægrotabant, & qui ex acutis, maxime ex his quæ per aluum secedebant mortui sunt. Omnes enim aluus sustulit. Cibum autem fastidiebant omnes, ob cunctos præscriptos morbos, in quos sanè ego incidi. Multi uero, & maxime hi ipsi, & qui tales erant, sed & alijs, perniciose habebant. & siticulosi alijs erant, alijs non. Ex his qui febribus alijsq; laborabāt, nullus siticulosus in tempeſtue. Sed licebat circa potum uictus rationem constituere, prout uelles.

Vrinæ autem prodeutes multæ quidem erant, non pro potus ingesti ratione, sed multum excedentes. Verum multa quadam malitia urinarum eiectionum erat. Neq; enim crassitudinem, neq; concoctiones, neq; purgationes bonas habebant. Nam in multis morbis purgationes per uescicam fientes, bonæ sunt. Significabant autem plurimis colliquationem, & turbationē, & dolores, & nullam iudicationem. Soporosi uero maxime phrenitici, & febre ardētē laborantes erant. Sed & in alijs morbis omnibus maximis, qui cū febre fiebāt. In totum autem plurimos aut grauis sopor comitabatur, aut paruos ac tenues, fomnos habebant. Multa præterea alia febrium genera populariter grata fata sunt, tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, longarum,

erronearum, anxiarum, inconstantium. Omnes autē hęc cum multa turbatione fiebant. Nam alii plurimis turbatę horrores, sudores non iudicatorij, & urinae uelut pręscriptum est. Atq; hęc plenisq; horum longa erāt. Neq; enim abscessus his fientes iudicabant, uelut in alijs. Et omnia quidem omnibus difficulter iudicabantur, & nullę iudicationes fiebant, & diuturnę, maxime uero his. paucis autem horum iudicatio circa octogesimum diem fiebat. Plurimis prout contigit defecerunt. Moriebantur autē horum pauci ex hydrope erectę obambulantes. Multos uero etiam in alijs morbis tumores infestabant, maxime uero tabidos. Maxima autē & grauissima erat tabes, et plures occidit. Nam multi per hyemem incipientes, partim decumbebant, partim erectę obambulabāt. Ante uer autem pleriq; ex decumbentibus moriebantur. Aliorum uero tusses nihil defecerunt. Verum æstate remiserunt. At sub autumnū omnes decubuerunt, & multi mortui sunt, plurimi uero horum diu ægrotauerunt. Coepit igitur plurimis horum de repente ex his afflictio, frequentes horrores erant, sæpe febres continuę, acutę, sudores intempestiui, multi, frigidi perpetuo. Multa frigiditas, & uix rursus recalescebant. Alui uarie adstrictę, & rursus breui humescentes. Et quę circa pulmonem erant omnia, infra distribuebantur. Multitudo urinarum non bonarum, colliquationes malę. Tusses autem aderant quidem perpetuo multę, & multa educentes matura ac liquida, non autē ualde cum doloribus. Sed etsi aliquantulū dolerent, ualde tamē leniter omnibus purgatio à pulmone fiebat. fauces non ualde mordaces, neq; salugines quicquam infestabant. Viscosa tamē, & alba, & liquida ac spumosa multa de capite descendeabant. Magnum autē malum & hos, & alios comitabatur ciborum fastidium, uelut pręscriptum est. Nam neq; potum cum cibo libenter sumebāt, sed ualde sine siti degebant. Grauitas corporis. Soporosi. Plurimis ipsorum tumor, & ad hydropem deueniebant. Horridi deliri circa mortem. Forma tabidorū erat leuis, subalbida, lentis colorem referens, subrubra, raua. Pituita alba referti. Scapulas alarum modo eminentes habentes. & mulieres sic. Atq; bilis item formata, & sub sanguinea. febres ardentes. & phrenitides, ac dyfenterię hos tentabant. Tenefmi iuuenibus pituitosis. lōga alui profluuia, acresq; secessus & pingues, biliosus. Erat autem omnibus pręscriptis grauissimum quidem uer, & multos occidit. Aestas autem facilima, & paucissimi perierunt. Autumno uero & sub pleiada rursus multi moriebantur quartanarij.

ÆGROTI SEDECIM.

PRIMVS.

IN Thaso Parium quendam, qui decūbebat supra Artemisii ædes, febris corripuit acuta, ab initio cōtinua, ardens, siticulosa. Principio soporosus, & rursus infomnis. Aluus turbata in principio. Urinę albę. Sexta die minxit urinam oleosam, mente motus est. Septima exacerbata sunt omnia, nihil dormiuit. Sed & urinę similes, & mens turbata. Ab aluo uero biliosa, pinguis prodierunt. Deinde octaua parum de naribus stillauit. Vomuit uirosa pauca, parum dormiuit. Nona per eadem. Decima omnia remiserunt. Vndecima sudauit, non per totum. Circumfrigidus quidem, uerum breui rursus in caluit. Duodecima febris acuta. Secessus biliosi, tenues, multi. In urinis quiddam in medio uehebatur, mente motus est. Decima septima laboriose trāmissa est. Neq; enim somni, neque febris augefcebat. Vigesima sudauit per totum, infomnis, secessus

secessus biliosi. cibum fastidiens. soporosus. Vigesima quarta recidiua facta est. Trigesima quarta à febre liber. Aluus non suppressa est. Et rursus incaluit. Qua dragesima à febre liber. aluus non multo tempore suppressa fuit. Cibum fastidiens. parum rursus febricitauit, & semper erroneo modo. partim sine febre, partim non. Nam etiam reliquisset & alleuata esset, rursus reuertebatur. Edulij quoque multis & vitiosis utebatur. Somni mali circa reciduias. mente motus est. Urinas crassitudinem quidem habentes tunc mingebat, uerum turbatas & prauas. & aluus iam adstricta erat, & rursus soluta. febriculae continuae. secessus multi, tenues. Centesima uigesima die mortuus est. Huic aluus assidue à prima die lubrica erat, ex biliosis, liquidis, multis: Aut adstricta ex feruidis ac crudis. Urinae uero perpetuo malae. Sopores plerumque, cum doloribus infomnis, cibum fastidiens, febris ardens continenter.

AEGROTVS II

IN Thaso decumbente apud frigidam, à partu ubi filiam peperisset, & purgatio facta non esset, febris acuta, horrida, tertia die corripuit. Multo autem tempore ante partum febriculosa erat, decubens, cibum fastidiens. Postquam autem remigisset, febres continuae, acutae, horridae. Octaua multum mente mota est, & sequentibus diebus. & breui rursus respicebat. Aluus turbata, ex multis tenuibus, aquosis, bile permixtis. sine siti erant. Undecima respicebat, uerum soporosa erat. Urinae multae, tenues, & nigrae. infomnis. Vigesima parum circumfrigit, & breui rursus incaluit, parum delirauit. infomnis. Alui secessus iidem. Urinae aquosae, multae. Vigesima septima à febre libera. aluus adstricta est. Non multo tempore postea coxae dexterae dolor fortis multo tempore. Febres rursus comitabantur, & urinae aquosae. Quadragesima dolores circa coxam alleuari sunt. Tussis autem assidue, humida, multae. aluus substituit. Cibum fastidiens. Urinae in iisdem, febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo uero modo exacerbescunt, partim ita, partim non ita. Sexagesima tussis quidem obscure defecerunt. Neque enim aliqua sputorum concoctio fiebat, neque alius conuetus abscessus. Maxilla uero ex dextris diuisa est. soporosa. rursus delirabat. & breui respicebat. Caeterum à cibis auersum animum habebat. & maxilla quidem ad locum suum redijt. Aluus autem biliosa, pauca egressit, febricitauit acutus. horrida. & sequentibus diebus uoce destituta est, & rursus respicebat ac loquebatur. Octogesima mortua est. Urinae huic perpetuo erant nigrae, & tenues, & aquosae. & sopor comitabatur. Cibum auersans. Tristis. Infomnis, irae. molestiae. Mens melancholica.

AEGROTVS III

IN Thaso Pythionem qui supra Herculeum templum decumbebat, ex laboribus, & lassitudinibus, & neglecta uictus ratione, rigor magnus, & febris acuta corripuit. lingua arida, siticulosus, biliosus. non dormiuit. Urinae subnigrae. quod in medio ipsarum pendebat, sublime erat. Secunda die circa meridiem frigiditas extremarum partium, & magis circa manus & caput. loquela & uoce destituta. Breuispirus ad multum tempus, rursus incaluit. Sitis. Nox quieta. Sudauit parum circa caput. Tertia dies quieta. Vespere uero sub solis occasu parum frigit. Turbatio nocte dolorose. nihil dormiuit. Ab aluo parca compacta stercorea prodierunt. Quarta mane quietus. Circa uesperam omnia

nia exacerbata sunt. frigiditas. loquela & uoce destitutus. in deterius recalescens est post tempus. Urinas minxit nigras in medio quid pendens habentes. Nocte quiete dormiuit. Quinta uisus est alleuatus esse. Verū iuxta aluum grauitas cū dolore. siticulosus. Noctē laboriose tulit. Sexta mane quietus. Vespere dolores maiores. exacerbatus est. Vespere clystere adhibito. ab aluo probe egeffit. Nocte dormiuit. Septima die anxius. submolestē ferebat. Urinā minxit oleosam. noctu turbatio multa. delirabat. nihil dormiebat. Octaua mane parū dormiuit. Mox autē frigiditas. Vocis interceptio. Spiritus tenuis imminutus. Vespere rursus excalescens est. mente motus est. Iam autem ad diem parū alleuatus est. Secessus meri. pauci. biliosi. Nona soporosus. anxius. quum excitaretur. non ualde siticulosus. Circa solis occasus molestē ferebat. delirabat. noctem malam habuit. Decima mane uoce destitutus. frigiditas multa. febris acuta. Sudor multus. mortuus est. dolores huic in diebus paribus.

AEGROTVS IIII

Phreniticus prima die decumbens uomuit æruginosa. multa. tenuia. febris horrida. sudor multus. continuus per totum. Capitis & colli grauitas cum dolore. Urinæ tenuis. in medio ipsarum pendentia. parua. diuisa. non sudauit. Ab aluo stercora aceruatim egeffit. multum mente motus est. nihil dormiuit. Secunda mane uoce destitutus. febris acuta. sudauit. non intermisit. Palpitationes per totum corpus. Nocte conuulsiones. Tertia exacerbata sunt omnia. Quarta mortuus est.

AEGROTVS V

In Larissa caluus. femur dextrum doluit derepente. ex his quæ offerebantur nihil proderat. Prima die febris acuta. ardens. quiete tenebat. dolores autem consequebantur. Secunda femoris quidem remisit dolores. febris autē acuta est. submolestē ferebat. non dormiebat. extremitates frigida. Urinarum non bonarum copia prodibat. Tertia femoris dolor quieuit. Mentis emotio. & turbatio. & multa iactatio. Quarta circa meridiem mortuus est. celerrime & acutissime.

AEGROTVS VI

In Abderis Peridem morbus corripuit acutus. continuus. cum dolore. Sitis multa. anxietas. potum continere non poterat. Erat autem sublienosus. & capite grauatus. Primo die sanguis è sinistra nare erupit. multa tamē febris augetur. Urinam minxit multam. turbatam. albam. deposita non subsidebat. Secunda omnia exacerbata sunt. Urinæ tamen crassæ quidem erant. uerum magis subsidebāt. & anxietas leuata est. dormiuit. Tertia febris emollita est. Urinarum copia. quæ concoctæ multam subsidentiam habebant. Nox quieta. Quarta circa meridiem. multum calidum sudorem per totum exclusit. A febre liber iudicatus est. non redijt. morbus acutus.

AEGROTVS VII

In Abderis uirginem quæ decumbebat in sacra uia. febris ardens corripuit. Erat autem siticulosa & infomnis. Menses autem primū ipsi descendebant. Sexta anxietas multa. rubor. horrida. mœsta. Septima per eadē. Urinæ tenues quidem. uerum boni coloris. Venter non uexabat. Octaua surditas. febris acuta. infomnis. anxia. horrida. intelligebat. Urinæ similes. Nona per eadē. item frequentibus sic surditas perseverabat. decima quarta mens turbata. febris remisit

fit. Decima septima sanguis per nares fluxit multus. Surditas parum remisit. & sequētibz anxietas. surditas aderat. & delira erat. Vigesima pedum dolor. surditas. delirium intermisit. sanguis paucus per nares erupit. sudauit. à febre libera. Vigesima quarta febris redijt. surditas rursus. pedum dolor permanfit. mentis emotio. Vigesima septima sudauit multū à febre libera. Surditas defecit. pedum dolor restabat. De cætero perfecte iudicata est.

ÆGROTVS VIII

IN Abderis Anaxionē, qui decumbebat ad Thracias portas, febris acuta corripuit. lateris dextri dolor alsiduus. Siccā tūssim habebat, neq; expuebat primis diebus. Siticulosus. Insomnis. Vrinæ boni coloris, multæ, tenues. Sexta de sirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat. Nam & febris augetebat, & dolores non remittebāt, & tusses uexabant, difficulterq; spirabat. Octaua cubitū secui. effluebat sanguis multus, uelut debebat. Remiserunt quidē dolores, tusses tamen siccæ comitabantur. Vndecima remiserunt febres. parum circa caput sudauit. Tusses adhuc. & quæ à pulmone prodibant, liquidiora erant. Decima septima incepit pauca, matura spuere. alleuatus est. Vigesima sudauit, à febre liber. post iudicationem alleuatus est. Erat autem siticulosus, & à pulmone procedentiū purgationes nō bonæ. Vigesima septima febris redijt. Tūssijt, eduxit matura multa. Vrinis subsidētia multa, alba. Sine siti erat. bene spirans. Trigesima quarta sudauit per totum. à febre liber. penitus iudicatus est.

ÆGROTVS IX

IN Abderis Heropythus erectē obambulans caput dolebat. Non multo autem tempore postea decubuit. habitabat prope superiorē uiam. febris ipsum corripuit ardēs, acuta. Vomitus ab initio multorum biliosorū. siticulosus. multa molestia. Vrinæ tenues, nigrae, id quod in medio ipsarū pendebat, sublimē erat aliquando, quandoq; non. noctē dolorose transegit. Febris aliàs aliter exacerbescēbat, plerūq; inordinate. Circa decimā quartam surditas. febres augetebant. Vrinæ per eadē. Vigesima multum mente motus est, itemq; sequētibz. Quadragesima multus sanguis ex naribus erupit. & magis intelligebat. Surditas aderat quidem, sed minor. febres remiserūt. Sequentibus diebus sanguis erumpēbat frequenter & paulatim. Circa sexagesimā sanguinis eruptiones cessarunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis. & febres augetebāt. Non longo tempore postea dolores omnium infernarum partium. Contigitq; aut febres esse maiores. & surditatem multam: aut hæc quidem remittere & leuiora fieri, infernarum autem partium circa coxas, dolores esse maiores. Jam uero circa octogesimam omnia remiserunt. Nihil tamē defecit. Vrinæ enim boni coloris, & plures subsidentias habētes prodibant, & deliria minora erant. Circa centesimam alius multis biliosis turbata est, & tempore nō modico multa talia prodibant, & rursus dysenterica cū dolore. Reliquorū uero quies erat. In summa, & febres defecerūt, & surditas cessauit. In ceteris uigesima perfecte iudicatus est. febris ardens.

ÆGROTVS X

IN Abderis Nicodemum ex uenere & poru, febris corripuit. Initio autem erat anxius. & cordis dolore uexabatur. siticulosus. lingua combusta fuit. Vrinæ tenues, nigrae. Secunda febris exacerbata est. horridus. anxius. non dormiuit. Vomuit biliosa, flaua. Vrinæ similes. Nox quieta. dormiuit. Tertia die remise

remiserunt omnia. & quies erat. circa solis occasus rursus moleste ferebat. nocte laboriose tulit. Quarta rigor. febris multa. dolores omnium. Urinae tenues, & quid in medio ipsarum pendens. Sexta mente multum motus est. Septima quies. Octava alia remiserunt omnia. Decima & sequentibus diebus aderant quidem dolores, uerum omnes minores. Exacerbationes autem & dolores huic ad finem usque in diebus paribus magis erant. Vigesima minxit urinam albam, quae crassa studinem habebat, & deposita non subsidebat. Sudauit multum. uisus est sibi a febre liber esse. Vespero uero rursus incaluit, & dolores eisdem horror. sitis. parum mente motus est. Vigesima quarta multam urinam albam, multam subsidentiam habentem minxit. Sudorem multum calidum per totum exudauit. a febre liber iudicatus est.

AEGROTVS XI

In Thaso mulier morosa, ex moerore cum occasione, erecte obambulans, in somnis facta est, & cibi fastidians. & erat siticulosa, & anxiosa. habitabat autem prope Pyladae aedes in Leio. Prima die sub initium noctis timores, sermones multum, tristitia, febricula tenuis. Mane conuulsiones multae. Quum autem intermississent conuulsiones illae multae, delirabat, turpia loquebatur. Dolores multum, magni, continui. Secunda per eadem, nihil dormiebat, febris acutior. Tertia conuulsiones defecerunt. Sopor autem & in somnum grauiorem delatio aderat, & rursus uigiliae. exiit, continere se non potuit, multum delirauit, febris acuta. Ad hanc noctem multum sudorem calidum per totum corpus excluit, a febre libera, dormiuit. Penitus respuit, iudicata est. Circa tertiam autem diem urinae nigrae, tenues: quod in medio ipsarum pendebat aliquandiu rotundum, non subsidebat. Circa iudicationem menses multi prodierunt.

AEGROTVS XII

In Larissa uirginem febris corripuit ardens, acuta, in somnis, siticulosa, lingua fuliginosa, arida. Urinae boni quidem coloris, sed tenues. Secunda die laboriose degebat, non dormiuit. Tertia ab aluo multa prodierunt aquosa cum uirositate pallida, eisdemque sequentibus diebus prodierunt eiusmodi tolerabiliter. Quarta urinam egressit tenuem, paucam: habebat in medio pendens illud sublime, non subsidebat, mente mota est ad noctem. Sexta per nares sanguis multus largi exiit, quumque in horruisset, sudorem multum calidum per totum effudit, a febre libera, iudicata est. In febris autem, & iam iudicatae, menses tunc primum prodierunt. Erat enim uirgo, Perpetuo uero anxiosa erat, horrida, faciei rubor, oculorum dolor, capitis grauitas. Huic non redijt, sed iudicata est. Dolores diebus paribus.

AEGROTVS XIII

A Pollonius in Abderis erecte titubans obambulabat multo tempore. Erat autem magnis uisceribus praeditus. & circa hepar dolor multo tempore familiaris ipsum comitabatur, & sane tunc etiam morbo regio tenebatur. flatu fus, coloris subalbi. Quum autem edisset ac bibisset intempestiuus carnem bubulam, incaluit parum primum, decubuit. Lacte uero usus cocto & crudo, multo, caprino ac ouillo, & uictu malo, omnium lesiones magna sequute sunt. Nam & febres exacerbatae sunt, & aluus nihil memorabile de ingestis egressit. Urinae tenues & paucae prodibant. Somni non aderat, inflatio mala, sitis multa, foperosa, praecordij dextri eleuatio cum dolore, extremitates undique subfrigidae, parum delirabat.

delirabat. Oblivio omnium quae loquebatur, mente mouebatur. Circa decimam quartam ex qua quum riguisset incaluit, decubuit, & insanijt. clamor turbatio, sermones multi, & rursus quies, & tunc sopor accessit, postea uero aluus turbata, multus, biliosus, meris, crudis. Urinae nigrae, paucae, tenues. Multa molestia. Seccessus uaric habebant. Aut enim nigri, & pauci, ac aeruginosi erant: aut pingues, crudi, & mordaces. Per tempora uero uidebatur etiam lactosa egere. Circa uigessimam quartam lenitas erat, & reliqua quidem in iisdem perleuerant, parum autem resipiscibat: ex quo uero decubuit, nullius meminit. Rursus autem breui desipiebat. Omnia in peius procedebant. Circa trigessimam febris acuta. Seccessus multi, tenues, delirus, extremitates frigidae, uoce destitutus. Trigesima quarta mortuus est. Huic perpetuo ex quo ego noui, aluus turbata. Urinae tenues, nigrae, soporosus, infomnis, extremitates frigidae, delirus perpetuo, phreniticus.

AEGROTVS XIII

IN Cyzico mulierem, quae gemellas filias magna difficultate peperit, & non ualde purgata est, primum inuasit febris horrida, acuta. Capitis & colli grauitas cum dolore. Infomnis ab initio, taciturna ac tetrica, & non obsecundans. Urinae tenues et decolores, siticulosa, anxia plerumque, aluus erroneo modo turbata, & rursus adstricta. Sexta ad noctem multum delirabat, nihil dormiuit. Circa undecimam insanijt, & rursus resipuit. Urinae nigrae tenues. Et rursus tempore in terposito oleosae. Et aluus multis tenuibus turbata. Decima quarta conuulsionones multae, extremae partes frigidae, nihil amplius intelligebat. Urinae suppressae sunt, decima sexta uoce destituta est, decima septima mortua est, phrenitis.

AEGROTVS XV

IN Thaso Dealcis uxorem, quae decubebat in Leio, febris horrida, acuta, ex timore corripuit. Ab initio contegebatur, & ad finem perpetuo, semper tacita manibus palpabat, uellebat, scalpabat, pilos legebat. Lachrymae, & rursus rufus, non dormiebat, ab aluo irritationes, nihil prodibat, parum comonita bibebat. Urinae paucae, tenues. Febres ad manum tenues, extremarum partium frigiditas. Nona multum delirabat. Et rursus sedata est, tacita. Decima quarta spiritus rarus, magnus, per tempus. Et rursus breuispira, decima septima ab aluo irritatio turbulenta, postea uero ipsi porus percuriebant, neque consistebant, omnino nihil sentiebat. Cutis arida circūtentio, Vigesima sermones multi, & rursus sedata est, uoce destituta, breuispira. Vigesima prima mortua. Huic perpetuo ad finem usque erat spiritus rarus magnus, omnino nihil sentiebat, semper contegebatur. Aut sermones multi, aut tacita perpetuo, phrenitis.

AEGROTVS XVI

Adolescens in Meliboea, ex potationibus & uenere multo tempore calefactus decubuit. Horridus autem & anxius erat, infomnis, & non siticulosus. Ab aluo prima die stercorea multa prodibant, cum multa defluxione, & sequentibus multa aquosa cum uiore pallida prodibant. Urinae tenues, paucae, decolores. Spiritus rarus, magnus, per tempus. Praecordij intentio submollis, oblonga ex utriusque. Cordis palpitatio perpetuo continua. Urinam mixxit oleo san. decima sensim mente motus est, moderatusque erat ac quietus. Cutis arida & circūdistenta. Seccessus multi & tenues, aut biliosi & pingues. Decima quar-

ta omnia exacerbata sunt. mente motus est. multū ddirauit. Vigesima infansit. iactatio. nihil mingebar. paucos porus continebat. Vigesima quarta mortuus est. phrenitis. Videtur porrò mihi æstas illa quæ tunc fuit, iuxta rationem commoditatem attulisse. Nam æstiuos morbos hyems succedēs soluit. Et hyemales æstas succedens transmutat. Quamquæ ipsa in seipsa quæ tunc erat æstas, non stabilis erat: sed repente calida, & austrina, & sine uentis. At tamen ad aliam tempestatem transmutata profuit. Magnam uero artis partem esse arbitror, etiam de his quæ scripta sunt recte, posse considerationem facere, ac iudicare. Qui enim hoc nouit, & his unitur, nõ uidetur mihi in arte multum falli posse. Oportet autem exacte perdiscere unquamquæ temporū constitutionem, & ipsum morbum. Et quid boni cõmunis sit in cõstitutione, aut in morbo. & quid mali communis sit in statu, aut morbo. & qui morbus longus sit, & lethalis. & qui longus, & non perniciosus ad uitam. & qui acutus, ac lethalis. & qui acutus, & superesse finens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorū considerandi, ac prædicendi facultas datur. Et harum rerum gnaros scire cõtینگit, quibus & quando, & quomodo uictum præscribere oportet.

HIPPOCRATIS COI DE MOR

BIS POPVLARIBVS LIB. IIII. IANO COR
nario Medico Physico interprete.



Post æquinoctium & post pleiada, qualia sunt erodentia & mucosa, quæ caput aperuerunt, supra aurem prodierunt. Et qui apud Leocydis ædes habitabat, in pede. Phanodico digiti in pede, in pectore. Qui tibiam sectus est, hac parte etiã nigrefactus est. Erat ulcus magnū in externa tibiæ parte, & retro prodibat. Quum purum factum esset, lateris dolor & pectoris sinistri è directo, & febres. Mortuus est à febre. Biliosum restiario abunde coloratū. Erustoria adhibenti circa æquinoctium, sanguis multus deorsum prodijt. Seni ualde uehementer abscersit, non ultra quatuordecim dies. Vulnerato ab Antiphilo, usto iudicatio facta est die septima, bilioso, stupido. Tertia post iudicatio, sanguinẽ spuit, superstes manebat. & recidiua facta est postea. Iudicatus est uelut par erat, circa pleiadū occasum primum. Post pleiadum occasum, biliosus ad insaniam usq;. iudicatio facta est, superuixit, circa nonam diem, absq; sudore. Circa æquinoctiū Chalcidoniū à portis delatus ad forum, ex ruptione circa māmam dextrā dolens, spuebat aliàs atq; aliàs pallens subuiri. Venter egerebat. Sudor auspica tus septima, tenuit plerumq; usq; ad octauā. iudicatus est decima quarta. Circa quadragessimam tubercula exorta ipsi circa utraq; aures, haud immerito putabatur suppuratus fore, non factum est. Pectus Aristodemou istum est. Philidis filio quum abcessus factus esset ex casu, & ipsi pectus istum est. Erat autem dolor quidam etiam antea, post æquinoctium autumnale recidiua. & aliàs usq; ad solstitiū hyemale, & cum sole æstiuo. Acheloi uxor sexta die abortiuit, quum esset sanguinea, & horrida. & sudores. Iudicatio facta est decima quarta, quor mensū fuerit foetus, haud scio. Masculum autem etiam aliū ad dies

dies uiginti se abortiuiffe dixit, an uera dixerit non scio. Circa solstitiū hybernum aquilonares uenti erant. Morbo regio corripiebantur abunde colorati, & partim horridi, partim nō. Linguae cōbustae tertia die. Et turbationes circa sextam & septimā, atq; hae diu durantes. Decimaquarta uentres resistentes, & in medicationibus nō obedientes. Pro ratione febrū etiā nulli sudores. Splenes quibusdam parui ad prae cordia dextra extenti, & ad manū submurmurantes. Sanguinis fluxiones. & urinis purgatio ac iudicatio. Multo autē magis infra nitebantur. Nam & hoc sub illud tempus corripiebat. Quibus non sic erat, splenes uero etiā eleuati, his sanguis ex sinistra nare. Solstitiū praetererat, hyberna hyberno modo in Aquilonaribus, paulo uero post austrina erant, ad quindecim dies. Postea uero niues quatuordecim diebus. Circa hanc anni constitutionem, morbi regij abunde colorati uigebant, qui non sincere iudicabantur, recidiuabant. Post niues, austrina succedebant, & pluuiæ, grauedines eruperunt, & cum febribus, & sine febribus. Cuidam uero etiā ad dentes, qui ante ex medio doluerat: ad dextra, superciliū, & oculos. Erant autē & raucofi, & fauces inflāmatae, & glandulae isthic spōgiae appellatae intumescēbāt. & tubercula circa aures, & maxillam mollia, & cū febre sedabantur. Incipientibus febricitare fiebant supernē, & in utraq; partes pleraq; horum. & Spongiae quibusdam sub autumnū & hyemem. Sed & porrigines. Et multae omnibus modis abortiebant, & difficulter pariebant. Sexta die uirgini iudicata, sexta reuertebant. iudicata uero sunt per sextam. Omnia in his tēporibus sexta & octaua iudicabatur, circa pleiadum occasus. Meandri caeci uxor statim cū pallore uiride, & statim purulentū spuit circa sextā. & hepatis feruor. & deorsum fecesius modicus. carnopurulenta sursum pauca, alba, lata expuebat, cibum fastidians. Mortua est prope uigesimā diem. Ex uicinis Thestoris famula, ex ustorij: fecesius bilioso, multo: praecordio intenso: Sexta die ex suppressione aluus ipsi tenuia, multa, una uice egesit. & statim sudauit, & iudicata est. & aluus substituit. eadem autem hora quum riuisset febricitauit. & rursus eadē hora. Thestori uxori quum pituita alba praedita non ualde esset, lactans acuta febre correpta est. Huic lingua cōbusta est, dum alia cōburerentur, sub hoc tempus: linguaq; exasperabatur, uelut grādine multa. Et lumbrici per os. Circa uigesimam autem non perfecte iudicata est. Circa pleiadum occasus Metrophanti filius, caput percussus ab alio puero, per testam: quum peruenisset ad duodecimam diem febricitauit. Occasus autem erat quod quū detergeret partes circa uelcus perfricuit, & perfrigeratus est. & labia statim sunt eleuata. Attenuata est autem cutis, multis locis ulterius ab ulcere. quum autē sectus esset non tarde, neq; pus effluxit, neq; alleuatus est. iuxta aurem uero uidebatur suppurari, in maxilla ad dextram. Hac enim parte etiā ulcus erat. Postea & hoc nō suppuratum est, & humerus dexter suppuratus est cito. Mortuus est circa uigesimam quartam. Post pleiadum occasum is qui aurē doluit, circa uigesimā diem postea uoce destitutus est, & dextrarū partium impotens. sine febre sudauit. dextra auris, dexter oculus, consistebat non ualde, & attrahebat quid ex inferna parte. A sinistris autē distortus est oculus grauiter dolens. collum durū factum est, tertia hora postea quā doluit. Post pleiadum occasum, seruus Attici à quarta na correptus, stupidus sedatus est. Alius eodē tempore uera stupida infania, ex

phrenitide ac lethargo mixta, correptus est. Ad coxas et crura uenit dolor, quie-
uit, quoto die haud scio. Eodem tempore horridi, uomentes, & post iudi-
cationem cibū auerfantes, & biliosi, & splenes magni, duri, dolorosi, & sangui-
nis eruptiones. Quibusdā uero eodem tempore, post pleiadum occasum, ex na-
ribus sanguis biliosus ob splenes. In Cranone uxorem Nicofrati correptā
decimaquarta die, statim occupauit impotentia colli, & aliarum partū. & cibus
includis fuit usq; ad decimā. Spiritus densus paruus. impotētia. palpans digi-
tis. delirans. sudores. distracta sunt ad dexterā partē, collum, os, oculus, natus.
Vrinarum subsidentia alba, eruū referens. alia alba. alia ramentosa, cum pallore
subuiridis, farinam lentū referens. Huic quādoq; uelut adiposum quiddam su-
peritabat, atq; hoc aceruatū, non multū dispersum, uelut quod in medio ipsarū
pendere solet disparatū. uelut extrinsecus ex ouicula. postea uero etiā non substi-
dens mingebatur. & alia quidem talis erat. alia subsidens. alia talis modice ad la-
titudinem dispersa. alia conturbata. alia talis. Quod in medio uehi solet, nube-
cula subnigra simile, quā putaretur crassitudinem habere. Laxum autē aliud
tenue. aliud tenue tale. aliud uelut equi. aliud uelut sunt caliginosa. Qui pri-
mus delatus est adolecēs, huic urina pura tenuis. Omnium secessus tenuis,
multus, sine bile. lingua ualde aspera. Febris adurens. insomnis. alius gibbosa.
Hic mente motus est octaua arbitror die, proteruum in modum. exurgebat. pu-
gnabat. turpia fortiter loquebatur, quum talis non esset. Huic quū urinae mul-
tae tenues prodissent ex suppressione, somnus obortus est continuus. & su-
dor, qui iudicatorius esse putabatur, ex quo talis erat forte circa decimā diem.
Verum postea rursus insanijt, et breui mortuus est undecima die. Occasionem
fuisse puto quod meracum multum bibisset, priusquam insaniret. Paucos habe-
bat annos, propemodum uiginti. Eumenis uxor autumnō uomuit bilem
atram. Sed & odores manifesti erāt. & febres horridae. & cordis siue osculi uer-
tris dolores. biliosa pauca uomebat, & lumbricum, Secessus tenues per omne
tempus. Ante pleiadū occasum desinebant statim sanguinis eruptiones. & bre-
uiores erant febres ac statim reuertentes breuibus recidiuis. & cibū auerfantes,
& uelut excocci, & anxij, & cor dolentes, & ferini in iudicationibus, & rigore
affecti, & biliosi. Adolecens peregrinus erat, cui tertia die sanguis ex nari-
bus multus fluxit. itemq; quarta ac quinta. Sexta compositae consistebat. mente
motus est. Septima die alius substitit. foporosus erat. Recidua tertia die. alius
eniti cessauit. Vrinam non uidi. Circa iudicationem uelut debebat. Atue-
ro circa pleiadum occasum austrina, & pluuia erant. & tunc Adolecens muco-
sa, subbiliosa, uiscosa, multa recrementa egerebat. febris uehemens continua,
lingua arida. Sexta iudicatus est. Septima rursus inuasit, dimisit eadem die cum
tremore. auris sinistrae fluxio uiscosa, crassa, die sexta. Puero ab ulcere Pha-
gedaena eroso, dentes inferni, & ex supernis ac infernis anteriores, emergebāt,
cauitatem habebant. Quibus os ex palato discedit, his medius considerat
fuit. Quibus uero superni dentes anteriores, his latus est summus natus. Qui
quintus dens ab anterioribus numeratur, quatuor radices habet, singulis pari-
bus ad utrunq; uicinum dentem connexis, extremitatibus omnibus ad inter-
nam partem reflexis. Circa tertium dentem suppurationes plures q̄ iuxta ae-
lios omnes. Et ex naribus fluxiones crassae, & à reponibus dolores, ex hoc ma-
xime

xime fiunt. Corroditur hic, maxime quintus, ex medio quidem nodum habebat unum, duos autē antierius. Paruus primus intrinsecus iuxta duos corrodebatur. Septimus radicem unam crassam, acutam habebat. Athenadae puero maculo doluit à sinistra parte infernus dens, à dextra supernus. Huius auris dextra suppurata est, dum non amplius doleret. Post pleiada clemens cocelum, nubilosum, & caliginosum, iudicationes quintanae, & sextanae ac septimanae.

Iam uero etiam diuturniores, febres recidivantes, & quandoque erroneae, & cibum auerfantes, & biliosae, & dysenteriae cibum fastidientes, febriculosae. Circa pleiadum occasum, austrina fortiter erat, sanguinis eruptiones, & febres tertianae naturam referentes, & lenes. Qui in sutrina decubebat, sanguinem abunde biliosum è naribus effudit. Secessus modicus, iudicatus est septima cum rigore.

Seruus in extrema caupona, quarta die sanguinem è naribus effudit, multa statim nugabatur, aluus renitebatur. Praecordium dolorosum, durum. Ad subditam glandem sexta die subierunt mala, cum pallore uiridia. Septima mane iactatio, clamor multus, uenarum pulsationes circa umbilicū. In acutissimis febribus pulsus densissimi, & maximi. Quale est ad uesperam exacerbari, tale erat in omni morbo. Ceterum ad principia, consideranda sunt etiam exacerbationes, & an citius redeant, & continuas, & anni tempus. Post pleiadam occasum, austrina. Quae quinta die iudicabatur, intermissa una repetebatur.

At uero laxa, pustulosa erant, uelut Acanthio Lapyto. Circa pleiadum occasum, subscabra, & aspera erant pruriginosa, nullas lachrymas emittentia, & magis quidem hoc tempore. Sed & impetiginosa turgentia. Haec erant in Pythodori uxore, & Capelio, cum febre, sub cuius initium ferè Pythodori uxori coxae impotentes. Post pleiadum occasum horrores, sanguinis è naribus eruptiones. Sutor quidam septima iudicatus est, una intermissa, altera rediit. Rursum quarta iudicatus est. Alius ex his qui à Leocyde uenerant, septima iudicatus est. Alius quarta. Moschus nona. Largus sanguis ex sinistra, modicus è dextra nare. Ad decimam quartam ad iudicationem, si quatenus debebant ab initio exacerbarentur. Delinquentes circa edulia decima septima fiebant. Circa aurem in dextra parte tuberculum, paruum intus durum, foris paruum laxum, dolorosum, nihil remittens, decima nona noctu factum est. Valde biliosis suppuratis, purgatio sepiè atramento maxime similis. Qui cucurbitam affixit, quum in coxa esset dolor, huic ad crus deorsum uenit, & melius habuit.

Qui in Ceramicò ab equo lapsus est, cui non statim cucurbita affixa est: uisus est intro, & uigesima die recruduit malum, sanguinis eruptiones foeculentae, & erodentes. Tenedia quarta die abortiuit, maculum triginta dierum, aluus liquida, tenuis, egressit, lingua combusta fuit, iudicatio quarta die. Post pleiadum occasum lienosa, usque ad quintum diem fluebant, iudicata sunt.

Cuidam septima die urina uelut erui lotura, similis ipsa sibi ipsi, postea parua recidua. Intermissit etiam Megaris filio, uerum sanguis non fluxit. Urina uelut Antigenis alba, crassa, similis. Circa solstitium hybernum, sydus non paruum, quinta & sexta postea terrae motus. Quae in Perintho morabatur anhelosa, Antigenis uxor, quae non sciebat an praegrans esset, menses comparantes rubri. Venter alius atque alius paruus, alius magnus. Tusiens semper, uelut si celerius iter perfecisset, Mensis erat octauus, sedata est prius febricitans.

Apemāni fratris uxor, septima die abortiuit foemellā uelut dixit sexaginta die rum. Circa nonam turbata est, post iudicationem, dexterās partes dolebat, uelut à recidiua. Hæc & concipiebat cito, & perdebat. Alia quædā in albis mensibus filiam peperit. Alia in rubris, uelut conueniebat. Horridi, anxij, cibum auersantes, reciduiantes, biliosi, sanguine manantes, subsplenici, doloroso modo pluri mi ex sinistris affecti. Apemanti uxori hac parte oculus distortus est dexter, ad alteram uero partem lateris mollitudo. Aristophontis filia tertia & quinta febricitauit, sicca plerumq̃ perseverauit. Venter tamen huic turbatus, ægre iudicatio fiebat, ultra triginta dies cessauit. Pustulæ ex lasitudinibus non ualde fortibus, perueniunt ad septimam liuidæ. Rigor ancillæ retro Heroum abortus est. At uero albæ magnæ, neq̃ ipsæ ualde bonæ, graui sopore pressorum, & somnolentorum, & non confidentium, & bile renitente; & siue lubrica, siue dura fuerit aluus, non confidentes. Zoili fabri pulsus tremuli tardi, Urina & alui secessus moderate decolor, pectinis distentio utriq̃ in di rectum, usq̃ ad umbilicum, cum febre acuta, cibum auersans, siticulosus. Filia ædilis apud Tecomæum, quum obscurum esset ipsi quòd uterum gestaret, secundi mensis initio erupit uomitus pituitosus, aliquando uero biliolus, diffusculter peperit, perfecte purgata est. Vomitus similiter usq̃ ad trigessimam diem perseverauit, postea uenter turbatus est, & uomitus cessauit. Lienteria, menses non prodibāt per duos annos hyeme habuit hæmorrhoidas. Duo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant, subsæculenta, edulia ex sanguine confecta colore referentia, ea ex spumosis bile abunde coloratis uiridia erant. Qui asinum ex pacto eleuauit, statim febricitauit. Tertia & quarta, & quinta, & septima, & octaua sanguis erupit, iudicatus est, aluus lubrica.

Vir metallicus, præcordium dextrum intentum, splen magnus, aluus intenta, subdura, spirituosus, decolor, Huic ad genu sinistrū, recidiua, per totum iudicatus est. Temenæ filius habebat quid spiritus, ut uiridans palloris esset, ad dorsum: ad manus uiridans palloris. Maritus Lechus puerperæ apud Sitodochum, arquato morbo infestatus, ad quem septima die ingressus sum, octaua moriebatur, neq̃ mingens, neq̃ egerens. Præcordia magna & dura, & spiritus densus. Hic moriens ne frontem quidem sudore humectauit præ dolore. Huius uxor eiecit foemellam septimestrem, septima die. Apparuit autem quarta die. Hanc à principio quidem pedum dolor tenebat. Desinente uero febre, spiritus non est solutus, sed intus relictus, dolor ad manus & brachium. Recidiua per longissimū tempus corripuit eos quibus urinæ ante iudicationem suppressæ fuerant. Quæ erat apud Temenen ipsius soror, cum rigore iudicata est. Quum autem uiridans pallor cito desineret, manus & humeri doluerunt: horum autem cessante dolore, caput, oculorum palpebræ supernæ eleuatae sunt, & lachrymæ profluebant, reliqua non noui ludicaria est primum septima die. Menandri uinitor similiter, uerum aluus ab initio tenuia egebat, postea suppressa est, itemq̃ urina iudicata est, non riguit, septima die: quoniam aluus antea turbata fuit. Potamonis filio aluus non egebat septima die, duobus diebus ante iudicationem non riguit, quapropter neque urina suppressa. Dens Hegeflistratio, cui suppressio iuxta oculum, suppuratus est iuxta extremum, & rursus sanatus est oculus

ius. & secundum nares pus descendit crassum. iuxta gingiuam carunculae partu-
 ue rotundae abscesserunt. Huic circa tertiam diem suppuration affutura puta-
 batur. postea auerteratur. Derepente uero intumuit maxilla, & oculi. Qui-
 bus abscessus ad oculos in febribus ardentibus, hi maxillas rubent, & sangui-
 nem ex naribus fundunt. Sed & quibus ad aures fiunt. Fortassis autem & ab-
 scessus ad articulos magis, non tamen clare noui. Rigores tremulis, praecor-
 dij intentio. Menses apparuerunt decima septima, iudicatio fiebat ita
 perpetuo. Si tamen non sic intus permansissent, iudicabantur tertia, quaedam
 quinta, quaedam septima. Hegeisfratio postremi duo dentes parte inter
 se contigua corrodebantur. postremus habebat supra gingiuam duos nodos,
 unum iuxta cauernam, alterum ex altera parte. Qua uero parte duo nodi es-
 rant, ibi radices latae similes singulis paribus coincidebant, ad alteram partem
 medietas una rotunda. Mulier cui sanguis e naribus erupit quarta & se-
 xta. Septima iudicata est, rubicunda erat. Mulieri ex capite fortiter grauata,
 iudicatio facta est circa uigesimam. Vigesima praecordia aestuosa. Septima
 die non ualde sanguis e naribus erupit. Secellus tenuis. ad oculum dextrum cir-
 ca octauam. Viro eadem, uerum septima iudicatus est. Sublienosus e si-
 nistra parte. Huic octogesima die, & diurniores oculi affectiones: fortassis
 quoniam post iudicatione, & quia multae. Vxor Temenae spiritiuosa praecor-
 dia, & intenta. Menses per tempus apparuerunt. An uero etiam praegnans
 fuerit, haud scio. alius primum suppressa, & tunc uomebat. postea non am-
 plius. alius enim multa uiscosa ac biliosa egebat. praecordium non impedi-
 bat. Vndecima ad magnum dextrae digitum inflammatio. alui egestio etiam pe-
 nitus procedebat. Quibus contingebus, melius habebat. Nam & in somnu
 delatio minor erat, & febris: & quodammodo facilius spirabat, quoniam su-
 pra malum uomitum, uomuerat. Decima sexta sensim factus est spiritus den-
 sus, & febris. mortua est. Hec febricitauit ante abscessum. Septima post abscesse-
 sum perijt. Erat & haec rubicunda. Filius mulieris ipsius Apemanti foro-
 ris, praecordia magna & splen, spiritus, secessus amarae bilis, aliquantulo ste-
 reo ammixto, lassus ex operibus. Vigesima die ad pedes, & iudicatio certe lassus
 ad articulos, non ad oculu. praecordia uero erant intenta. & sane erat etiam rufi-
 scila quaedam modice sicca. Quae relinquuntur post iudicationem recidiam fa-
 ciunt, & in ipsis morbis quae excernuntur, sputum praematurum, alui secessus,
 intemperies, & similia. Apemantus cui dolores in sede, in dextri lateris
 mollitudine, & iuxta umbilicum paulo inferius, & e dextra parte: ante dolo-
 rem urinam cruentam mingebat. desuit tertia die. Et faber in altera parte,
 ex eadem in directum, & hic quoque urinam cruentam eiciebat. Quae ubi cessas-
 set, ambo subsidentias in urinis habebat, & hoc tertia die. Apemantus aut plu-
 rimu fouebatur. Alter uero non sentiebat, nisi in dextra parte. Et Nicoftrato
 accidit aliquid iuxta ultimas partes a dextris, inferius quibus in sinistris. lon-
 ge uero subter lateris mollitudinem, usque ad umbilicum utriusque. Anicula a-
 pud Sosileum alba pituita referta: Tibiae duris tumoribus, albis, laxis, itaque pe-
 des, uerum minus. Erant autem et in partibus infra femora, etiam si plerisque dis-
 ficilis huc exitus patet: immo & in lumbis. & uenter tenuis erat, praecordia sub-
 mollia, spiritiuosa non ualde. Erat autem desinentibus plurimis, etiam alia cura

ubi glauci facti erant oculi. Atque oculorum quidem cura paulo moderatior erat. Coxæ uero accuris affectiones uterinæ erant, quum dolores esse putarentur. Apposito enim ac subditio medicamēto odorato, ex farina & unguento, contigit ut breui discuterentur ac desinerent. Tempus autem abscessus ad oculum, annus. Circum circa durus fuit, cui etiam pustulæ non perfecte contabuerunt. Sunt autem & à disquamatis talia. Seruus in Hippolochi uilla, cui in præcordijs utrinque quid collectum erat durum, & fulgorem aliquantulum habens inferne, qualis erat in fabri ferrarij uxore hydropica: Cui tenuia recrementa progressa partem aliquam euacuauerunt. Erat autē & hoc ipsum ad dextrum, planum quiddam, supra ea quæ circumferentiam habet eleuatum. Huic umbilicus ex natiuitate denigratus erat, & ulcus profundum fiebat, & umbilicus non ualde cicatricem contrahebat. & pudendum summa parte denudatum erat, quum non statim tale fuisset, neque conuatum, & adhuc magis fiebat. Hic plurimum uomebat, febris cibi fastidium, sanatus est. Verum circa septimam à decubitu diem (nam & antea ægrotarat) aquam multam bibens, & fortassis aliter contemnens, iactabatur & aliquantulum conuellebatur. Desinente autē consuisione, circa animaduersionem extinctus est. Ante hoc uero urinam acruatam minxit, & flatus cum crepitu prodierunt, & supernæ partes minime sunt euacuatæ. Quum autem mortuus esset, statim etiam & illæ fortiter emollitæ sunt, & reliquæ rubefactæ sunt, uelut à flagris per totum corpus, excepta ea parte ubi tumor ille maxime eleuatus erat, & multum quoque calidus erat.

Cuidam uero in Abderis deorsum erupit. Cuidam autem anteriore parte intumescere sine febre. Tumor ad contactum suppurato similis erat.

Famulæ anhelosæ, quum uasa menstruum sanguinem funderent, anhelationes illæ cessabant; febris fiebat, mamma sinistra superne suppurata est. & ab initio etiam auris. Olympiodori famulæ sanguis ex sinistra nare, & iudicata est ad uigilantiam, quemadmodum etiam febricitantibus, & secessus quales etiam æstate populariter grassati sunt, & quales Hipponactis. Hyle famula Aristidis, octaua die in pharmacorum purgatione, inferne signa habuit, quæ illa facile ferunt, & si non præter rationem debilitantur, & neque spumosa, neque sublinguolenta, sed qualia sunt oua, uelut Heraclidæ uxor purgata est multum, & facile tulit. Quæ in Bulagoræ uilla depurgata erat, cœpit febricitare ex splene (Qui uero dextrum præcordium habent, non quidem sublimē, uerum intentum, hi etiam magis rubicundi sunt) rubicūda quum esset, alium in principio turbatam habuit, expectabam ad oculum decubitum. Huic septima die saluginosa lachryma mordax ex oculis prodijt, & secundum nasum, & fauces, & aurem sinistram. Decima quinta sudauit cum rigore, non iudicabatur ante rigorem, pallida facta est ualde. & faciei circumtenso ac contractio. Aurem è directo splenis ac lateris dolebat. Pueris uentres turbati, & tusses sic cæ: quandoque ad humerum suppuratio fiebat in tussibus, posterioribus diebus. Fullo collum, caput, septima manus torpida. Nona crus torpidum. tussis cessauit. Cui maxilla distracta fuit, in quinto mense in uentre distracta erat ad sinistram partem. In Cranone Lycino Grammatico, ex febre biliosa ex splene, capitis grauitas, stridebat secundum pulmonem, in labijs utriusque ulcera, intus rotunda, parua, postea etiam sanguinis quid ex nare è directo manauit

manauit. Famulæ quam recens emptâ uidi, cui duricies in dextris erat magna, nō ualde dolorosa. & uēter magnus ac circūtenfus. nō similis hydropicæ, & aliās pinguis ac mollis. & nō ualde difficulter spirans, uerum decolor. Menfes septem annis non prodierant. facta est dysenteria, & nō tenesmo tentata. Et sub hæc duricies in dextra dolorosa erat. & febres tenues. & non ultra septem dies etiā aluus turbata est, secessus electrum referens, subuiscosus, multus ad aliquot dies. Sanata est. & menses postea prodierunt. & partes secundum uentrem molles fiebāt. & corpus boni coloris ac crassum ipsi erat. Minois uxor ex sectione, pressa ab eam administrātibus durius, marcorē ac corruptionē incidit, malo ad pulmonem deueniēte, breui significationē de se dedit quotquot diebus supererat. erat & aliud quiddam intrinsecus. Quæ induntur in nares si febricitarint, si quidem solutus fuerit dolor, crassa per nares effluunt. Si uero necq̄ dolor, necq̄ febris, tenuia: & fortassis feruida: Veluti tenuē quidem Hespippo, quum ad noctem quid indidisset. Crassum uero illi in Corintho eunuchō simili, Celeuris filio erat. Maturi in morbis abscessus an iudicent, si gnūm est, si dum feruida sunt mala, non febricitarint: & dum molesta sunt, faciliē portarint: Velut quæ in sede acciderunt Charoni. Leambio uero quū in intestinum ulcerosum esse putaretur, in dysenteria pharmacis curato, humerus & sedes ulcerata sunt in sinistra parte, citra febrem. Cui à flatibus laterū mollitudo eleuabatur, & aliquantulum dolebat, huic quū lacuberius & meracius bibisset, & insuper dormisset, statim nausea & calor accedebat. Deinde ignē incendenti, & pro cibis farinam crassiorē in craticula coctam comedenti, aluus substitit. & purulentū tamen quiddam egeffit. Quum autē sedes esset inflāmata, sine febre & sine dolore sufficienter erat. hoc assero. Senex in lapideis uel stibulis, iūbos doluit, & ambo crura, & utriq̄ dolores descēdebant ad femora, & quandoq̄ tibias, & aliquando ad genua. & quū diutissime durarēt, recursio nes multæ fiebāt. tumor in pedibus, lumbis, tibia. breues inguinū tumores. uenter durus. & totus pectē intensus ac dolorosus. Plerūq̄ cōpertus est etiam uescicam durā habere ac dolorosā. & papularū eruptiones, & calores oculis, auribus, naribus, manu. Iudicationes, & alia per quæ cognoscimus de ipso agro, an sudet, aut tangat, aut aliquid offecerit, aut gustauerit, itemq̄ alia cognoscuntur. Pili, color, cutis, uenæ, nerui, musculi, carnes, ossa, medulla, cerebrū, & à sanguine uiscera, uenter, bilis, alij humores, articuli. & postea an doluerit iuxta aures, iuxta ipsam collectum tuberculum, glandulam nō attingens, os nō suppurans, & hoc disparuit. & tunc statim febricitauit. Pulsus, tremores, conuulsiones, singultus, circumspiratio, secessus, per quæ cognoscimus. Suppuratis oculis, & dum erumpunt, ulcera magna fiunt, & dum secantur, profunda. & utroq̄ modo oculi ulcerantur. Aristeas ex pago Amphilocho quarta die mente motus est. aluus subuiridia egeribat. & somni salubres. albicantis coloris. Quibusdā ab initio subtremituli digiti, & labia ubi loquerētur, itidemq̄ alia partes: & proterue lingua citiore ac uolubiliore præditi: his rubor in faciē maxime erat. Hi ebriosi erāt, aut uomitu cōmode usi intumescebāt. Qui iuxta Medosadædes habitabat, cui tenuia, nō biliōsa, aquosa, multa, per secessum profiebāt. præcordiū cedēs & gibbosum: soporosus fiebat. Circa decimā quartā ad iudicationē maxime progressio, rigor sine tremore, dissolutio, resolutio, cōtractio, secessus

secessus & egestiones. soporosus. mente motus. ex fomno non insanit. iudicatus est circa decimā quartā. nihil è iudicantibus contrarium. Alius similiter in principijs secessus subuiscosi, ex quibus quod crassum est iudicatorium est. in somnis. postea subuiscosi, subbiliosi, maturi, biliosi, non tenues: qui ubi compacti fieri cœpissent, iudicationes celeres. Præcordiū intentū apparuit inflammati, aut uenarū intentarum modo, circa sextam. Postea dormiuit septima. iudicatus est circa nonam. albicantis coloris ambo, non sultui. Quū secessus aquo si sub dio expositi essent, superne leues, tenues, ifatidi ualde similes fuerūt: inferne uero subsidentia habebant. Quibus in dextris distentio submollis, phrenitici sunt: si non soluantur febre desinentre. Quibus autē à mollitudine uentris in hac ipsa febre, quiddam collectū aut durum dolorosum fit, & ualde malignum diffundi non potest, ex talibus fortassis suppurantur. In dextris tumores eleuati, si quidem si quis plurimum ac maxime premat, submurmurint, non ualde maligni purandi sunt. Velut in dextris illi qui ex Amphilochi pago erat, & ei qui iuxta Medosadae aedes habitabat. Hi soporosi erant, & in somnis mente moti. Constitutiones quales in quibus temporibus ac regionibus magis & minus fiunt. Vigores morborum, & ad iudicationem, & quotidie, & an citius fiant aut serius, tertia, quarta, circuitu, & in quibus circuitibus iudicantia, tumentia, cruenta, & non. Quibus abscessibus recidiuæ fiant, uenæ temporū, & cōtractiones, & colorū mutationes ante iudicationes, ex rubro ad uiridem ac pallidum, si non iudicent. & cutis circūtensiones absq; iudicatione & oculorum cōtractio, corporis duricia sicca. Qui quidem uolentes iachrymantur, non malum est. Quibus autē inuitis lachrymæ profluūt, malum. Quibus in dentibus circūcirca uiscosa fiunt, malum est subhiare ac fixis oculis intrudere. Qui in tibia ulcus habebat, & Attico usus est, huic puftulæ eleuatae, rubræ, magnæ: atq; hoc pro tuisi quæ postea accessit. prius enim non tuisijt. In Aeno quicumq; capite uulnerati horridi erāt, maligni & suppurati ex tenefmo. ex peregrinatione ac itinere dolor pedum, & in turbationibus lasitudines. Clinia cibum auersans, colliquescens, purulentū, aliquādo parū cruentū, purulentū tumidum eiecit. Hippeæ uxor hydropica, quæ etiā per tres annos uere incipiēte tuisijt, amplius aut suppurata est, ad hyemem aquosa facta est, ab illis aut pharmacia curata melius habuit. Mortua est ancilla. Ex tuisientibus qui manibus laborabant, uelut seruus ille qui farmentæ obrorquebat, & Amyntæ filius, ambo sola dextra resoluti cessauerunt, quādo quidem perpessi sunt hoc tuisientes. Qui uero aut equitarūt, aut iter fecerunt, in lumbis ac femoribus resoluti sunt. Plurimæ uero tuisisses siccae erant: Sin minus, uiolentæ sanæ. Vxor Emmyris modo nō morbofo, absq; febre, stupida esse uidebatur. postea ad tremorē totius corporis res ipsi deuenit, et ad colliuationē, & cibi fastidium ac sitim, & frigida erat. Nyctalopes qui plurimā minxissent, postea parū quiddā mingebant. Verū tuisientes & insuper febriles tubercula ad aures habebant, erumpentia circa septimam aut octauā diem. Emmyris filia febricitabat, & ex aure purulentum fluebat, circa octauam haud pro comperto habeo. Quibusdam uero etiam dens corrosus fuit, retius maxime ex supernis. Præ omnibus autem hic reperitur corrosus, ad hunc dolor, & quibusdam etiam circumsuppuratio. Quibus uero ad aures, hi magis

magis tussiebant quā illi. Quibus autem cū febris ad suppurationē, septima recedit. Cuidā post quē exacerbatus fuit, præcordium solutum nō est. alio autem emollitā, inerant pauca subuiscosa, compacta, non bona utrina cruētī coloris. spuebat autem sputum spumofum. Ille ad quē Cynicus me induxit, septima exacerbatus est, circa decimā quartam iudicatus est. Disparentia, mala sunt, purus fauces, pauca, lata, matura expuens, ex naribus parū sanguinis stilauit, capite grauatus erat. Manuum ac pedum dissolutio, aluus soluta profuit, pedes semper calidi, somni aderant ipsi, & iuxta aurem nō extuberabat, quoniam matura spuisset. Demarati uxor, pedes etiam in horroribus calidi: siue ad suppurationem, siue non tendebat, perijt. Senex qui è uita decessit, ægrotabat simul cū uxore sua, furiosum quiddam in se habebat. Postea uero ubi prodijisset ab ipso lumbricus subcrassus, & modicus cibus, statim sedatus, & dormiuit, & sanus erat hic senex, & corporis cutis circūtensio, extremæ partes frigida, mollis, tremulus ab initio & labijs, & manibus, & uoce, mente motus est moderate, hiabat ac fixis oculis intendebat, non ualde difficulter spirabat, diebus haud scio quot ultra uiginti mortuus est. Quibusdam præcordia & aluus subegesserunt compressa, acruatim, nō cum murmuratione, uelut in Abderis uermium speciem præ se ferentia. Quicquid contingit priore iudicatoris dies præcedente die, & mala & bona signa sūt in diebus, quibus qui exacerbantur diuturniores sunt: & quibus desinētes remorantur. Quædā non fideliter alleuabant, & quædam per seipsa exacerbabātur. Sputa peripneumonias quibusdam biliosa, quum desinere uolunt, Valde flaua breuia sunt. Si qualia sunt quæ in principijs adsunt, talia postea appareant, hæc nō ualde conuocari puto: sed iudicare uelut ei qui apud præceptorē erat, & uelut alijs quoque uidi. Nicippus in febris per somnū semen effudit: & nihil ad peius processit, & hoc ipsum saepe ipsi factum est, & nihil læsit. Prædictum est ipsi id desturum, postquam febres iudicatæ forent, & sic factum est. Critias in febris ab insomnijs uexabatur quæ nouimus, & cessauit etiam ipse eadē somnijs re unā cum iudicatione. Alcippus quum haberet hæmorrhoidas, à curatione prohibebatur, Curatus insannj, febre acuta succedente cessauit. In febris acutis siticulosi, à medicis potu interdicto, aut etiā à seipsis abstinentes, multum sibi bibere posse uidentur: his aqua frigida data ut reuomant, prodest. Biliosa enim aderunt. Quod nerui ipsi in seipsos trahunt, signū est. Si quidē enim nerui in supernis manus sauciati fuerint, manus deorsum nutabit, dū ab infernis neruis trahitur. Si uero contrā, uice uersa. Tulsient siccam tulsim, qui testes affectos habent, & ex tulsu uena secta, ad testem solutio fit, & inflammati tussiuunt, & in febris ex inguinum tumoribus insuper tussiuunt.

HIPPOCRATIS COI DE MOR

BIS POPVLARIEVS LIB. V. IANO COR

nario Medico Physico interprete.



IN Helide olitoris uxor. febris corripuit ipsam acuta. & medicamenta bibens nihil sentiebat opis. In uentre infra umbilicum erat quid durum, & altius altero, & dolores exhibebat fortes. Huc enim manibus cum oleo fortiter compressum ac emollitum est. & postea sanguis frequens ipsi deorsum processit, & sanata est, & uixit. In Helide Timocrates amplius bibit. In sanies autem ab atra bile, bibit pharmacum. hic purgatio multam pituitam ac bilem atram egerat per diem. & ad uesperam purgatio cessauit, & dolorem pertulit in purgatione multum. & quum potentia bis bisset, somnus ipsum corripuit, & tenuit per noctem, donec sol oriretur. In somno autem presentibus nihil respirare uidebatur, sed mortuus esse. & neque quid diceretur, neque quid fieret, sentiebat. Extentum autem fuit corpus et rigidum. Verum uiuebat, & excitatus est. Scomphus in Oeniadis pleuritide correptus, mortuus est septima delirus. Pharmacum autem bibit infra purgas. priore ante positionem die mentis compos erat, & purgatus est non multum, quum autem purgaretur, delirauit. Phoenici in Oeniadis & Andreae fratribus maxilla altera intumuit, & labium quod est ante maxillam & oculum. & neque intrinsecus quicquam spectanti apparebat, neque forinsecus suppurabat. Sed tumens arida putredine putrescebat. Et alter eadem perpeffus est. Mortuus est autem alter septima die, & pharmacum bibit, & nihil profuit. Verum Phoenici circulus putridus exsectus est. & ulcus purgatum est magna ex parte priusquam moreretur. Mortuus est autem & hic, ubi diutius uixisset. Euridamus in Oeniadis, in peripneumonia decima die incepit delirare. curatus ad mentem redijt, & sputa erant puriora, et morbus ad melius procedebat, & somno multo perfusus est. & oculi morbum regium contrahebant. & mortuus est ad uiginti dies. In Oeniadis uir quidam morbo tenebatur, quum sine cibo esset, fortiter in uentre ipsius fugebat, & dolebat. & quum edisset ac cibi contriti essent, tempusque post cibi esum accessisset, non longe postea idem hoc patiebatur. & tabescebat corpus ac consumebatur. & alimentum ipsi non contingebat a ciborum esu. & per alium secedebat cibus prauus & combustus. Quum uero recens cibum accepisset, eo ipso tempore minime fugebat, neque dolor aderat. Hic omnis generis pharmacum bibens sursum ac deorsum purgatum, nihil opis sentiebat. Vbi uero uena ipsi secta esset in utraque manu, donec exanguis redderetur, postea utilitatem percepit, & a malo liberatus est. Eupolemus in Oeniadis, dolebat coxam dexteram, & inguen, & commissuram propinquam ad coxam, ab inguine & coxa in anteriore parte. Huic sanguis detractus est a talo, multus ualde, et niger, ac crassus. & pharmacum bibit alium deorsum purgans, & multum purgatus est. & melius quidem habebat, dolores autem non remittebant. Sed suppuratam habebat & coxam, & commissuram in ipsa ad sedem, & partem circa inguen, quibus locis etiam amplius dolebat. Pus autem ad os magis fiebat, quam ad carnem, in profundo, & per tempus sic habens negligebat, donec ualde debilis fiebat. postea crusta

crustæ ipsi inustæ sunt, ualde multæ & magnæ, ac inter se propinquæ. & pus effluxit multum ac crassum. & mortuus est postea paucis diebus, tum præ magnitudine ac multitudine ulcerum, tum ex corporis debilitate. Huic si una amplæ sectio incisa fuisset, & per sectionem pus emissum esset, & si opus fuisset, etiam altera sectio facta esset: Hæc sanè in tempore si facta fuissent, mihi quidem uidetur quòd sanatus esset. Lycon in Oeniadis, reliqua quidem eadem patiebatur, Verum dolores etiam ad crus non ita ualde progrediebantur, & non factus est suppuratus, sed sanus multo tempore. Bibebat autè pharmaca. & curbitas adhibebat. & uenam secabat. Atq; his factis melius habere uidebatur.

Homo quidam Athenis prurigine toto corpore uexabatur, maxime autè testibus ac fronte, uexabatur autè ualde uehementer. & cutis crassa erat per totum corpus, & uelut lepra aspectu, & ex nulla parte curè apprehendere potuisset, præ crassitudine. Huic nemo opitulari potuit. Transgressus autem ad Mesolum, ubi sunt calidæ balneæ, à pruritu quidè & cutis crassitudine liberatus est, uerum hydropicus factus mortuus est. Athenis uirum cholera corripuit, uomebatq; & deorsum egerebat, & dolebat. & neq; uomitus, neq; per aluum secessus, sisti poterat. & uox ipsum destituebat. et ex lecto moueri non poterat. & oculi caliginosi ac caui erant. & conuulsiones tenebant ab aluo & intestino, & singultus. Verum secessus multo copiosior erat q̄ uomitus. Hic ueratrum in lentium succo bibit, & alterum lentium succum in super bibit, quatum potuit, & postea uomuit, & coacta sunt ac adstricta ipsi ambo, frigidus autè factus est. & lauabat in ferne usq; ad pudenda, calida ualde multa, donec etià supernæ partes calefactæ sunt. & uiuebat. postera uero die, polentam bibit ex aqua. In Larissa uxori Gorgiae menses suppressi erant per annos quatuor, præter ualde modicos. Verum in utero, ad quacuncq; partem se inclinasset, pullum exhibebant ac grauitatem. Hæc mulier concepit, & peperit, & puella uiua nono mense edita est, ulcus habens in coxa. & secundæ cõsequentes, ac sanguinis fluxus ualde multus, successerunt. postridie, & tertia die, ac quarta, etià grumi sanguinis concreti. & febris tenebat usq; ad decem primos dies. & de cætero prodijt ipsi sanguis ruber, & facies fortiter intumescibat, itemq; tibiæ, ac pedes ambo, & alterum femur. & cibos non admittebat. Sitim autè habebat uehementem, & frigidissima aqua conferebat. Vinum autem nequaquã. At uenter post primū puerum modice emollitus est, ualde autè non cõsolidit, sed durior erat. dolor autem non aderat. Quadagesima uero die à prima superfoetatio excidit, caruncula quædam. & uenter cõsolidit omnesq; tumores. & fluxio tenuis, ac sanguis oculus prodijt, & sana euasit. Mulier in Pheris caput circūcirca dolebat multo tempore, & nemo poterat illi quicquã opis conferre, neq; dum caput purgaretur. Melius autem habebat, quum menses ipsi facile prodibant. Hæc quū caput doleret, ex subdititijs odoratis ad uterum appositis opem sentiebat, & modo dice depurgata est. & quum concepisset, dolores caput relinquabant. Mulier in Larissa prægnans erat. Huic decimo mense sanguis prodijt multus per quatuordecim dies. Plurimus autem tribus diebus ante pueri editionem. Decima quarta excidit ex utero puer mortuus, habens dextrum brachiū lateri adnatum. & tertia die noctu eadem hora qua puer, prodijt secunda, & purgamenta alba, deinde post hæc per tres dies ac noctes multa moderate prodierunt. Postea

febris corripuit, per duos dies totidemq; noctes. & dolebat omnem uentrē, & coxas, maxime uero pectinem. In Lariffa Hippothenes peripneumonia apprehensus esse medicis uidebatur, erat autem nequaquam. Verū principio lucians in duro loco cecidit supinus, aduersario ipsi illapso, & lauatus est frigida, & coenauit, et grauior factus esse sibi uidebatur. Sequenti autem febricitauit, & tussis apprehendit siccor, & spiritus densus. Quinta die cruentum excreauit, non multum. & delirare incipiebat. Quando tussiebat, dolebat pectus & dorsum. Sexta autem ubi sternutasset, sanguis fluxit è naribus, quatuor heminarum mensura. Ad uesperam neq; loquebatur, neq; sentiebat, neq; quid fieret, neque quid diceretur. Undecima mortuus est. Per quinque uero dies, modo sapiens erat, modo non. Erat & sine febre. Spiritū autem nullum recipiebat, neq; stercorem habebat. Non enim erat spurū. Scamandrus in Lariffa, & in coxa marcorem habuit, & in oīse diu disparato. Ipse uero sectus est sectione magna, etiā ad os ipsum, & postea uetus est & tunc die duodecima post sectionē cepit cōuulsio, & ualde obtinuit. cōuellebatur autē crus hoc usq; ad costas, & ad aliam quoq; partem conuulsio progrediebatur. fieciebatur autem crus, & extendebatur; & alia membra mouebat. & maxillæ compactę riguerunt. Hic mortuus est conuulsus octaua die post conuulsionis inuasionē. Curabatur autem tepesactio rns utriculis, & fomētis erui, per totū corpus. & infusum per clysterem immisum est, & tunc modicum stercoris prodit, & pharmacum bilem abunde purgans bibit, ac in super catapotiu deglutiuit, & secessit quidē, nihil autem à catapotio opis sensit. & somnus modicus uenit. & rursus pharmacū idem forte ad uesperam bibit, ac sole emergente mortuus est. Videbatur autem multo tempore morbum ferre potuisse, nisi ex pharmaci uij perijisset. Equiso Palamedis in Lariffa undecim annorū, percussus est in frōtem supra oculum dextrum, ab equo; & uidebatur os non sanum esse, & exiliebat ex ipso modicus sanguis, & sectus est sectione magna usq; ad secundam laminā, & curabatur sic habens ipsum os, quod etiam antea statim os peperit. Vigesima tumor cepit circa aurē, & febris & rigor. & in die magis intumescere ac dolebat tumor. & ab initio febricitauit ex rigore. & oculi intumuerunt, & frons, & tota facies. Patiebatur autem hæc in dextra magis capitis parte. Progressus est autem tumor etiam ad sinistram, nihil tamen hie læsit. Demum febris cōtinua corripiebat. Atq; hæc minora erant, usq; ad octauam diem. Vixit autem uetus, & per catapotium purgatus, & cataplasmate tumori imposito. At uero ulcus nullius mali causa erat.

In Lariffa Theophorbi filius uescam scabiosam habebat, & uiscosam urinam mingebat. & dolebat dum & inciperet mingere, & dum desineret. & confricabat pudendum. Hic quum bibisset pharmacum urinam ciens acre, in uescam quidem nihil processit, uerum multum purulentum & bilem euomit, & deorsum alia huiuscemodi egerebat. & uentrem dolebat, & intrinsecus ardebat. Reliquum uero corpus frigidum erat, & totus resolutus est. & nihil asumere uolebat. Huic exulceratus est uenter fortiter ualde, à ui medicamentū, & mortuus est tertia post potionem die. Vxor Antimachi in Lariffa, prægnans erat diebus circiter quinquaginta, & reliquo tempore præ fastidio à cibo abstinebat, & per septem dies uterum dolebat, & cor. & febris corripiebat. eo tempore nihil per aluum egerebat. huic datum est catapotium deorsum pur-

purgans fortius quæ conueniebat, & euomit bilem combustam, præ cibi abstinentia & febre. Nam neque ullo potu urebatur, euomit autem paucâ uolenter, & grumosa, & ubi concitata fuisset, ac ipsam emisisset, debilis esse uidebatur, & non uolebat aquam bibere euomere. Postea uero dolor fortis tenebat infernum uentrem: exulceratus enim erat à medicamēto, & prodibat ipsi statim post steræcus, subcruentū ramentosum. Semper aut̄ amplior fiebat & debilitas, & cibi fastidium: & purgamēti erant heminae quinque. Sistebatur autem aluus, aqua multa super uentrem affusa, aliud autē nihil potuit admittere. Mortua est circa mediam noctem. Videbatur uiuere potuisse, si aquâ bibere potuisset, ac statim uomere priusquam deglutiuisset. Famula Onesidemi in Larissa, ulcerata est aluum & intestinum, à bile sponte commota, & prodibat sursum ac deorsum bilis & sanguis, & febris tenebat. Huic debili datum est pharmacū deorsum purgans in potu, debile, aquosum, ac modicū, & uomuit ab ipso multum. & infra amplius subijt, & uespera redijt. Postridie febris erat, sed debilis. Aluus autem ulcerabatur, & adhuc eadem egerat. Tertia die ad uesperam mortua est, quum febris ualde fortis ipsam corripuisset. Quapropter omnino moritura esse uidebatur. Minime uero ideo quod aquam frigidam biberat, donec uomitus tenebat. Postquam autē perfrigeratus est supernus uenter, depurgatus per aquam, succo frigido postea potu, sic postea in fufum per clysterem immisum est. Eudemus in Larissa, hæmorrhoidas habens fortes, ac diurnas, quum exanguis esset, bilis commota est, sed leniter in corpore, & aluus turbata deorsum biliosa egerat, & hæmorrhoides intumescēbat. Pharmaco deorsum purgante potu, probe depurgatus est, & rursus bibit succū, & amplius aluus turbata est. & dolor ad præcordia consistebat. Huic quum uenter non probe haberet, sed adhuc curatione indigeret, manus hæmorrhoidibus admotæ sunt, & uomuit. Postea quum cancer successisset, febris irruit, & non dimisit antequam occideret. Quandoque etiam quum rigor subrepēs dimisisset, febris uenit: & prodijt ipsi bilis & flatus, & partim prodibat, partim intus erat, & dolor in uentre. Hæmorrhoides autem extra intestinum rectum erant, reliquo tempore à purgationibus auspicate. & flatus per ipsas prodibat. & ad sternutationem principium fiebat.

In Larissa uir quidam fauciatus est cominus ex manu per hastam latâ à tergo, et summum eius penetrauit infra umbilicum per multum spatium, quod liuidum erat, & tumidum: postquam autem uulneratus fuit, dolor obtinebat primū fortis, & uenter intumescēbat. Huic postridie datum est pharmacū deorsum purgans, & egressit modicum cruentum, & mortuus est. Videbantur intestina huius non esse sana, & uenter sanguine plenus esse. Apellæus Larissæus ætatem habebat annorum circiter triginta, aut parū aberat. Corripiebatur autem morbo, à quo uexabatur noctu magis in somno, quæ interdium. Aegrotabat autem ad duos annos ante mortem. Vomebat bilem fuluam aliquando ubi excisatus esset. Vomebat etiam nigrâ. Hic purgatione à capite forti ualde ad multum tempus purgabatur. & quum pharmacum bis bibisset, sex menses ipsam penetrauit. Erat ualde uorax multi cibi, & quum corpus haberet biliosum, multum luçtatus, ualde rignit. & febris corripuit, ac morbus ad noctem. postridie sanus esse sibi uidebatur, & rursus altera die. Sequenti uero nocte morbus inuasit cœnatum à primo somno, & per noctem ac diem, & usque ad cœnam tenebat

nebat. Mortuus est priusquam resipisceret. Conuellebatur primum circa de-
xtras partes, faciemque ac reliquum corpus. postea in sinistris. et quum uideretur
quietus esse, soporem habebat ac stertebat. & rursus succedebat morbus.

Eumelus Lariffæus rigida habuit crura, & manus, & maxillas. & non po-
terat neque extendere, neque flectere, si non alius flecteret ac extenderet. Et neque
maxillas diducere poterat, si non alius diduceret. Aliud uero nihil neque dole-
bat, neque edebat, nisi mazam, & aquam mulsam bibebar. Vigesima die sedens
cadii supinus, & caput ad lapidem uehementer offendit, & uertigo ipsi caligie
nosâ offusa est. & paulo post surgens, sanus erat. & soluta erant omnia, præter
quam post somnum ubi excitaretur, articuli modice ligati erant. Erat autem
duodecim aut tredecim iam annorum. & ægrotauit mensibus tribus aut qua-
tuor.

In Lariffa uirgo quæ sanguinem uomuit non multum, suppurata facta,
febris corripientibus, non liberabatur priusquam moreretur. Mortua est
tertio mense. Ante mortem uero obfurduerunt ei aures, & non audiebat, nisi
quis ualde exclamasset. Verum ante sanguinis uomitum debilis erat. Fa-
mula Dyferidis in Lariffa, quum iuuëcula esset, ubi uenere uteretur, fortiter cir-
cum circa dolebat. Aliàs autem sine dolore erat. Concepit autem nunquam. Et
quum sexaginta esset annorum dolebat à meridie, uelut ex partu uehementer la-
boraret. Hæc quum ante meridiem porrum edisset multum, postquam dolor
ipsam corripuit uehementissimus, & priores omnes excedens, exurgens aspe-
rum quiddam in ore uteri deprehendit, postea quum ipsa animi deliquium in-
cideret, alia mulier immissa manu, expresit lapidem asperum, magnitudine
uerticilli fusi. Et sana tunc statim, & postea erat. Maliensi curus onustus
inductus est supra costas, & costas confregit, & per tempus substitit ipsi pus
infra costas. Vtusus sub splenem penicillis ac linamentis utebatur, & peruenit
ad decem menses. Resecta uero cute, cauerna apparuit ad tenue intestinum u-
trinque procedens, & ad rhenem, & ad ossa procedebat putrida. In hoc non a-
nimaduertens esse, quod & corporis habitus biliosus erat, & in corpore putre-
do sicca tenuis intestini multa, & aliarum carniū, quas statim eiectione oportet
habere, si quis potuisset sicco pharmaco, dum robur aliquod homo habebat. Nam
ab humidis nihil remittebant, sed putrescebant. A linamentis uero inditis quum
humor sisteretur, rigor corripiebat & febris, & magis putrescebat. affluebat
autem isthic putridum quiddam, subnigrum, graueolens. Priusquam uero cu-
rationis aggressio fieret, quotidie multum foras penetrabat. Erat autem non
probe fluidum. Cognitum est naturam morbi esse magis remotam, quam sub-
ter cutem. Quod si uero etiam omnia recte facta essent, tamen non uidebatur
seruari posse, etiam si uentris profluuium ipsum corripuisset. Autonomus
in Omilo, ex capitis uulnere mortuus est die decimalexta, in media æstate lapi-
de ex manu ictus, in futuras in medio sincipite. Quare non animaduerti ipsum
secari opus habere. deceperunt enim me futuræ habentes in seipsis iaculi læsio-
nem, postea enim conspicuum id fiebat. Primum quidem ad clauiculam, postea
ad latus dolor fortis ualde. & euulsio ad ambas manus uenit. In medio enim
capitis ac sincipitis ulcus habebat. Sectus est autem die decimaquinta, & pus
prodijt non multum. Membrana uero cerebri imputrefacta apparebat. Fa-
mula in Omilo ex capitis uulnere, duodecim annos nata, moritur in media æsta-

re, decimaquarta die, Januam quidam ipsi impegerat, & os contuderat ac ruperat. Sutura uero in ulcere erant. Quare cognitum est recte sectione opus habere. Secta est autem non uelut oportebat, sed quantum relictum est, pus in ipso factum est. Octaua, rigor, febris inuasit. habebat autem non uelut oportebat, sed quantum etiam prioribus diebus quando febris non tenebat. Nona uero die reliquum relictum est, & ualde modicum pus cum sanguine subtus apparuit. & membrana cerebri pura erat. & somnus quidem occupabat. febris autem non dimittebat. Conuulsio uero manum sinistram inuadebat. Nam in dextris magis ulcus habebat. Cyrenius in Omilo suppuratus factus, infernum uentrem uetus est, triginta diebus serius quam oportebat. & mansuete se habebat, & reficcatum est pus in uentre. Verum in calidissimo tempore edens fructus pomorum, & alios cibos non cōferentes, à febre correptus est, & à uentris profluuio. & mortuus est. Hecafon in Omilo, uelut etiam alter serius uetus est, attamen reficcatus est uenter, modico excepto. Dysenteria uero arripiebat ipsum, quā ubi effugisset, omnia edebat donec totus intumuit, & erupit ipsi pus deorsum, & uentris profluuio mortuus est. Hecafon in Omilo, ab immundicia non purgata, & à praua purgatione, dolorem acutum in coxa habebat. & hic quidem discessit, successerunt autem ipsi febres. & multo tempore in lecto decumbebat, neque bibens quicquam, neque sitiens. & debilis, & horridus. Huic commode quidem abiatu est morbus uelut conueniebat. Opem autem percipiebat ex his quae offerebantur. Tandem uero erupit morbus deorsum, & totus secessit prae multa bile, & mente motus est, & mortuus. Videbatur autem morbum euasurus esse. Qui in Salamine in anchoram incidit, in uentrem fauciatus est, & circumcirca dolebat. Bibit autem pharmacum, & non egessit deorsum, neque reuomit. Mulier quae iugulauit seipsam, suffocabatur: & datum est ipsi longe postea pharmacum deorsum purgans, & post secessum ipsi exiit. Qui ex Euboea uenit adolescens, quum multum esset deorsum purgatus, intermissione facta quietus febricitauit. Deinde quum putaret se purgatione sursum uersum opus habere, non ualidam radicem ueratri bibit, & post potionem quarta die mortuus est, nihil expurgatus. Verum somnus ipsum tenebat, & sitis sedari non poterat. Serua illa cui à catapotio sursum quidem pauca prodibant, ac suffocabant: deorsum uero multa, nocte mortua est. Erat autem barbara. Quidam homo Euboeus potu pharmaco deorsum purgante, per tres dies purgabatur, & mortuus est. Habebat autem manum suppuratam usque ad cubitum. Symmachi filius à bile suffocabatur, noctu quum dormiret, & febris eum teneret. Pharmacum autem ubi bibisset, non continuit, neque purgatus est diebus sex antequam moreretur. Qui iuxta curriculum habitabat, quum noctu sanguinem uomuisset, postredie mortuus est, sanguinem uomens multum, & strangulatus. Ad splenem uero, & deorsum multus sanguis ipsi prodibat. Puer à mulo percussus uentrem & hepatis, mortuus est quarta die. Spiritum autem densum habebat, & non intelligebat quicquam. & febris tenebat. Hermophili filius aegrotabat diebus undecim. Febris autem tenebat, & cibi non deorsum prodibant. & primum quidem delirauit, nocte uero cessauit. Sequenti autem die uoce destitutus iacebat

cebat stertens, distortos habens oculos, febricitans. Penna uero immissa uocauit bilem atram, & quum infusum per clysterem immissum esset, stercus prodijt multum. Seruæ Aristionis pes sua sponte marcore corruptus obtorpuit, iuxta medium pedis intrinsecus ex obliquo: & ossa putrida facta abscesserunt, & prodibant paulatim fistulosa. & uentris profluuiū succedebat, & mortua est. Mulier sana, crassa, à catapotio conceptus gratia accepto, dolorem habebat uentris, & tormen in intestino, et intumuit. Spiritus autem sistebatur, & desperatio erat cum dolore, & sanguinem uomuit non multum. & emortua est quinquies, ut uita decessisse putaretur. & neq̄ uomitu factō ab aqua frigida laxabatur, neque dolor præsens, neque spiratio. Superfusæ uero sunt ipsi aquæ frigide amphoræ circiter triginta super corpus. & sanè hoc solum prodesse uidebatur. & postea deorsum processit bilis multa. Quum autem dolor obtineret, nihil poterat secedere, & uixit. Antander à catapotio accepto, cætera sanus erat. Verum circa uesticam dolorem habere uidebatur, purgauit ipsam celeriter multo purgamento. & à meridie dolor tenebat fortis ualde. & in posteram diem strangulatio, & desperatio, & iactatio. & uomebat, & nihil per fecessum egerat. & noctu patiebatur, & somnus non accedebat, postridie uero egerat multum, & postea sanguinem, & mortuus est. Athenadē puero masculo à Phagedæna ulcere corrosio, doluit à sinistra parte dens infernus, à dextra supernus. Huius auris dextera suppurata est, dum non amplius doleret.

Sutor in Pityo dum soles ueteramentarias fueret pupugit seipsum supra genu in femur, & ferme longum digitum immerfit. Huic sanguis quidem nullus effluxit. Vulnus autem cito clausum est, femur autem totum in tumore eleuabatur, & procedebat hic tumor usq̄ ad inguen & lateris mollitudinem. Hic tertia die mortuus est. Quidā iuxta inguen sagitta percussus, quē nos uidimus, maxime præter omnem opinionem seruatus est. Neq̄ enim cuspis exempta est, erat enim ualde in profundo: neq̄ sanguinis eruptio ulla memorabilis fiebat: neq̄ inflammatio: neq̄ claudicauit. Cæterum cuspidem inuenimus nos, ipsamq̄ exeminus, quū sex iam essent anni, ex quo fauciatu erat. Suspicio autem erat hæc, inter medios neruos cuspidem occultatā fuisse, nullamq̄ uenam aut arteriam dissectam esse. Qui percussus est spiculo acuto retrorsum paulo infra collum, uulnus quidem habebat nō memorabile aspectu, neq̄ enim in altum ferebatur, uerum non multo tēpore postea exempto spiculo, distendebatur in posteriorē partem tractus, uelut opisthotonici. & maxillæ ligatæ erāt. & si liquorem aliquem in os fumeret, eumq̄ deglutire conaretur, rursus relidebatur ad nares. Cæteraq̄ statim peiora fiebant, & secūda die mortuus est. Adolescens per asperam uiam cursu factō, dolebat pernam, maxime inferna parte. Abcessum autem locus accepit nullum, uelut qui colligeret humorē. Verum tertia die totus locus nigrescebat, usq̄ ad talum, astragalum appellatū, & usq̄ ad cavitatem quæ est ad pectus pedis, & quod denigratum erat nō diffringebatur, sed prius moriebatur. Viginti uero dies ex toto à cursu uixit. Qui ad oculum percussus est, percussus quidē est in palpebram, descendat autē cuspis ante fatis, barbæ uero summum supereminēbat. Secta palpebra, sublata sunt omnia. Nihil erat mali. Oculus enim permanfit, & compendio sanus factus est.

Sanguis

Sanguis autem effluxit large, & multa copia. Virgo illa pulchra Nerij filia, erat quidem annorum uiginti, uerum à muliercula amica ludente, lata manu percussa est in sinciput. & tunc quidem uertigine capta est, & sine spiritu erat. & quum ad domum uenisset, statim febris uehemens corripiebat, & caput dolebat, & rubor circa faciem erat. Septima die circa aurem dextram pus processit graueolens, subrubrum, amplius cyatho, & uidebatur sibi melius habere, & alleuata est. Rursum augebatur febris, & in soporem deferebatur, & loqui non poterat. & faciei pars dextera trahebatur, & difficulter spirabat, & conuulsio ac tremor aderat, & lingua detinebatur. et oculus stupidus erat. Nona mortua est.

Cleomenis filius hyeme initio facto cibum auerfabatur, & eius fastidio contra febre uexabatur, & uomebat cibos ac pituitam, & per duos menses cibi fastidium durabat. Coco in spina gibbositus facta est ex phrenitide. Huic nulla medicamenti potio conferebat. Verum uinum nigrum, & panis eius, & balneorum abstinentia, & frictio, & lenis fons non cum multo fomento, sed piacide. Cuidam quæ circa uigesimalium ætatis annum, biberat pharmacum ad fetum perdendum, accidit dolor, uomitus biliosorum, multorum, pallidorum ac prasinorum. Quum bibisset, conuulsio tenebat, linguam comandebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum, & erat ei lingua magna, nigra. Oculorum autem alba, erant rubra. infomnis. Quarta mortua est ad noctem. Ori ganum potum, oculis, & dentibus malum est. Puella quæ de rupe cecidit, uoce destituta. iactatio aderat. & uomuit ad noctem sanguinem multum, quum ad sinistram aurem impegisset, amplius inde fluebat. Aquam mulsam difficulter deglutiebat. stertor, spiritus densus, uelut morientium. Venæ circa faciem distentæ, decubitus supinus, pedes tepidi, febris debilis, uocis interceptio. Septima uocem rupit, calores tenuiores tenebant, superstes mansit. Pythocles ægrotantibus aquam, & lac multa aqua ammixta dabat. Perniones percutiendi, & calefaciendi sunt pedes sic ut maxime excalefacias igne & aqua.

Oculis incommoda sunt, lenticula, fructus pomorum dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, & crura, & coxam, ex laboribus abortis, aquæ marinæ, aceti quæ calidum fomentum confert, ita ut uel aspergas, uel spongiam his imbutam adhibeas. Deligare uero oportet lanis succidis, & pellibus agninis. Fulsonibus inguina extuberant dura, & sine dolore, & circa pubem, & in collo, similia erant tubercula magna, febris ante decimum diem. Tussi uexabantur à rptionibus. Tertio mense autem quarto uenter colliquiuit. Calores successerunt, lingua sicca, sitis, egestiones deorsum malignæ, mortui sunt.

Qui lapide in caput percussus est à Macedone, & corruit. Tertia die uoce destitutus erat, anxietas, febris tenuis, pulsus non ualde in temporibus. Nihil omnino audiebat, neque sapiebat, non quietus, sed quarta mouebatur, humiditas circa frontem, & sub nasum, & usque ad mentum, & mortuus est. Eniastes in Delo iaculo iclus retro in latus, in sinistra parte, ulcus quidem sine dolore habuit. Tertia uero uentris dolor uehemens, non egerat. Infuso uero per clysterem immisso, stercus prodijt ad noctem. afflictio intermittebat. Sedes ad scortum extrabat. Quarta & ad pubem, & uentrem, dolor irruerat, quiete scire non poterat, biliosa uomuit abunde colorata. Oculi quales animi delicia

quium incidētium. Post quintum diem mortuus est. Calor quidā tenuis inerat. Ei qui hepar percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum per corpus diffusus est. oculi caui. anxietas. molestia. Mortuus est priusquam concio solueretur, quum sub diei exordium percussus fuisset. Polemarchi uxori hyeme anginosā, tumor sub gutturo, febris multa. uena secta est. cessauit suffocatio ex faucibus. febris comitabatur. Circa quintam genu dolor ac tumor finisfri. & circa cor uidebatur ipsi aliquid colligi. & respirabat uelut hi qui submersi fuerunt respirant. & ex pectore substrepebat, uelut qui concluso ore loquuntur. Engastrimythi quasi ex ventre loquentes Græcis appellati. Tale quiddam continebat. Circa septimam aut nonam ad noctem aluus deorsum prorupit, & multa liquida quæ mala putantur egressa. Ipsa uero uoce intercepta mortua est. Ventres subpurgare oportet in morbis, quū matura fuerint. infra quidē, ubi confidisse uideris. Signum habes, si neque anxij, aut capite grauati fuerint. & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes cessauerint. Surfum uero, in exacerbationibus. Tunc enim etiam sua sponte eleuantur, quum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactarint. Ex casu uulnerato cubito, ob corruptionem cubitus suppuratur. Quum autem iam maturus est, uiscosa sanies exprimitur. Velut etiam Cleogenisco, & Demarcho Aglaotelis filio. Similiter autem & ualde ex isdem pus nullum. Velut Aeschyleli filio contigit. Suppuratis autem plurimis horror & febris succedebat. Parmenisci filio furditas accidit. Contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana solum indita perurgare. & oleum infundere, aut netopū. Præcipere uero ut deambulare, mane surgeret, & uinum biberet album.

Aspasi uxori dolor dentis uehemens, & maxillæ in tumore eleuatae sunt. Quum uero castorium & piper collueret, opem sentiebat. Callimedontis puero contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, sectio uenæ brachij; & lini torrefacti cataplasma imponere subactum uino albo, & oleo imbutum, ita ut deligetur neq̄ calidum, neq̄ ualde coctum. Aut cum aqua mulsa coquatur foeni græci, aut ordei, aut tritici farina. Meffandro quum gingiua dolore corripere, & uehementer intumesceret, sectio uenæ brachij; & alumen Aegyptium in principio sedabat.

Hydropicum laboribus fatigari oportet, sudare, panem edere calidum, in oleo bibere, non multum lauare, & caput tepide. Vinum autem album & tenuē, & somnus auxiliatur. Bianti pugili quū natura uorax effet, contigit ut in affectiōes cholericas, bilis sursum ac deorsum ex eētis, delaberetur, ex carnis esu. Maxime uero ex porcinis carnib. crudioribus, & ex ebrietate uini odorati, & placentis ac dulcarijs ex melle, & cucumere pepone, & lacte, & polenta recēti. In æstate uero affectiōes cholericæ, & febres intermittētes. Timochari hyeme destillatio, maxime in nares, quū uenere ulus esset, resiccata sunt omnia. lafsirudo, calor successit, caput graue. sudor à capite multus. destuebat autē & per totum corpus. Erat autē etiam sanus sudare aduersus. Tertia die euasit sanus. Post canem febres fiebāt sudorosa: & nō perfrigeantur omnino post sudorē, sed rursus amplius incalecebant: & longæ, & leniter sine iudicatione, & nō ualde siticulosæ. paucis in septē & nouē diebus cessabāt. Vndecima & decima

cimaquarta, & decimasextima, & uigesima iudicabantur. Polycratem febris inuadebat, & sudor qualis præscriptus est. Purgatio à pharmaco deorsum facta est. & febris erat lenis. Rursus in temporibus sudores parui, et circa collū, ad uesperam. Deinde in totū, & rursus incaluit. Circa duodecimam & decimā quartam diem febris augetebeat, & secessus pauci, post purgationē sorbitionibus usus est. Circa decimāquintam uentris dolor circa iplenem, & lateris mollitudinem sinistram. Calidorū adhibitiones minus profuerunt, quā frigidorum. Quum autem leni ac molli per clysterē infuso usus esset, dolor cessauit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum indicem, & infernum os dextræ manus confregit. inflammatio successit, & marcor, & febris. Subpurgatus est moderate. Calores lenes, & dolores. de digito quid decidit. Post septimū diem, sanies exibat lenis, postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictum est opisthoronum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ cōsertæ, & ad collū rigida. Tertia uero die rotus cōuellebatur in posteriorem partem cum sudore. Sexta à prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepit. inflammatus est, & dolorosus erat. & ubi repositus est, & dolor remisit proficiscebatur ad agrum, rediens lumbos doluit, lauit, maxillæ ad noctem conferebantur, & opisthoronus aderat. Saliua spumosa uix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est.

Thrinon Damonis filius, habebat circa tibiarū malleolum ulcus, iuxta neruum sanè iam purum. huic à pharmaco corrosio contigit, ut opisthoronò more retur. Profectio in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculū sunt, dolores ad noctem. Tussis hyeme, maxime in austrinis, crassa & multa alba excreantibus, & febres succedebant leniter, & quinta die cessabant. Tussis autem circa quadraginta, uelut Hegesipoli. Eutychides ex cholericis affectionibus, in cruribus ad neruorum distentionē desinuit. una cum secessu deorsum. Bilem multam abunde coloratam uomuit ad tres dies ac noctes, ualdeque rubram, & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex potibus, neque ex cibis. & urinæ ac transitus deorsum suppressio multa. per uomituum fex mollis prodijt, & deorsum quoque erupit. Androphani uocis interceptio, ignorantia, delirium. His solutis supererat adhuc diu multis annis, & recidiue fiebant. Lingua uero per totum tempus permanebat sicca. & si non collutione uteretur, loqui non poterat, & plerumque erat ualde amara. Aliquando etiam dolor ad cor, quæ uenæ sectio soluit. Huic aquæ potus, aut aqua mulsæ contulit. Veratrum nigrum bibit, neque biliosum prodibat, sed modicum. Tandem hyeme decubuit, & mente motus est. & linguæ affectiones similes, calor tenuis. sine dolore. lingua decolor. Vox peripneumonica. de pectore stragula rejiciebat, & se educi iubebat. Nihil autem poterat clare loqui. Ad noctem mortuus est. Nicanoris affectio erat, quæ ad conuiuiū progredieretur timor, tibicinæ: quæ sub initium uocis tibiarū, in conuiuiu tibia canere audiuisset, præ timoribus turbationes. Vix se sufferre posse dixit, quum nox esset. Interdium uero audiens, nihil commouebatur. Talia comitabantur ipsum multo tempore. Daemones qui cum illo erat, cęcutire, & corpore exoluto esse sibi uidebatur: & non accelsisset sanè ad præruptū locū, neque trans pontē, neque minimi scrobis altitudinē transgredi poterat, sed per ipsum scrobē. Hæc per tempus aliquod ipsi affuerunt.

Phoenicis affectio ex oculo dextero talis quaedam erat, plerumque uelut fulgur elucere putabat. Quum autem non diu ipsum continuisset, dolor ad tempus dextrum instabat, & per totum caput ac collum. Caput intumescere retro ad uentricula, & distentio, & duricies circum tendines, & ubi caput commouere, aut dentes diducere conabatur, non poterat, ut qui ualde distendebatur. Vomitus ubi facti fuissent, praedictos dolores auertebant, & leniores faciebant. Sed & uenae sectio proderat, & uerari potio. eduxit autem uaria & omni gena, maxime uero praesina. Parmenisco etiam prius incidebant tristitia, & decedendi e uita cupiditas. Quandoque uero rursus laetitia. Cononis serua ex capitis dolore incipiente, mente mota est. clamor. querae multae. raro quies. Circa quadragesimum diem mortua est. Decem autem diebus ante mortem uoce destituta, & conuulsa fuit. Adolescens quidam multo meraco potro, supinus in habitaculo quodam dormiebat. Huic serpens Arges appellatus in os ingressus est, & sane quum sensisset, & loqui non posset, dentibus stridit, & serpentem deuorauit, & dolore magno renebatur. & manus praetensas adhibebat, uelur qui strangularetur, & iactabat se ipsum, & conuulsus mortuus est.

Timocharis seruus, ex atrabilarijs esse putatus, a talibus ac tor uiris, similiter mortuus est circa eandem diem. Nicolai filius circa solstitium hybernum ex potationibus horruit. ad noctem febris. postridie uomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum concio fori adhuc plena esset, sudor totius corporis. cessauit. Diopithis sorori in semitertiana, circa accessionem etiam cor grauius dolens, & concomitabatur etiam is dolor tota die. & huiusmodi cordis dolor etiam alijs similiter aderat. Verutamen sub pleiadis occasum, uis talia rariora fiebant. Epicharmi uxori antequam pareret, dysenteria erat. dolor uehemens. secessus recrementa, subcruenta, mucosa. Vbi peperisset, statim sanata est. Polemarchi uxori in morbo articulari, coxae dolor quidam uehemens. causa erat quod menses non prodirent. Vox intercipiebatur, per totam noctem usque ad meridiem. Audiebat autem & sapiebat, & per manum significabat, quod circa coxam esset dolor. Epicharmo circa pleiadum occasum, dolor humeri, & grauitas in brachium, anxietas, uomitus multi, aquae potus. Euphranoris filio pustula uelut culicum morsus, uerum modo dico tempore. postridie febricitauit. Siccitates multae post Faunium factae sunt, usque ad aequinoctium autumnale. Sub canem aestus magni, calidi uentri. Febris sudorifica. Tubercula iuxta aurem multis oborta sunt. Tychon in obsidione circa Datum, a catapulta percussus est in pectus. & paulo post rictus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquisse aliquid de spiculo in septo transuerso. Et quum ipsi uideretur, ad uesperam infusum per clysterem adhibuit, & pharmacum deorsum purgans dedit. Noctem primam transiegit moleste. Statim uero ubi dies illuxisset, & me dico, & alijs, melius habere uidebatur. Erat enim quietus, praedictio facta est, quod ubi conuulsio fieret, breui esset moriturus. Sequenti itaque nocte moleste habens, infomnis, plerumque in uentrem decumbens, tertia ex oriente die conuellebatur, & tunc mortuus est. Billo percusso in dorsum, spiritus multus per uulnus cum strepitu processit. sanguis erumperebat. Vbi uero medicamentum cruentis uulneribus destinatum adhibuit ac deligatum esset, sanatus

fanatus est. Contigit & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris, deinde os liuefactum est. mortuus est. Et Phania & Euergetæ filio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse discessit, & pus non comparuit. Aristippus in supernum uentrem uolenter ac grauiter sagittæ ictu petitus est. uentris dolor uehemens, & breui ardebat. deorium uero non egerebat. anxius erat. biliosa abunde colorata quum uomuisset, melius habere uidebatur. paulo post rursus dolores uehementes, & uenter uelut in uoluulis. calores. sitis. & in septem diebus mortuus est. Neapolis similiter percussus, eadem passus est: acri infuso per clysterem immisso, aluus deorium erupit. color per corpus diffusus est, tenuis, pallidus, niger. oculi ficci, stupore rigidij, intus conuersi, intuentes in corde. Metrodori filio ex dentis dolore, maxillæ marcor, & gingiuarum carnis superexcrecentia. Moderate suppuratus est. exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla. Mulieri in Abderis, carcinoma abortum est circa pectus. & per mammam fluebat sanies subcrueta. obstrata uero fluxione, mortua est. Plerique ex destillatione secundum dimidiam capitis partem dolebant. & humore secundum nares procedente febricitabant leniter. & in quinque diebus perfrigerabantur. Et quæ in partu congesta fuit, dolor circa pectus & latus factus est. excreationes purulentæ. Tabes constitit. febres per sex dies. Rursus alui profluuium. quies. febris. aluus adstricta est: & circa septimam diem mortua est. Anginosa quædam dextram manum & crus doluit. febris tenebat debilis. strangulatio tertia die remisit. quarta conuulsa, uoce destituta. stertor, dentium contritio, maxillarum rubor. Mortua est quinta aut sexta die. Signum circa manū subliuidum. Alia quoque in palato stertorosa. lingua sicca, peripneumonica. non desipiens mortua est. Et in Olyntho hydropicus, derepente uoce destitutus, desipiens per noctem ac diem, mortuus est.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS

BIS POPVLARIBVS LIB. VI. IANO CORN

nario Medico Physico interprete.



VIBVS CVMQUE ex abortu circa uterum, et tumoribus, ad capitis grauitatem conuertitur, & iuxta sinciput maxime dolores, & quicunq; alij ab uteris: his in octo aut decem mensibus ad coxam morbus definit. Acutum habentes caput, qui quidem ualidam habent ceruicem, robusti sunt tum alias, tum ossibus. Qui uero caput dolent, & aures fluentes habent: his palatum cauum est, & dentes inter se non è directo respondentes. Quibuscunq; os de palato discessit, his medius confidet natus. Quibus uero inde unde dentes prodeunt, his summus natus sinus fit. Puerorū elucescentiæ simul cum pubertate, in quibusdā mutationes habent etiam alias. In rhenem dolor grauis, quū implentur cibo, uomūt pituitam. Quum uero redūdarint dolores, aruginosa. & melius quidem habent. Soluuntur aut, quū cibus euacuati fuerint, arenulæque fuluæ sublident, & cruentum minuit, torpor femoris è directo, quiescere non cōducit. Sed exercitia, nō impleri,

iuuene

iuuenes ueratro purgare, poplitem secare, urinā cientibus purgare, attenuare, & mollire. Menses aquosis diu permanent. Quū uero non breui prodierint, intumescunt. In Cranone antiqui dolores frigidi, recentes autem calidi, ex sanguine uero plurimi, & quæ ex coxa, frigida sunt. Quæ ad rigores fortes progressa sunt, non ualde mitigantur, nisi prope uigorem. Ante rigorem urinarū suppressiones, si ex bonis fuerint, & alius egerat, & somni ad sint, fortassis autem & febris modus, fortassis etiam quæ ex lassitudinibus.

Abscessus non ualde, quibus rigores. Crurum effeminationes, ueluti si aut ante morbum iter fecisset, aut statim ex morbo: eo quod fortassis ex lassitudinibus in articulos abscessit, ex quo crurum effeminationes. Tubercula extra extuberantia, & acuta, & fastigiata, & æqualiter maturescētia, & non obdura, & deorsum uergentia, & non bifida, meliora: contraria uero, mala: & quanto plus contraria, pessima. Ferinum autumno, & oris uentriculi dolores, & horrores, & ara bilis. Circa initia exacerbationes considera, & in omni morbo, quale est ad uesperam exacerbari, & annus ad uesperam, & ascarides. Infantibus tussicula cum uentris turbatione, ac febre cōtinua, significat post iudicationem bimestri, in totum uigesima die, etiam tumores ad articulos. Si quidem infra umbilicum constiterint, in infernis articulis superna, bonum: si uero supra, non similiter morbū soluunt, nisi suppurata fuerint.

Quæ uero in humeris suppurātur tantillis, mustellæ cubito præditos, paruumque ac macilentum brachium habentes faciunt. Soluerit autem & ulcusculorum inferne eruptio, si non rotunda & profunda fuerint. Talia enim perniciosa etiam aliā sunt pueris. Soluerit itidem sanguis fluens. Magis autē in perfectioribus is apparet. Lachrymæ in acutis male habentibus, ultro neque quidem bonæ. Inuoluntarie uero defluentes, malæ. Quibus circūtenetur palpebra malum. Malus est etiam oculus inarescens, uelut spuma, & obscuratio oculorū mala est. Et squalliditas mala, & qui intrinsecus corrugatur, & rigētes, & qui uix conuertuntur, & qui intus conuersi sunt, & quæcunque alia omittuntur. Febres aliæ quidem mordaces sunt manui, aliæ lenes. Aliæ uero non quidem mordaces, uerum augescentes. Aliæ autem acutæ quidē, sed quæ à manu uincantur. Aliæ statim adurentes, aliæ semper debiles, siccæ. Aliæ falsuginosæ. Aliæ inflatæ, horrendi aspectus. Aliæ ad manum humectæ. Aliæ subcundæ ualde. Aliæ ualde pallidæ. Aliæ liuidæ. & alia id genus. Distentiones corporis, & articularum duricię, malum, & ipse dissolutus, & cōfractio nes articularum, malum. Oculi audacia delirij signum est, & oculorū deiectiones ac peruerfiones, malum.

SECTIO SECVNDA.

Dilatate, constringere, alia quidem, alia uero non. Humores alios quidem expellere, alios uero siccare, alios autem indere, & alia quidem parte, alia uero non. Attenuare, crassificare, corpus, cutē, carnes, & alia, & aliqua quidem, aliqua uero non. Leuigare, exasperare, indurare, mollire, alia quidem, alia non. Excitare, torpescere, & quæcunque alia huiuscemodi. Deuolare, subcedentia statim reuolare, renitentibus concedere. Alium humorem non prodeuntem ducere, prodeuntem uero simul effundere, operari simile, uelut dolor dolorem sedat. Dissimilia, si uergant sursum eleuata, inferne solueri

uere, & contraria per eadē: uelut est capitis purgatio, uenæ sectio, quando non temere detrahitur. Abscessus uelut glandularum tumores, signū quidem sunt earum partium quæ germina habent, sed & aliarum. Maxime uero circa uiscera. Maligni autem hi sunt. Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi; extra magni, intus parui: intus magni, extra parui: alius extendens, alius urgens: dupla intro reuocatio, uelut superinpirationibus, calidus, frigidus. Medela assiduarum oscitationum, spiratio longa. In non potantibus, & uix, spiratio breuis. E directo & laterum, et præcordiorū intentiones, & splenis eleuationes, & è naribus eruptiones, & aures è directo. Horū plurima etiam ad oculos. Verum igitur omnia: aut quæ quidem ex infernis fursum, è directo: qualia sunt quæ iuxta maxillas, aut circa oculū aut aurē; quæ uero ex supernis deorsum, non è directo: Atqui & anginosi rubores, & laterū dolores è directo. Aut etiā quæ infra hepar sunt ex supernis distributa, uelut in testes ac uarices: Consideranda sunt hæc quo, & unde, & propter quid. Venæ temporum non confidentes, neq; uiriditas splendida, si spiritus intus relinquatur, aut tussis sicca, non ferina: ut in articulos decumbat expectare oportet, è directo distentionum secundum uentrem ut plurimum. Habēt autem horum plurimi, & facies rubundas, & ex natura sunt modi albidioris, & de naribus sanguis nō erumpit, aut parum erumpit, & si quidem ex affusis intus relinquatur, paratus est abscessus. Sitis intus relicta, & oris resiccatio, & iniucunditas, & cibi fastidium, eodem modo, Febres autem non acutæ, eiusmodi sunt, uerum reuertentes. Quæ relinquuntur post iudicationem, reciduas facere solent. Primum itaq; splenis eleuationes, si non ad articulos finierint, aut sanguinis è naribus eruptio sit, aut dextra præcordij intensio: si non penetrauerint in urinam. Hæc enim est interceptio utrorumq; & recidiuæ horum merito fiunt.

Abscessus igitur horum facere oportet, si non fiant. Eos uero qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui uero non ualde, eos coadiuuare. Eos uero auertere, si omnino incommodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt: sin minus, si iam incipiunt. Quarantana sanguinis è naribus eruptiones ægre iudicant. Febres quæ una die intermittentes, altera supererigunt unā cum iudicatione, ex quinque ad septem circūcuius durant. Quæcumq; tertianæ naturam habent, his nox molesta ante exacerbationem: Quæ uero sequitur, tolerabilior plerumq; est. Tussis sicca parum irritantes à febre adurent, non pro ratione siticulosæ, neque linguæ torrefactæ, non feritate, sed spiritu. Constat id inde. Quum enim loquūtur, aut hiant, tunc tussiuunt: quum uero non, minime. Hoc autem in febris ex lasitu dinibus obortis maxime contingit. Nihil temere affirmandum, nihil committendū. Contraria paulatim facta accessione adhibenda sunt, & interquiescendū. Dolenti capitis partem posteriorem, recta uena in fronte secta profuit. Successiones præcordiorum ex qualibus qualia alterant, & ut scerum in inflammationum qualia possunt, siue ex hepate spleni, & uice uersa: & quæcumq; huiusmodi. Reuellere oportet, si non qua oppret repāt, si uero qua oportet, his oscula aperire oportet, qualiter singula reput. Latæ pustulæ nō ualde pruriginosæ sunt: Quales Simon habebat hyeme, qui ubi ad ignē inuogeretur, aut calida lauaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbi-

tror si quis calida fomēta adhibuisset, opem ferre potuisset. Quæcunq; concoqui oportet, conclusa esse conuenit. Contraria uero siccare, & aperta esse.

Oculorum fluxiones, si aliàs conducere uideatur, reuellere ad fauces conuenit. Et ubi eructatio conducit, & quæcunq; alia huiusmodi. Transitus apertos esse oportet, ueluti nares, & alia quibus opus est, & uelut opus est, & qualia, & qua parte, & quando, & quantum opus est: uelut sudores, et alia sanè omnia. In magnis malis facies si fuerit bona, bonū signum est. In paruis autem, cōtraria significans bonæ significationi, malum. Apud magnū Theatrum ubi mulier retro heroum, morbo regio superueniente, permanfit ipsi.

Apud Temenæ neptim ille nigricantis erat coloris. In Perintho genitura similis urina talis, quæ esset iudicatoria, etiam pectinis affectionum. Nam huiusmodi urinæ talia sanāt: quoniam neq; flatu multo, neq; stercore multo egresso euacuabantur. Non enim profecto magnū erat præcordium. Brasia cam septima die quis comedit, quū adhuc difficulter spiraret, postquam pecten emollitus est, recte spirans factus est. aluus ipsi expulit. De sanguine ferroso, quoniam in pauidis talis, aut in his qui uigilarunt: & siue malus, siue bonus.

Quibus splen deorsum uergit, pedes & manus, & genua calida sunt: nasus & aures semper frigida. Num propter hoc quod tenuis sanguis: Num & natura talem hi habent? Suppurationibus umbilicus terminus, quibus suppurationis uentres turbantur. Splen durus non superne, inferne, rotundus, laetus. Circa longus, tenuis longus. Minus capitis grauedine laborantibus.

Circa ægrotantē administratio, & de morbo interrogatio: quæ narrat qualia, quomodo accipiendi sermones: quæ ad ægrotantē, quæ ad præsentēs, quæ ad externos. Quod in calidiore, solidiore, in dextris: & nigri propterea, & uenæ extrinsecus, & multo biliosiores. Concretū est, cōpactum est citius: ubi motū est, desinit, & tardius augetur, & ad amplius tempus. Quod solidum factū est, & biliosius, & sanguinolētius est: Hic calidior est locus animalis.

SECTIO TERTIA.

Cutis raritas, uentris densitas: cutis constrictio, carniū incrementum: uentris torpor, uniuersorum confusio: ualorum immundicia, cerebri consumptio. Quapropter & caluities, instrumentorum attritio. Detractio cursum, luctus, quiete, multis celeribus deambulationibus, carne ouilla, maza cocta plerunq; panis modicus. Detractionis signum, eandem horam diei feruare, derepente enim trahitur. Remittito labores, aut destinet. Similiter enim totū concidit. Quum uero iam cōciderint, carnes suillas affatas exhibeto. Quū autem implentur, signū est, quod corpus rursus floridū sit. In exercitiis, uentris signum, sudor fluens guttatim, qui exit uelut ex canalibus: aut collapsio ex eleuatione. Mulier quam primū curauit in Cranone, splen ipsi magnus natura, febris ardens, rubicunda, spiritus, decima sudor plerunq; superne. Sed & infernè, decima quarta. Minus his qui ex capite grauedine ac raucedine laborant, ubi febre correpti fuerint, recidiuæ uelut puto fiunt. Quicquid superatur, non reuertitur. Ipsa enim maturatio, & iudicatio simul, & abscessus.

Quibusdam ubi uenere utuntur, uenter inflatur, uelut Damagoræ. Quibusdam uero in hoc strepitus, Arcefilao uero etiam intumescibat. Flatuositas simul causa est in his qui scapulas alarum modo eminentes habent. Sunt enim

enim flatuosi. Frigidum ualde, uenas rumpit, & tuſim mouet, uelut nix, glacies: & conſtringit, uelut ſunt eminentiæ oblongæ, & rotundæ, Plicera & Gongronæ, à ſatyrorum circa aures eminentijs, & arborum quarundam tuberculis appellatæ. Simul cauſa ſunt etiã duricies. Poſt mictionem concretio, pueris magis, num quod calidiores? Figuræ magis alleuantes, uelut qui ſarmenta manu necēbat & obtorquebat, præ doloribus decumbens, arrepta paxilli ſumma parte ſupra ſeipſum infixã, inhærebat, & melius habuit. Quem ex montano labore circa pontē ego uidi crura iactantē, altera tibia minime extenuabatur, femoribus autem ualde. Vring & genitura nõ ſupprimebantur. Quæcunq; laterum naturæ, ſcapulas alarum modo eminentes habent, propter cauſæ debilitatem, in deſtillationibus malignis, ſiue excretio fiat, ſiue non fiat, malum. Rigores incipiunt mulieribus quidē magis à lumbis, & per dorſum, & tunc ad caput. Sed & uiris poſteriore corporis parte magis quàm anteriore. Horremus enim magis exterioribus quàm interioribus corporis partibus, uelut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarior, Indicat autem pilus. A quibus autem alijs rigent, fortaſis ulceribus, incipiunt à uafiſ. Summa, ex natuitate, & cauſa, & plurimis rationibus, & paulatim in cognitionem uenientibus colligentem ac addiſcentem, an ſimilia ſint inter ſe, & an non ſimilia ſint inter ſe: quo ex diſſimilitudinibus ſimilitudo fiat una. Sic fanè fuerit uia. Sic etiã eorum quæ recte ſe habent probatio, et non recte ſe habentium redar gutio. Sanguinis ex naribus eruptio, aut ſubpallide nigricantibus, aut rubicundè pallentibus, aut ſubpallidis. Parum dimittentem craſſefacere oportet ſicco. Alijs uero minus craſſificatione opus eſt. Sicco autem opus eſt albo, uelut galla, alumen. Poſtquã uenere uti inceperint, aut hircire, ſanguis ipſis è naribus erumpit. In accēſibus aliq; quidē ſtrepitum edunt, uelut Arceſſus laus. Alij uero accēſſuri, horridi ſiunt ac rugoſi. Alij poſtquam accēſſerint, uentri inſtantur, uelut Damagoras. Mutationes cauendæ. Cibus modicus, non deſaſſari, non ſitire. Omnis attenuatio laxat cutem, deinde circumtenditur. Renutritio uice uerſa. Cutis confidentis corrugatio, renutritæ extēſio, Rugoſum, læue, utriuſq; ſignum: itemq; ſubbiſioſum & ſubrubrurum: Sic etiã deſtractas eſſe mammas, graciles autem ſurſum tractas eſſe & circūtenſas, etiã ſi quis non propterea putauerit id fieri, ſed in carnoſis. Clauiculæ conſpicuæ, uenæ pellucidæ. Herodicus febricitantes interficiebat circuitibus, luſcis, multis fomētis, mala eſt febriculofitas, inimica fami, luſcis, circuitibus, cur ſibus, frictioni: laborem labore. Ipſis uenarum rubor, liuor, pallor, laterum dolores molles. Non ſitire faciunt, continere os, tacere, uentrum cum potu frigidum inducere. Occaſiones unde ægrotare cœperint, conſiderare oportet, ſiue capitis fuerit dolor, ſiue auris, ſiue lateris. Signum ſunt dentes, & in quibusdam inguinum tumores. Vlcerã ſentia ac tubercula iudiciãtia febres. Quibus hæc non ſiunt, iudicatio ſublata eſt: Quibus intus relinquuntur, ceruiffimæ recidiuæ ac celerrimæ. Sputa rotunda delirium ſignificant, uelut in Pleno. Qui hæmorrhoidas habent, neq; pleuritide, neq; peripneumonia, neq; phagædena, neq; furunculis, neq; tuberculis terebinthi figuram habentibus corripuntur, fortaſis autem neq; lepris, fortaſis neq; uiriliginibus. Multum tamen intempeſtiue curati, talibus non tarde correpti ſunt, & ſic pernicioſæ

fuerunt: & quicumque alij abscessus, uelut fistulae, aliorum medela sunt. **De** cubitus humorum ad aliquem locum, in quibus factos affectus liberat, in his prius ipse factus, illos impedit. Alterius loci morbos loca excipientia, aut ob dolorem, aut ob grauitatem, aut propter aliud quiddam liberant, aut quod alij sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationem talia spuunt. Conuenit quibusdam sanguinem detrahare, tempestiue in talibus. In alijs autem uelut in his, non conuenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni, pleuritis, bilis.

SECTIO QUARTA.

Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidiua fit, pro ratione recidiuarum. Recidiua uero si ante, rursus intumescunt, & permanent, uelut febrium recidiuae in similibi circumsitu; his spes est ad articulos abscedere. Urina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lasitudinis febribus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si uero ultra hoc, etiam sanguis e naribus large eruperit, etiam ualde. Cui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est: erat quietior. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

Agasis filia quum esset puella densum spiritum habebat. Mulier autem facta, a partu non diu dolore correpta leuiter, magnum onus sustulit. & statim quidem in pectore aliquid crepuisse uisum fuit. Postera die & anhelationem habebat, & coxam dexteram dolebat. & quum haec doleret, tunc etiam anhelatio habebat: coxae uero dolore cessante, etiam anhelatio cessabat. Spuebat spumosa, ab initio uero florida. Vbi uero confidisset sputum, uomitui bilioso tenui simile erat. Dolores maxime erant quum manu laboraret. Hanc ab alio arcere uisum fuit, porroque, ac ouicula, & boue. In rebus autem agendis, a clamore, & ex candescencia. Cui in capite tumor depascendo proferpebat, ei primum alumen ustum profuit. Habuit alium abscessum, forte quod os abscessurum esset. Abscessit sexagesima die supra aurem, sursum ad uerticem uulnus erat.

Intestina crassa habet, qualia sunt canis, uerum maiora. Dependent autem ex medianis membranis, Mesocolis hac parte appellatis. Haec uero ex nervis, de spina, sub uentrem. Aegrotantibus gratificationes, uelut est pure prae parare potus ac cibos, & ea quae uidet: molliter ea quae contingit. Aliae gratificationes, quae non magnopere laedunt, aut facile reparari possunt, uelut frigidida, ubi hac opus est. Aliae gratificationes sunt, introitus, sermones, habitus, uestitus aegrotanti, tonsura, ungues, odores. Aqua decocta partim ut aerem admittat, partim ut uas non plenum sit, & operculum habeat. Quod ex sanguinis eruptionibus, aqua inter cutem corripuntur. Si qualia oportet purgari, purgentur, facile ferunt. In Aeno legumina comedentes alsidue, feminae, mares, crurum impotentes facti sunt, & permanferunt. Sed & eruum comedentes, genuum dolores habebant. Palam uigilans calidior externis partibus, frigidior autem internis. Dormiens uice uersa. Calidae naturae frigiditas, potus aqua, quiescere, somnus in frigore, contacto, somnus sedentium, erectorum nictatio. Debiles uictus, frigidi: robusti uero calidii. Aquarum arte non prae paratarum, quae quidem ab aethere excreta est, aut cum tonitruo, aestiua: procellosa uero mala. Aqua uorax, uigilia uorax. Percali

Percalidam naturam calido tempore, in frigore cubile crassefacit: in calido attenuat. Exercitatio sanitatis, est uesci citra saturitatem, non refrigerare laborem. Inter uigilandum siti leui somnus medela est. Siti uero ex somno, uigilia in quibusdam. Quibus plurimus calor est, maxima uoce prædicti sunt. Nam & plurimus est frigidus aer. Ex duobus autem magnis, magna etiam quæ generantur existunt. Ventriculo calidi, carne frigidi & tenues, hi eminentes uenas habent, & iracundiores sunt. Terra siccitatibus squalida, uolucrum genus abundat. Hircire incipiens, uter testis extra apparuerit, si quidem dexter, masculum: si uero sinister, femellam portendit. Oculi prout ualidi fuerint, ita etiam corpus: Sed & color in peius aut melius uergit. Iustum est autem, prout se habuerit alimentum, ita & quod forinsecus est sequi. Signa lethalia, per cutem, nares, calidus uapor: ubi prius nares frigidum spiritum emiserunt. Signa uero uitalia, contraria sunt.

Labores cibos precedant.

SECTIO QVINTA.

MOrborum naturæ medici. Inuenit natura ipsa sibi ipsi aggressiones, non ex præmeditato, partim uelut est nictare, partim uero & ea quæ lingua subministrat, & quæcunq; alia huiuscemodi, non edocta natura, & nullo magistro usa, ea quibus opus est facit. Lachrymæ, narium humiditas, steruationes, auris sordes, oris saluæeductio, spiritus introitus, exitus, oscitatio, tussis, singultus, non eiusdem omnino modi. Urinæ secessus, & flatus, & huius alterius, alimenti, & transpirationis, & ea quæ feminis solis adsunt, & in reliquo corpore sudores, pruritus, corporis distentiones cum oscitatione, & quæcunq; huiuscemodi. Hominis anima semper producitur usq; ad mortem. Si uero efferbuerit, unâ cum morbo etiam anima corpus depascitur.

Morbi connutriti, in senectâ, & per concoctionem, & per solutionem, & per rarefactionem desinunt. Sanatio, contra sentientem non consentiæ affectioni. Frigidum & auxiliatur, & occidit quæcunque ex calido sunt.

Excandescentiâ retrahit cor & pulmonem in seipsa: & ad caput calida ac humidum. Lætiâ uero relaxat cor. Labor articulis & carnibus: cibus, somnus, uisceribus. Animæ deambulatio est cura hominibus. In uulneribus sanguis concurrit, opitulandum igitur ut uacuum expleatur. Si auris doleat, lana digito obuoluta oleum calidum instillato. Deinde lanam intus in uulam manus positam, sub aurem subdito, ut aliquid ipsi extisse uideatur, postea in ignem immitto. Dolus. Lingua urinam significat. Lingua uirides cum pallore biliosa, biliosum autem à pingui: Rubicundæ uero à sanguine. Nigræ ab atra bile. Sicca à fuliginoso ardore, & uterina parte. Albæ uero à pituita. Urina concolor cibo, & potui, & qualis intrus est humidi colligatio.

Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: quapropter per hanc humores cognoscimus. Si salsa carnes gustanti, redundantiæ signum. Si mammarum papillæ, & rubor pallidus fuerit, morbosum uteri uas est. Hominibus sordes in auribus, dulcis quidem lethalis, amara uero non. Terram mutare commodum est in longis morbis. De biliores cibi breuem uitam habent. In fluxionibus ad coxam, uenas retrò

aures secato. Coitus morbis ex pituita commodus. Calido uentriculo præditos, fortes potus ac cibi perturbant. Atra bilis uelut similis est hæmorrhoids. Augescentes morbos coitus. Frigiditas ea quæ in uentre sunt indurat. Coitus ea quæ in uentre sunt indurat. Eum qui ueratrum bibit, si citius purgare uolueris, lauare oportet aut comedere. Sanguis in somno intro magis fugit. Rigor à superiore uentre, febris ab inferiore magis. Attractio, pulmo, siccus ardor: Superuacuatum siccit & somnus multus. Frigidissimus cibus, lentes, milium, cucurbitæ. Vcera exoriantur si quis dum impurgatus est laborauerit. Mulier, capra, elaterium aut cucumerem syluestrem comedentes, pueris purgatio. Calido corpori, id quod comedit, intrinsecus frigiditas est, forinsecus autem dolor à sole, igne, uel fætu, in tempore æstiuo. Contrario uero cõtrario modo. Cibi partim celeriter superantur, partim tarde.

SECTIO SEXTA.

Carnes attractrices, & ex uentre, & extrinsecus. Indicio est sensus ipse, quod expirabile ac inspirabile est totum corpus. Calidissima uenula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est exerit, & statim secerit. Et quibus quidem pingue, bilis flaua: quibus autè sanguis, atra. Mentis, memoria, olfactus, aliorum etiam famis instrumentorum exercitatio. Labores, cibi, potus, somnus, res ueneræ, omnia mediocria. Frigidior in frigido tempore ac regione calidior erit. In doloribus proximum uentrem purgato, sanguinis autem uentrem secato. Vstio, sectio, calefactio, perfrigeratio, steruationes, plantarum succi, in quibus uim habent, & cyceonis mixtura. Masticorum autem lac, allium, uinum feruefactum, acetum, sal. Homo ex lassitudinibus ex itinere, imbecillus, grauatus, expuit. Tussiuit enim ex uertice: febris acuta, ad manum submordens. Secunda die capitis grauitas, lingua combusta fuit, naris unguibus conscalpta sanguinem non effudit. Sinister splen magnus & durus dolebat. A quartana correpti, à magno morbo non corripuntur, Si uero corripantur prius, & succedat quartana, liberantur.

Pro qualibus qui morbi. Bilis fit, uelut de uulneribus dixi, quod fit biliosa. Caliditas acrimoniae signum est. Turbationes, transitus. Nam mente moris dolores laterum desinunt: quibusdam & febres, quibusdam non, Sed cum sudoribus. quibusdam autem cum turbatione. quibusdam uero cutis arida & circumtenisa ac saluginosa. Torpefactiones quales ex qualibus, & quales illi cui coxa. Per aures, ex auribus, plerumque tertio die moriuntur. Quibus cutes circumtenduntur arida ac dura, sine sudore: quibus laxæ sunt ac raræ, cum sudore moriuntur. In recidiuis mutationes profunt. His transmutare oportet ad ea quæ conueniunt, antea quam male afficiantur, uelut Cherioni. Quæ iritantur ex qualibus, stridulae faucium asperitates terminum præscribunt. Quibus quidem id quod sanum est relinquatur, causa deorsum submissa, eos aut purgato, aut deligato, aut eijcito, aut reseccato, aut exurito. Quibus uero non, non. Quibus sanguis multus fluit ex naribus, qui quidem decolores mero modo sunt, his parum prodest. Quibus uero colores rubicundi, non similiter. Et quibus capita sunt quæ facile to-

lerant

lerant, prodest: Quibus fecus, non. Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior ac copiosior, hi morbosius sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo, uice uersa. Sputa rotunda, mentem emouent, uelut illi in Plinthio. Huic sanguis ex sinistra nare erupit, & solutus est quinto die. Versina multam subfidentiam habens, à mentis emotione liberat, qualis erat Desxippi. Post pilorum defluuium, quartana febris non ultra annū. Aurium eruptiones estate quinta die fiunt. Quandoque uero etiam diutius durant. Ita & circa gingiuas, & circa nares suppurationes. Quibus in dentium dolore, de supercilio tenuia descendunt, his à pipere probe affricio postredie crassiora descendunt, si etiam alia non obrinuerint. Nam Hegeippo sopori ferum inditum non obtinuit, sed magis & uiolentius insuper prouocauit.

Ossium naturam ex capite colligere oportet, deinde neruorum, & uenarum, & carniū, & aliorum humorum, & supernorum ac inferorum uentriaculorum, & mentis, & morum, & eorum quæ per annum fiunt, tempore quodam anni præcociore, uelut pustulæ & huiusmodi. Simile enim est his quæ quotidie citius aut serius accipiuntur. Similiter & biliosum, & sanguineum corpus atrabiliarium fit, si non habet euacuationes. Lycino postremū splen magnus dolorosus, in quarta aut quinta.

SECTIO SEPTIMA.

Tuisses cæperunt circa solstitia hyberna, decimaquinta aut uigesima die, ex frequenti australium & aequilonarium ac niuorum transmutatione. Ex his alia breuiores, alia diuturniores fiebant, & post has multæ peripneumonicae affectiones. Ante æquinoctium rursus plerisque reuertebantur, quadragesima ut plurimum ab initio die: & aliquibus sanè ualde breues ac iudicatu faciles erant, aliquibus autem fauces inflammatae sunt, quibusdam Anginae obortæ, quibusdam leues syderationes, alijs Nyctalopes, atque hi magis pueris. Verum peripneumonicae affectiones ualde breues erant. Faucium uero inflammationes post tussim, aut omnino parum pro tussi fiebant, atque hæc breues, magis autem Nyctalopes. Anginae uero & leues syderationes, aut duræ & siccae, aut paruae & raro matura educentes: quibusdam uero etiam ualde. Qui igitur aut uocibus amplius se fatigarunt, aut ringerunt, in anginas magis deserunt. Qui uero manibus laborarunt, manibus tantum syderati ac resoluti sunt. Qui uero equitauerunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labores cruribus perfecerunt, his ad lumbos aut crura impotentiæ resolutoriæ obortæ sunt, & ad femora ac tibias lassitudo ac dolor. Durissimæ autem & uiolentissimæ tusses erant quæ ad leuem syderationem ac resolutionem perducebant. Verum omnia hæc in recidiuis fiebant. In principijs uero non ita ualde. Plerisque autem horum tusses in medio remiserunt, sed perfecte non defecerunt, uerum cum recidiua affuerunt.

Quibus uoces frangebantur ad tussim, horum plurimi ne febricitarunt quidem, Quidam uero parum. Sed neque peripneumonicae affectiones ulli horum fiebant, neque leues syderationes, neque ullus alius morbus de se significationem præbuit, sed in sola uoce iudicabantur. At uero Nyctalopicae affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex alijs causis fiebant. Fiebant autem

pueris maxime. Oculorum autem nigrae partes aliquantum variegabantur, quae pupillas paruas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat. Et magnos magis quam paruos oculos habebat, & plurimi rectos capillos ac nigros. Carterum mulieres non similiter à tursi afflictae sunt. Verù paucae febricitarunt, & ex his ualde paucae ad peripneumoniam affectionem deueniunt, atque hae seniores, & omnes superstites euaserunt. Causabar autem hoc fieri, eo quod non similiter uelut uiri prodirent, & quod nequaquam similiter ut uiri morbis corripiuntur. At Anginae hiberis duabus oboriebantur, atque hae mansuetissimi moris erant: abundantius autem famulas corripiebant, quibus & uiolentissimae fiebant, ipsasque celerrime perimebant. Viris uero multis fiebant, qui partim euaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutire non poterat, his ualde mites ac toleratu faciles erant. Qui uero etiam in super obscure loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus uero etiam uenae circa tempora & ceruicem attondebantur, his aliquantum malse erant. Pelsimae uero his quibus & spiritus sublimis coeleuabatur. Hic enim etiam incallescabant. Nam sicut scriptum est, ita cõfortia affectionum habebant. Et quae quidem primum scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant.

Quae uero posterius, non sine prioribus. Celerrime autem moriebantur, ubi febrili rigore in super riguissent. His ita praesens nihil memorabile proderat, non uentris turbatio, non uenae sectio, neque quaecumque alia tentauit. Secui enim uenam sub lingua, quosdam & sursum purgavi. Haec igitur omnino in aestate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multae, & potissimum in siccitatibus sippitudines dolorosae populariter grassabantur. Sanguinis uenarum suppressiones faciunt animi deliquium, figura alterata, interceptio, linamentum intortum, appositio, deligatio. Inguinum glandularumque tumoris plurimi fiebat, eo quod heparitis affecta esset. Erat autem & ab arteria male affecta malum signum, ueluti Posidoniae. Quibus sanguis erumpebat, morientes fronte non exudarunt, sed uelut contracti praesiccitate erant. Et anhelosi, ac cum sudoribus pereuntes, male habebant. Ventrium abundantiae turbationem ferunt, uelut Posidoniae: & quae animalcula in aluo inducunt. In attenuatione circumtentio ante obitum, & umbilicus oblongus ipsi protractus est: & ginguarum dentes ambientium exulcerationes.

Multa de unoquoque recte praecipari possunt, quae partim eadem possunt, partim non: uelut est talia diffundi, exolui, & educi, & indurari, & maturari, & ubi mutatione opus est, de lecto propellere timidos, & torpentes excitare ad ea quae relinquunt. Hydropticus citius secare oportet, tabescetes statim uerere, caput secare, & huiusmodi. Hydropticorum pestinem ne contingito, neque internas partes. Simile est enim multis generibus. Affectiones circa cor siue uentriculi osculum Xenarcho, & calidum acuatim expirare, & uelut per euacuationem ab initio fouere. Vox qualis est iraculentibus, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit, & oculi tales fuerint ex natura turbulenti, quales sunt, ubi irascuntur hi qui tales non sunt. Et alia iuxta morborum rationem, uelut uerbi causa, Morbus tabidam speciem inducit, si talis ex natura aeger fuerit, ex tali morbo superstites euadet: & alia eodem modo. Tuse

ses laborioſæ contingunt locos læſos, & maxime articulos. Sed & in febris laſitudinem inducentibus, tuſſes ficcæ ad articulos decumbunt cum febre, ſi intus relinquuntur. Spiritus tabeſcentibus obſcuro mali, & non parientiſſimus, & quicumq; alij tales ab eadem conſtitutione. Tabeſcentibus autem minus malus. Malum item uer, quum ſici folia cornicis pedibus ſimilia fuerint.

In Perintho uere plurimi ægrotarunt. Simul cauſa fuit tuſſis per hyemem populariter uagata, & alijs quicumq; diuturni ſunt morbi. Nam & in ambiguis conſirmati ſunt. Quibusdam uero diuturni non ſunt oborti, uelut his qui doſores rhenales habent. Sed & alijs, uelut homo ille ad quem Cyniſcus me adduxit. Dolorum in lateribus, & pectore, & alijs partibus, tempora an multum differant conſiderandum eſt. Nam quum melius habuerint, rursus deterius habebunt, non delinquentes. In longis dyſenterijs cibi faſtidia mala, tum aliàs, tum ſi inſuper febrerint. Vlcera circumglabra maligna ſunt.

Lumbos dolenti reſcurſus ad latus, & puſtulæ quæ ſeps uocantur. Rhe num affectiones non uidi ſanatas ſupra quinquageſimum annum. Quæ in ſomnis exacerbantur, & quibus extremæ partes perfrigerantur, & mens turbatur, & alia quæ circa ſomnum ſiunt eiſmodi: & quibus contraria. Quibus nihil intra conſtitutum tempus accidit, ſingulis partus uirtuales ſiunt.

Apparentia in quibus menſibus ſiunt. Labores in circuitibus, quicquid in ſeptuaginta mouetur, in triplicitate perficitur: & quicquid in nonaginta mouetur, in triplicitate perficitur. Poſt menſes, dextera & ſiniſtra hiant.

Humiditas per prodeuntia, diætã ſicca opus habet. Quod citius diſcretum ac motum eſt, rursus augetur tardius, & ad longius tempus. Labores tertio, quinto, ſeptimo, nono menſe: & ſecundo ac quarto.

Hæc ex parua tabula conſideranda ſunt.

Victus ratio ſit repletionem, uacuationem, ciborum, potuũ. Mutationes horũ qualia ex qualibus, prout ſe habent. Odores delectantes, offendentes, impletes, placantes. Mutationes ex qualibus, prout ſe habent. Illabentes, inſgreſſos aut egreſſos ſpiritus, aut etiam corpora. Sermones qui audiuntur, alij meliores, alij offendentes. Et à lingua ex qualibus qualia alliciuntur.

Spiritus, tanta caliditas, frigiditas, craſſities, tenuitas, ſiccitas, humiditas, plenus, imminutus et copioſior, à quibus mutationes, quales ex qualibus, prout ſe habet. Continetia, aut cõtenta, aut intus permeantia corpora. Sermonibus, ſilentio, dicere quæ uult, ſermonibus quibus dicit, an magni aut multũ, ueri aut ficti. Prodeuntia & egreſſa noſſe oportet, unde cœperunt: aut ubi deſiuerunt, aut quantum diuulſa ſunt, itemq; colores, in quibus aut caliditatem, aut ſalſuginem, aut dulcedinem, aut tenuitatẽ, aut craſſiciem, equaliter aut inæqualiter, corpus, tempus: Mutationes quales ex qualibus habet. In cœpit eructationem, non obtinuit. Lachrymæ uolenti, nolenti, multæ, paucæ, calidæ, frigidæ, craſſities, ſapor. Sputum an per ſe excreat, aut tuſſiendo reſiciat, itemq; uomitum. Solis calor, frigus, humectatio, ſiccitas: Mutatio per qualia, ex qualibus, ad qualia ſe habet. Labores, ocia, ſomni, uigilia.

Quæ in ſomno ſiunt, inſomnia, cubilia, & in quibus, & ex quibus. Mentis intelligentia ipſa per ſeipſam, citra instrumenta ac negotia, triſtatur, læta-

tur, timet, confidit, sperat, desperat: uelut Hippothoi domestica famula mentis suae per seipsam gnara erat, & quae in morbo acciderant sciebat. Aetatem ab aetate discernere oportet, & an prius aut posterius quam conuenit, quid fiat, ueluti si resolutus est hyeme, & seni aetate, aut infanti, & aetate aut prius, aut posterius quam conuenit. Dentium emissiones, pilorum productiones, genitura magis & minus, pilorum augmentum, crassitudo, robur, imminutio, quod cognatum est, & quod per seipsum, quanto magis & minus. Anni tempus, in quo & citius aut ferius. Tempus in quo factum est, pluuiosum aut siccum, frigidum aut calidum, sine uentis aut cum uentis, & qualibus uentis.

Temporis in principio, aut medio, aut fine, aut semper, praeterito aut praesente. Morbi tempus & hora, accidentia, circuitus, & ex circuitibus maiores, & per amplius tempus: incrementa, & totius morbi incrementum, remissio, uigor, & magis & minus perficiens, & quando, & qualiter, & in quali hora ac aetate.

Populariter grassantium morborum modi, & si quis ex incipientibus inceperit sine uomitu, ueluti aut ubi biberunt quid continentes, aut parum purgati. Febriculosi fortassis ualde candidi, quorum etiam labia, qualis modus, tempora. Corpus, actio, in considerationem ducatur. Visus, auditus, natus, tactus, lingua, cogitatio consideretur. Tumores in superioribus palpebris relictis, dum alia circum circa gracilescent, reciduias faciunt: In extremitate uero subrubicundi, duri, & ualde uiscofi, & insurgentes ac inhaerentes in his sunt, uelut Pharsalio Polymedi. Erumpentes tumores aut liuores, in lippitudinibus aut ulceribus: Sed & quae deferuntur ex tuberculis ac purificationibus, quia signa sunt. Circa messem tormina circa umbilicum, & doiores, quandoque à porro: Sed & ab alio his postea. Sacri ignes quibusdam à collo, & circa has partes, in facie iudicabuntur: Nigri etiam quibusdam à collo, mali erant: & si pustulae essent, male erant: & quibus alius turbata esset.

Adamantus arrabiliaris à peplis pluribus uomuit aliquando nigra, quandoque à cepis. Febres in quibus ulcerantur labia, fortassis intermittentes: & tertianis perfrigerationes. At amburentes statim ad manum soluuntur semper.

Quale inest in articulis considerandum, an non suppurantur. Consuetudo autem, ex qualibus sani degimus, uictus modis, tegumentis, laboribus, somnis, rebus ueneris, mentis affectionibus. Quomodo morbos ferant, à quibus quae figurae, ad quos locos conuersi sunt, quando ceperunt, affuerunt, desuerunt. In quibus intemperans horridus. Contrarie in morbo uictus rationes, qui facile, qui aegre toleratur. Uictus rationes quantum fieri potest cognoscendae. Nam non nosse, multarum calamitatum res est. Bonis autem medicis similitudines pariunt errores ac difficultates. Verum contraria facit causa & occasio. Scio quod difficile est ratiocinari ac cognoscere uias, ueluti si sit acuto capite, simus, subaridus, biliosus, aegre uomens, facile uomens, niger, iuuenis qui temere uitam degit: Haec simul inter se consentire difficile est. Cui fistula refringebatur, tulsiculae permanere impediebant.

Cui apex hepatis complicatus erat, cum concussis, repente dolor sedatus est. Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex uocabatur, hic quum annorum uiginti quinque esset, saepe per somnum semen effudit: & interdum quoque frequenter ipsi prodibat.

Quum autem ad annum

trigesimū peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est. In Abderis palæstræ custos, qui Scheneus dicebatur, multum luctatus aduersus fortiorem, & in caput lapsus, digressus multam bibit frigidam aquam. Postea illa nocte uigiliæ obortæ sunt, angustia, & extremarum partium frigiditates. Postridie ingressus ad domum, & glandula aluo subdita, non subijt, uerum parū minxit, prius aut nihil minxerat: ad noctē lauit, nihilo minus uigiliæ et angustia aderat, delira uit. Tertia die frigiditas extremarū partiū, ex calefactus sudauit, porta aut aqua multa tertia die mortuus est. Atrabiliarij, etiam comitali morbo corripi plerunq; solent, & uicissim comitales fieri solent atrabiliarij. Vterq; uero morbus magis fit, prout ad alteram partem inclinari. Si quidem enim ad corpus inclinari, comitales fiunt. Si uero ad animum, atrabiliarij melancholici dicti.

In Abderis Phaethusa Pythæa uxor, priore quidem tempore fecunda erat: quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses multo tempore suppressi sunt. postea dolores & rubores ad articulos oborti sunt. Hæc autem ubi contigissent, & corpus uirile factum est, & hirsuta penitus euasit. & barbâ produxit, & uox aspera facta est. Et quum nos omnia tentassemus, quæ ad menses detrahendos conferre uisa essent, non prodierunt, sed mortua est, quæ non ita multo tempore postea uixisset. Idem hoc contigit etiam Namythæ Gorgippi uxori in Thaso. Visum est autem omnibus medicis, in quos sanè ego incidit, unam spem esse, si menses secundū naturam prodirent. Verū & huic prolici non potuerunt omnia nobis molientibus, sed paulo postea mortua est.

HIPPOCRATIS COI DE MOR

BIS POPVLARIBVS LIB. VII. IANO COR

nario Medico Physico interprete.



POST canem febris fiebat sudorifica, & non perfrigerabatur penitus post sudorem, sed rursus incalecebat: & leniter longa, & iudicatu difficilis, & non ualde siticulosa. paucis in septimo & nono desinebat, alijs undecimo, & decimo quarto, & decimo septimo. Polyerati febris, & sudor, qualis descriptus est, à medicamento purgatio deorsum uehementer, & febris adeo lenis facta est, ut obscura cōsisteret, præterquam in temporibus. & sudores ad uesperam, circa caput, collum, pectus. Deinde rursus etiam per totum uentrem, & rursus incalecebat. At circa duodecimum & decimum quartum febris aucta est, & modicæ alui subgestiones. post purgationem usus est forbitioibus. Circa decimum quintum dolores uentris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem. Calidorum appositio minus profuit quàm frigidorum. Quum infuso per clysterem molli usus, esset, cessauit dolor. Idem quoq; Cleocydi profuit, ad dolorem similiter habentem, itemq; febrim. Circa decimā sextam calores leniores esse uidebantur, & egestiones bilis meracæ, & animus audacior. spiritus aut moderatus. Quandoque uero aceruatim attractum, rursus aceruatim expirabant, uelut præ animi deliquio, aut uelut in umbra desidens respirare solet, is qui per æstum iter fecit. Decimā septima itaq; die desidēs in fellam, animi deliquiū incidit, & multo

tempore

tempore sine uoce ac sensu iacebat, & uix aquam mulsam suscipiebat, fibras in collo distendens, ut pote faucibus resiccatis, ac omni uirium exolutione praesente. Vix itaque intra seipsum erat, & calores leniores fiebant. Postea uero desinit morbus uigesima secunda die. Pythodoro eodem tempore febris continua, octaua die sudor obortus est, & rursus incallescerebat. Decima rursus sudor, duodecima forbiuit succum, & usque ad decimam quartam obscura erat, in temporibus autem comparebat, & sine siti erat, & ipse sibipsum sanus esse uidebatur. Sudores fiebant omni die. Decima quinta iusculum pulli forbes uomuit bilem, & aluus infra exturbata est, & febris exacerbata est, rursus desinit, & sudores fiebant multi, & corpus totum perfrigeratum erat, exceptis temporibus. Pulsus non defecit. Videbatur quiesuisse modico tempore ut incallescere se putaret. Vigesima quarta quum iam gustaret cibos multis diebus, & pransus esset, multa erat febris, & ad uesperam delirium, accedente simul etiam somno. Detinebat itaque iam continua & uehemens, & quandoque unam, quandoque duas noctes uigilabat. reliquo uero tempore somnus abunde contingebat, ut operosum esset excitare, & delirium in somno, & si quando ex somno excitatus esset, uix ipse suspensus erat. Sitis exors. Spiritus moderatus, talis aliquando, qualis Polycrati. Lingua non decolor. Post septimam recidua succi exhibebantur. post decimam quartam cibus. Circa primos septem eructabat, ac reuomebat: quandoque cum potu subbiliosum, circa anxietate, donec aluus deorsum soluta est. Sudores post recidiam defecerunt, nisi quis circa frontem esset tantillus ut uix significatione de se praberet. lingua ex somno si non collueretur, subbalba praesiccitate, & ruptiones uicorum circa ipsam, & in labio inferno, & circa dentes. alui egestionis paucae. Circa decimam quintam ut recidua facta est, frequentiores & uiscae. De coctum malicorij sedauit ipsas. Urinae quales sunt diuturnae. Sub ultimū tempus dolor pectoris deglutienti potum, & manus in pectore. Cuminū & ouum absorbenti sedatus est. lingue raritas profuit. Quinquagesima à prima circa arcturum, sudores breues iuxta lumbos & pectus, & corpus perfrigerabatur, exceptis temporibus, ualde modico tempore. Prima & quinquagesima remisit, nec iterum apprehendit. Eratolai filius circa æquinoctium autumnale dysentericus fiebat, & febris tenebat. Egestionis alui erant biliosae, tenues, multae, & moderate subcruentae. Dolor autem uentris uehemens. Vbi ferum & lac bibisset, silice candefacta immissa, dolores & subcruentae egestionis moderatiores fiebant, sed biliosae comitabantur. & saepe ad exonerandam aluum surgebat, sed minore dolore. Febricula uero et aegroti, & multis, omnino non adesse uidebatur per omne tempus, post primos sex dies, adeo obscura erat. Verū iuxta tempora pulsus erat, & lingua praesiccitate subbalba, & moderate siticulosus, & sine somno. Sorbitionibus autem iam utebatur & uinis. Quum iam ad decimum quartum diem peruenisset, tubercula circa aurem oborta sunt, tum altera, tum utraque, dura ac cruda: omnia disparauerunt, moderate autem dolorosa erant. Quum autem non desinerent egestionis, & semper biliosae essent, absorbenti herbam in farina, biliosae egestionis & dolores ad tempus aliquod mitiores facti sunt. liquidas uero multas saepe egerebat, & cibos ualde auerfabatur, & omni necessitate coactus admittebat. Calor autem, & lingua, & sitis tales sequebantur quales dicti sunt, & sudores nulli. Oblitio uero huiusmodi quaedam. Vbi inero gasset

terrogasset de eo quod paulo antea audiuiſſet, modico interpoſito tempore rurſus interrogabat: & rurſus repetebat, uelut qui non dixiſſet, & ſe deſidere obliuiſcebatur, niſi quis ipſum commonefecifier. & ipſe ſibi ipſi conſcius erat huius affectionis, neq; ignorabat. Spiritus qualis ſano. Vltra trigefimū uero uſq; ad quadragefimum diem, & dolor uentris multum augeſcebat, & ſupinus decumbebat, & ſe conuertere ne tantillum quidē poterat. & quia dolor uehementis erat, alijs qui cibum exhiberent opus habebat. Alui egeſtio erat multa, & diſcreta, tenuis, & calores uinoſi, quecunq; tandem ingeſſiſſet, & quādoq; ſubcruenti, & corporis dolor, colliquatō extrema, & impotentia. & ne alio quidem ſubſeuate ſurgere amplius poterat. In medio uero umbilici ac oſſis pectoris, circa hanc ſedem adhibita manu, talis palpitiō erat, qualis neq; à curſu, neq; à timore circa cor generari poſſit. Bibenti lac aſininum coctum, nouem heminarum Atticarum menſura ad duos dies, biliōſa purgatiō uehemens oborta eſt, & ceſſauerunt dolores, & ciborum appetentiā accēſit. Poſtea uero bubuli lacis crudi quatuor heminas Atticas bibit, pro uice una cyathos duos, in diem, primum ſextam aquę partem ammiſcens, & uini nigri auſteri parum. Semel autem in die cibum capiebat ad ueſperam. Panis erat ad menſuram dimidię chcenicis ſubcineritijs, & piſciculus petroſus ſimplex, aut carūcula caprę aut ouiculę. Potus lactis poſt primos decem dies, ad quadragintā uſq; ſine aqua, cum uini nigri modica parte. Poſt ſeptuageſimum iam à primo diem, à balneo ad noctem, ſudor exiguus obortus eſt. Vtebatur autem modico potu, & poſt cibum potu aſteriorē. Creſcraſti lac in farina magis q̄ ſerum caprinū contulit, quum dolor eſſet circa totum uentrem, & dolores cum multa ad egerendum ſurrectiōe, ac ſubcruētā egeſtione, & tumor circa pedes, ſerē iam ad dies uiginti quinque eſſet. Et Adriano eadem contulerunt. Verum Caneę filio lac aſininum coctum. Cydis filio circa ſolſtitium hybernū rigor & febris, & auris dextrę dolor, & capitis dolor. Talis autem auris dolor ſtatim à paruo puero ipſum comitabatur, fluidus, fiſtuloſus, & grauis odoris. Quum autem ita ſe haberet, plerunq; doloris exors erat. Tunc autem dolor erat uehementis, & capitis dolor. ſecūda aut tertia die bilis uomitus, deſidenti exonerādi uentris gratiā, prodijt excrementum ſubbiliōſum uiſcoſum, uelut ex ouo ſubpallidum. Quarta & quinta ad noctem aliquantum delyrabat, & dolor capitis ac auris uehementis, & febris. Sexta alui egeſtio à mercuriali. & calor, & dolor ceſſaſſe uidebatur. Septima uelut ſanus. In temporibus autem dolor non deſecit. ſudor nullus obortus eſt. Octaua ſuccum ſorbuit. ad ueſperam autem betę ſuccum. & in noctē ſomnus. & ualde doloris exors. & nona latebatur ad ſolis occaſum. Verum ad noctem capitis & auris uehementis dolor. Contigit quoq; aurem purē manare circa hoc tempus quum maxime doleret ſtatim à principio. Totam uero noctem nonam, & ſequentem diem, ac noctis magnā partem, neminem noſcebat. Verum ſuſpirās perſeuerabat, in die uero intra ſeipſum erat. & dolores ceſſabāt, & calor moderatiō erat. Quū aut ſorbuiſſet mercurialem, undecima egeſſit per aluū pituitoſa, mucoſa, maleolentia, duodecima & decima tertia moderate habebat. Decima quarta initio mane factō, uſq; ad meridiem per totum corpus ſudabat, cum ſomno & ſopore multo, ut operoſum eſſet ipſum excitare. ad ueſperam expectectus eſt, & corpus quidem moderate perſingeratū eſt,

in temporibus autē pulsus perseverabat. decimaquinta & decimasexta succis-
 usus est. Decimasextima venit rursus dolor eorūdem ad noctem, & delirium;
 & pus fluebat. Decima octava & decimanona ac uigesima, infani modo dege-
 bat. Vociferabatur autem attollere seipsum nitens, sed capiti dominari non po-
 tens, manibus protentis semper aliquid frustra uenabatur. Prima & uigesima
 sudor exiguus circa latus dexterum, & pectus, & caput. Vigesima secunda sus-
 dor circa faciem plurimus erat. Voce autem hoc tempore, si quidem ualde co-
 naretur, quæ uolebat perfecte loquebatur. Si uero ex tempore citra conatum,
 semiperfecta & os exolutum, & maxillæ & labia semper in motu, uelut qui lo-
 qui uellet, & oculorum frequens motus ac intuitus, & color in dextro oculo ue-
 lut dictum est, subruentus. & palpebra superna intumuit, & iuxta maxillam
 rubor in fine, & uenæ omnes in facie manifestæ, adeoq; contractæ, & oculis nō
 amplius nictabat, sed intente intuebatur, & palpebras diducebat ad supernam
 partem, uelut fieri solet ubi quid in oculum incidit, & quum biberet, descēden-
 tis potus in pectora & uentrem strepitus audiebatur, qualis & Chartadi. Spi-
 ritus leniter semper moderatus. lingua qualis est peripneumonicis cum pallo-
 re albicans, ab initio & semper capitis dolor. Collum semper immobile ut unā
 cum capite circumageretur opus habebat, & pars secundū spinam ex collo re-
 cta ac inflexibilis, decubitus quales dicti sunt, & non semper supinus decum-
 bebant. At pus iam ferosum album, multum negocij ad detergendum cum spon-
 gijs exhibebat, odor eius ualde excellens. circa postremū tempus pedum con-
 tactum non ualde percipiebat. Harpalidæ forori prægnanti circa quartum
 aut quintum mensem, tumores circa pedes aquosi fiebant. & oculorum cauæ
 partes intumescabant, & totum corpus in tumorem eleuatum erat, uelut in pi-
 tuita alba affectis, tussis sicca, rectæ ceruicis spiratio, & eiusmodi anhelatio, &
 quandoq; strangulationes à spiritu, ut sedens in lecto perseveraret, decumbe-
 re autem non poterat, sed etiam si qua somni expectatio esset, desidebat. Sine fe-
 bre erat leniter, & fœtus ad plurimū tempus immobilis erat, ueluti corruptus,
 & translabebatur. Comitabatur autē anhelatio ferè ad duos menses. At quum
 fabis melle ammixto, & eglemate mellis usa esset, & Aethiopicum cuminum
 in uino bibisset, melius habuit. Postea tussiendo eduxit multa, matura, pituito
 sa, alba, & spiratio illa cessauit, peperit autem foemellam. Polycratis uxori
 ætate circa caniculæ sydus febris. Spiritus matutinus minor, à meridie magis
 & paulo densior spiritus. Tussis & excreatio statim ab initio, similis purulen-
 tis. Intus circa arteriam & fauces subfibilabat fridula asperitate, facies boni co-
 loris, in maxillis rubor, non abunde coloratus, sed leniter floridus. Progressu
 uero temporis & uox raucosa, & corporis colliquatio, & circa lumbos eruptio-
 nes, & alius circa postremum tempus liquidior. Septuagesima die febris ex-
 trinsecus ualde friguit, in temporibus autem quies. Spiritus uero frequentior
 fiebat. Verum post hanc quietem spiritus densior, adeo ut sedens perseveraret,
 donec mortua est. In arteria strepitus multus inerat, & sudores prauī, & intus
 ualde modesti, usq; ad extremum tempus. Dies accesserunt ipsi perfrigeratæ
 plures quam quinque. Post primos autem purulentum excreare persevera-
 bat. Mulieri supra portas habitanti iam seniori febricula oborta est: quæ
 quum iam desineret, colli dolor usq; ad spinam & lumbos, & harum partium

non ualde potens erat. Maxillæ erant cōpactæ, & dentes in seipſos, plus quàm ut specillum admitterent. & uox balbutiens, eo quòd reſolutum, & immobile ac debile eſſet corpus. prudens tamen erat. Calefactorijs & aqua muſſa tepida, tertia ſerè die hæc laxauit, & poſtea ſuccis & iuſculis ſana euasit, id quod ad ſinem autumnalis temporis contigit. Apud Harpalidem: unctor, crurum ac manuum impotentior circa autumnum factus, bibit temere medicamētum ſurſum ac deorſum purgans. ex purgatione febris, & ad arteriam deſluebat fluxor, qui loquentem impediret, & faceret ut inter loquendum anhelaret, ſimiliter ut anginoſus raucoſus. Strangulatio deglutienti, & alia quæ in angina. Verum tumor non erat. Febris autem & tuſis augetur, & excreatio liquidæ ac multæ pituitæ. Progreſſu temporis & dolor circa pectus ac mammam finiſtram. Quum autem exurgeret, aut commoueretur, anhelatio multa, & ſudor à fronte & capite. & faucium affectio mollior erat, dolore ad pectus deſcendente. Ab initio igitur fabis melle ammixto utebatur. Poſtquam autem febres detinebant, magis aceto muſſo calido, & meliſ delinctu multo. Vbi præterſeſſent dies quatuordecim omnia deſiuerunt. & manuum ac crurum non longè poſtea potens factus eſt. Chariadi febris ardens, uomitus bilis multus, & infra alui egeſſio. uigilia. & iuxta ſplenem tumor rotundus. Tertia die mane ſurrexit, ſtrepitu circa uētram citra dolorē percepto. Vbi uero aluum exoneraret, ſanguinis recentis plus quàm congij menſura ſubijt. & ubi iterum atq; iterum cohibuiſſet, grumi concreti. anxietas circa cor & os uētriculi & ſudor per totum ſerè corpus. & febricula frigefcere uidebatur. & primum prudens erat, progrediente uero die, & inquietudo maior, & anxietas, & ſpiritus paulo denſior. & confidentius ac benignius quàm pro tempore homines compellabat, ac excipiebat. & quædam animi deliquia accedere uidebantur. Quum autē exhiberent aliqui ſuccos, & aquam de farina craſſa in ipſa macerata, nō ceſſauit: ſed ſpiritus, ad ueſperam ualde multus erat, & iactatio multa, et ad dextera, et ad ſiniſtra tranſmouens ſeipſum nullo tempore quieteſcere poterat. pedes frigidi. In temporibus et capite calor magis propinqua iam morte. & ſudores multi. & uibentis ſtrepitus audiebatur, circa pectus & uētram, deſcendentis potus. Quod uero peſſimum erat, ubi dixiſſet ſibi aliquid infra ſubire uelle, & oculis intente intuitus eſſet, non diu ſe cohibens mortuus eſt. Hermoptolemi uxori hys temporibus febris. & capitis dolores. & quum bibiſſet, ut quæ difficulter deglutiret, ſurrexit, & cor ſe ſanaiſſe dixit. lingua liuida ab initio. Occaſio uidebatur ex horrore poſt balneum facta eſſe. Vigilabat & nocte & die. Poſt primos dies interrogata, non adhuc ſolum caput, ſed & totum corpus ſe dolere dixit. Sitis quandoq; uehemens, quãdoq; moderata. Quinta & ſexta & uſq; ad nonam ſerè delirium, & ruruſ ad ſeipſam loquebatur ſemiperfecta cum ſopore. & aliquando manum ad dealbatum parietem protendebat, & puluinu querendam frigidum ad caput ſitum, etiam pectoribus adhibebat. & ſtragula quandoq; reſiciebat, & in oculo dextro ſubcruentum quid erat. & lachrymabatur. Urina autem erat: quæ in pueris ſemper peſſima eſt. Ex aluo egebat ab initio quidem ſubſulua. poſtea uero aquoſa ualde, & huiuſmodi coloris. Undecima moderatius calida eſſe uidebatur. & quãdoq; ſitis exors ſiebat, adeo ut niſi quis dediſſet, non peteret. Somni poſt primum tempus cōtingebant mode-

rate interdiu, ad noctem uigil erat. & ad noctem magis dolebat. Nona uenter exturbatus est aquosis excrementis. Similiter etiam undecima. Sequentibus uero moderate multum ad egerendum furgebat, & talis egestio erat. Erant autem in prioribus diebus indignationes & euolationes, uelut pueri, & uociferatio, & timores, & circumspeditiones, ubi sopore excitata esset. Verum decima quarta operosum erat ipsam continere exilientem ac clamantem repente & pertinaciter, uelut ex plaga, & uehementi dolore ac timore, uelut si quis ipsam apprehensam modico tempore detineret. Deinde rursus quietem habebat, & sopore pressa dormiens perseuerabat omnino non uidens, quandoque necque audiens, & totam hanc diem ad utrumque modo ad tumultum, modo ad quietem transmutabat. Sequenti nocte per alium subijt quid cruenti, uelut mucosum: & rursus uelut limosum: postea prasina ualde ac nigra. Decima quinta repentina iactationes, & timores, & uociferatio lenis fiebat. Sequebatur autem efferatio, & indignatio, & euolatio, nisi ipsi cito quod uellet porrectum esset, & cognoscebat quidem omnes & omnia statim iam post primos dies, & oculi subcruentum illum fedatum est. Verum infania iuxta temporis occasionem, & uociferatio, & mutatio predicta sequebatur ad soporem. audiebat inaequaliter, aliqua ualde, & si submisse quis loqueretur: aliqua uero clarius eloqui oportebat. Pedes semper equaliter cum reliquo corpore calidi, usque ad extremos dies. Verum decima sexta minus. Decima septima moderatius quam alij diebus habens, ad noctem horrore ipsi oborto, se contrahens magis febricitabat. & sitis multa erat. reliqua similia sequebantur. Tremores autem circa manus fiebant. & aliquantum concutiebat caput. & oculorum intuitus prauus. & sitis uehemens, ubi bibisset rursus postulabat, & rapiebat ac large bibebat. neque auellere ipsi poterant. lingua sicca, ualde rubicunda. & os totum ac labia ulcerata erant ac sicca. & ambas manus ad os ad mouens manducabat quum tremula esset. & si quis aliquid ad manducandum aut sorbendum obtulisset, large ac furiose deglutiebat ac sorbebat. & signa circa oculos mala. Diebus autem tribus aut quatuor ante obitum, horrores quandoque incidebant ipsi, adeo ut contraheret corpus, & conteregetur, & anhelaret. crura distendebantur, & pedes frigidi erant. Sitis similis, & mentis affectiones similes. & surrectiones ad egerendum aut inanes, aut paucis & tenuibus prodeuntibus, cum modica quadam tensione. Postrema tertia & uigesima, oculus magnus mane erat, & circumspectio breuis. & quietem agebat, quandoque etiam absque cõtectione ac sopore. Ad uesperam uero dextri oculi motus, qualis uidentis, aut aliquid uolentis, ab externo angulo, ad nasum. cognoscebatque & interroganti respondebat. Vox post multa subblasa, & prae uociferatione fracta ac raucosa. Amphiphradis filio aetate lateris sinistri dolor, & tulsis. & alui egestionis multae, aquosae, & subbiliosae. & febris cessasse uidebatur circa septimam. Tulsis aderat. Color subalbidus ac subpallidus. Circa duodecimam cum uiore subpallidum spuebat. Spiritus progressu morbi semper densior, & anhelatio, & stridula asperitas circa pectus & arteriam. Sorbitionibus utebatur. prudens per omne tempus. Circa uigesimam octauam mortuus est. Sudores quandoque fiebant foras. Caupo peripneumonicus. aluus statim subibat. Circa quartam sudor multus. febricula cessasse uidebatur, tulsicula nulla, ut ita dicam. Quinta, sexta & septima detinebat febris

bris. fudor octaua. Nona excreauit pallidum. decima subibat alius acruatini non saepe. circa undecimam mitius habebat. Decimaquarta sanus. Her- moptolemo post pleiadis occasum febris accessit. Tussis non ualde. lingua peripneumonica. nona exudauit. totus frige factus est, uelut uidebatur. obtulerunt ipsi succum. circa meridiem calefcebat. Vndecima fudor. & alius erupit biliosus egestionibus. Tussicula accessit. Decimaquarta pallidum excreauit. & stertebat. Decimaquinta quum per totum tempus prudens mansisset, mortuus est. Alius quidam in palato stertens. lingua sicca, peripneumonica, prudens mortuus est. Et Posidonius adhuc ætate infante, iuxta pectus, & præcordia, & latus, multo tempore dolebat, citra febres. Multis autem annis antea suppuratus fuerat. hyeme uero quum in horruisset, dolor augetebat. & febricula tenuis. & excreatio purulenta. tussis cum stridula asperitate circa fauces. & stertens, quum prudens esset mortuus est. Balis filius quum ex monte penitus aberrasset, sexta lingua praua, subrubra. & uocem læserat inter aberrandum. oculi colorati, natantes uelut dormitantium. color reliqui corporis non ualde uelut in morbo regio, sed subpallidum, liuidum. uox praua. lingua obscura, peripneumonica. non prudens. Spiritus ad manum malus, non densus, neque magnus. frigidi pedes lapidosi. Circa nonam mortuus est.

Quædam apud Metronem anginosa, dexteram manum ac crus doluit. Febricula tenebat debilis. suffocatio die tertia remisit. Septima conuulsa. uox intercepta. Stertor. dentium collisio ac confertio, maxillarum rubor. Hæc non longe uitam protraxit, quinta aut sexta mortua est. Signum circa manum subliuidum. Bion ex hydropico diuturno cibum auerfabatur ad multos dies. & uerina: stillicidio uexabatur. In sinistro genu abscessus fiebat. suppuratus est. mortuus est. Ctesiphon hydropicus ex febre ardente multa. & prius hydropicus ac splenicus, ualde repletus est & scorum, & crura, & peritonæum membranam alium ac intestina ambientem. Ad finem tussis & suffocationes fiebant ad noctem, magis à pulmone, uelut pulmonicis ac tabescentibus. Tribus aut quatuor diebus ante diem obitus, rigor, febris. circa femur dextrum intus ad uenam mediam ab inguine collectio uelut ignis ferri, subliuidum habens ruborem. ad noctem cordis ac oris uentriculi dolor. & non longe postea uocis interceptio. strangulatio cum stertore. & mortuus est. Et in Olyntho hydropicus, de repente uoce priuatus, noctem & diem despiens, mortuus est. Prodromi filius, ætate subblæsus, æstuosus. lingua ipsi subarida, obscura. egestio alui deorsum multa. Superstes euasit. Leophorbida: febris acuta post solstitium hybernium, præcordiorum & uentris dolor, alui egestiones liquidæ, biliosæ, multa. & interdium soporosus. lingua peripneumonica. tussis non inerat. Duodecima nigra pauca & prafina egestit. Decimaquarta febricula cessasse uidebatur. Postea uero forbitionibus utebatur. Decima sexta os ualde saluiginosum siccum fiebat. ad summam uesperam horror, febris. Vigesima prima circa meridiem rigor, & fudor. febris desuit. uerum calor adhuc suberat tenuis. ad noctem rursus fudor. & uigesima secunda ad noctem fudor. & calor remisit. At prioribus diebus omnibus sine sudore erat. Aluus autem humecta fuit etiam in putata postea recidua. Quæ superne habitabat Theoclis cognata

ta, sub pleiadas febris acuta. sexta uidebatur cessasse. lauit uelut febre sedata. *se-*
 p̄t̄ma mane maxilla ualde rubicunda, utra non memini. In uespera febris ue-
 nit multa. & animi deliquium, & uocis interceptio erat. non longe uero postea
 sudor, & quies cessante morbo septima die. Theodori uxor in febre uehe-
 menti sanguinis eruptio facta est, hyeme, ubi febris desisset. circa nonam, non
 longe postea, lateris dextri uelut ab utero grauitas. Sed & primum, & sequenti-
 bus diebus, obortus est dolor uehemens iuxta pectus. & fomento ad latus dex-
 terum adhibito, remisit dolores quarta die. spiritus densior, arteria uix respi-
 ranis subsibilabat. & supina difficulter se uertere poterat. ad noctem febris acu-
 tior. & delirium breue fiebat. Quinta mane mitior esse uidebatur. sudor de fa-
 cie diffundebatur primum modicus. deinde multo tempore per totum corpus
 ac pedes. Postea uero uidebatur ipsi febris remisisse. Erat autem ad manum fri-
 gidius corpus arteriarū. Quæ uero in temporibus sunt etiam magis saliebant.
 & spiritus densior. & aliàs atq; aliàs delyrabat. & omnia ad deterius. lingua per-
 petuo alba ualde. & tussis non inerat, nisi tertia ac quinta die ad breue tempus.
 Sitis non erat. Sputatio erat. Præcordium dexterū ualde eleuabatur circa quin-
 tam. uerum postea mollius. egestio tertia die à balneo stercoris modici. Quin-
 ta rursus liquidi modici. Venter autem mollis. Urinæ acerbæ, cineris speciem
 referentes. oculi uelut delassatæ, difficulter suspiciebat ac circumferebat oculos.
 Quinta ad noctem ægre affecta fuit. & delirium sequebatur. Sexta rursus ea-
 dem hora, qua plenum solet esse forum, multus sudor diffundebatur, in cipie-
 bat à fronte ad totum corpus. ad multum tempus prudenter res suas dispone-
 bat. ad meridiem uero ualde delyrabat. & perfrigeratio similis erat. omnia uero
 circa corpus grauiora. Ad uesperam tibia ipsius ex cubili decidit, & puero præ-
 ter rationem minabatur, & rursus silebat, & ad quietem conuertebatur. Circa
 primum somnum sitis multa, & infania, & erecta sedebat, & præsentibus con-
 uiciabatur. & rursus cōt̄c̄uit, ac in quiete erat. & uidebatur reliquum noctis so-
 pore pressa esse. Verum oculos non clausit. Ad diem indicabat plerq; nuti-
 bus, corpore quiescens, & moderate intelligens. Sudor rursus eadem hora. si-
 militer oculi demissi, ad infernam palpebram magis incumbentes, rigide ac stu-
 pide intuentes. albæ oculorum partes pallidæ & mortiferæ. & totū corpus pal-
 lidum ac nigrum. manum plerunq; ad parietem, aut ad stragula habebat. strepi-
 tus autem bibenti magni fiebant, respuebat. & sursum ad nasum absorbebat. &
 floccos legebat. & faciem obuolabat. Post sudorē manus uelut in glaciem con-
 gelatæ. sudor sequebatur frigidus. corpus ad manum frigidum. exsiliabat, uo-
 ciferabatur. insaniebat. spiritus multus. manus tremulæ fiebant, sub mortem
 progressæ iam etiam conuulsæ. septima die mortua est. Sexta die in nocte stra-
 tum modice perminxit, quod minxerat de festucis detrahebatur, uiscosum, ge-
 nituræ simile. Vigilabat per omnes dies. post sextam urina subcruenta.

Antiphanis filio hyeme, lateris dexteri dolor, tussis, febris, edebat, deambu-
 labat etiam febriens. Videbatur ruptio facta esse. nona remisit. febris non reli-
 quit. tussis multa. & crassa ac pumosa spuebat. latus dolebat. Circa decimam
 quartam & rursus uigefimam febres desinere uidebatur, & rursus corripiebatur.
 erat autem calor tenuis, & parū quid relinquebat. Tussis quandoq; deficiebat,
 quandoq;

quandocq; abundabat, cū multa suffocatione, Tunc uero remittebat, & excreatio post hos dies multa, cum strangulatoria tussi, & purulenta supra uas effluentia ac spumantia prodibant, & in faucibus pleruncq; stridula asperitas subsistebat, anhelatio semper detinebat, & spiritus densior, raro bene spirabat. Ultra quadragesimū diem, prope sexagesimum opinor, oculus sinister excæcatus est, cū tumore, sine dolore: nec lōge postea etiam dexter, & pupillæ ualde albæ ac siccæ fiebant, & mortuus est post excæcationē, non progressus ultra septem dies, cum stercore ac multa deliratione. Similia & ex similibus eodem tempore contigerunt etiam Thessalioni, feruentia, & spumantia, & purulenta, & rufes, & stridulæ asperitates. Polemarchi uxori hyeme anginosæ tumor sub gutture, febris multa, uena secā est, cessauit strangulatio ex faucibus, febris comitabatur, Circa quintam genu dolor & tumor sinistri, & circa cor dixit sibi uideri aliquid colligi, & respirabat uelut respirāt, hi qui sub aquam mergi fuerunt, & ex pectore substrepēbat, uelut qui concluso ore loquuntur, engastrimythi, quasi ex uentre loquentes appellati. Tale quid contingebar, Circa octauam aut nonam ad noctē alius prorupit, ac liquida multa, acruata & graueolentia egessit, uox interceptiebatur, Mortua est. Anstippus in supernum uentrem uiolenter ac grauius sagittæ ictu petitus est, uentris dolor uehemens, & breui ardebat, deorsum uero nihil egerebat, anxius erat, biliosa abunde colorata quum uomuisset, melius habere uidebatur, Paulo post dolores rursus uehementes, & uenter similiter ardebat, uelut in uolulis, calores & sitis, in septem diebus mortuus est. Neapolis percussus similiter, eadem passus est, acri infuso per clysterem immisso, alius deorsum erupit, color per corpus diffusus est tenuis, pallidus, niger, oculi squallidi, stupore rigidi, intus conuersi, intente intuentes. Ei qui in hepar percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum per corpus diffusus est, oculi caui, anxietas, molestia, Mortuus est prius q̄ concio solueretur, in qua die percussus est. Qui caput percussus est lapide à Macedone, supra tempus dextrum, ita ut fissura saltem facta dissecio contigisset, uertigine affectus est & cecidit, Tertia die uoce destitutus erat, anxietas, febris non ualde uehemens, pulsus in temporibus uelut tenuis caloris, nihil audiebat, neq; sapiebat, neq; quiescebat, humiditas circa frontem, & sub nasum, usq; ad mentum, Quinta mortuus est. Eniates in Delo iaculo percussus est retrorsum in latus, iuxta sinistram partem, ulcus quidem sine dolore, Verum tertia die uentris dolor paruus, non egerebat, infuso per clysterem immisso, stercus prodibat, & dolor deficiebat, sedes extra ad scortum extabat, quarta die etiam ad pubem, & totum uentrem, dolor uehementer iruebat, quiescere non poterat, biliosa uomuit abunde colorata, oculi cum uirore pallidi, quales in animi deliquijs, Post quintam mortuus est, Erat autem calor quidam tenuis in ipso. Billo percussus in dorsum, spiritus multus per uulnus cum strepitu prodibat, & sanguinem fundebat, Verum deligatus emplastro cruentis uulneribus commodo, sanus euasit. Contigit & infelicissimo Philes hino, denudatione in fronte facta, nona die febris, Deinde liuefactum est os, mortuus est. Et Phaniæ & Evergetæ filio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab offe discessit, & pus subtus depascebatur, His dum perforarentur, ex

ipso offe egressa est sanies tenuis, serosa, subpallida, graecolens, lethalis. Con-
tingit autem talibus etiam uomitus accedere, & ad finem conuulsiones: & ut
clangorosam uocem edant, ac impotentes fiant, & si in dextris fuerit uulnus, in
sinistra parte: si uero in sinistris, in dextra. Theodori filio nona die in sole
uerfato, febris accessit decima die, ex denudatione iuxta os nullius momenti.
In febre uero denudatum est, discessit cutis, multum clangorosus erat. Vigesi-
ma secunda uenter eleuatus est maxime circa praecordia. Vigesima tertia mor-
tuus est. Quibus ossa fracta fuerint, his septima die febres. Si uero calidi-
us fuerit tempus, etiam citius. At si magis fracta fuerint, etiam euestigio.

Et Exarmodi famulus similiter dolore habebat ad femur, non è directo uul-
neris, & factus est clangorosus. & colli erat dolor. Et Posidocreon tertia
conuulsio, calor non relinquebat, mortuus est die decimo octauo. Ilagora
filius percussus est retro in caput, contuso offe ac nigrefacto quinta die super-
stes euasit, os autem non discessit. Magnae nauis gubernatori anchora di-
gitum medium, & os dextrae manus confregit, inflammatio successit, & mar-
cor, & febris, subpurgatus est, quinta calores moderate remiserunt, itemque dolo-
res, de digito quid decidit. Post septimum diem sanies exibat leniter. Postea
per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Praedictio facta est opistho-
tonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillae confertae, & ad collum rigi-
dae. Tertia die totus conuellebatur in posteriorem partem, cum sudore. Sed à
praedictione mortuus est. Harpali filius ex libera Telephane, luxationem
infra in pede magni digiti accepit, inflammatus est, & ualde dolorosus erat,
& ubi repositus est, & dolor remisit, proficiscebatur ad agrum, rediens lumbos
doluit, lauit, maxillae ad noctem conferebantur, & opisthotonus aderat, salis-
ua spumosa uix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thri-
non Damonis filius, habebat circa tibiam aut malleolum ulcus, iuxta neruum
iam purum. Huic à pharmaco corrosa contigit, ut opisthotono moreretur.

Menoni sub arcturum & prius, ex febre aestiua, & alui profluuio aegre as-
fecto, & ex itinere delassato, dolor lateris sinistri, & tussis, quae ex destillatio-
ne quidem etiam prius aderat, uerum tunc ualde intenta erat, & uigilabat. &
febrem statim ab initio aegre ferebat, & erectus sedens tertia die spuebat palli-
dum, arteria ex stertore subsibilabat. Circa quintam spiritus moderate densus,
pedes, tibiae, extremae partes plerumque frigidae, & extra stragula, alui egestio
ab initio fiebat biliosa, neque ualde modica, neque multa, septima, octaua, &
nona, leuius ferre uidebatur, & somni aliqui contingebant, & quae excreabat
crudiora erant, decima, & usque ad decimam tertiam, alba & pura, & praecor-
dium mollius fiebat, sinistrum tamen distentum, & melius spirabat. Subdita
glande moderate aluus subijt. Decimam tertiam rursus pallidum spuebat. Decima
quarta magis. Decima quinta praesinum. Aluus autem maleolentia, biliosa, li-
quida, multa demisit. Sinistrum praecordium eleuabatur. Decima sexta autem
etiam ualde intumuit, & spiritus iam stertorosus, sudor circa frontem & cer-
uicem, raro ad pectus, extremae partes, & frons, leniter permanebant frigidae.
Saltatio uero uenarum circa tempora detinebat. Somni soporosi noctem ac
diem postremo tempore. Urina ab initio cruda, cineris speciem referens. Circa
decimam

decimam, & usque ad decimamtertiam tenues, & non decolores. Verum à decimatertia quales ab initio. Cleocho lateris dolor & febris. remisit febris. sudauit per totum corpus. In urina multa erant quæ ferebantur ac innatabant. postea turbata est. Circa Pleiadum occasum Olympiadæ uxorem, foetum octimestrem gestantem, ex casu febris acuta corripuit. lingua æstuosa, sicca, aspera, pallida. oculi pallidi. & corpus mortiferum. foetum corripit quinta die: facile liberata est. & fomnus ut uidebatur soporosus. uesperis excitantes non sensit. sternutatoriū adhibitum percepit. potionem suscepit & succum. deglutiens potionem aliquantū tussiuit. uox non soluebatur. neq; ipsa quicquā alleuabatur ex morbo. oculi tristes ac submissi. spiritus sublimis per nasum trahebatur. color prauus. sudor circa pedes, & crura, ubi iam morti propinqua esset. mortua est. Nicolai cōcubinæ ex febre ardenti, abscessus iuxta aurem fiebant ab utraq; parte, paulo posterius alter, quum iam febris remittere uideretur, uelut tumor laxus. Circa decimum quartum magni citra signa sedati sunt. recidua facta est. Color qualis mortuorum. lingua aspera, ualde densa, subalbida. Stiticolosa. alui egestio deorsum multa, liquida, male olēs per omne tempus. Ante finem corruptum est corpus, præ multitudine egestionis. Mortua est circa uigesimalium diem. Andream ante pleiadem horror, febris, uomitus. Ab initio semitertiana apparebat. Verum tertiana erat. Quum rursus in foro uersaretur, in horruit. febris acuta. uomitus bilis meracæ. delirium ad noctem. quarta rursus melius habebat. Quinta difficulter. Sexta à mercuriali probe egeffit aluus. Septima difficilior. & sequentibus iam diebus febris magis continenter affligebat. & sine sudore ab initio, & stiticolosa. Maxime uero os resiccabatur, & potionem nullam libenter admittebat, quum multa iniucūditas circa os esset. lingua sicca, inarticulata, asperitas efflorescebat, cum pallore albicans. Vigil. anxius. exolutus. fractus. lingua præ siccitate quādoq; subblæsa, donec mares defecisset. succū maxime admittebat. Nona aut decima circa aurē sinistra, atq; etiam alterā, tumores parui citra signa apparuerūt. Urinæ semper non decolores, iterū sine subsidentia. Decimaquarta sudor circa supernas partes non multus, sed moderatior. Calor circa decimamseptimam euauit. Aluus post decimam sicca, citra glandem subditam non egerens. Circa uigesimam quintam pituita per totum corpus pruriginosæ calidæ, uelut igne ambusta. Dolor autem erat circa iocos sub alis, & latera: transiuit ad crura citra signa, & desiuit. Balneum proderat & unguenti illitio cum aceto. Mense uero secundo aut tertio forasais, ad rhenes dolor, qui etiam antea quandoq; fuerat, sedatus est. Aristocrati circa solstitium hybernū lassitudo, & horror, & calor. Postea tertia die incepit lateris dolor itemq; lumborum. & tumor sub alis initium sumens, per totum dextrum latus durus, rubicundus, liuidus, uelut ab igne calefactus & inustus. anxius. omnia moleste ferens. ualde stiticolosus. lingua subalbida. Urinæ non procedebant. crura subfrigida. alui egestio à mercuriali modica, liuida, subalbida spumosa, ad noctem spiritus eleuabatur. sudor circa frontem, partes infernæ frigida. collum inflabatur. tussis non inerat. mortuus est prudenens. Onesianacti circa autumnū lippitudo. postea uero febris quartana. Incipiente quartana cibos ualde auerfabatur, in progressu uero libenter accipiebat. Sed & Polychari in quartana, similia circa cibum accidebant.

Mnesia

Mnesianacti alui egestio ante febrē, et postea, ad multū tempus sequebatur, multis albis mucosis prodeuntibus: & quandoq; pauco sanguine, citra dolorem. Streptus autem in ventre. Post febrē abscelsit circa sedem tuberculum durum, quod multo tempore in cōcoctum comitabatur. erupit ad intestinum, & foris fistulosum fiebat. Deambulante uero ipso in foro, splendores præ oculis obuerfabantur, & solem non ualde uidebat. Quum autem parum discessisset, extra seipsum erat. & collum conuulsū est. Postquam autem domum deportatus est, uix suspexit, & ipse uix suppius erat. Primum autem collustrabat circumstantes. & corpus perfrigeratum est. uix uero recalfactus est utriculis & fomentis adhibitis. Postquam autem ipse intra seipsum esset, & exurgeret, non uolebat exire, sed timere dixit. Si uero quis de grauib; morbis discesserit, subducebat se præ timore. Quandoque etiam caliditatem sibi ad præcordia allabi dixit, & oculorū splendores comitari. & alui egestio multa, & sæpe, & similis hyeme contigit. facta est uenæ sectio, datum est ueratū. bibit lac bubulum, prius autem afininum. cōtulit, & alui egestiones sedauit. Aquæ potus ab initio. deambulationes quoq; & capitis purgationes. Anecheti filio hæc contigerunt. hyeme in balneo dum ungeretur ad ignem, calefactus est. & statim in comitales cōuulsiones incidit. Postquam uero multæ factæ essent conuulsiones, circūspexit. non apud sese erat. quum autem intra seipsum esset, rursus postridie mane correptus est ac conuulsus. spuma non ualde. Tertiā lingua inarticulata. Quarta per linguam significabat. Quinta loqui nō poterat, sed in principijs nominum hærebat lingua ualde. & cōuulsio fiebat. & extra sese erat. Quum uero hæc remitterent, lingua uix in suū statum restituebatur. Sexta abstinēbat ab omnibus, & forbitio, & potu. & à nulla amplius affectione corripiebatur. Cleocho ex lassitudinibus ac exercitijs melle per dies aliquot uenti, tumor ad genu dextrum obortus est. Immo potius ad infernam partem circa tendines sub genu. circumibat subclaudicans. & sura intumescēbat, ac dura erat, & ad pedem, & ad malleolum dexterum. & tubercula ad gingiuas circa dentes magna, uelut uuæ acini, liuida, nigrefacta, doloris exortia, ubi cibum non caperet. Sed & crura doloris exortia erant, si nō exurgeret. Venit enim & ad sinistrum tumor, uerum minus liuescēbat. In tumoribus circa genua ac pedes uelut suppurationes erant. Tandem uero fieri nō poterat, ut staret, aut calcaneis insisteret, sed in lecto decumbēbat. Calores manifesti, quandoq; cibum auerfabatur. nō ualde siticulosus. neq; ad sedem surgebat. anxius. & quandoq; etiam pusillanimitas tenebat. ueratrum exhibitum est, & capitis purgationes. Ad os pharmacum ex manna thuris, cum alijs ammixtis profuit. Ad ulcera in ore, forbitio lenticulæ comoda erat. Circa sexagesimam sedati sunt tumores à secundo ueratro. dolores tantum ad genua decumbēti uenerunt. Humor autem & bilis abscelsit ad genua, etiam pluribus diebus ante ueratrum. Pisistrato humeri dolor, & grauitas diuturna deambulanti & aliàs sano. hyeme uero incidit multus lateris dolor, & calor, & tussis. & excreatio sanguinis spumosi, & in faucibus stertēbat. Verum facile ferebat, & apud seipsum erat. & calor remisit, simulq; & excreatio, & stridula asperitas. & circa quartam aut quintam diem sanus. Simonis uxor in partu conuulsæ dolor circa pectus & latus, tussis, febres, excreationes purulentæ, tabes. ad sex menses febres. & alui profluuia

profluvia semper. Ad finem febres cessauerunt. post cessationē substitit aluus. & post septem dies mortua est. Euxeni uxorem ex fomentis ut uidebatur, calores nullo tempore relinquebant. magis tamen ad uesperam augetebant. sudores fiebant per totum corpus. Febre ad augmētum tendente frigiditas pedum, quandoq; etiam tibiārū & genuum fiebat. tussicula sicca ad modicū tempus, febre exacerbari incipiente. deinde cessabat. per multum aut tempus etiam totius corporis rigor fiebat. Sitis exors semper. Vbi medicamētum bibisset, & ferum, magis laesa est. Ab initio omnino sine dolore erat, & bene spirabat. Medio uero tempore lateris dextri dolor fiebat. & tussis commota est, & anhelatio. & excreationes paruæ albæ ac subtenuēs. & horror non amplius ex pedibus, sed de collo & dorso. & aluus liquidior. remisit febris cum multo sudore, & perfrigerata est. Anhelatio uero erat uaria. mortua est post remissionem septima die quum esset mente prudens. Polemarchi uxor aestate incepit febrire. dimisit autem ipsam febris sexta die. titubans obambulabat. ad noctem calores. Rursus interposito tempore corripuit febris, & non dimisit tribus ferè mensibus. tussis multa. excreatio pituitæ. Postquam uero uiginti durasset diebus. spiritus semper densus. in pectore strepitus. plerumq; sudor. mane febris mitior. & horrores quandoq; corripiebant. somni fiebāt. & aluus aliquando humectabatur, & rursus restitabat. moderate cibū gustabat. At medio tempore ad genua & tibias dolor. & ad flectendum ac extendendū alio opus habebat. Perseuerabāt crurū affectiones usq; ad finem iam propinquū. & intumescerunt pedes usq; ad tibias, & ad contactum dolebat. & sudores ac rigores desierunt. Febris autem semper intendebatur. Ante obitum aluus erupit. prudens permanebat. Tribus ante obitum diebus, in faucibus stertebat, & spiritus reuertebatur. Mortua est. Hegesipolis filiolus quatuor ferè mensibus dolorem circa umbilicum corrodentem habebat. Progressu temporis augebatur dolor. Percutiebatur uentrem. uellicabat. calores corripiebant. contabescebat. ossa reliqua erant. pedes tuebant. Testes, uenter, partes circa umbilicum inflata. Num & quibus futurum est ut aluus exturbetur; cibum auerfabatur. lac solum admittebat recens. & aluus liquida erat, & subcruenta sanies subibat, male olens: aluus ardebat. mortuus est ubi uomisset modicū pituitosum, adeo ut quis genituram putasset. Plateæ filio ubi mortuus esset futura capitis ualde caua est. Quum autem ægrotaret, semper manu sinciput contingebat, maxime morti propinquus. Non dolebat autem caput. & in femore sinistro sub inguen partes inferiores liuidæ. Testes autem graciles erant. Similia etiam Hegoridæ filio. mortuus est. Præterquam quod uomitus plures sub obitum contigerunt. Hippiae soror hyeme Phrenitica. mente aberrans. manibus negotium exhibens. lancinans seipsam. Quinta & sexta ad noctem uoce destituta, soporosa. inflans in maxillas & labia, uelut dormientes. septima mortua est. Osander ubi inhorruit, lateris dolor, & ad genua dolor, itemq; ad femur. ubi comedisset delirabat. breui mortuus est. Cleotimo futuri alio liquefacta multo tempore, & calore oborto, iuxta hepar tumor tuberculosus ad inum uentrem descendit, & aluus liquida fiebat. & aliud ipsi tuberculum iuxta hepar sursum ad præcordium. mortuus est. Quibusdam capitis dolor uehemens cum calore; quibusdam quidem ad dimidiā capitis partem,

& secundum nares humor quidam decedit tenuis, aut maturus: aut ad aures: aut ad fauces ex capite securius. Quibusdam uero hæc sicca. At marcor uehemens periculosus est. Si uero affuerit anxiosus, aut biliosus uomitus, aut stupor oculorū, aut uocis interceptio, et raro quid loquitur, aut delirium, lethalia hæc sunt & conuulsoria. Quicumq; uero ex destillatione dimidiam capitis partē dolent, & humore secundum nares decedente insuper febricitant leniter, in quinta aut sexta perfrigerantur. Echecrati caeco capitis dolor uehemens magis ad posteriorem partem, & colli quo loco connexio est, & ad uerticē procedebat. Pro gradiente tempore & ad aurem sinistra. & dimidia capitis pars dolorosa erat. mucosa semper procedebant leniter combusta. & calor comitabatur tenuis. & cibum auerfabatur. in die melius habebat. ad noctem uero dolebat. Postquam autem pus per aurem erupit, cessauerunt omnia. erupit autem circa hyemem. Num & omnibus suppurationibus, & affectionibus circa oculum, dolores ad noctem? Quibus tussis hyeme maxime austro spirante crassa & multa exscreantibus, febres accedunt. leniter autem quinta die sedantur. Tussis uero circa quadagesimam, uelut Hegeſipoli. Quibus calores multi quandoq; sedantur, hi non per totum corpus, sed aut circa ceruicem, aut sub alis, aut capite sudantes liberantur. Chariti hyeme ex tussicula populariter grassante febris aduentans, acuta corripuit. stragula reſiciebat. sopor cum dolore. Urinae erant rubrae uelut erui lotura. subsidencia statim ab initio multa, alba. postea etiam subrubra. Septima à glande subdita pauca prodierūt. sopor detinuit sine dolore. humiditas in fronte. somnus ad noctem, et calor mitior. octaua succum admisit. soporosus permanſit usq; ad undecimā. Hac autem die etiam calor maxime cessauit. Postquam uero tussis erat, ex creatio perseverabat semper multa, facilis. primum uiscosa, alba, crassa. postquā autem concocta esset, similis purulentis. Urinae ab undecima die puriores. subsidencia aspera. decimatertia dolor ad dexteram, usq; ad lateris mollitudinem, ad imum uentrem. Urina supprimebatur. Porus callyphylli contulit. Decima quinta rursus dolor. decima sexta ad noctem magis dolor præcordij incipiebat ad uentrem. Mercurialis aqua subduxit. Calor intra uigesimū euanuit. & excreationes sequuntur sunt crassa. Melius habuit ad quadagesimum. Subpurgādi sunt uentres in morbis, ubi purganda matura fuerint. Inferni quidem, ubi confidisse uideris. signum habes si non anxij fuerint, necq; capite grauati: & quum calores mitissimi, & quum post exacerbationes cessarint. Superni uero, in ipsis exacerbationibus. Tunc enim & hi eleuantur, quū anxij, & grauati supernis partibus fuerint. propterea uero in principijs purgandū nō est, quoniam sua sponte in his temporibus expurgantur. In cubiti processu ex casu sauciato, cubitus marcore corruptus suppurratur. maturatione uero fiente, uiscosa sanies ac glutinosa exprimitur, & breuē supprimitur: uelut & Cleogenico, & Demarcho Aglaotelis filio. Similiter autem et ualde ex isdem pus nullū: uelut Aeschyli filio contigit. At ubi suppurratur plurimis horrores & febres accedunt. Alcmani ex rhenum affectionibus se recolligenti, & sanguine deorsum detracto, sursum ad hepar conuersus est morbus, & ad cor dolor uehemens. & spiritus præ dolore detinebatur. & alius difficulter egerebat parua caprini stercoreis pilulis familia. anxietas non inerat. Verum rigor quādoq; & febris corripiebat. & sudor. & uomitus, & in dolore

dolore non conferebat aqua marina per clysterē infusa. Verum fursurum decoctum infusum contulit. A cibo abstinuit ad dies septem. aquam mulsam meraciorem bibit. postea lentis succum, quandoq; uero ex lenticula fresa decoctum. Inde bibit aquam. postea catulum coctum: & mazæ parum, quæ potissimū diu antea confecta esset. progressu uero temporis, aut ceruices bubulas, aut extremas partes suillas coctas, unā cum priore aquæ potu. quies. regnē. ad rhenum affectionem infusum per clysterem ex cucumere syluestri. Parmenisci filio surditas. contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana expurgare, & solum oleum, aut netopum infundere. deambulare. mane surgere. uinum album bibere, oleribus abstinere. pane & piscibus petrosis nutrire. Aspasii uxori dentis & maxillæ dolor uehemens. Castorium & piper colluens, ac in ore tenens, remisit. Et stillicidij urinæ affectionem ipsi sedauit farina cum rosa ceo. Capitis dolores ex utero sedat castorium. Plurimas uteri affectiones flatu faciunt. Signum sunt ructus, & strepitus circa uērem, & lumborum tumores, & dolores circa rhenes ac coxas. Ad hos autem confert, aromatiu res tiam partē, farinę duas, in uino odorato albo coquere, & linteolo illita cataplasmati modo imponere, qua parte uentris dolores ab utero affligunt. Calli medontis filio contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durū, & magnū, & crudū ac dolorosum, uenæ brachij sectio: & seminis lini torrefacti cataplasma, uino albo ac oleo subactum ac imbutū, ita ut neq; calidum, neq; ualde coctum deligatur. Aut cum aqua mulsā coquatur fœni græci, aut ordeī, aut tritici farina. Melissandro quum gingiua dolore corripetur, & uehementer intumesceret, sectio uenæ brachij, & alumen Aegyptium in principio sedabat.

Eurychidi ex cholericis affectionibus, ad neruorum in cruribus distentionem desiiuit, unā cum secessu deorsum. Bilem multā abunde coloratam uomuit ad tres dies ac noctes ualde subrubram. sub uomitū bibit, & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neq; ex potibus, neq; ex cibis. & urinæ ac transitus deorsum suppressio. per uomitus fex mollis prodijt, & deorsum quoq; erupit. Regio morbo correpto prodest laborare, sudare, panem edere, bibere non multū, lauare caput calida multa, sed potius tepida, uinum album, somno non multo uti. Calligeni circa uigefimum quintū ætatis annum de stillatio, iussis multa, quod defluebat per uim educebat. nihil infra persistebat. annos quatuor perseverabat. Ab initio calores tenues fiebant. Veranum non profuit, sed modicus cibus, & comprimi corpus, edere panem, bibere uinū nigrum, obsoniorum quorūcunq; usus, abstinentia ab acribus, salis, pinguibus, succo silphij, oleribus crudis, multa deambulatio. Lactis potus non cōsulit, sed sesamum purum, crudum, acetabuli mensura bibere, cū uino molli. Timo chari hyeme destillatio, maxime in nares. Quū Venere usus esset, resiccata sunt omnia. lassitudo, calor successit. caput graue. sudor à capite multus. defluebat autem & per totum corpus. Erat autem etiam sanus sudare aduersus. tertia die sanatus est. Cleomenis filius hyeme initio factu cibum auerfabatur, & etius fastidio citra febrem uexabatur. & uomebat cibos ac pituitam. Duobus autem mensibus cibi fastidiū durabat. Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic nulla medicamenti potio contulit. Verum uinum nigrum, & panis eius, & balneorum abstinentia, & unctio, & frictio ab unctioe, & fouere non

ualde, neq̄ multo fomento, sed leni. Quibus fluxiones in oculis tenues & diuturnæ, si maturæ in nares proceſſerint, profunt. Quibus prægnatibus ex caſu, aut cõuulſione, aut plaga, dolores leniter fiunt, his in tribus diebus manifeſtum fit, an foetum corrumpet. Cuidam quæ circa uigeſimum ætatis annum biberat ulcro pharmacũ ad foetum perdendum, accidit dolor, uomitus bilioſorum, multorum, pallidorũ, præſinorum, nigrorũ. Quum bibiſſet, tertia die cõuulſio corripiebat, linguam cõmandebat. Ad quartã diem ad ipſam ingreſſus ſum. lingua nigra, magna, oculorũ albæ partes, erant rubræ. uigilabat, quarta mortua eſt ad noctem. Pythodes ægrotatibus aquam, & lac multa aqua ammixta dabat, & renutriebat. Perniones pertundere oportet, & caleſcere, ita ut t̄p̄ maxime excaleſcias igne & aqua. Oculis in cõmoda ſunt lentacula, fructus pomorum dulces, & olera. Doloribus circa lĩbos, aut coxam, aut crura, ex laboribus abortis, aquæ marinæ acetiq̄ calidum fomentum conſert, ita ut uel aſpergas, uel ſpongiam his imbutam adhibeas. Deligare uero lænis oportet. Origanum potum, oculis & dentibus malum eſt. Puella quæ de rupe cecidit, uoce deſtituta, iactatio ipſam tenebat, uomuit ad noctẽ ſanguinem. Quum ad ſiniſtram aurem impigiſſet, amplius inde fluebat, & aquam nullam difficulter deglutiebat, ſtertor habebat. Spiritus denſus uelut morientium. Venæ circa frontem in t̄t̄æ, decubitus ſupinus, pedes tepidi, febris multa, aliquando acuta, maxime expaueſcebat, ſeptima uocẽ rupit, calores tenuiores erant, ſuperſtes euafit. Niſantides humeri dolorem habebat, in æſtate abortum ex abſceſſu, profuit ipſi corpus & humerum in aqua marina mado facere, ad multum tempus: & per tres dies uinũ album aquoſum bibere, ſimul ut in aqua marina decumberet, ita ut & in ipſa urinam eſceret. Fullo in Syro phreniticus, quũ moueretur cruribus tremulis, corpus uelut à culicibus compunctum, oculus magnus, motus breuis, uox fracta, ſed clara tamen, urina pura & ſubſidentiam non habens. Num propter alui ex thapſia egeſtionem, decima octaua die morbus remiſit, euaneſcens citra ſudorem. Nicoxenus in Olyntho ſimiliter ſeptima die uidebatur à morbo liber eſſe cum ſudore. Sorbitiones aſſumebat, uinum, botrũ ex ſole. Decimaſeptima die ingreſſus ſum ad ipſum, lingua ardebat, calor forinſecus non ualde fortis, exolutio corporis uehemens, uox fracta, ut operoſum eſſet exaudire, clara tamen, tempora collapſa, oculi caui, pedes molles ac tepidi, iuxta ſplenem diſtentio. Inſuſum per clyſterẽ non ualde ſuſcipiebat, ſed reſiliebat, prodijt ſtercus compactũ modicum, & aliquid ſanguinis, arbitror ab inſuſo. Urina clara, pura, decubitus ſupinus, crura diducta ac diſparata, ob exolutionem, penitus uigil, Intra uiginti dies calor euauit. Potus erat aqua de farina craſſa in ipſa macerata, Sed & de pomis ſimulq̄ mali punicis ſuccus, & lentis torrefactæ, & farina lotura cocta, frigida, tenuis forbitio. Superſtes euafit. Fuſionum inguina extuberant dura & ſine dolore, & circa pubem ac collum ſimilia erant tubercula magna, febris ante diem decimum. Tuſi uexabantur à ruptionibus. Tertio menſe aut quarto uenter colliquitur, Calores ſucceſſerunt, lingua ſicca, ſitis, egeſtionem malignæ, mortui ſunt. Cholericæ bilis ſurſum ac deorſum eruptiones, ex carnis eſu, maxime ſuillæ crudioris, & ex cicere, & ebrietate uini odorati ueteris, & inſolatione, & ex ſepijs, & locuſtis, & gammaris: & ex olerum eſu, maxime pomi & ceparum

Insuper & à lactucis coctis, et brasicis, & ramicibus crudioribus: & à placentis ac dulcarijs & mellitis libis, & à fructibus pomorum, & cucumere pepone, & uino lactei teporis, & eruo, & polenta receti. Cholericæ affectiones magis in æstate fiunt, & febres intermittentes, & quibus horrores accedunt. Hæc quandoq; malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt. Verum cauere oportet, Iudicat autem tales morbos maxime quinta & septima & nona dies. Melius tamen est cauere usq; ad decimã quartam. Pherecydæ post solstitium hybernum, noctu lateris dextri dolor etiam prius fieri solitus cessauit, pransus est. & egressus horruit, febris ad noctem, doloris exors. tulsicula quædam sicca. Vrina non multa, subsidentia multa. Ab initio rametosa, glabra, diuulsa: post dies quatuor turbulenta, subsidebant, & urina non decolor, subsidentia habens, & collectio nõ apparebat in matula, ubi perfriguisset. Tertia die aluus sua sponte egressit. Quarta subdita glande, stercoracea & biliosa prodierunt, fluxus erat liquidus, Somnus ad noctem non ualde, Verum interdiu aliquantũ dormiebat. Sitis nõ uehemens. Quarta ad noctem maxime cutis circa frontem, & reliquũ corpus mollis, semper superexcedens, febris uinebatur ad manũ, & sub ea humefcebat, pulsus in fronte ualde obscurus, uenarum grauitas in cõuersionibus, & in omnibus egeffionibus ad modicum tempus, semper doloris exors, ab initio anxius, & paulatim uomebat. Septima à glande subdita, egressit ter biliosum ac stercoraceum, liquidum ualde ac pallidum, & iam aliquantũ delyrabat, & humilitas modice quandoq; circa frontẽ, stragula in faciem ducebat, oculos frustra uelut si quis uideret contrahebat, & rursum niqtabat, & stragula reijciebat. Nona die sudor mane obortus ad pectus, perseverabat donec moreretur, & febris, & delyratio augefcebatur. Circa frontem sudor plurimus graueolens, color ualde albus, cutis sub pilis interpuncta, præcordium dextrũ eleuatum, demisit à seipso biliosa. Octaua apparebat uelut culicum morsus, ante mortem tulsien do reiecit uelut ex muco fungos, cõpacta quædam, alba pituita circũdata. Exfcrearat autem et antea parua, alba, lactea, post cœnam in fomno horruit, mane surrexit, capite grauatus horruit, uomuit, capite grauabatur, ad noctem remisit, usq; ad meridiem leniter horruit, rursum noctem grauius tulit, Sequenti die febris acuta, capitis torpor, uomitus multæ bilis, quæ plurima prafina erat, cessauit omnia, somnus ad noctẽ, mane perfrigerabatur, sudor & humiditas per plurimam corporis partẽ, iuxta splenem manu indicabat ad modicum tempus collectionem doloris exortem, statim euauit, ad noctẽ uigil, circa fori tempus exacerbabatur febris, anxietas, uerrigo, tormẽ, capitis dolor, uomitus prafinus, lenis, uiscosus uelut pituita, circa solis occasum cessauerunt omnia, sudor capitis, colli, post uomitũ egressit per aluum stercoracea, liquida, biliosa, neq; nigra, neq; inconuenientia. Noctem moderate habebat, itemq; sequentẽ diem, ad noctem rursum uigil, Vomitus mane similiter & sequenti die, citra anxietatẽ, dolores capitis post sudorem cessarunt, ad uesperam omnia remiserunt. Nona nõ amplius uomuit, magis calefactus est, Reliquis nõ uidebatur febrere, Venæ in temporibus saliebant, doloris omnino exors, sitis semper erat, Nona quum ad selam surrexisset ualde animo linquebatur, à glande subdita egressit rametia nigra & biliosa colore, quantũ stercoracei destillabat, uox fracta, in cõuersionib; grauis, oculi caui, cutis frontis circumtempfa, alioqui bene spirabat, moderatus erat,

ad parietem plerūq; conuersus. flexibilis in decubitu, incuruatus quiescens. lingua alba, leuis. Circa decimam & postea, urinæ rubræ in circuitu, in medio exiguū quid albū. Duodecima ad glandem subditā, similia destillabāt biliosa & ramentosa. post glandem animi deliquiū. postea os resiccabatur. Colluebat semper. & si nō ualde frigida esset aqua, calidā esse dicebat. niuem leniter gustabat, sitis non inerat. stragula semper de pectore repellebat. Clamydem calefieri non sinebat. ignis procul, isq; paruus, utriusq; maxillæ rubor. postea lingua inartiusculata. recalcēbat unum aut duos dies, cessauit. Androphani uocis interceptio. ignorantia. delirium. His sedatis supererat multis annis, & recidiuæ fiebant. lingua permanebat per totum tempus sicca, & si collutione non uteretur, loqui non poterat: & plerūq; erat ualde amara. Aliquando etiam dolor ad cor. Venæ sectio soluit hæc. aquę potus. aqua mulsa. Veratrū quoq; bibit nigrum, biliosum nō prodibat, sed modicū. Tandē hyeme decubuit, & extra se positus mēte motus est. & lingue affectiones similes. calor tenuis. lingua decolor. Vox peripneumonica. de pectore stragula rejiciebat, & se educi iubebat, uelut micinrum, quum nihil clare loqui posset, neq; apud seipsum esset. educebāt ipsum. ad noctē mortuus est. duobus aut tribus diebus decubuit. Nicanoris affectio erat, quū ad conuiuū progrediretur timor tibicina: quū sub initium uocis tibie, in cōuiuio tibia canere audiuisset. præ timoribus turbationes, uix se sufferre posse dixit, quū nox esset. Interdiu uero audiens nihil cōmouebatur. & hæc multo tempore ipsum comitabantur. Damodes qui cū illo erat, cæcutire, & corpore exoluto esse sibi uidebatur: & sanē præruptū locum non accessisset, neq; trans pontē, aut minimæ altitudinis scrobum, ausus fuisset transgredi, præ timore ne caderet, sed per ipsum scrobum ibat. hoc ad tempus quoddā ipsi aderrat. Phœnicis affectio erat. ex oculo dextro plerūq; uelut fulgur elacere putabat. Vbi uero nō diu ipsum clausisset, dolor ad tempus dextrū uehemens oriebatur. postea etiam ad totum caput, & collum. caput intumescēbat retro ad uerticula. & distentio ac duricia erat circum tendines. Si itaq; conaretur cōmouere caput, aut aperire dentes, non poterat, utpote ualde dissentus. Vomitus si quando aborti essent, relatos dolores auertebant, ac mitiores faciēbant. & uenæ sectio profuit. & ueratrū duxit omnigena, & nō minime prafina. Parmenisco etiam prius incidebant tristitia, & desiderium excedendi è uita. quandoq; uero rursus lætus erat. At in Olyntho aliquando autumnī tempore, uoce priuatus decumbebat, quietem agens, ita ut parū saltem loqui conaretur, ac inciperet. Immo etiā si quid loquutus esset, rursus uoce destituebatur. somni aderant. quandoq; uero uigilia: & iactatio cū silentio, & anxietas. & manus ad præcordia uelut dolenti. Aliquando auerius iacebat quietē agens. febris perpetua. & facile spirabat. Postea dixit se cognoscere ingressos. Bibere quādoq; tota die ac noctē, etiam si potus exhiberetur, nō uolebat: quandoq; uero urna derepēte correpta, omnem aquā ebibeat. Urina crassa uelut iumentū. Circa decimā quartam remisit. Cononis serua ex dolore capitis incipiente, extra se mēte mortua erat. & clamor. & querelæ multæ. raro autē quies. Circa quadagesimū diem mortua est. Decem uero diebus ante mortem, uoce destituta & conuulsa fuit. Timocharis seruus ex atrabiliaris esse quum putaretur à tot ac talibus uiris, mortuus est similiter circa eosdem dies. Nicolai filius circa solstitiū hybernū

bernum ex potationibus horruit. ad noctē febres. post die uomitibus biliosus, merus, modicus. Tertia die quū concio adhuc fori plena esset, sudor totius corporis cessauit. & statim rursus calefactus est. uomitus similis. Quarta ab aqua mercurialis egeffit stercorea & liquida. Vrina cineris specie, qualis est aqua mercurialis, non dissimilis, subsidientia non erat, neq; urina multa, pauca quādam in medio uehebatur innatantia. dolores præcordij sinistri & lumboru. Putabat se ex uomitu insuper respirare, & insuper respirabat, quādoq; dupla respiratione. lingua alba, habens ex dextra parte concretionem adnatam. instar lupini. Parum siticulosus erat. uigil. prudens. Sexta dexter oculus maior dum uideret. Septima mortuus est. Verum alius ante mortē eleuata fuit. & mortuo posteriores partes rubefactæ sunt. Meroni circa pleiadum occasum febris. lateris sinistri dolor usq; ad clauiculā, atq; is adeo uehemens ut quiescere nō posset. & inflammatio tenebat. alui egestio multa, biliosa. In tribus ferē diebus cessauit dolor. Calor autē circa septimū aut nonum. Tussis inerat. excreationes neq; biliosæ, neq; multæ fiebant, uerū pituitosæ. tussis comitabatur. cibos gustabat. quādoq; uelut sanus exibat. Corripiebant aut aliquando calores tenues modico tēpore. sudores fiebant ad noctē. Spiritus in calore densior. maxillarū rubor. circa latus grauitas, & sub alas, & ad humerum, tussis tenebant. medicamentū per superna eduxit biliosa. Tertia à medicamēto erupit pus, uerū ab initio morbi quadragesima. repurgabatur circa triginta quinque alios dies, et sanus euasit. Vxori Theotimi in semitertiana anxietas, & uomitus, & simul horror incipiente febre. & sitis. progrediente tempore incipiente febre calor ingens. Vbi aquam mulsam bibisset, & uomisset, et horror, & anxietas sedata sunt. & mali punici succū postea accepit. Diopithis forori in semitertiana, cordis dolor grauis circa accessione, & comitabatur is totam diem. & huiusmodi cordis siue oris uentriculi dolor etiā alijs. similiter aderat. Verū tamen sub pleiadis occasum uiris talia rariora fiebant. Vxori Apomotri in semitertiana circa arcturū, uehemēs cordis dolor circa accessione. & uomitus. & strangulationes ab utero simul instabant, & ad dorsum dolores iuxta spinā. Quum aut huc ipsi peruenerent, cordis dolores cessabāt. Terpidæ matri à Dorisco, quum abortus factus esset mense quinto gemellorū, ex casu, ab altero quidem statim, uelut in tunica quadā liberata est. ab altero uero prius aut posterius quadraginta diebus. Postea autē concepit in uentre. At anno nono dolores uehementes circa uentrem ad multū tempus, quādoq; incipiebāt ex collo ac spinā, cōsistebant autē ad inum uentrem & inguina: quādoq; ex genu dextro, cōsistebant autem ad eundem locū. Et quum quidem iuxta uentrem dolores essent, alius eleuabatur. quū uero sedaretur, cordis dolor coincidebat. Verū strangulationes non aderant. Sed frigiditas corporis, uelut in aqua iacētis. Tempore quo dolor fiebat, per totum corpus dolores spargebatur, mitiores his qui ab initio erant. allium, silphium, acria omnia nō cōferebant, neq; dulcia, neq; acida: neq; uina albā. Verum nigra, & balnea rara. Ab initio quoq; uomitus uehemētes fiebant, & ciborum exclusiones. & circa dolores menses non apparebant. Cleomenis uxori circa fauonij flatus, ex nausea & lassitudine, lateris sinistri dolor, ex collo ac humero auspicatus. febris & horror, & sudor. Incipit autē febris, & nō desinit, sed augebat. & dolor uehemens, tussis, excreatio sub cruetā, pallida, multa.

lingua alba. alui egestiones moderatae, liquidae, urinae biliosae. **Quarta ad noctem** menses prodierunt multi, cessauit & tussis, & excreatio, & dolor, calor autem tenuis. Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor, alui egestiones subcruentae, mucosae. Vbi peperisset, statim sana erat. Polemarchi uxori in morbo articulari coxae dolor de repente, mensibus non prodeuntibus. Vbi betae succo biliffet, uox supprimebatur per noctem, & usque ad meridiem, attamen auscumbat, & sapiebat, & manu significabat, dolorem esse circa coxam. Cliniae forori seniori uomitus, quicquid accepisset per quatuordecim dies, citra febre, cruentorum uomitionum reiectiones, & contracta stragulatio ad cor procedebat. Castorui, feseli, mali punici succus, sedauerunt omnia, abscisis autem dolor moderatus ad lateris mollitudinem, bulbi succus, & uinum lactei reporis, aufteru, & papes quae paucissimi cum oleo. Pausaniae filiam ex fungi crudi esu, anxietas tenebat, stragulatio, dolor uentris. Aquam mulsam calidam bibere ac uomere profuit, & balneum. In balneo fungum euomuit, & ubi illa cessatura essent, exsudauit. Epicharmo circa pleiadum occasum, humeri dolor, & grauitas uehemens ad brachium, anxietas, uomitus multi, aqua potus. Euphranoris filio pustulae uelut a culicum morsu. Post faoniui siccitates fiebant, usque ad aequinoctium autumnale. Sub canem, aestus uehementes, & uenti calidi, & febres sudorificae, & statim aliquantum recalescebant. Tubercula uero iuxta aurem multis fiebant. Aniculae a tulsis uexatae circa nonam diem. Adolecenti splenico ancillae filio, aluo liquefacta, circa idem tempus. Cresiphonti sub arcturum, fere circa septimum. Adolecenti solum suppurata sunt. Eratylli filio euauerunt. Circa utraque tempora, nullae exudationes, lingua praesiccitate blasi. Recti uenti spirauerunt multi ac frigidum, & niues ex clementi caelo quandoque fiebant, & post aequinoctium, austrina aequilonaribus permixta, aquae multae, populariter grassatae sunt rufes, multae, magis autem in pueros. Circa aures multae talia, qualia Satyri habent. Quandoque uero ante hoc tempus hyems ualde hyberna erat, cum niue & pluuijs aequilonaribus. Timonactis filio ferme bimestri pustulae in cruribus, & in coxis, & lumbis ac imo uentre, & tumores ualde rubicundi. His autem sedatis, conuulsionibus & comitialibus fiebant, sine febribus, multis diebus, & mortuus est. Polemarchi filio contigit quidem ut priore tempore suppuratus esset, & excrearet, postea uero calores ipsi erant, & hydropticus erat, & splenicus, & anhelosus ad locum accliuem si quando accederet, impotens, & striculosus, quandoque etiam cibum leniter auerlabatur, & siccatae rufisculae ad multum tempus ita fiebant, titubans obambulabat, & si non facile solubilis esset aluus deorsum, plena reddebatur, & anhelatio ac strangulatio magis fiebant, Tandem autem defluxus & excreatio superuenit, ac tulsis. Excreatio crassa, pallida, purulenta, & febris uehemens cessasse uidebatur, & tussis mitior, & excreatio pura. Redijt rursus febris acuta, spiritus densus, mortuus est. Verum antea riguerunt pedes, & postea perfrigeratus est. Spiritus magis interclusus est. Urina subsistit, extremae partes perfrigeratae sunt, prudens mortuus est, tertia die a recidiua. Thyni filio in febre ardente inedia macerato, alui egestio multa, Verum cum bile, & animi deliquio, & sudore multo fiebat, perfrigeratus est ualde, & uoce destitutus erat rotam diem ac noctem. In stillatum pilanae succum continuit, sapiebat, bene spirabat. Epicharmi filio accidit ex uia & potu cruditas, Postridie mane anxie

anxietate oborta, ubi aquā, acetū, salē bibisset, euomuit pituitā. Postea rigor apprehendit, lauit febricitans. Pectus dolebat. Tertia mane statim sopor modico tempore tenebat, & delirabat. & febris acuta. grauius morbū tulit. Quarta uigil. mortuus est. Aristoni ulcerato pedis digito, cum febre loquelae obsecratur. Carcinoma ascendit usq; ad genu. perijt. Erat autem nigrum, subaridum, graueolens. Cui carcinoma in faucibus uisum est, sanus euasit à nobis. Polyphantus in Abderis caput dolebat in febre uehementi. Urinae tenues, multae. Subsidentiae densae & conturbatae. Quum autem non cessaret dolor capitis, sternutatoria decima die adhibita sunt. Postea ad collum dolor uehementis. Urina prodijt rubicunda cōturbata uelut iumētū. mente motus est phrenitico modo. Mortuus est in uehementibus conuulsionibus. Consimiliter etiam Eualcidae famula, quū multo tempore densae urinae prodijissent, & capitis dolores adessent, phrenitica facta mortua est, eodem modo ex uehementibus doloribus. Nam urinae densae ac cōturbatae, certum signū sunt doloris capitis, & cōuulsionis, ac mortis. Halicarnassensis qui in domo Xanthippi diuere fabatur, aetate hyeme dolebat, & caput non mediocriter. Erat autē annorum circiter quinquaginta. Vena secta est iuxta Mnesimachum. laesum est caput euacuatum, ac perfrigeratū. Non enim facta est suppuratio. Phreniticus factus est, & mortuus. Urinae erant & huic densae. In Cardia Metrodori filio ex dentium dolore corruptio maxillae, & gingiuarum uehemens carnis excrescentia. mediocriter suppuratio facta est. exciderūt dentes molares, & maxilla. Anaxenor in Abderis, erat quidem splenicus, & uiciati coloris. Contigit autem ipsi ut tumor circa femur sinistrum obortus, de repente euanesceret. Non multis uero postea diebus oborta est ipsi circa splenem uelut pustula nocturna ab initio, insuperq; tumor ac rubor durus. Post diem quartum febris ardens oborta est, & liuefacta sunt omnia circum circa, & putrida uidebantur. mortuus est. Verum prius subpurgatus est, & intelligentiam habebat. Clonigus in Abderis, erat quidem nephriticus, mingebat autem sanguinē paulatim plerūq; difficulter. Vexabat etiam aluus dysenterica. Huic mane quidem dabatur lac caprinum, & aquae quinta pars, ita ut ex ambobus cōpositum totum essent heminae tres. Ad uesperā autem, panis ualde afflatus, obsonia, beta aut cucumis, Vinum nigrum tenue. Dabatur etiam cucumis pepo. Hac uero uictus ratione quū uteretur, & aluus substitit, & urinae purae prodibant. Bibit autem lac donec urinae restitutaerunt. Mulieri in Abderis carcinoma factum est circa pectus. erat autem tale. per papillam sanies subcruenta fluebat. intercepta autem fluxione, mortua est. Dinij filio in Abderis umbilicum mediocriter sauciato, fistula parua relicta est. & quādoq; etiam lumbricus per seipsum satis crassus penetravit. & quum febreret, uomebat biliosa. quandoq; uero & haec ipsa per fistulam prodibant. Allapsum est & intestinum ipsi ad fistulam, & uelut fistula corrodebatur, & rursus refringebatur. & tussis permanere prohibebant. Pythoanis filio in Pella febris statim incepta multa. & in somnum collapsio. & cum uocis interceptione somni fiebant. & aluus dura per omne tempus. At gians de ex felle subdita, multa egerebat, & statim remittebat. Verum breui aluus rursus eleuabatur. & febris exacerbabatur. & collapsio in somnum per eadem. Quum autem idem ductus esset, datum est medicamentum quoddam ex his

quæ cnico, & cucumere syluestri, & peplo constant. & biliosa egestio erupit. & statim sopor sedatus est. & febris mitigabatur. & omnia leuiora facta sunt. & iudicatus est die decimaquarta. Eudemus splenem uehementer dolebat. imperarunt ipsi medici ut multū ederet, & uinum biberet modicū, tenue, & multum deambulet. nō mutātū est quicquā. Vena secta est. cibos ac potus parce sumpsit. deambulationes fecit sensim augmēto facto. Vinū bibit nigrū, tenue, sanatus est. Philistidi Heraclidę uxori cōepit febris acuta. rubor faciei, ex nulla manifesta causa. paulo post in die rigorem habuit. quum nō recalesceret, conuulsiō facta est in digitis manuum ac pedum. paulo post recalescēta est. minxit urinas compactis quibusdam innatantibus, nubeculosas, diuulsas. noctem dormiuit. Secunda die rursus riguit. paulo magis calefacta est. & rubor minor. & conuulsiōnes fiebant moderatiores. Vrinæ consimiles. noctem dormiuit. parum uigilauit, quum nulla molestia premeretur. Tertia die minxit coloratiora, modicam subsidentiam habentia. eadem hora rigor apprehendit. Febris acuta. sudor ad noctem per totum corpus. Verum uesperis color ad morbi regij modum permutatus est. noctu dormiuit ac per totum corpus sudauit. Quarta sanatus ex sinistra nare probe fluxit. & menses pauci comparuerūt ordinate. Rursus autem eadem hora febris exacerbata est. Vrinæ compactis quibusdam innatantibus paucae. Aluus natura quidem dura, uerum multo magis substitit, neque quicquam prodibat, si non glandem subdidisset. noctem dormiuit. Quinta febris mitior. & ad uesperam per totum corpus sudabat. & menses prodierūt. & noctem dormiuit. Sexta minxit acruatam multam urinam, compactis quibusdam innatantibus, modicam subsidentiam habentem, cōcolorem. Circa meridiem uero parū rigore tenebatur. aliquantum incaluit. sudauit per totum. noctem dormiuit. Supina parum calefacta est. facile tulit. sudauit per totum. uring boni coloris. iudicata sunt omnia. Tychon in obsidione circa Datum, ictus est catapultā in pectus. & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquisse ferrum in septo trāuerso. & quum ipsi ita uideretur, ad uesperā infusum per clysterē adhibuit, & pharvacum deorsum purgans dedit. Noctem primā transegit. Statim uero ubi dies illuxisset, & medico, & alijs, melius habere uidebatur. erat enim quietus. Prædictio facta est quod ubi conuulsiō fieret, non tarde moriturus esset. Sequentem noctem moleste ferens. infomnis. plerūq; in uentrē decumbens. Tertia mane conuellebatur. Circa meridiem mortuus est. Eunuchus ex uenatione & discursu hydropicus factus est. Quidam circa Elealcis fontem, ad sex annos habuit ex equitatione, inguinum tumorem, uarices, & coxendicum dolores.

Qui lateris mollitudine tabuit, septima die mortuus est. Præpotentis erudi salsa cum melle. Scortatio turpis, dysenteria medela est. Leonidæ filia natura concitata, auersa est: auersa, in iram exanduit: ubi ira exanduit, reconciliata est. Medicus nō intellexit. puella mortua est. Philotimi filius puer uenit ad me in lechina, caluaria os habens medicina destitutus:

in quo uidebam occultas ratiocinationes non esse constantes.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VICTVS RATIONE IN MORBIS

acutis, Iano Cornario Medico Physico interprete.



VI Cnidias appellatas sententias conscripserunt, recte quidem scripserunt ea quæ patiuntur ægroti in singulis morbis, & quomodo quædam ipsorum euenerunt: & hætenus quidem etiã qui medicus non sit, recte conscribere possit, si probe ex singulis ægrotis quæ patiuntur didicisset. Quæ uero medicum ante discere oportet, ægroti non referente, horum pleræq; omissa sunt, alia in alijs, & quædam ualde commoda ad coniecturam. Quum autem ad coniecturam dicatur, quo modo singula curare oporteat: in his multa aliter sentio, quàm uelut illi prodiderunt. Et non solum ob hoc nõ laudo. Verum quòd etiã paucis numero usi sunt medicamentis. Nam exceptis morbis acutis, plurima ab ipsis relata sunt pharmaca aluum deorsum purgantia exhibenda, & serum ac lac pro tempore. Si quidem igitur hæc bona essent, & morbis cõuenientia, in quibus exhibenda esse monuerunt: longe magis laudanda essent, eo quòd quum pauca sint sufficiunt. Nunc uero res non ita habet. Qui tamen postea eam tractationem repetierunt, magis sanè medico modo, de his quæ singulis exhibenda sunt transegerunt.

At neque ueteres quicquã memorabile de uictus ratione conscripserunt, & quanquam magna hæc res sit, eam omiserunt: attamen multos in singulis morbis modos, multiplicemq; ipsorum diuisionem non ignorarunt aliqui.

Cæterum numeros singulorum morborum clare pronuntiare uolentes, non recte scripserunt. Non enim facile sit enumerare, si ex eo quis ægroantium morbum æstimet, quod alter ab altero aliqua re differt: & ideo non poterunt eundem morbum esse, si non idem nomen habeat. Mihi uero placet, ut in uariis arte mentem adhibeamus. Nam quæcunque opera bene ac recte tractat, ea singula bene ac recte facere oportet: & quæ cito, cito: & quæ pure, pure: & quæ citra dolorem tractare oportet, ita facere ut quàm minimus dolor sentiantur: & alia omnia eiusmodi insigniter præ alijs ad meliorem modum tractare oportet. Maxime uero laudauerim medicum qui in acutis morbis, qui plurimos homines occidunt, præ alijs insigniter ad meliorem partem excellat. Sunt autem hi acuti, quos ueteres nominauerunt pleuritidem, peripneumoniã, phrenitidem, & febrem ardentem, & alij morbi qui ex his hærent, quorum febres omnino continuæ sunt, & occidunt. Quum enim non pestilentis morbi modus quis communis grassatus fuerit, sed sparsi fuerint morbi, & non similes, ab his morbis plures moriuntur, quàm ab alijs omnibus. Idiotæ igitur non ualde cognoscunt eos qui in his, alijs præstant: aliarumque curationum magis aut laudatores, aut uituperatores existunt. Et profecto magnum signum hoc est, quòd populares minime de his morbis intelligentiam habeant, ueluti quos studio consequi oportet. Nam qui medici non sunt, medici esse uidentur, maxime propter hos morbos. Facile est enim nomi-

na ediscere, quæ proferri solent apud ægros his morbis affectos. Si enim quis pitisanæ succum nominarit, & uinum tale, aut tale, aut etiam aquam mulsam, omnia hæc eadem plebeis hominibus, & meliores, & deteriores medici dicere uidentur. At res hæc non ita se habet, sed in his sanè uel maxime alij ab alijs differunt. Videntur autem mihi digna esse quæ scribatur maxime hæc, quæ ignorantur à medicis, maxime scitu cōmoda, & quæ magnas utilitates, aut magna detrimenta afferunt. Quæ itaq; ignoratur hæc sunt. Cur nam in acutis morbis, aliqui medici omne æuum terunt, pitisanas non colatas exhibentes, & recte se medicari putant. Aliqui uero plurimi faciūt, ut nullum ordeum æger deuoret. Magnum enim detrimentum afferre arbitrantur. Verum per linteum excolantes succum exhibent. Quidam uero ipsorum neq; pitisanam crassam dederint, neq; succum: atq; hi partim donec ad septimū diem æger perueniat, partim uero perpetuo, donec iudicatus fuerit morbus. Sanè huiusmodi quæstiones ne proponere quidem medici consueuerunt, fortassis autem neq; si proponatur, comperiantur. Proinde calumniā incurrit tota ars apud uulgus adeo magnā, ut neq; omnino medicinam esse putent. Nam in acutis morbis intantum inter se differunt artifices, ut quæ alter exhibet optima esse putans, ea alter iam mala esse existimet: & ferè ob id artem uaticinationi similem esse dixerint. Quia uates eandem uatem, si sinistra appareat, bonam esse ducunt: si dextera, malam. Et in aruspicina talia sunt, alia in alijs. Verum aliqui uates cōtraria his dicunt. Afferro autem hanc speculationem pulcherrimam esse, & cognatā plurimis ac maxime commodis in arte. Nam ægrotantibus omnibus plurimum ad sanitatem confert, & sanis ad securitatem, & his qui se exercēt, ad bonum habitum, & ad quod quisq; uoluerit. Pitisana igitur recte omnibus frumentaceis edulij prælata esse uidetur, in morbis acutis, & laudo sanè eos qui ipsam prætulerūt. Nam uiscositas ipsius leuis est, & continua, & iucunda, & lubrica, & moderate humida, & sitim eximit, & facile eluitur, si forte & hoc opus sit: & neq; adstrictionem habet, neq; malam turbationem, neq; in uentre intumescit. Intumuit enim in coctura quā maxime tumescere solet. Quicumq; igitur pitisana in his morbis utuntur, nulla die uasa uacua fieri permittant, ut ita dicam, sed utantur, & non intermittant, si non aut ob medicamentū, aut infusi per dysterem usum, intermittere oporteat. Et qui quidem bis in die cibum capere soliti sunt, eis bis danda est: qui uero semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verum sensim progressu factio, si fieri poterit, etiam his bis detur, si sanè opus habere uisum fuerit. At uero copia sufficit ab initio dare nō multa, neq; minus crassam: sed ut consuetudinis gratia quid ingeratur, & ut ne multa uasorum uacatio fiat. Cæterum quod ad augmentū copię sorbitionis attinet, si quidē sicior fuerit morbus, quā quis putarit, nō ita magna copia dare oportet, sed ante sorbitionem, aut aquam mulsam, aut uinum præbibendum exhibere, utrum ex his conuenientius fuerit. Verum uero conueniat, in singulis modis referretur. Si uero os humectetur, & à pulmone prodeūtia qualia oportet fuerint, sorbitionis copiam, ut in summa dicam, augere oportet. Quæ enim citius & magis humectantur, celeritatem iudicationis significant. Quæ uero tardius & minus, tardioiorem iudicationem significant. Et hæc quidem per se talia omnino existunt. Verum multa quoque alia commoda omittuntur, ex quibus coniecturas

de pitisana

de augmento
in aqua

iecturas facere oportet, quæ postea referentur. & quanto copiosior purgatio fuerit, tanto plus dare oportet, usque ad iudicationem, maxime duobus à iudicatione diebus, quibus sanè quinta, aut septima, aut nona iudicare uidetur. ita ut etiam parium ac imparium dierum rationem habeas. Postea uero sorbitione quidem mane utendum est. Vespere uero ad cibos transeundum. Conueniunt autem talia ut plurimum his qui statim tota pituita utuntur. Nam & dolores in pleuriticis statim sua sponte cessant, ubi memorabile quid spueri ac expurgari ceperint. & purgationes longe perfectiores sunt, & minus suppurati fiunt, quæ si quis aliter uictum suppeditet. & iudicationes simplices, & melius iudicantes, & minus reuertentes. Pituitam porro ex optimo hordeo factam esse oportet, & quam optime coctam, & præsertim si non solo succo uti uelis. Nam unâ cum reliqua pituita uirtute, lubricitas facit ut ordeum dum deglutitur non lædat. Nunquam enim adhæret, neque secundum thoracis rectitudinem moram trahit. Lubricissima autem est, & maxime sitim eximit, & facillime concoquitur, & debilissima est, quæ optime cocta est, quibus omnibus opus est. Si quidem igitur non opem tulerit quis quantum opus est, ut sufficiens sit eiusmodi pituita: forbitionis modus, multis modis lædetur. Etenim uerbi causa, quibus cibus in tus conclusus est, si quis non facta deorsum euacuatione, sorbitionem dederit, dolorem si adeft amplius exacerbauerit: & si non adeft, statim induxerit. & spiritus densior fiet. Hoc uero malum est. Pulmonem enim resiccat, & præcordium, & pectinem, ac septum transuersum dolore affligit. Quinetiam si lateris dolor asiduius est, & ad calefactoria non remittit, & spiritum non prodit, sed citra putrefactionem ac concoctionem ualde uiscosum fit, si non soluerit quis dolorem, aut uentre mollitio, aut uenæ secta, utrum tandem horum conduceret pituitam autem ita habetibus dederit, cito mors talium contingeret. Propter has igitur causas, & alias huiusmodi adhuc magis, qui tota pituita utuntur, septima die & citius moriuntur, partim mente læsi, partim ab erectæ ceruicis spiratione, & stertore suffocati. Tales uero ueteres sydere ictos esse putauerunt, ob hoc quidem maxime, non minus autem quod et mortuis ipsis latus liuidum reperitur, ut simile quid plaga appareat. Causa uero huius est, quod prius quam dolor soluitur moriuntur. Cito enim anhelosi fiunt. Præ multo autem ac denso spiritu, uelut iam dictum est, ualde uiscosum circa concoctionem fit sputum, & egressum fieri prohibet. Immo stertorem inducit, charilaginosi pulmonis arteriarum partibus bronchijs appellatis impactum. & ubi ad hoc deuenit, lethale iam plerumque existit. Nam & ipsum sputum impactum, prohibet quidem spiritum intro ferri, cogit autem cito extra ferri. Atque sic mutuam opem ad malum inter se conferunt, dum & sputum impactum, densum spiritum facit: & hic quum densus fit, sputum insuper uiscosum facit, & lubricum fieri, ac elabi impedit. Occurrant autem hæc, non solum si pituita intempestiue utantur: uerum multo magis, si quid aliud ederint, aut biberint, quod minus quam pituita idoneum sit. proinde plerumque consimilia sunt auxilia, & his qui tota pituita utuntur, & his qui succo ipsius: his uero qui neutro horum, sed solo potu, quandoque etiam diuersimode auxiliari oportet. At uero hoc modo omnino facere oportet. Si cui à cibo recens accepto, & alio nondum subeuacuata, febris inceperit, siue cum dolore, siue sine dolore, inhienda est sorbitionis exhibitio, donec putarit

cibum

*hædet**Lenissimi Modis
Purginge pituita**ca. (horborum, 8)*

cibum ad infernam intestini partem secessisse. Utendum autem est potu aceti multo, si dolor affuerit, hyeme quidem calidi, æstate uero frigidi. Si uero multa fuerit sitis, etiã aqua multa, & aqua. Postea uero si dolor aliquis affuerit, aut periculosus aliquid apparuerit, danda est forbitio neq; multa, neq; crassa, atq; hæc post septimū, aut nonum diem, si ualidus æger fuerit. Si uero nõ subijt ueluti or cibis ei qui recens cibum accepit, si quidem ualidus sit, & ætate uigeat, infusum per clysterem adhibendū est. Si uero debilior fuerit, glande utendum est, si non sua sponte probe prodierit. Tempus porro exhibendæ forbitionis hoc maxime obseruare ab initio, & per omnem morbū oportet. Quum quidem pedes frigidi fuerint, inhibere oportet forbitionis exhibitionē. Maxime uero & à potu abstinendum est. Vbi uero calor descenderit ad pedes, tunc exhibere conuenit, & putare in omnibus morbis, & nõ minime in acutis, & maxime in his qui magis febriles ac periculosissimi sunt, tempus hoc magnam uim habere. Utendum est autem primū quidem maxime succo. Deinde uero pitana, iuxta prædictas coniecturas diligenti facta consideratione. Cæterū pleuritis, hoc est dolor lateris siue ab initio fiat, siue postea, calefactorijs quidem primū non alienū est tentare dissoluere. Ex calefactorijs uero optima est aqua calida in utre, aut in uesica, aut in uase æneo, aut testaceo admota. Verum molle quid antea ad latus supponere oportet, lenitatis ergo. Commode etiam spongia mollis, magna, ex aqua calida expressa apponitur. Cõregere uero stragulis ipsum fomentū oportet. Nam & ampliore tempore sic sufficiet & durabit, & simul ut ne uapor ad egrorantis spiritum afferatur: nisi fortassis & hoc ad aliquid cõmodum esse uisum fuerit. Aliquando enim ad aliquid cõmodat. Insuper autem & ordeum, & eruum, in aceto diluto, ita ut paulo acidius sit q̄ ut quis bibere possit, dissoluta ac feruifac̄ta, & in marsupia coniecta, apponere oportet: & fursur eodē modo. Siccum autem fomentū præbent sal & milium torrefactum, in laneis sacculis conuenientissimū. Nam & leue, & lene est miliū. Soluit autem huiusmodi molitorum fomentū, etiam dolores ad clauiculam pertinentes. Sectio autem uenæ non similiter soluit dolorem, si non ad clauiculam pertingat dolor. Quod si ad calefactoria dolor non soluatur, nõ multo tempore calefacere oportet. Resiccat enim hoc pulmonem, & suppurationē facit. At si quidem dolor ad clauiculam de se significationē præbeat, aut grauitas ad brachium, aut circa mammam aut supra septum tranuersum: uenam secare prodest in cubiti flexura internā, & non cunctari copiosum sanguinē detrudere, donec multo rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubicundo liuidus. Vtrūq; enim cõtingit. Si uero sub septo tranuerso fuerit dolor, ad clauiculam autē de se significationē non præbeat, aluum mollire oportet, aut ueratro nigro, aut peplio, ita ut ueratro quidem daucum, aut fesele, aut cuminū, aut anisum, aut aliud quid ex odoratis ammisceas, peplio uero silphij succum. Sed hæc inter se si miscantur, confamilis modi existunt. Ducit autem nigrum ueratrū melius, & ad iudicationē commodius q̄ peplium. Peplium uero flatus magis erumpere facit. Ambo autē hæc dolorem sedant. Sedant item alia multa aluum subducētia medicamēta. Verum hæc inter ea quæ ego noui optima sunt. Alioqui & ea quæ in forbitionibus exhibentur aluum subducētia medicamēta opitulantur, quæctiq; non ualde iniucida sunt, aut ob amaritudinē, at propter aliam quandam iniucunditatē, aut ob copiam

in uena fleuiculi

peplio si soluit dolo
 rem teno in melle
 in uas ad dolo
 res hinc fit. 105. 2. 1. g.
 qui dolo det paco
 in guboni Oton de uo
 na aneque Hromor
 ide, Vnde Oton naxa del
 ato Cæcacio Vg de uo
 uis. Vnde Minutio Vm
 i pulchra Oton in uenit
 i paco

piam; aut colorem, aut aliquam suspicionem. Prifanā tamen statim infuper forbendam dare oportet, postq̄ medicamentum bibit, nō memorabili copia pauciorē, q̄ quanta sumere adfuetus est. Nam & rationi cōsentaneum est, in media purgatione forbendā non dare. Quum autē cessauerit purgatio, tunc minus forbeat de ea, q̄ adfuetus est. Postea uero reducat semper ad maiorē copiam, si & dolor sedatus fuerit, & nihil aliud aduerferit. Idem mihi sermo est, si etiā prifanā succo uti opus fuerit. Melius enim esse assero, statim omnino incipere forbere, q̄ praeuacuatīs iam uasis forbere auspicari, aut tertia, aut quarta, aut quinta, aut sexta, aut septima die, si sanē nō iudicatus fuerit morbus ante hoc tēpus. Præparationes autē & his consimiles faciendæ sunt, quales dictæ sunt. De forbitionis igitur exhibitione ita sentio. Sed & de potū, qualemcunq̄ tandē quis ex describēdis sumpturus est, eadem mihi penitus sermonis ratio est. Noui autem etiā medicos maxime cōtraria facere his quæ fieri oportebat. Omnes enim uolunt, ubi sub morborū initia homines fame præmacerarunt, duobus aut tribus, aut etiā pluribus diebus, sic forbitiones exhibere, itemq̄ potus: & fortassis etiam paripis esse uidetur, ut magna corpori mutatione fiēte, etiā magnū quid ualde contra obijciatur. Verum mutare quidem non parum, bene habet. Recte tamen mutatio transferenda est, & ex mutatione adhuc magis exhibitio eorum quæ per os sumuntur. Maxime igitur lædi poterint, si non recte mutationem fecerint, hi qui tota prifana utuntur. Poterint etiā lædi qui solo succo utuntur. lædi quoq̄ possunt qui solo potu utūtur. Minime uero hi. Oportet autem & in sanorum adhuc hominū uictu addiscere quæ cōferunt. Si enim sanis tales aut tales uictus multū differre uidētur, tum in alijs quibusdam, tum in mutationibus: quomodo nō etiā in morbis multū differāt, & maxime in acutis? Atqui facile est hoc addiscere, quod simplex uictus cibi ac potus, ipse sibi ipsi semper similis, securior omnino est ad sanitatem, q̄ si quis derepente ad alium meliorē, magnam mutationē faciat. Nam & his qui bis in die cibum sumunt, & his qui semel, repētinae mutationes noxas ac ægritudines inducūt. Et eos sanē qui prædere nō adfueti sunt, si pransi fuerint, statim infirmos facit hoc, & toto corpore graues, & debiles, & pigros. Si uero etiam infuper cœnauerint, aciedum ruciantes. Quibusdam uero etiam alui liquida egestio oboritur, quū præter cōsuetudinem, uentriculus grauetur, solitus resicari, & nō bis intumescere, neq̄ bis cibos coquere. Auxiliatur igitur his, mutationē rursus adæquare, dormire enim oportet uelut nocte reducta post cœnam, hyeme quidē, absq̄ frigore, æstate uero, absq̄ calore. Si uero dormire non queat, ubi multam lentam deambulationem non stando oberrauit, nihil cœnet, aut pauca, eaq̄ innoxia. Insuperq̄ minus bibat, & potū non aquosum. Talis autē adhuc magis affligetur, si ter in die ad satietatem cibum acceperit, & adhuc magis si sæpius. Quamquam sanē multi sint, qui facile ferunt, si ter in die cibum copiose accipiant, qui ita sunt adfueti. Quin & hi qui bis in die cibum capere soliti sunt, si pransi non fuerint, debiles & infirmi sunt, & ad omne opus timidi, & uentriculi osculum dolent. Viscera enim pendere ipsi uidētur: & calidam ac cum uirore pallidam urinam mingunt, & alui egestio cōburitur. Quibusdā etiam os amarescit, & oculi caui sunt, & tempora palpitant, & extremæ partes perfrigerantur. Ex pleriq̄ ex his qui pransi nō sunt, cœnam edere nō possunt. Si uero cœnā sumperint, uentri-

effectus morbi

culum grauat, & multo magis ægre in lecto degunt, quæ si etiam pransi fuissent. Quum igitur talia hæc sanis fiant, ob victus dimidiæ diei mutationem præter consuetudinem: apparet neque apponere, neque detrudere commodum esse. Si igitur hic qui præter consuetudinem semel in die cibum accepit, ubi tota die uasa uacua fecit, quantum consuevit coenauerit, uerisimile est ipsum, si tunc quum im- pransus esset doluit ac ægrotauit, & ubi coenauit grauis fuit: multo magis grauari. Si uero etiam longiore tempore euacuatis uasis, postea derepente coenauerit, adhuc magis grauabitur. Qui igitur præter consuetudinem uasa uacua fecit, ei hanc diem rursus adæquare sic conducit absque frigore, & calore atque labore. Hæc enim omnia grauiter tulerit, & coena multo minor exhibenda est, quæ consueuit, eaque non sicca, sed modi humectioris. & postea bibat potum non aquosum, neque pauciorum quam pro cibi ratione. Sed & postea die pauca prædeat, quousque sensum progressu fiente ad consuetudinem reuertatur. Qui tamen supernas partes amara bile infestantur, talia molestius ferunt. Pituitosi autem supernis partibus, cibi præter morem abstinentiam omnino facilius ferunt. Quare etiam semel in die cibum præter morem capere, facilius utique eisdem tulerint. Sufficiens igitur & hoc signum est, quod maximæ mutationes eorum quæ circa naturas nostras ac habitus contingunt, maxime morbos faciunt. Non igitur licet intempestiue, neque uehementissimas uasorum uacuationes facere, neque uigentibus morbis, & in inflammatione consistentibus, cibos exhibere, neque licet derepente in tota re quicquam, aut huc aut illuc mutare. Multa uero his cognata, ex his qui uentri contenti sunt, itemque alia referre quis possit, quod facile quidem ferunt cibos, quibus aduerti sunt, etiam si natura non sint boni. Similiter etiam potus: ægre autem ferunt cibos, quibus aduerti non sunt, etiam si non sint mali, similiter etiam potus, & quæ quidem multus carnis esus præter consuetudinem assumptus facit, aut allium, aut sulphurium, aut succus ipsius, aut caulis, aut alia huiusmodi, magnas quasdam peculiaris uires habentia, minus admiretur quis ubi talia dolores uentriculis magis quam alia inducunt. At iusta fuerit admiratio, si didiceris quantam maza turbationem, & molem, & flatum, & tormen uentriculo inducat, si præter morem ingestæ fuerit, ab eo qui maza edere non est solitus: aut qualem sitim panis ipse calidus ingestus inducat, et repentinam repletionem, ob siccandi uim, & quod tarde transit: & quæ diuersas inter se affectiones faciant, & panes ualde puri, & qui ex toto sunt collati, præter consuetudinem in cibo accepti, itemque maza sicca præter morem, aut liquida, aut uiscosa: & quale quid faciant potentæ recetes non aduersus, & alia his qui recentibus uti aduerti sunt, itemque uini & aquæ potus, præter morem derepente uicissim permutatus, & aquosum uinum, & meracum, præter consuetudinem derepente potatum. Illud enim humiditatem in superno uentre inducit, & flatum in inferno. Hoc uero uenarum palpitationem, & capitis grauitatem ac sitim. Quin & album uinum, & nigrum, si quis præter consuetudinem permutet, etiam si ambo uinosa fuerint, tamen multa in corpore alterant, ut minus mirum esse quis dixerit, dulce & uinosum uinum non idem posse, si derepente permutata fuerint. Porro huiusmodi aliquam partem sermoni contrario patrocinari oportet: quod mutatio uictus his facta est, corpore non mutato, neque ad robur, ut cibus apponere opus sit, neque ad debilitatem, ut detrudere oporteat. Insuper autem & robur coniectandum est, & morbi uniuersumque modus, & hominis natura, & consuetus

consuetudo uictus acri, non ciborum solum, sed etiam potuum. Multo autem minus ad additionem procedendū est. Nam detractionē omnino tollere saepe conducit: ubi suffecturus est aeger, donec morbi uigor maturescat. In quibus autem hoc faciendum sit, scribetur. Multa uero etiam alia relatis cognata scribere quis possit. Hoc tamē melius testimoniū est. Non enim cognatum est rei illi de qua plurimus à me sermo habitus est, sed ipsa res opportunissimū est documentum. Nam ab acutorū morborū initio, aliqui quādoq; eadem die qua morbus inaecepit, cibos comederunt: aliqui postridie: quidā etiam forbuerunt quicquid oblatum esset, quidam etiam cyceonē. Omnia autē haec deteriora quidem sunt, q̄ si quis alio modo uictū instituisset, multo tamen minus detrimentū afferunt in hoc tempore peccata, q̄ si quis primis duobus aut tribus diebus, penitus uasa uacua fecisset, et quarta aut quinta die, tali uictu usus esset. Deterius tamē est, si omnibus his diebus uasis euacuatis, in posterioribus diebus hoc modo uictū instituat, prius q̄ cōcoctus ac maturus sit morbus. Etenim hoc modo mortem plurimis manifeste affert, si nō omnino facilis fuerit morbus. Quae uero ab initio cōmittuntur peccata, non similiter, ut illa medelam omnē respuunt, sed multo facilius correctionē admittunt. Hoc igitur maximū documentum esse arbitror, quod primi dies forbitione tali, uel tali, non sint priuandi, in his qui paulo postea talibus, aut talibus forbitionibus usuri sunt. Funditus igitur ignorant, tum hi qui granosa pitifana utuntur, quod ab ipsa laeduntur, quum sorbere inceperint, si duobus, aut tribus, aut pluribus diebus antea uasa euacuauerint: tum hi qui succo utuntur, quod sorbentes laeduntur, ubi nō recte forbitionē inceperint. Tunc tamen cauent, & magnam noxam afferre cognoscunt, si prius q̄ maturus factus fuerit morbus, granosam pitifanā forbuerit aeger, succo uti adfuetus. Omnia igitur haec magna testimonia sunt, quod medici aegros nō recte ad uictum perducunt. Sed in quibus morbis uasa uacua facere nō oportet, his qui forbitionibus uti debent uasa uacua faciunt. In quibus uero ex uasorū uacuatione, ad forbitiones mutationē facere nō oportet, in his mutationē faciunt, & hoc plerūq; absolute. Aliquādo uero in his temporibus mutationem ad forbitiones faciunt ex uasorū uacuatione, in quibus saepe ex forbitionibus ad uasorū uacuationē accedere expediebat, si ita morbū exacerbari cōtingat. Aliquādo autē & cruda attrahuntur de capite, & à thoracis regione, biliosa, & uigiliae ipsius cōiiciunt, ob quas nō coquitur morbus: & tristes ac amarulenti fiunt, & delirant, & splendores ipsius ob oculos obuertantur, & aures sonitu plenae sunt, et extremae partes perfrigeratae, & urinae in coctae, & spurta tenuia, & falsa, & meraco lore tineta, ac pauca, & sudores circa collū, & anxietudines, & spiritus in latiorne sursum uersus offendens, densus, aut etiam ualde magnus, supercilia distenta ac grauata, deliquia animi praua, & stragulorū de pectore reiectiones, & manus tremulae. Quādoq; uero labiū infernum concutitur. Haec autē in principijs comparētia, uehementis delirij significationē praebent, & plerūq; acri moriuntur. Qui uero effugiunt, aut cū abscessu, aut cum sanguinis è naribus fluxione, aut ex crasi puris spūto effugiunt: alias uero minime. Neq; enim talium rerū peritos medicos esse uideo, quomodo debilitates in morbis dinoscere oporteat, & quae ex uasorū uacuatione efficiuntur, & quae propter aliam aliquam irritationem, & quae propter dolorē, & praecacumine morbi: itemq; quot affectiones, &

omnigenas species, natura nostra & habitus singulis pariat: & quidem quum talium cognitio, aut ignorantia, salutem aut mortem afferant. Maius enim malum est, si ob dolorem & morbi acumen debilitato, exhibet quis potum, aut forbitio- nem copiosiorē, aut cibum, ob uasorum uacuationem debilem esse existimans. In decorum etiam est ob uasorum uacuationē debilitatum non cognoscere, & uictum premere. Affert equidem periculum aliquod & hoc peccatum, uerum multo minus quā alterum. Multo autē magis risu dignū hoc peccatum est quā illud alterū. Si enim alius medicus, aut etiam idiota, ingressus cognouerit ea quae contigerunt, & edenda ac bibenda dederit ea quae alter prohibuit, palam auxiliū tulisse putabitur. Talia uero faciunt, ut artifices maxime ab hominibus uituperentur. Videtur enim ipse ille qui ingressus est medicus aut idiota, uelut mortuū fuisse talle. Scribentur autē de his quoque signa, ex quibus singula dinoscere oportet.

Consimilia tamen illis quae circa uentrē contingunt, & haec sunt. Nam si totum corpus praeter consuetudinem multū quiescat, non statim magis robustum fit. Si uero etiam tibi multo tempore quieuit, de repente ad labores prodierit, uictiofum quiddam palam operabitur. Ad eundem modū etiam singulae corporis partes. Nam & pedes tale quiddam operabuntur, & alij articuli laborare non adfuerit, si interposito tempore de repente ad laborandū prodeat. Eadem etiam oculi & dentes perpetientur, & quaecumque tandem pars. Nam & lectus praeter morem mollis dolorem inducit, itemque praeter consuetudinem durus. Sed & si sub dio lectus praeter morem sternatur, corpus indurat. Quin & talium omnium exempla scribere fatius fuerit. Si quis enim accepto ulcere in tibia, neque ualde periculoso, neque adeo contemnendo, ita ut neque ipsi ita difficulter, aut adeo facile ulcera sanescant: statim prima ab initio die decubens curetur, & nequaquam crus eleuet, hic sane hoc modo citra inflammationem fuerit, & sanus multo citius sic fiet, quam si obambulans curetur. Attamen si quinta aut sexta die, aut etiā prius surrexerit, & progredi uoluerit, magis utique affigetur ac dolebit, quam si statim ab initio obambulans curatus esset. Si uero etiam multum de repente se fatigauerit, multo magis dolebit, quam si illo modo curatus, in illis diebus ita se fatigasset. Perpetuo igitur haec omnia inter se testimonium praebent, quod omnia quae de repente multum supra modum huc & illuc mutantur, laedunt. Multiplex igitur in uentre laesio est, si ex multa uasorum uacuatione, plus moderato de repente ingeratur. Quin & in reliquo corpore, si ex multa quiete, ad ampliorem laborem de repente deueniat, multo magis laedetur, quā si ex multo cibo ad uasorum uacuationē transmutetur, & si ex multo labore de repente ad otium ac segnitiam exciderit. Oportet tamen & his corpus quiescere. Oportet item illis uentrē a ciborum copia quiescere. Sin minus, & dolorem in corpore inducet, & totius corporis grauitatē. Plurimus itaque sermo de mutatione huc atque illuc à me habitus est, eo quod haec nosse ad omnia commodum sit, & ad hoc praesertim de quo nobis sermo erat, quod in acutis morbis ad sorbitiones mutationē faciunt ex uasorum uacuatione. Facienda enim est mutatio uelut ego iam iubeo, deinde non est utendum sorbitionibus priusquam morbus maturus factus fuerit, aut aliud quoddam signū apparuerit, uel uacuatoriū, uel irritatoriū, circa intestinū, aut circa praecordia qualia scribentur signa. Vigilia fortis, potus & cibos crudos & inconcoctiores facit, Et rursus in contrariam partē mu-
tatio

tatio, diffoluit corpus, & excoctionem ac capitis grauitatem inducit. Vinum porro dulce, & uinosum, & album, ac nigrū, & aquā mulfam, & aquam, & acetum mulfum, his notis distinguere oportet in morbis acutis. Vinum dulce minus caput grauat, q̄ uinosum, & minus mentē ferit, & magis q̄ alterum per aluum & intestinū subit. Viscera uero magna facit, splenē & hepar. Quare neq; his qui amara bile abūdant cōmodum est. Nam & siticulosum in talibus est, & flatuosum in superno intestino: nō tamen inferno intestino inimicū pro flatu ratione, & quidem quū non ualde penetret flatu à uino dulci, sed circa præcordia moretur. Certē per urinam hoc minus exit omnino q̄ uinosum albū. Spiritum uero magis educit dulce q̄ alterū. & quibus quidē siticulosum est dum bibitur, his minus q̄ alterum uinū educit. Quibus uero siticulosum nō est, his magis q̄ alterum educit. At uero album uinosum uinū, plurima ac maxima ex parte iam & laudatum & uituperatū est, in dulcis uini enarratione. Ad uescicam autem magis penetrat q̄ alterum: & quum urinam ciet, ac semper perrūpat, multum in his morbis profuerit. Nam & si ad alia incommodius sit altero, attamen quæ in uescica sit ab ipso purgatio, liberat, si quale oportet propellatur. Bonæ uero hæ notę sunt de uini utilitate ac detrimento, quas seniores me non uerūt. Fuluo uero uino, & nigro austero, in his morbis ad hæc uti poteris, si capitis grauitas nō affuerit, neq; mentis percussio, neq; spiritū ab ascensu prohibeatur, neq; urina suppreffa sit: alui autē egestiones humectiores ac ramētores fuerint. In talibus sanē, uel maxime cōuenit ex albo transmutationē facere, & si qua his similia existūt. Hoc uero insuper intelligere oportet, quod si aquosum fuerit uinū, supernas partes omnes, & eas quæ circa uescicā sunt minus lædet. Verum partibus circa intestinum magis proderit, si meracius fuerit. Aqua uero mulfā si bibatur per totū morbum in acutis morbis, in totū quidem his qui amara bile abūdant, ac magna uiscera habēt, minus cōmoda est q̄ his qui tales nō sunt. Siticulosa tamen minus est dulci uino. Pulmonē enim mollit, & spiritū moderate educit, & tulsim lenit. Habet enim uim quandam exterioriā, quæ magis moderato spiritū uiscosum facit. Vrinās etiā sufficiēter ciet aqua mulfā, si nō aliqua ex uisceribus affectio prohibeat. Sed & biliosa per aluū magis egerit, quandoq; bona, quandoq; magis q̄ conuenit colore saturata, ac spumiosiora: atq; hoc biliosis & magna uiscera habētibus magis cōtingit. Spiritū igitur educationē, & pulmonis mollitionē, aquosior aqua mulfā magis facit. At spumosas alui egestiones, & biliosa magis q̄ conuenit colorata, ac magis cauida, meraca aqua mulfā magis ducit q̄ aquosa. Talis autē egestio habet quidē & alia magna nocumēta: Neq; enim ex præcordijs ardorē extinguit, sed concitat, & anxiam molestiam, ac membrorū iactationē facit: Verum & intestina & sedem exulcerat. Horum autē auxilia scribentur. Qui igitur aqua mulfā utitur, absq; forbitionibus, pro alio potu, in his morbis, hic multū successum percipiet, & nō in multis successu destituetur. Quibus autē danda sit, & quibus non, & ob quas causas non danda, maxima ex parte dictū est. Damnata uero est aqua mulfā ab hominibus, ueluti quæ bibētes ipsam extreme debilitet: & propterea mortē accelerare putata est. Verū hoc propter eos qui seipfos fame cōficere cōstituerunt dictū est. Aliqui enim aqua mulfā sola in potu utitur, nimirum ueluti talis existat. At hoc non omnino hoc modo se habet. Sed si sola bibatur, multo quidē fortior est, q̄ aqua, si non aluum exturbet. Sed & uino albo ac tenui, &

educit, sed minus q̄ alia, si quis semper aquæ potu utatur. Si tamē inter acetum mullum & aquā mullam, parū aquæ absorbeat, sputū educit, propter qualita- tis potuū tranſmutationē. Inundationē enim quandā inducit. aliās aut̄ neq̄ si- tim ſedat, ſed exacerbat. Eſt enim naturę biliōſæ biliōſa, et præcordio mala, imō peſſima ſit ac biliōſiſſima, & vires maxime proſternit, ubi in uacuitatē ingreſſa fuerit. Sed & ſplenē auget & hepar, ubi inflammatū fuerit, & fluctuat ac ſuperin- natat. Nā & tardi trāſitus eſt, eo q̄ frigida eſt & cruda ac incoctilis, & neq̄ per aliuū ſecedit, neq̄ per urinas trāſit. In ſuper aut̄ & propterea læſionē inducit, q̄ à natura ſtercus nō ſubducit. Si uero etiā dum adhuc frigidi ſunt pedes aliquādo bibita fuerit, hæc omnia multo plus lædit, ad quodcūq̄ tādē ipſorū peruene- rit. Vbi tamē in his morbis ſuſpicatus fueris, aut capitis grauitatē uehemētē, aut mētis percuſſionē, penitus à uino abſtinendū eſt, & aqua in tali utendū: aut uinū aquoſum & albū penitus dandū, & penitus inodorū, & poſt ipſius potū aqua modica in ſuper bibēda. Ita enim robur uini caput & mentē minus percel- let. In quibus aut̄ potu ipſius maxime utendū ſit, & quādo ualde multa, & quā- do moderata, & quādo frigida, & quādo calida, partim prius dictū eſt, partim pro tēporis occaſiōe dicitur. Cæterū de reliquis potibus, qualis eſt ordeaceus, & qui ex herbis ſiūt, & qui ex uua paſſa, & uuarū expreſſarū retrimētis, et ex tri- tico: & cnico, & myrri baccis, & malo punico, & de alijs, ubi alieuius ipſorū u- ſus cōiugerit, ſcribetur circa ipſum morbu: quemadmodū etiā de alijs cōpoſitis medicamētis. Balneū uero in multis morbis opem tulerit eo utētib; ad ali- quos quidē aſidue, ad aliquos nō itē. Quādoq̄ uero minus eo utendū eſt, pro- pterea q̄ homines ad hoc ſint imparati. In paucis enim domib; præparata ſunt neceſſaria inſtrumēta, & nec miniſtri uelut opus eſt parati habētur. Si uero nō omnino bene quis lauetur, nō modicā læſionē incurret. Nam & rugurio fumū nō habēre opus eſt, & aqua larga, & balneo multo, & nō ualde large aſuſo, ſi ſa- nē nō ita opus fuerit. Et deſtrictione quidē potius utendū non eſt. Si uero deſtri- cetur, calido utendū eſt ipſo deſtrictorio medicamēto, eoq̄ multiplici magis q̄ aliās receptū eſt, et in ſuper nō pauca aqua perfundendū, & cito perfundēdum. Breui quoq̄ uia ad ſoliū opus eſt, et ut facilis ſit inſcenſus, et facilis itē exitus, o- portet aut̄ eū qui lauetur eſſe moderatū ac taciturnū, & nihil ipſum operari, ſed alios & perfundere, & deſtricare. Debet etiā poſtea multa aquæ mixtura parata eſſe, & celeres perſuſiones fieri, et ſpōgjs utendū eſt pro ſtrigili, et nō ualde ſiccum inungendū eſt corpus. Caput tamē reſicatū eſſe oportet, quantū eius fieri poteſt maxime, ita ut ſpongia extergeatur. & neq̄ perfrigerari caput oportet, neq̄ extremas partes, neq̄ reliquū corpus. & neq̄ eū qui recens ſorbitionē ac- cepit, neq̄ eū qui recēs potū ſumpſit, lauare oportet. & neq̄ ſorbere, neq̄ bibere cito poſt balneū. Magnā tamen partē ægro tribuere conuenit, ſi ſanus balnei ualde amās fuit, & lauari adſuetus. Tales enim magis appetunt, & loti utilitatē ſentiunt, & nō loti lædūtur. Cōuenit autē in totum magis peripneumonijs, q̄ febribus ardentibus. Nam dolorem lateris & peſtoris ac dorſi balneum lenit, & ſputum maturū facit, ac educit: & facilem ſpirationē reddit, & laſitudinē exi- mit, articulos enim & cutis ſuperficiē mollit. Sed & urinam ciet, & capitis gra- uitatem ſoluit, & nares humectat. tot igitur bona balneo adſunt, quibus omni- bus opus eſt. Si uero apparatus penuria aliqua fuerit, in una re uel pluribus, pe- riculum eſt ne magis lædat balneū q̄ proſit. Singula enim ex ipſis magnū detri- mentū aſſerunt, ſi nō à miniſtris uelut cōuenit præparata fuerint. Minime uero

tempertiuū est eos lauare, quibus alius in morbis liquidior iusto est. itēq; eos quibus plus iusto adstricta est, & nō prius subijt. Sed neq; debilitatos lauare oportet, neq; ex ciborū fastidio naucentes, aut uomentes, neq; eos qui biliosum eructant, neq; eos quibus sanguis ex naribus erūpit, nisi minus q̄ pro occasione cōuenit, fluat. Occasiones aut nosti. Si uero minus q̄ pro occasione fluat, lauare expedit, siue totū corpus ad reliqua inde opē sentiat, siue caput solū. Si igitur pręparationes cōmodę fuerint, & æger bene suscepturus est balneum, quotidie lauare cōuenit. Eos uero qui balneo delectatur, etiā si bis in die laueris, nihil peccaueris. Cæterū balneis uti, multo magis licet his qui tota p̄sana utuntur, q̄ his qui solo utuntur succo. Licet autē & his aliquādo. Minime uero his qui potu solo utuntur. Sunt tamē ex his quoq; quibus licet. Coniectare uero ex pręscriptis oportet, et quibus balneū in singulis uictus modis profuturū est, & quibus nō. Quibus enim aliquid horū deest cōmodorum, quę balneū facit, et quę balneo cōmodant, lauare nō oportet. Quibus uero nihil horū deest, & adiunt ipsis signa in quibus lauari cōducit, lauare oportet. Febris autē ardens fit quū reficcatę uenule, hora æstiuā acres ac biliosos serofos humores, in seipsas attraxerint: & febris multa detinet, & corpus uelut ex oisū lassitudine detentū, de lassatur ac dolet. Fit autē plerūq; & ex lōgo itinere, & longa siti, quū reficcatę uenule acres ac calidas fluxiones in seipsas attraxerint. Fit autē lingua aspera ac sicca, & ualde nigra, & dum circa uentrē mordetur, dolet: & alui egestiones ualde liquidę ac pallidę sūt: & sitis uehemēs inest, itēq; uigilię. Aliquādo etiam mētis emotiones. Huic & aquā, & aquā mulsam aquosam coctam, quātum uosauerit, bibendā dato. & si amarū fuerit os, uomere cōducit, & uentrē per clysterem subluere. Si uero ad hæc non soluantur, lacte asinino cocto purgato. Salsum autē nihil, neq; acre exhibeto. Nō enim suffleret. Sorbitionē uero donec extradicaciones fuerit, ne dato. Et si sanguis ex narib. fluxerit, soluitur affectio, itēq; si sudores accedāt iudicatorij, genuini, cū urinis albis & crasis, ac subsidētis leuib;: & si abscessus aliquis fiat. Si uero absq; his soluta fuerit, recidua rursus ægritudinis cōtinget. Aut coxę, aut crurū dolor emerget, & crassa expuet, si sanus futurus est. Febris ardentis genus aliud. Aluus subit, siti plena est, lingua, aspera, sicca, sanguinolosa. Vring interceptio, uigilia, extremitates frigefactę. Tali si nō sanguis ex naribus fluxerit, aut abscessus circa collū fiat, aut crurū dolor, & spūta crassa spuerit (hęc autē suppressa aluo sūt) aut coxę dolor, aut pendendi uor, nō iudicatur, & testis intensus iudicatorij signum est. Sorbitiones attractorias dato. Verum in acutis morbis uenam secabis, si uehemēs appareat morbus, & qui ipsum habeāt in uigoris ætate fuerint, & robur ipsis affuerit. Si quidē igitur angina fuerit, siue aliquis alius ex pleuriticis morbus, eclegmatis delinctu repurgato. Si uero debiliores appareāt, si plus de sanguine detraxeris, inasfo alui per clysterē tertio quoq; die utere, donec in tuto fuerit æger, aut etiā fame opus habeat. Pręcordia inflammata nō ex flatuū interceptione: septi transversū intensiones, aut spirituum protensiones: in rectę ceruicis spiratione sicca, quibus pus non subest. Verum ex flatuū interceptione, affectiones hæc accedunt. Maxime autē & hepatis dolores, & splenis grauitates, et alię inflammationes, & supra septum transversum dolores, ac morborum collectiones, solui non possunt, si quis prius medicamentis purgare aggrediatur. Nam uenę sectio in talibus principalis est. Deinde infusa per clysteres, si non magnus & uehemens

vehemens fuerit morbus. Sin minus, etiam postea medicamēto purgante opus est. Sed & post uenæ sectionē, purgans medicamētū securitate ac moderatio-
 ne opus habet. Quicūq; uero ea quæ inflammata sunt, statim in principio mor-
 borum medicamēto soluere aggrediūtur, hi de intento quidem ac inflammato
 nihil auferunt: non enim remittit affectio quæ adhuc cruda est: quæ uero mor-
 bo resistunt ac sana sunt, colliquescunt. Debili uero siente corpore, morbus in-
 ualescit. Quū autem morbus corpori præualuerit, tale iam in curabiliter affectū
 est. Vt aliquis derepente uoce priuatus fiat, uenarū interceptiones faciunt,
 si sano hoc cōtingat absq; manifesta, aut alia forti causa. Venam igitur secare o-
 portet, in brachio dextro internā, & sanguinem detrahere, iuxta habitū ac æta-
 tem rationem ineundo, an plus aut minus oporteat. Coincidūt autem plurimis
 ipsoꝝ hęc: rubores faciei, oculorum stabilitates, digitorū in manibus distētio-
 nes, dentū fridores, pulsationes, maxillarū contractiones, extremitatū perfrige-
 ratio, spiritū per uenas interceptiones. Quum dolores accesserint, atque bilis
 & atrium fluxionū affluxus sunt. Dolent aut partes internæ dum mordentur.
 Cōuersæ uero, & ualde sicca sientes uenæ intendūt, & inflamatæ affluentia
 atrahūt. Vnde corrupto sanguine, & spiritibus nō potentibus naturales in ip-
 so uias permeare, perfrigerationes sūt ex statione, & uertigines, et uocis inter-
 ceptio, & capitis grauitas, & cōuulsiones, si iam ad cor, aut hepar, aut ad uenam
 deuerint. Hinc morbi comitiales fiunt, aut semilyderati, si in ambiētes locos
 fluxiones inciderint, & à spiritibus pertransire non potētibus reficere fuerint.
 Quare talibus, fomētis prius adhibitis, uenā secare oportet statim ab initio, dū
 adhuc eleuati sunt omnes affligentes spiritus, ac fluxiones. Facilius enim auxi-
 lium admittūt. & refectis uiribus, & cōsideratis iudicationibus, medicamētum
 exhibere sursum purgās, si non alleuetur: ad infernā uero aluum, si non fubeat,
 infusum per clysterē adhibere. Postea uero lac asininū coctum dato, & non mi-
 nus q̄ duodecim heminas bibat. Si uero uirium robur adsit, plures q̄ sedecim.
 Angina fit quū fluxio ex capite multa ac glutinosa, tēpore hyberno aut uer-
 no, ad uenas iugulares influxerit, et hæ fluxionē ampliorem, propter amplius
 dinem, attraxerint. Quū aut frigida & glutinosa sit, spiritus trāsitus obturabit,
 & sanguinis transitus obturās, propinquas sanguinis partes cōgelat, ipsumq;
 immobilem ac stabilem facit: quū natura frigida sit, & obturādi uim habeat. &
 propterea suffocantur, lingua liuescente, & rotūda siente ac reflexa, propter ues-
 nas quæ sunt sub lingua. Præcisā enim uua, quā aliqui columellam uocant, ues-
 na crassa ab utraq; parte est. Quū igitur hæ plenæ sint, & in linguā imitantur,
 quæ rara est ac spongiosa, propter siccitatē: contingit ut ipsa præ uiolentia hu-
 morē ex uenis suscipiens, ex lata fiat rotunda: ex bene colorata, liuida: ex molli,
 dura: ex facile flexibili, inflexibilis: adeo ut æger cito suffocetur, si non quis cito
 auxiliū ferat, uenæ sectionem à brachijs faciens, & uenas sub lingua secans, &
 eclegmatū delinctu curans, & calidos gargarifimos exhibens, & caput radens.
 Debet autem & ceratū collo ac capiti circūponere, & lanas obuoluere, & spon-
 gijis mollibus ex aqua calida expressis fouere. Bibat aut æger aquam, & aquam
 mulsam, non frigida. Succum uero pifanæ tunc sumet, quum iam ex iudicatio-
 ne in tuto fuerit. Quum uero æstiuo uel autumnali tempore, fluxio calida
 ac nitrosa, de capite defluerit, utpote ex tēpore acris ac calida facta: talis ubi est
 mordet

mordet, & ulcerat, & spiritu implet, & ceruicis spiratio accedit, & siccitas multata, & quae uidentur gracilia apparēt, & tendines posteriores in collo distenduntur, & uelut in retano distenti esse uidentur. & uox abrupta est, & spiritus paruus est, & retractio spiritus densa ac uiolenta accedit. Talibus arteria ulceratur, & pulmo ardet, quum non possint extrinsecum spiritū inducere. Et si his affectio nō ultronea ad externas colli partes deferatur, grauior ac ineuitabilior est, & propter tempus, & quod a calidis & acribus sit humoribus. Si febris corripiat, ueteri stercore non subeunte, aut a cibo recens accepto, siue cum dolore lateris, siue absq; eo, quietem agere oportet, donec cibi descēderint prius ad infernam aluum: potu uero uti aceto mulsō. Quū autem ad lumbos grauitas descendit, infuso per clysterem eluere, aut medicamento purgare oportet. Vbi uero purgatus fuerit, uictum praescribere ex sorbitione primum, & aquae mulsae potu. Deinde ex cibis ac piscibus coctis, & uino aquoso, modico, ad noctē. Interdium autem, ex aqua mulla aquosa. Quū uero flatus graueolentes prodierint, glandula subdititia, aut infuso per clysterē utendū erit. Sin minus, in aceti mulsae potu cohibere oportet, donec ad infernam aluum descēderint cibi, deinde sic per infusum clysteris subducere. At si mollem ac uacuum uentrem habentis febris adens accedat, si tibi cōmodum esse uisum fuerit medicamentis purgare, intra tres dies id ne feceris, sed quarto. Postquam uero medicamentum exhibueris, sorbitionibus utere, obseruans febriliū exacerbationes, ut nūquam exhibeas quum sunt, aut futurae expectātur, sed ubi desinunt, aut quiescerunt, & q̄ longissime à principio. Quum uero frigidi sunt pedes, necq; potum, necq; sorbitionem, necq; aliud quicquam eiusmodi dato: uerum maximū hoc esse ducito, ut expectes donec ualde fuerint calfacti. Deinde sic id quod conducit exhibe. Plerumq; enim futurae exacerbationis febris signum est pedum frigiditas. Si uero in tali tempore exhibueris, maxime per omnia peccaueris. Morbum enim non parum augebis. Quum autem febris desinit, uice uersa pedes reliquo corpore calidiores fiunt. Auetur enim frigefaciens pedes, accessa ex thorace, ad caput flammam remittens. Vniuerso autem calore acruatim sursum concurrente, & ad caput exhalante, merito pedes frigidi fiunt, ut qui excarnes & neruosi si natura existant. Insuper autem etiam quum longe à calidissimis locis absint, perfrigerantur, calore ad thoracem coaeruatō. Et rursus iuxta proportionem, quū febris soluitur, & in tenues partes dirimitur, ad pedes calor descendit. Hoc igitur tempore & caput, & thorax ipsorum perfrigeratur, qua de causa sorbitione exhibenda est. Nam ubi pedes frigidi fuerint necesse est uentriculū calidum esse, & multo fastidio plenum, & praecordium intentum, & corporis iactationem, propter internam turbationem: & mentis abalienationem, & dolores, & aeger distrahitur, ac uomere cupit, & si praua uomuerit, dolet. Postquam uero calor ad pedes descendit, & urina progressa est, etiam si non sudarit, omnia desinunt. Hoc igitur tempore sorbitionem dare oportet: alioqui perniciosa est.

Quibus uero perpetuo aluus in febribus liquida est, his praecipue pedes calfaciens, & ceratis integens, & fascijs obuoluens, animum aduerte ut ne sint reliquo corpore frigidiores. Si uero calidi sunt, calefactorium nullum adhibe, sed conferua ut ne perfrigerentur. potu autem utendum est quā paucissimo, aqua frigida, aut aqua mulsae. Quibus autem in febribus aluus liquida est,

&

& mens perturbata, & multi ex talibus floccos auferunt, & nares scalpunt, & paulatim quidem respondent si interrogentur, ipsi uero à seipsis nihil aptum dicunt: talia atrabiliaria esse mihi uidentur. Talibus igitur ita se habētibus, si alius uis liquida fuerit, ac colliquuerit, uidetur mihi sorbitiones frigidiores ac crassiores exhibere oportere, & potiones alui sistentes, & uinosiores magis quam adstringentes. At quibus in febribus uertigines ab initio, & capitis pulsus fuit, & urine tenues, in his expectare oportet, ut ad iudicationes febris exacerbetur. Nec uero admirarer, si delirarent. Quibus in principio urine nebulosae, aut etiam crassae sunt, tales depurgare oportet, si etiam alia cōtulerint. Quibus uero in principio urine tenues, tales ne purgato, sed si uisum fuerit, infusum per clysterem adhibeto. Hos sic curare cōducit. Aeger corpore quietem agat, unguentum ac aequaliter cōtegatur. Potu utatur aqua mulsa aquosa: & sorbitione succi praeferantur ad uesperam. Aluum uero ab initio per clysteris infusum subducito. Medicamenta autem his ne exhibeto. Si enim quid circa uentrem cōmoueris, urina non cōcoquitur, sed absque sudore ac iudicatione, febris ad multum tempus durabit. Sorbitiones autem ubi prope iudicationem fuerit, ne dato, si turbetur: uerum quum remiserit turbatio, & ad melius procedet. Obseruare uero etiam omnium febrium iudicationes oportet, & in hoc tempore sorbitiones detrahere. Solent autem longae fieri hae febres, & impetuosos humorum de loco ad locum illapsus habere, si quidem infernae partes frigidae fuerint, circa aures & collum. Si uero non fuerint frigidae, alias mutationes habent. Fluit autem sanguis ex naribus, & alui his exturbantur. Quibuscumque uero febres anxiosae sunt, & quae praecordia intendunt: & decumbentes in eodem loco decubitus non sustinent, & extremae partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia ac custodia opus habent. Degant autem hi ut nihil ipsis exhibeas aliud, quam acetum mulsum aquosum. Sorbitionem uero ne exhibe, donec febris desierit, & urina coacta fuerit. Decumbere autem debet aeger in domo obscura, et in stratis quam mollissimis reclinatus esse, ita ut multo tempore decubitus in eodem loco toleret, & quam minimum se iacet. Hoc enim talibus maxime prodest. Super praecordium uero, lini semen linteo illitum imposito, obseruando ut ne horrescat, aeger dum apponitur. Sit autem summe tepidum, aqua & oleo coctum. Coniectare uero ex urinis oportet id quod futurum est. Si enim crassiores ac pallidiores fuerint, meliores sunt. Si uero tenuiores ac nigriores, deteriores. Si autem mutationes habent, temporis diurnitatem significat: & necesse est ut morbus & ad deterius, & ad melius, inaequalitatem permuet. Caeterum inconstantes febres, finire oportet, donec constiterint. Quum uero constiterint, & uictu, & curatione conuenienti occurrere, speculatione secundum naturam facta. Sunt autem aspectus aegrotorum multi. Quare animaduertendum est medico, ut ne aliqua manifesta causa ipsum lateat, neque ex his quae rationatione cognoscuntur, neque ex his quae ad numerum parem aut imparem apparere oportet. Maxime igitur numerum imparem uereri oportet. Nam hi dies in alterutram partem aegrotos inclinare faciunt. Primum itaque diem obseruare oportet, quo aeger debilis esse coepit, cognitio principio ex quo, & quando. Praecipuum enim hoc est ut sciatur. Quum uero aegrum interrogaueris, etiam haec omnia considerabis. Primum quidem quomodo caput habet, an doloris exors sit, nec grauitatem in seipso habeat. Deinde praecordia

cordia & latera an doloris exortia sint. Si enim præcordium dolorosum fuerit, aut eleuatū, aut obliquitatē aliquam habuerit, aut fatietatē: aut lateris dolor affuerit, & unā cum dolore, tussicula, aut tormen, aut uentris dolor: Quū horum quid affuerit in præcordio, aluum maxime infusus per clysterem soluere oportet. Bibet autem aquam mulsam calidam coctā. Considerandū uero est an dum exurgit, animi deliquiū incidat, an bona spiritus tolerātia ipsum habeat: & inspicienda alui egestio, num uehemēter nigro colore prodierit, aut pura, quales fani hominis sunt egestiones: & an febris ad tertium diem exacerbetur. Vbi uero ualde probe tales consideraueris in his morbis tertia die, ad hæc iam etiam alia contemplare, & si quarta simile quid tertiæ habuerit ex ipsdem illis, æger in periculo uersatur. Ex signis autē, nigra alui egestio, mortē significat. Quæ uero sani hominis egestioni similis est, si per omnes dies apparuerit, salutare signum est. At si glande subdita nō obediēt, & spiritus bona tolerātia affuerit, si ubi ad se dem exurrexit, aut isthic in lecto, animi deliquium incidit: Hæc ubi ægroto, aut ægrotae, ab initio affuerint, delirium futurum expecta. Intenus aut sis quocq; ad manus. Si enim tremulæ fuerint, tali sanguinis de naribus destillatione futurā expecta. Inspicere uero ipsas nares oportet, an spiritus æqualiter per utraq; feratur, & si multus feratur è naribus, conuulsio fieri solet. Si uero conuulsio fiat, tali mors expectanda est: & bene habet si quis hoc prædicat. Si uero in febre hyberna, lingua aspera fiat, & animi deliquia ad sint, tali remissio febris contingere solet: attamē fame talem macerare oportet, & aquæ, & aquæ mulsæ potu, ac ptisanæ succo conseruare, ita ut fidem ne habeas februm remissioni. Nam qui talia signa habent, de uita periclitantur. Vbi uero hæc cognoueris, ac probe cōtemplatus fueris, ita fore prædicere potes, si placuerit. Quum uero in febris horrendū quid acciderit quinta die, aut aluus derepente liquida decerit, & animi deliquiū incidat: aut uocis priuatio contingat, aut conuulsio, aut singultus fiat: ex his anxiosus fieri æger solet, & sudores sub naso, & circa frontem ac ceruicem à posteriore capitis parte oboriri. Qui uero hæc patiuntur, spiritus uosi facti nō longe postea morientur. Quibus autē in febris crura sunt tuberculosa, atq; hæc tubercula moram trahentia nō maturantur, febris per seuerantibus, & strangulatio acciderit in faucibus, ita ut partes circa fauces graues exstant, & tubercula nō matura facta, sed extincta fuerint: talibus sanguis è naribus fluere solet. Et si quidem multus fluxerit, solutionē morbi significat. Sin minus, morbum longum. Quanto autē minus fluxerit, tanto deterius est, & longitudo maior. Si uero reliqua facillima fiant, tali dolore: ad pedes expectare oportet. Si autē contigerint pedem, & dolorosus esse perseueret æger, & calore affligatur, ac nō soluiatur: paulatim & ad ceruicem dolores peruenient, & ad clauiculam, & humerū, & pectus, & articulum. Nam & hunc tuberculoso fieri oportebit. His autē extinctis, si manus cōtrahantur, aut tremulæ fiant, conuulsio talem corripit, & delirium. Sed & pustule in supercilio oriuntur, & robures habet, & palpebra altera ad alterā progeminat, & inflammatio dura detinet, & oculus uehemēter intumescit, & delirium ualde augefcit. Noctes autē plus q̄ dies delirij significationē præbent. Multa uero signa ad imparē numerum magis sunt, q̄ ad parē. Vtro aut horum numerorū fiant, lethalia existunt. Tales uero si quidē ab initio medicamētis purgare uolueris, antē quintū diem id facito, si uenter

si ueter murmurarit. Sin minus, impurgato finito. Si uero murmurarit, & alui egestiones bilioſæ fuerint, scammonio dato moderate purgato. In reliquo uero uictu potus ac forbitiones parciffime exhibeto, quo melius æger habeat, ſi nõ remiffione facta decimũ quartum diem tranſgreſſus fuerit. Quum febricitanti decima quarta die uocis interceptio acceſſerit, nõ cita ſolutio cõtingere ſolet, neq; liberatio à morbo fieri, ſed temporis diuturnitatẽ tali ſignificat. Quum itaq; apparuerit in hac die, longius protrahetur morbus. Quum febrienti quarta die lingua cõturbata loquitur, & aluus bilioſa liquida egerit, talis delyra re ſolet. Sed obſeruare ac aſſequi euentus oportet. Aeftiuo ac autũnali tempore in morbis acutis, ſanguinis deſtillatio repentina, firmitatẽ ac multam inflammationẽ circa uenas ſignificat, & in poſterũ diem tenuium urinarũ apparitiones. & ſi ætate uiguerit, & corpus in exercitio, aut bene carnoſum habuerit, aut atrabiliaris fuerit, aut ex potu manus tremulas habuerit, bene habet ut delyrium, aut cõuulſionem prædicat. Et ſi quidem in diebus paribus accedat, melius eſt. In iudicatione uero pernicioſum, ſi non multus acruatim concitatus ſanguis, redundantia exitus faciat per nares aut per ſedem: aut abſceſſus, aut præcordiorũ dolores, aut ad teſtes, aut ad crura dolores inducat. His autem cõcoctis, exitus ſiunt ſputorũ, craſſarum urinarũ, leuium, albarũ. Febri ſingultoſæ ſilphij ſuccũ, acetũ muſſum, daucũ tritum, bibẽda dato. & galbanum in melle. & cuminũ in eclegmate delingendũ. & piſanæ ſuccum poſt hæc ſorbendũ. Talis autẽ effugere nõ poteſt, ſi nõ ſudores iudicatorij, & ſomni æquales acceſſerint: & urinæ craſſæ & acres decurrerint, aut ad abſceſſum morbus decubuerit. Nux piñea, & myrrha, in eclegmate dentur. Bibendum autem talibus acetũ muſſum q̄ minimum dato. Si uero ualde ſticuloſi fuerint, aquam ordeaceam. Peripneumonicas ac pleuriticat affectiones ſic cõſiderare oportet, an acuta ſit febris, & dolores lateris alterius, aut utriuſq;: et dum ſpiritus ſuſum fertur an doleat: & an tuſſes adſint, & ſputa prodeant ſulua, aut liuida, aut etiã tenuia, & ſpumofa, & florida: & ſi quid aliud diuerſum habeat, ab his quæ illis fieri ſolent. Hunc ſic degere oportet. Si quidẽ dolor ſurſum tendat ad clauiculam, aut circa mammã, & brachiũ, uenam in brachio ſecare oportet internã, utra tandem fuerit parte, in ea ipſa: detrahere uero ſanguinẽ, iuxta corporis habitum, & tempus, & ætatem, & colorẽ, plus & cõſideret. & ſi acutus fuerit dolor, ducere uſq; ad animi deliquium. Poſtea uero inſuſum per clyſterem adhibere. Si uero ſub thorace fuerit dolor, & ualde diſtendat, pleuriticõ medicamento aluum ſubpurgato, & interim dum purgatur nihil dato. Poſt purgationẽ uero acetum muſſum. Medicamentũ aut purgãtẽ exhibeto quarta die. Verũ per tres ab initio, inſuſum per clyſterẽ adhibeto: & ſi hinc nõ alleuetur, ſic ſubpurgato. Cuſtodia aut fiat uſq; ad febris quietem ac ſeptimũ diem. Deinde ſi in tuto eſſe uideatur, ſuccũ modicũ ac tenuem primũ melle ammixto exhibeto. Si uero facile educat ſputũ, & bene ſpiret, ac doloris exors ſit circa latera, etiã paulo craſſiorem ac ampliorẽ, & bis in die dabis. Si uero nõ facile liberetur, potionẽ pauſciorem, & modicam ſorbitionẽ, ſuccum tenuem, eũq; ſemel, & in quo tempore melius degit, exhibeto. Cognofces autem hoc ex urinis. Sorbitionẽ enim exhibere in his morbis nõ prius oportet, q̄ urinas concoctas, aut ſputa matura facta eſſe uideris. Si uero is qui medicamentũ accepit, frequenter & multum pur-

gatus fuerit, necesse est dare, uerū pauciorē ac tenuiorē. Nō enim poterit dormire, prę uasorū uacuatione: neq; similiter coquere: neq; iudicationes sustinere ac expectare. At ubi crudorū, colliquationes factę fuerint, & ea quę renituntur abiecerit, nihil obstabit. Matura uero sunt sputa quidem, quū similia fuerint puri. Urinę autē subsidentias habentes subrubras, uelut est cruū. Nihil autē prohibet & ad alios laterū dolores tepefactoria apponere & cerata. Inūgere autem crura ac lūbos oleo calido, & pinguedinē illinere, præcordia uero ex lini semine integere usq; ad mammas. At ubi in uigore est peripneumonia, auxiliū non admittit, si non expurgetur: & malū est si æger difficulter spirauerit: & urinę tenebre & acres, & sudores circa collum ac caput fiant. Tales enim sudores prauis sunt, præ suffocatione, & impetu ac uiolentiā, superatibus morbis, si nō urinę multę ac crassę prodierint, & sputa matura exierint. Virum autē horū sua spon te uenerit, morbū soluit. Ad peripneumoniā medicamentū quod delingitur. Nux pinea & galbanū, in melle Attico, Abroronū in aceto mulso. Piper, ueratrū nigrū feruefacito, & pleurítico in principijs dum dolor uexat, bibēda dato. Bonum est & panacem in aceto mulso feruefacere, & excolare, ac bibēdum dare, tum hepaticis, tum in doloribus septi tranuersi. Et quacūq; ad uentrem, aut ad mictionē impellere oportet, hæc in uino & melle dabis, illa ad uentrem, cū aqua multa aquosa copiosiore bibēda dato. Dysenteria sedata abscessum, aut tumorem aliquē faciet, si non ad febres, aut sudores, & urinas crassas, & albas, ac ualde perspicuas, aut ad tertianas, aut ad uaricē, aut ad testem, aut ad cruram, aut ad coxam dolor decubuerit. In febre biliolā ante septimū diem, cum rigore morbus regius accedens, soluit febrem. Verū sine rigore si accedat, extra temporis occasiones, perniciosus est. Tetanus lumborū in anteriorem ac posteriorē partem distentio: & in atrabiliarijs, ubi spirituum per uenas interceptiones fuerint: uenę sectione soluantur. Quum autem à tendinibus uehementer in anteriorē partem reuelluntur, & circa collū ac faciem sudores fiunt, dum præ dolore mordentur ac resiccantur tendines usq; ad sacri osis finem exporrecti, qui crassiores spinam cōtinent, qua parte maxima ligamenta exorta, deorsum ad pedes usq; desinunt: Tali si nō febris & somnus accesserit, et sequentes urinę cōcoctionem habentes prodierint, & sudores indicatorij, uinum creticum uinosum bibēdum dato, & farinam coctam edendā. Et cerato unguento ac illinito, & integito crura usq; ad pedes, ubi calida aqua prius in scapha perfudisti: brachia quoq; ad digitos usq; integito: & lumbos ac spinā à collo usq; ad coxas, pinguedine incerata mollī pelli illita circūdato, ita ut etiā anteriores partes cōplectantur: & interposito tēpore, per utriculos calida aqua infusa foueto, & circuitento linteo ipsum reclinato. Aliū uero ne ualde soluas, nisi glandula subdititia, si multū tempus fuerit, quo absq; egestione permanfit. & si quidē in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, mei radicē in uino odorato tritam, & daucum bibenda dato, mane ubi ieiunus est ante calidę perfusionē. & post hæc breui farinam coctam, tepidā, plurimā edat. & uinū ubi uoluerit, bene temperatū in super bibat. & si quidē in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, prædicere oportet. Morbi porro omnes solūntur, aut per os, aut per aluū, aut per uescicā, aut alium aliquē eiusmodi articulū. Verū sudoris species omnibus cōmunis est. Veratrū dare his oportet, quibus à capite fluxio fertur

tur. Quicūq; uero ex abscessibus, aut uenæ ruptura, aut propter intemperantiā,
 aut ob aliam quandā fortem causam, suppurati fiunt, talibus ueratrum ne dato.
 Nihil enim profuerit, & si quid perpetietur ager, ueratrum in causa esse uidebi-
 tur. Si uero corpus dissoluatur, aut dolor in capite sit, aut aures obturate sint,
 aut nares, aut sputatio: aut genuum grauitas sit, aut corporis tumida moles præ-
 ter consuetudinem, dato quicquid tandem horum contigerit, si nō ex potibus,
 neq; ex rebus ueneris, neq; ex tristitia, neq; ex curis, neq; uigilijs hæc fiant. &
 si quidem horū quid in causa fuerit, ad hoc ipsum curationē instituito. Do-
 lores ex itinere, laterū, dorsū, lumborum, coxarū, & quicūq; respirantes dolent,
 causam manifestam habētes. Sæpe enim ex crapulis & cibis inuoluntarijs, dolores
 procedere solent, & ad lumbos, & ad coxam. Quibus uero ipsorū talia fuerint,
 urinæ difficultas ipsis accedit. Horum autē causa iter est, & grauedinū ac rauce
 dinum. Quæcūq; ex uictus ratione cōtingunt, Pleraq; uniuersiq; prout
 præter consuetudinē uictu usus fuerit, maxime annotat. Nam qui nō soliti sunt
 prandere, si pransi fuerint, multus uentris tumor ipsis accedit, & dormitatio, ac
 repletio. Si uero insuper cenauerint, aluus exturbatur. His ubi balneo usi sunt,
 dormire cōducit. Vbi uero dormiuerunt, deambulare lenta ac multa circuitio-
 ne, & si quidē aluus euacuata fuerit, cenare, & bibere uinū pauca, meracius,
 Si uero euacuata nō fuerit, corpus oleo calido illinere, et si sitierit, uinum aquo-
 sum album aut dulce bibere ac quiescere. Si uero nō obdormierit, amplius quie-
 scere. Reliquus uictus similiter ut his qui crapula grauatur constituatur. Quod
 uero ad potus attinet, qui quidē aquosi sunt, tardioris transitus sunt, & intus ob-
 uoluntur, & circa præcordia reduant, & ad mictionē non decurrūt. Tali uero
 potu repletus, nullū opus celeriter perficere poterit, ex his quæ intēto corpore
 per uolentiā aut celeritatē perfici solent. Quiescat autē q̄ maxime, donec unā cū
 cibis cōcoctus fuerit. Quicūq; uero potus meraciores sunt, aut austriores, pal-
 pitationē in corpore, & pulsationē in capite inducūt. His cōmodum est ut in su-
 per dormiant, & calidū quid forbeant, ad quod maxime iucūde affecti sunt. At
 uero ieiuniū ad capitis dolorem ac crapulam malū est. Cæterum qui semel
 in die cibū capiunt, hi & impotētes sunt, & calidam urinā mingunt, præter cō-
 suetudinem uasa uacua habētes. fit autē & os salsum ac amarū, & in omni ope-
 re tremunt, & tēpora ipsis distendūtur, & cenā concoquere nō possunt, uelut
 si prāsi essent. Hos aut minus bibere oportet q̄ soliti fuerūt, & mazam liquidio-
 rem pro pane sumere: et ex oleribus, runcem, aut maluā, aut ptisanā, aut bētas.
 Bibere uero uinū inter cibū, moderatū & aquosius: & à cena modice deambu-
 lare, donec urinā descēderit, ac minxerint. Vtatur aut & piscibus coctis. Edu-
 lia porro maxime de se significationē præbent. Allium flatū, & colorem cir-
 ca thoracē facit, & capitis grauitatē, & anxietatē. & si quis alius dolor antea fieri
 cōsueuit, eum exacerbauerit. Vrinam aut ciet, & hoc bonū habet. Optimum
 uero est ut quis ipsum edat, si aut ebrius est, aut ad potationē ire uolet. Cas-
 feus flatū, & adstrictionē, & ciborū accensionē facit, quū crudū & incoctile sit
 edulū, pessimū aut est repletos ipsum inter potū edere. Legumina omnia fla-
 tuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & uiridia. His aut utendum
 nō est nisi cū cibis. Vnūquodq; uero ex ipsis sua peculiaria uitia habet. Cicer
 flatū, tum crudū, tum frictū, & dolorē inducit. Lens adstringit, & turbatio-
 nem

nem inducit, si cū cortice sumatur. Lupinus minime inter hæc mala habet. Silphij caulis & succus, quibusdā quidem maxime, in expertis aut non trāsfit per uentrē. Verū uocatur hoc malū cholera sicca. Fit autē maxime ubi cū multo cafeo mixtus fuerit, aut cū carnis bubulæ esu. Nam & atrabiliaria affectiones à bubularū carniū esu exacerbātur. Est enim insuperabilis ipsarū natura, & nō cuiusuis uētriculi est ipsas cōcoquere. Optime tamen ipsas cōcoxerint, ac summo uerint, qui percoctis & q̄p̄ uetustissimis utantur. At caprinæ carnes quæcūq; in bubulis insunt mala, omnia habent, itēq; à cōcoctione alienitatē: et flatuosiores sunt ac ructus ampliores faciūt, & cholera generāt. Sunt autē odoratissimæ, solidæ ac iucūdissimæ, optime & percoctæ, & frigida. Verū iniucūdissimæ et graueolētes ac duræ, pessimæ: imō etiā recētes. Optimæ uero sunt ætatis tēpore: pessimæ autūno. Porcinæ uero carnes prauæ sunt, quū fuerint crudiores aut ambustæ. Magis autē cholera generāt, & turbationē faciunt. Suillæ autē optimæ sunt omniū carniū. Sed præstant etiā ex his quæ nō uehementer pingues sunt, neq; tenues, neq; ueteris uictimæ ætatē habent. Edere uero ipsas oportet absq; pelle, & subfrigidas. In cholera sicca uēter inflatus est, et strepitus insunt, et dolor laterū ac lumborū. Secedit autē nihil deorsum, sed aluus adstricta est. Talem adseruato ut ne uomat, sed aluus subeat. Infusum itaq; calidū ac pinguisimū q̄ citissime per clysterē immittito: et oleo illiū in aquā plurimā calidā demittito, in solū reclinans, & calidā paulatim affundēs. Et si calescēti ipsi aluus subierit, morbus solutus est. Dormire quoq; tali cōducit, & bibere uinū tenue, & uetus ac meracius, & oleum dato, ut & quiescat, & aluus subeat, & soluatur morbus. A cibis uero & alijs abstineat. Si uero nō remiserit dolor, afininū lac bibendum dato, donec purgatus fuerit. At si liquida fuerit aluus, et bilis subeat, et tormina sint, & uomitus, ac suffocationes: his optimū fuerit quiescere. Bibere uero aquā mullā, & nō uomere. Hydropū duæ naturæ sunt: quorū alter sub carne si fieri aggreditur, ineuitabilis est. Qui uero cū inflationibus sit, multa bona fortuna opus habet, maxime aut ærumnis, & fomētis, ac temperantia. Edat autē sicca & acria. Sic enim uel maxime urinā eiecerit, & plurimū uiribus polluerit. Si uero difficulter spirauerit, & tēpus uernum fuerit, & simul ætas uiguerit, & uirium robur adsit, de brachio sanguinē detrahare oportet. Deinde panes calidos ex uino nigro & oleo tinctos edat: & q̄p̄ minimum bibens, q̄p̄ plurimum laboret. & carnes suillas carnosas edat cū aceto coctas, ut aduersus accliuēs deambulationes reniti possit. Quicūq; infernū uentrē calidum habent, & alui egestionēs acres & inæquales ipsis prodeūt præ colliqutione: his si quidē potētes fuerint, ueratro albo reuellere oportet. Sin minus, succus tritici horni crassus, frigidus dandus est, & lenticulæ fresæ decoctū, & panes subcineriti, & pisces febrienti quidē cocti, nō uero febrienti, assati: & uinū nigrum nō febrienti: sin minus, aquā à mēspilis, aut myrti baccis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut uitiū cēnāthe. Si uero febris nō habeat, & tormina adsint, lac afininū calidum modicū primum, deinde sensim fiente progressu amplius, & lini semē, & triticeam polentā, & fabas Aegyptias, exēpto eo quod in ipsis amarū est, molita ac trita hæc inspergēs bibat: aut oua semiconcreta assata edat, & similaginē, & miliū, & alicam coctā in lacte: hæc cocta frigida edat, & quæ his similia existunt, tum pocula, tum edulia in cibo assumat. Maximi momēti circa uictus rationem

tionem, est obseruare ac cauere, tū in acutis, tum in lōgis morbis, & intēſiones febrū, & remiſiones, quō temporū occaſiones ſcias, quādo cibos exhibere nō oportet, & quando tuto exhiberi poſſunt. Insuperq; quando plurimū ab intentione abſunt. Noſſe porro oportet eos quibus caput dolet ab exercitationibus, aut curſibus, aut profectionibus, aut uenationibus, aut ex alio quopiā in tēpeſtuo labore, aut ex re uenerea: decolores item, raucoſos, ſplenicos, exāguos, ſpirituoſos, & ſiccā tuſim habētes, ac ſiticuloſos, & flatuoſos, & uenarum interceptiones: & eos qui intenta habēt præcordia, & latera, & dorſum, & torpefactos, & obſcure uidentes, & quibus auriū ſonitus incidūt, et qui urinariā ſiſtulam urinā non continentē habent, & morbo regio laborātes, & quorū alui cruda eiſciunt, & quibus ex naribus, aut per ſedem ſanguis uehemēter erumpit, & qui tubercula habēt, & quibus uehemēs dolor incurrit, & non ſuperauerint: ex talibus nullū medicamento purgandū eſſe. Periculū enim habebis, et nihil opis afferes, & ſpōtaneas liberationes ac iudicationes tolles. At ſi ſanguinē alicui detrahere cōducit, ſolidam aluū facere oportet, atq; ſic detrahere, & fame macerare, ac uinū auferre. Poſtea uictu cōueniente, & fomētis humidis, reliquam curationē perage. Si uero aluus denſa ac adſtricta eſſe uideatur, molle inuſum per clyſterem immitte. Si uero medicamentū dare uiſum fuerit, per ueratrū tuſto ſurſum purga. Deorſum uero nullum taliū. Optimū autem eſt ad miſtionem, & ad ſudores, & ad deambulationes perducere, & leni frictione uti, ut ne habitū denſum efficias. Si uero in lecto decūbat, aliī ipſum fricent. Et ſi quidem in thorace ſupra ſeptum trāſuerſum, affectio ipſum infeſtarit, plurimū reſideat, & minime ipſum reclinent, quādiu uires tolerant: & ſedentem multo tempore multo oleo calido defricent. Si uero in inferna aluo ſub ſepto trāſuerſo dolores habeat, decumbere cōducit, & nullo motu moueri tali corpori cōfert, extra defricionē. Qui uero ex inferna aluo ſoluuntur dolores, per urinas & ſudores, ſi moderate delabuntur, ſua ſpōte ſoluuntur, qui parui ſunt. uehemētes aut prauī ſunt. Tales enim aut pereunt, aut abſq; alijs morbis ſani non fiunt. Verum qui huiusmodi ſunt incumbūt ac firmantur. Potio hydropico. Cantharidas tres, detracto capite uniuſcuiuſq; & pedibus, & alijs, corpora uidelicet ipſarū in tribus aquæ cyathis terito. Quū autē is qui bibit doluerit, calida aqua perfundatur. Bibat aut prius illiſus, ieiunus: & edat panes calidos ex oleo. Medicamentū ſanguinem ſiſtens. Fici ſuccum lana exceptū intus ad uenam appone. Aut coagulo intorto nares obturato. Aut chalcitidem digito prius efformatam apprime, & cartilagineſ extrinſecus utrinq; cōprime: & aluum lacte aſinino cocto ſolue, & caput rade, & perfrigeratiā adhibe, ſi calidum tempus fuerit. ſeſamoides ſurſum purgat. potio eiſ eſt drāchma dimidia in aceto mulſo trita. Commiſcetur etiam ueratrīſ tertiā potionis pars, & minus ſuffocat.

Ad trichiaſin, id eſt pilos pungentes in palpebris enaſcentes. Immiſſum in acum foramen habentem filum, in ſumma ſupernæ palpebræ marginē deorſum uerſus perpūctione facta trāſmitte, & aliud itidem ſub hoc inferne trāſſet: & extenta fila cōſue ac deliga, donec decidāt. & ſi quidē ſatis habuerit, bene eſt. Sin minus, & quid defecerit, rurſus eadem facito. Sed & hæmorrhoidas eodem modo tranſmittes, filo lanæ ſuccidæ craſſiſſimo ac maximo in acū immiſſo, ac deligato. Securior enim ſit curatio. Deinde cōpreſſione facta medicamentū

to erodēte utere, & ne prolue donec deciderint: & semper unā relinque. Postea uero refectis uiribus ueratū dato, deinde exerceatur & exudet, & ante exercitacionē mane frictio multa fiat. Verū à cursu abstineat, & ebrietate, & ab acribus, origano excepto. Vomāt aut per interpositos dies septē, aut ter in mense. Sic enim q̄ optime habuerit corpus. Vinū uero fuluū, austerū, aquosum ac modicū bibat. At uero ad suppuratos, scillæ frusta rotūda secta in aqua coquito, & ubi ualde bene efferbuerit, diffundito, & alia affusa coquito, donec ad contactū percocta ac mollia apparuerint. Deinde leuiter tritis cuminū frictū ammisce, & fesama alba, & amygdalas recētes tritas, & hæc melle excepta delingenda præbe, & postea uinū dulce bibendū. Sorbitiones uero sumat, pep̄lū, appellatum in coniu album, tritū ac etabulū parui mēsurā, in aqua loturæ farinæ recētis dilutum accoctū, melle affuso tepidū absorbens. Atq̄ sic degat per diē. Deinde suppurans ea quæ eueniūt coenam dato. Fabarū item depuratarū quadrantē, & rubiæ farmēta duodecim, terito, misceto, coquito, et pingui addito delingenda præbero. Ad oculos. Spodiū lotum probe uelut farinæ massam subactū, non liquidū, uuæ immaturæ acerbæ succo humectatū leuiter terito, in sole reficcatō, & ut ad illitionem cōmodum sit humectato: quū uero siccum factū fuerit, leuiter trito sicco oculos sublinito, & angulos cōspergito. Ad eosdem. Ebeni drachmā, æris usti obolos nouē, croci obolos tres. Hæc trita in cotricula terito, & uini dulcis heminā Atticā affundito, deinde ad solē obuolata exponito, & ubi cocta exaruerint, ipsis utere. Ad dolores oculorū. Chalcitidis drachmā, uuæ expressæ ut duæ partes sint reliquæ, myrrhā et crocū terito, & mustū admisceto, & ad solē coquito, ac illinito. Sint aut in uase æneo. Earū quæ ab utero stragulantur cognitio. Digitis duobuscōprimito, et si senserit, uteri stragulatione est. Si nō, cōuulsio. Ad hydropicos. Peplī meconij appellati, ac etabulū parū Atticū rotūdū, portio una, squamę eris specilla lota tria. Hęc leuiter trita, et cū farina recētū agglutinata, ac in catapotia efformata, deglutieda dato. Purgāt aquā deorsum. Aliud, qd̄ stercora per aluū expellit. In caricas succū tithymalli instilla, in singulas septies, deinde in nouū uas cōpositas recōde, ac exhibe ante cibū. Aliud. Peplū, quod & meconiū appellatur, aqua affusa trito ac excolato, et farinā placētarū torrefactarū ammiscēs, & mel coctū affundēs, hydropicis edendū dato: et uinū dulce aquosum, aut aquā mulsam aquosam in super bibendā. At meconiū, quod primū excrementū à pueris prodit, collectū recōdito, ac curato,

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE IUDICATIONIBVS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



De iudicationibus quæ cito ad melius tendunt, plerunq̄ eadē signa sunt, quæ etiam sanitatis. Sudores enim optimi sunt, & celerrime febrē sedant, qui in iudicatorijs diebus fiunt, & febrem perfecte summouēt. Boni quoq̄ sunt qui per totū corpus sientes, morbū facilius ferre faciunt. Qui uero nihil horū faciunt, incōmodi sunt. Denari uero oportet alui egestio nem, morbo ad iudicationē tendente. Sit aut subfulua, & nō ualde

ualde graueolens. Cōmodum est & lumbricos exire ad iudicationē. *Urina autē optima est, quæ habet albissimā subsidentia, & leuem ac æqualē, per totū tempus donec iudicatus fuerit morbus.* Significat enim securum ac breuē fore morbum. Si sudore oborto morbus deficiat, & urina fulua albā subsidentia habēs cōspiciatur: his eadē die recidiua febris fiet, atq; hæc quinta die citra periculū iudicatur. His qui in breuissimo tēpore sani euadēt, omnia maxima signa fiūt. Nam magis sine dolore degūt, & extra periculū, & noctu dormiūt, & alia signa secura præ se ferūt. Quibus in febre nō lethali capitis dolor, et alia signa circūstant, in his bilis dominatur. Quibus inceperit dolor primis diebus, & quarta ac quinta magis premūtur, hi septima à febre liberātur. Febres iudicātur in iisdem numero diebus, ex quibus & superstites euadūt homines, & ex quibus pereūt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis fiētes, quarto die desinūt, aut prius. Lethalissima uero & signis horredissimis fiētes, quarto die aut prius occidūt. Primus igitur ipsarū insultus sic desinit. Alter ad septimū deducit. Tertius ad undecimū. Quartus ad decimūquartū. Quintus ad decimūseptimū. Sextus ad uigesimalū. Atq; hæc in acutissimis morbis, per quatuor ad uiginti, appositiones fiūt. Nō potest autē quicq; horū integris diebus exacte numerari. Neq; enim anni ac mēses totis diebus cōstant. In febribus ardētibus bona signa apparētia, qualia in sanis scripta sunt, si quidē minora fuerint, ad tertiam diē remissionē indicāt. crassiora uero, in crastinū, crassa aut, eadē die. In febribus ardētibus si posterius seprimo die morbus regius accedat, iudiciū est sudoris. Nā morbus nō solet exudare, neq; usq; alibi abscessum facere, sed sanus fit. Necesse autē est ubi calor febris discessit, & humorē in seipsum attraxit, febre cōtingere iudicationē, per urinas prōdeūtes, aut etiāalui egestionēs, aut sanguinis ex naribus fluxū, aut mictionē multā, aut per multā humiditatē, sudorē, aut uomitū, Mulieri uero etiā per mensiū uiam. Maxime igitur hæc iudicationem faciūt, & quicquid his propinquū contingit. Facit autē & alias iudicationes, sed minus q̄ has. Si uero septimo die morbus regius accedat, aut posterius, in febre ardēte, & difficilis multi sputi secessus, tum in ardētibus, tum in alijs febribus: si nullo taliū signorū fiēte dimiserit febris, necesse est tales iudicationēs pro illis fieri, aut magnorū tuberculorū abscessum, aut dolores ex abscessu uehementēs, aut collisiones humorū ex calore. Iudicationes & remissionēs eorū quæ febrē ardētem significant, longiorē morbū faciunt. Si uero fortia fuerint, mors plerūq; sequitur. Reliquæ uero ardētes securę desinūt septimo aut decimoquarto die. Solet autē & ad lipyriā deuenire, & detinet maxime xl. dies, & in Epialum trāsīt, & lipyria eadē quoq; die corripit ac dimittit. Fit autē & capitis dolor. Si uero lipyria nō dimiserit in xl. diebus, sed producta fuerit, & dolor habuerit caput, et de lypret æger, ipsum purgato. Desinente uero febre ardente si accedat morbus regius, nō solet amplius exudare, neq; usquā alibi abscessum facere, sed sanus fit.

exquisita

Tertiana in septē circuitibus plerūq; iudicatur. Quibuscūq; in febribus intolerabilibus septima, aut nona, aut decimaquarta morbus regius accedit, bonum: si non dextrum præcordiū durū fiat. Sin minus, ambiguum. Acuti morbi in quatuordecim diebus plerūq; iudicātur. Sudores febricitati si fiant tertia die, & v. & vii. & ix. & xi. & xiiij. & xxi. & xxxi. hi sudores morbos iudicant. Qui uero non sic fiunt, dolores significant.

urina optima.

lipyria

tim maturescētes, si in iudicatorijs diebus concoctæ fuerint, morbum solunt.
 Exemplū urinarū ulcera facere oportet. Nam ulcera si repurgantur pure albo,
 celerem curationē indicāt. Si uero in saniosos humores trāsmutentur, maligna
 fiunt. Eodem modo & urinæ significāt. Si ex dolore tenues fiant, ex occasione
 ratiocinari oportet, ex qua morbus accessit, & hęc inspicere ubi sedatur. Nam
 hac deficiente, alijs signis qualia cōueniunt accedentibus, non putandū est mor-
 bo liberationē contingere. Si doluerit caput, & ex hoc febris accedat, et hinc
 nō sedetur: dolore non cessante febris nō iudicatur: & plurima talia iudicatio-
 nis longæ sunt ad melius, etiam in his quæ ad sanitatē tendūt. In præcordijs
 tumores molles, & doloris exortes, & ad cōtractum cedentes, diuturniores qui-
 dem iudicationes faciūt, minus autem horrendas tuberculis his cōtrarijs. Eo-
 dem modo habet & de tuberculis in reliquo uētre. Ex urinis si quidē id quod
 micūtū est purum fuerit: subsidentia uero albā ac leuem habuerit, diuturnior sit
 morbus, & minus quā optima secura est hæc urina. Si uero & urina subrubra fue-
 rit, & subsidentia subrubra ac leuis: diuturniorē quidem hæc morbum quā prior
 significat, sed ualde salutarem. Quicūq; podagrici morbi fiunt, hi in quadra-
ginta diebus ab inflammatione liberi sedantur. Sed in his pleraquē longæ iudica-
 tionis ad melius sunt. Quæ ad mortē tendunt, in die ac nocte iudicatur, quæ
 uidelicet debilitationis signa sunt, uelut epōti medicamenti, exturbationis alui
 & sursum, & deorsum, anxietatis, & aliorū huiusmodi. Si igitur horū signa in
 die ac nocte submoueātur, bene est. Sin minus, lethalia esse putāda sunt. Su-
dores pessimi sunt frigidi, & circa ceruicē sientes. Hi enim mortes, & morborū
 longitudinē præsignant. Alui egestiones uarię, diuturniores quidē sunt nigris
 & alijs lethalibus egestionibus, nihilo uero minus perniciosæ. Sunt autē tales, ra-
 mentosæ, biliosæ, cruētæ, pralinæ, nigræ: & aliquādo simul omnes prodeūt, ali-
 quādo singulæ particulatim. Vrina si quandoq; pura micta fuerit, quan-
doq; subsidentia albam ac leuem habens, diuturnæ tales sunt, & minus securæ
quā optima urina. Si uero fulua ac tenuis fuerit urina multo tēpore, periculū est
ne sufficere homo possit, donec cōcocta fuerit urina, & si aliās superstitis futuri
signa fuerint, his abscessum affore expecta ad locos infra septū transversum. In
 febribus si mutationes habeat urina, diuturnitatē temporis significat, & neces-
 se est ægrotū mutari & ad deteriora, & ad alterā partē. Si urine ab initio nō si-
 miles fuerint, sed ex tenuibus crassæ fiāt, & penitus tenues, tales ægre iudicant
 ac incōstantes sunt. Frigidi sudores cū acuta quidē febre, lethales sunt: cū mi-
tiore uero, longitudinē morbi significāt. Et ubi in corpore caliditas aut frigiditas,
hic morbus est, & ubi in toto corpore mutatiōes repētinae fiūt, & si corpus
perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio trāsmutetur, morbi longi-
tudinē significat. Si febricitati sudor accedat, febre nō deficiente, malū, prolo-
gatur enim morbus, & humiditatē significat. Febricitati frigidi sudores acce-
dētes, longā febrem significāt. Sudor multus in tēperate fiens sano, morbū si-
 gnificat, estate minorē, hyeme maiorē. Alui egestiones si in idē cōcedere ac cō-
 sistere permiseris, uelut ramēta subsidēt: si pauca, modicus est morbus: si multa,
 multus: his infusum per clysterē adhibere cōducit. Quibus uero in egestione in
 ferne bilis atra subsidet, si copiosior, maior est morbus. Si paucior, minor. Si ue-
næ pulsarint, & facies sana fuerit, et præcordiā nō mollia, sed in tumore eleuata,
 diutur

h. 37. f. p. 101
 l. 1. c. 6. idē

diurnus est morbus, & absq̄ cōuulsione nō soluitur, aut multa sanguinis ex naribus fluxione, aut uehementi dolore. Et palpitationes in manibus, diurnæ febris signum sunt, aut breuis iudicationis in deterius: & in his plerq̄ quæ ad mortem tendunt. His qui breuissimo tempore perituri sunt, maxima signa ab initio fiunt. Nam & difficulter spirant, & noctu nō dormiunt, & signa periculosa præ se ferunt. In febre cōtinua si quis quarta die & septima affligatur, & undecima non iudicatus fuerit, plerūq̄ perit. Quicūq̄ à diffentione antrotrorsum ac retrorsum corripuitur, in quatuor diebus pereit. Si uero hos effugerint, sani fiunt. In febris ardentibus si accedat morbus regius, & singulus quinto die, lethale est. Recidivæ fiunt in his, quibus definitibus uigilantes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut dolores uniuersiusq̄ membri: & quibus febres sedantur, neq̄ signis solutorijs sientibus, neq̄ in iudicatorijs diebus: & si deficiente febre, & sudore accedente, urinā fuluā minxerint, albam subsidentiam habentē, his febris recidivā eadem die expecta. Hæc uero recidivæ quinto die iudicantur extra periculum, & si ex iudicatione facta urinā rubicundā, rubram subsidentiam habentem minxerint, etiā his recidivæ febris fit eadem die: & pauci ex hac feruantur. Quum recidit febris ardens, plerūq̄ etiam exudat. Et si reuertens tot diebus detineat quot prius, etiā tertio recidivæ, si non impari die dimiserit reueria. Plerūq̄ si crudæ sint urinæ, & alia signa nō secundum rationē eueniant, morbus in die iudicatoria recidivæ. Quādoq̄ uero etiā reuertitur in die iudicatoria, his talibus relictis. Abscessus circa aurē quibus circa iudicationē sientes non suppurantur, his submoris recidivæ fit, iuxta recidivæ rationem, similis circuitui: in his spes est ad articulos abscessum fieri: aut urina crassa, qualis est alba in quartanis delaslatorijs, liberat ab abscessu. Quibusdā uero horū etiam sanguinis è naribus eruptiones fiunt. Hæc autē sanguinis eruptio quartanas nō soluit, neq̄ morbos qui per alia uigilantes sanari solent. Atrabiliarijs cum phrenitide occupatis, si hæc morrhoides oboriatur, bonum est. Quicūq̄ infaniunt sua sponte liberati ex morbis, his infania soluit dolor ad pedes progressus, aut ad pectus: aut tristis uehemens oborta. Si uero horū nihil fiat, infania soluta oculi priuatio cōtinuatur. Qui lingua offendunt, & labiorū non sunt potentes, si hæc sedata fuerint, suppurati fiunt. Dolorem in locis infernis fortem soluit aut surditas, aut sanguis multus è naribus erupens. Infania magni morbi ex more sientis solutio. Quibus in febris ardentibus coxarum dolor, oculorū distortio, aut cæcitas, aut testium tumores, aut mammarū eleuatio, febrem ardentem soluit, aut etiam sanguinis ex naribus fluxus. In febre ardenti si insuper corripiat rigor, exudare solet. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. Quibus in febris ardentibus tremores oboriuntur, mētis emotio soluit. Quibus in febris aures obsurduerūt, his nō soluta febre, infanire necesse est. Soluit autē sanguis ex naribus erupens, aut alius biliosa egerēs, aut dysenteria accedens, aut coxarū, aut genuū dolor. Quibus febris rigor accedit, febris soluitur. Quibus dolores fiunt derepente, præcordiū eleuātū est superne, & si circa spuriā costā graues dolores fiunt, his solutio fit uenæ sectio, & purgatio deorsum. Non enim corripit febris uehementis locis impotentibus. In his qui ab hydrope detinentur, si aquositas per uentrē ad uelicā aut uentrē fluat, solutio

solutio fit. Si à pituita alba occupato, alui profluuium uehemens accedat, solutio fit. Qui ab alui profluuiio multo tempore detinentur unà cum tussis, non liberantur, si non dolore uehementes in pedibus inciderint. Si uero uult cōmutatio ac correctio naturæ fieri, postquam nō amplius aluus profluit, aut inanem omnem egestionē habuerit, flatus foras prodeūtes accidunt. Nullū itaq; humorē manifestum habent. Quare ei qui ita habet secure exhibere scies ea quæ cōueniunt, & si uoluulus accedat, uinū frigidum multum meracū paulatim bibendū dato, donec somnus, aut crurū dolor fiat. Soluit autē & febris, aut dysenteria. Caput circūcirca dolenti ac ægrotanti, si pus per aures, aut per nares fluxerit, soluit morbū. Quibuscunq; sanis derepēte dolores oboriuntur in capitibus, & statim uoce priuantur, ac stertūt, hi in septem diebus pereunt, si nō febris corripuerit. Caput circūcirca dolenti, quicunq; ex supernis locus doluerit, cucurbitam affige. Soluit dolor ad coxas, & genua, & anhelatio, quicquid horum factū fuerit. Lippienti ab alui profluuiio corripui, bonum est.

A conuulsione aut distentione neruorum uexato, febris accedens soluit morbum. Si à febre detentum conuulsio corripuit, sedatur febris eadem die, aut postridie, aut tertia die.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE DIEBUS IUDICATORIIS, IANO

Cornario Medico Physico interprete.



AGNAM artis partem esse arbitror, de his quæ recte scripta sunt posse cōsiderationem facere ac iudicare. Qui enim hoc nouit, & his utitur, non uidetur mihi in arte multū falli posse. Oportet autem exacte perdiscere unāquamq; temporum constitutionem, & quenc; morbū, & qui morbus sit bonus, & qui periculosus, aut in constitutione, aut in morbo, & qui morbus longus sit & lethalis; & qui longus, & nō perniciosus ad uitam, & qui acutus ac lethalis; & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorum cōsiderandi ac prædicendi facultas datur, & ex his cognoscere datur, quibus, & quādo, & quomodo uictum præscribere oportet. Maximum itaq; signum in ægrotis qui uicturi sunt, si non præter naturam fuerit febris ardens, & alij morbi eodē modo. Nihil enim horrendum, neq; lethale fit in his quæ secundum naturam sunt. Secundum est, si non etiā ipsum tempus simul cum morbo impugnet. Plerunq; enim hominis natura, uniuersi potestatem non superat. Postea uero si partes circa faciem gracilescent: & uenæ in manibus, & in oculorum angulis, & supercilijs quietem habeant, quum prius non quieuisent. Huic si uox fuerit debilior, & fit leuior: & spiritus rarior ac tenuior, sequenti die remissio morbi contingit. Hæc igitur considerare oportet ad iudicationes: & an bifida linguæ pars uelut saliuæ alba obducitur, et an in summa lingua hoc idem factum sit, uerum minus. Si quidem igitur parua hæc fuerint, ad tertium diem remissio fit morbi. Si uero aliquanto crassior sit saliuæ, in crastinum. Si uero adhuc crassior, eadem die. Quin & albas oculorum partes in principio morbi denigrari necesse

neceſſe eſt, ſi inualuerit morbus. Hæc igitur ſi puræ ſiant, perfectam ſanitatē indicant: leniter quidem, tardius; uehementer autem, citius. Cæterum acuti morbi ſiunt à bile, ubi in hepar influxerit, & ad caput conſtiterit. Hæc igitur patitur hepar. Intumefcit & expanditur ad ſeptū tranſuerſum præ tumore. & ſtatim ad caput dolor irruit, maxime uero ad tempora: & æger auribus non acute audit. Sæpe etiam oculis non uidet. & horror, & febris corripit. Atq; hæc quidem ab initio morbi ipſi ſiunt ex interuallo, quādoq; uehementer, quādoq; minus. Quanto autē morbi tempus magis progreſſum fecerit, tanto maior fit dolor in corpore: & pupillæ oculorū ſparguntur, & obtuſe uident: & ſi digitū admoueris ad oculos, non ſentit, eo quod non uidet. Quod autē non uideat, incognoueris. Non enim niſtat dum digitus admouetur: et floccos auferit de ſtragulis, ſi quidem uiderit, pediculos eſſe putās. Et quum hepar magis expaſſum fuerit ad ſeptum tranſuerſum, delirat: et ob oculos ſibi obuerti putat reptilia, & alia omnigena animantia fera, & milites armatos pugnantes, & ipſe aduerſus ipſos pugnare ſibi uidetur: & talia dicit uelut qui uideat, et egreditur, et miſatur ſi quis ipſum egredi non permittat. Et ubi ſurrexerit, crura eleuare nō potest, ſed cadit. Pedes autem ſemper ſiunt frigidi. Et quum dormierit, exilit à ſomno, & inſomnia horrēda uidet. Hoc autem cognoscimus, quod ab inſomnijs exilit ac perterretur, poſtquā ad ſanam mentem redijt. Exponit enim inſomnia hæc, qualiaq; & corpore fecit, & lingua loquutus eſt. Atq; hæc quidem ſic patitur. Quādoq; uero etiam uoce priuatur, per totam diem ac noctem multum aceruatum ſpiritum respirans. Poſtquā uero delyrare ceſſauit, ſtatim ad ſanam mentem redit. Et ſi quis ipſum interroget, recte reſpondet, & intelligit omnia quæ dicuntur. Deinde rurfus paulo poſt in iſdem afflictionibus iacet. Hic morbus accidit maxime in peregrinatione, & ſi alicubi deſertam uiam iuerit, & timor ipſum ex ſpectro corripuerit. Corripit etiam alijs modis. Tetani tres. Siquidem ex uulnere tetanus, ſiue diſtentio neruorum antrorſum ac retrorſum fiat, æger hæc patitur. Maxillæ cōgelantur ac rigent, uelut ligna: & os aperire non potest, & oculi frequenter lachrymantur ac diſtrahuntur, & dorſum riget, & crura flectere non potest, neq; manus, neq; ſpinam. Quum uero lethaliſ fuerit, potus & cibi quos prius accepit, per nares quādoq; redeunt. At ophiſthotonos, retrorſum hians diſtentio, reliqua quidem eadem ægro inducit ut plurimum, ſit autem quum in ceruice tendines retrorſum ægrotarit. Aegrotat autem, ab angina, aut ab uua, aut locis circa tonſillas ſuppuratis. Aliquando etiam à capite febribus accedentibus conuulſio ſuccedit. Iam uero etiam à uulneribus. Hic trahitur in poſteriore partem, & præ dolore dorſum ac pectora rigent, & eiulat. Hic conuellitur uehementer, ut uix detineatur à præſentibus, ne è lecto excidat. Alius tetanus eſt minus lethaliſ prioribus. ſit autem ab iſdem, & totum corpus ſimiliter conuellitur. Febris ardens prædictis non ſimiliter ſit. Vrit enim ſemel ut neceſſe ſit febricitare. Sitiſ igitur multa hominem tenet, & febris uehemens. lingua uero rumpitur exaſperata, & ſicca ſit: & color ipſius primum quidem pallidus eſt, uelut ſolet, progreſſu uero temporis nigreſcit. Et ſi quidem in principijs nigreſcat, citiores iudicationes ſiunt. Si uero poſteriori, diuturniores. Coxendicum morbus ex hiſ maxime cauſis ſit in pleriq;: ſi quis diutius in ſole uerſetur, & coxendices fuerint calfacti,

& humor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quòd autem id quòd resiccatur condensatur ac còpingitur, hoc magnū signum est. Aeger enim articulos uertere ac mouere nō potest, præ dolore articularum, & eo quod uerticula sunt còpacta. Dolet autem magis lumbos & uerticula ea quæ sunt ex obliquo coxarū, & genua. Consistit autē dolor plurimo tempore in inguinibus simulq; coxendicibus, acutus ac æstuosus, & si quis ipsum erigat aut transmoueat, euolat præ dolore q̄ maxime potest. Quandoq; uero etiam còuulsio accedit, & rigor ac febris. Fit autē à bile & pituita, fit etiā à sanguine: & dolores cōsimiles ab omnibus morbis: & rigor & febris aliquando corripit debilis. Morbus regius acutus est, & celeriter occidēs. Color totus malicorij speciē refert, & est uehementer cum uirore pallidus, quemadmodū lacerti cū uirore pallidiores. cōsimilis autem est cutis. Et in urina subsidet uelut eruum fuluum: & febris & horror debilis habet. Quandoq; etiā stragula habere non sustinet, sed mordetur ac raditur matutino tēpore, ubi nondū cibum accepit, in internis partibus. Deinde uiscera plerunq; fugunt. Et si quis erigat ipsum aut alloquatur, nō sustinet. Hic uel plurimū moritur intra quatuordecim dies. Has autem ubi effugerit, sanus fit.

Peripneumonia talia facit. Febris uehemens tenet: & spiritum densum ac calidum respirat: & anxietas adest, & impotētia, & iactatio, & dolores circa scapulas, & clauiculas, & mammam: & grauitas in pectoribus, & delirij. Quandoq; uero doloris exors aeger est, donec tussire inceperit. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Saluam autē albam & spumofam primū spuit. Lingua flaua est, uerum progressu temporis nigrescit. Si quidem igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Si uero posterius, tardius. Tandem uero etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas inhæret. At liberationē à morbo significat lingua, similiter uelut in pleuritide. Hæc autem patitur aeger minimū diebus quatuordecim, ad summū una & uiginti: & tussit hoc tempore uehementer: & unā cū tussi purgatur, primū quidem saliuā multa ac spumofa. Septima uero & octaua die, ubi febris in uigore fuerit, & humida sit peripneumonia, crassior: sin minus, non. Nona uero & decima, cū uirore pallida ac subcruenta. Duodecima autem usq; ad decimam quartam, multa & purulenta. Atq; hoc in his cōtingit, quorum naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quorum uero & natura, & morbi constitutio sicca est, in his minus.

Cæterum de iudicatorijs diebus, etiam iam ante à me dictum est. Iudicantur autem febres quarta die, septima, undecima, decimaquarta, decima septima, uigesima prima. Ex his autē acutis quædam etiam trigesima, Deinde quadragesima, postea sexagesima. Quum uero hos numeros exceßerint, diuturna iam febrium constitutio fit.

HIPPOCRATIS COILIBER

APHORISMORVM, IANO CORNARIO Medico Physico interprete.

SECTIO PRIMA.



MITA breuis, ars longa, tempus præcept, experimentū periculosum, iudicium difficile. Oportet autē non solum seipsum exhibere quæ decent facientem, sed etiam ægrotum, & præsentem, & quæ externa sunt. **II.** In perturbationibus alui, & uomitibus sponte fientibus, si quidē qualia purgari oportet purgētur, confert, & leuiter ferūt: Sin minus, uice uersa. Sic & uasorum uacuatio, si quidē talis fuit, qualis fieri debet, confert, et bene ferunt: Sin minus, uice uersa. Inspecere itaq; oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conuenit, aut non.

III. In exercitiis boni habitus ad summū progressi periculosi sunt, si in extremo fuerint. Non enim manere possunt in eodem, neq; quiescere. Quū uero non quiescant, nō amplius in melius augetur, reliquū est igitur ut in deterius. Ob has igitur causas bonam habitudinem non tarde soluere confert, quo corpus rursus renutritionis principiū sumat. Neq; uero collapsiones ad extremum ducere oportet. periculosum enim est. Sed qualis natura est eius qui perferre debet, ad hoc ducere cōuenit. Similiter autē & euacuatiōes ad extremum ducentes, periculosæ sunt. & rursus renutritiones in extremo existentes, periculosæ sunt. **IIII.** Tenuis & exacti uictus, & in lōgis semper affectio nibus, & in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt, & rursus uictus ad extremā tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremū progressæ, difficiles sunt. **v.** In tenui uictu delinquentes ægrotantes, magis læduntur. Omne enim delictū quod committi poterit, magis magnū committitur in tenui q̄ in paulo pleniore uictu. Quapropter etiā in sanis periculosus est ualde tenuis, & constitutus, ac exactus uictus, quoniam delicta grauius ferūt. Ob hoc igitur tenuis & exactus uictus periculosus est magis quam paulo plenior.

VI. Ad extremos morbos, exacte extremæ curationes, optimæ sunt.

VII. Vbi igitur peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, & extrême tenuissimo uictu uti necesse est. Vbi non, sed pleniore uictu uti licet, intantum subdescendendū est, inquantū morbus extremis mollior fuerit.

VIII. Quū in uigore fuerit morbus, tūc tenuissimo uictu uti necesse est.

IX. Simul autē coniectare oportet, an æger ex uictu durare possit ad morbi uigore: & utrum ille prius deficiet, & ex uictu durare nō possit: aut morbus prius deficiet ac obtūdetur. **X.** Quibus igitur statim uigor est, his statim tenuis uictus exhibendus est. Quibus uero uigor posterius, his ad illud, & paulo ante illud tempus, subtrahendus est. Antea uero mitius æger uictu tractandus est, quo durare possit. **XI.** In exacerbationibus subtrahere uictum oportet. Nam apponere noxa est. Ex quibus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbationibus subtrahere oportet. **XII.** Exacerbationes & constitutiones indicabunt morbi, & tēpora anni, & circuituum inter se collata incrementa

mēta; siue quotidie, siue alternis diebus, siue per amplius temporis interuallum fiant. Sed & ex apparentibus indicia fiunt, uelut in pleuriticis, si sputum statim appareat incipiente morbo, ipsum abbreviat. Si uero posterius appareat, producit, & urinæ, & alui egestiones, & sudores apparentes indicant & ægre & facile iudicandos, & breues & longos morbos, xiii. Senes facillime ieiunium ferunt. Deinde ætate consilientes. Minime adolecentes. omnium uero minime pueri, & inter hos ipsos qui ipsi seipsis alacriores fuerint.

xiiii. Qui crescunt, plurimum habent innatum calorem, plurimo igitur opus habent alimento. Sin minus, corpus consumitur. Senibus autem modicus est calor: quapropter paucis fomitibus opus habent, à multis enim extinguuntur. Ob hanc etiam causam febres senibus non similiter acutæ fiunt. Frigidum est enim ipsorum corpus. xv. Ventres hyeme & uere natura calidissimi sunt, & somni longissimi: Quapropter in his temporibus alimenta plura exhibenda sunt. Nam innatum calorem ampliolem tunc habent, alimen- to igitur ampliore opus habent. Signum sunt ætates, & athletæ.

xvi. Victus humidi omnibus febricitantibus cōferunt. Maxime uero pueris, & alijs ita ali aduetis. xvii. Et quibus semel aut bis, & plus aut minus, & ex parte exhibere oportet, considerandum est. Dandum uero etiam aliquid est temporis, & regioni, & ætati, & consuetudini. xviii. Aestate & autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime, deinde uere.

xix. His qui in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere: sed auferre de appositionibus ante iudicationes. xx. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integre, neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neque alijs irritamentis, sed sinere. xxi. Quæ ducere oportet, quò maxime repunt, eò ducere oportet, per conuenientes locos.

xxii. Concocta medicamentis aggredi oportet, & mouere non cruda, neque in principijs, si non turgent. Plurima uero non turgent.

xxiii. Quæ prodeunt nō multitudine æstimare oportet, sed quandiu prodeant qualia oportet, & facile æger ferat. Et ubi opus est, usque ad animi deliquium ducere oportet: & hoc facere, si sufficiat æger. xxiiii. In acutis affectionibus raro etiam in principijs medicamentis uti oportet: atque hoc facere diligenti prius æstimatione facta. xxv. Si qualia oportet purgari, purgantur, confert & facile ferunt. Contraria uero difficulter.

SECTIO SECUNDA.

IN quo morbo somnus laborem facit, mortale: Si uero somnus profit, non lethale. ii. Vbi somnus delirium sedat, bonum est. iii. Somnus, uigilia, utraque modum excedentia, malum.iiii. Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

v. Lassitudines spontaneæ denunciant morbos. vi. Quicunque aliqua corporis parte dolentes, plerumque dolores nō sentiunt, his mens ægrotat.

vii. Quæ multo tempore attenuantur corpora, lente reficere oportet. Quæ uero breui, breui. viii. Si ex morbo cibum capiens quis non fiat ualidus, significat quòd corpus uberiore alimēto utitur, Si uero cibum non accipiente hoc contingat, nosse oportet quòd euacuatione opus habet.

ix. Corpora quocumque quis purgare uoluerit, fluida facere oportet.

x. Non pura corpora quāto plus nutries, tanto magis lædes. xi. Facilius est repleri potu, q̄ cibo. xii. Quæ relinquuntur in morbis post iudicationem, recidiuā faciunt. xiii. Quibuscunq; iudicatio fit, his nox grationis ante exacerbationem. Quæ uero sequitur plerunq; tolerabilior est. xiiii. In alui fluxionibus, mutationes egestionum profunt, si non ad prauas mutantur. xv. Vbi fauces ægrotāt, aut tubercula in corpore nascuntur, excretionēs cōsiderare oportet. Si enim biliosæ fuerint, corpus simul ægrotat. Si uero similes sanis fiant, tutū est corpus nutrire. xvi. Vbi fames, non oportet laborare. xvii. Vbi cibus præter naturam copiosior accessus fuerit, morbum facit. Ostendit autem sanatio. xviii. Eorū cibus aceruatim & uelociter nutriūt, ueloces etiam egestionēs fiūt. xix. Acutiorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neq; mortis, neq; curatilitatis. xx. Quibus dum iuuenes sunt, uētres humidi sunt, his senescentibus reficcantur. Quibus uero dum iuuenes sunt, uentres sicci sunt, his senescentibus humectātur. xxi. Famē uini potus soluit. xxii. Quibuscunq; morbi ex repletionē fiunt, euacuatio sanat. Et quicunq; ex euacuatione, repletio. Et aliorum contrarietas. xxiii. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. xxiiii. Septimæ quarta index est. Alterius hebdomadæ octaua principiū est. Consideranda uero est undecima. Hæc enim quarta est secundæ hebdomadæ. Consideranda rursus decima septima. Ipsa enim est quarta quidē à decima quarta, septima uero ab undecima. xxv. Aestiuæ quartanæ plerunq; sunt breues. Autumnales uero longæ, & maxime quæ ad hyemem pertingunt. xxvi. Febrem in conuulsione fieri melius est, q̄ conuulsionem in febre. xxvii. His quæ non secundum rationē leuant, non oportet credere, neq; ualde timere ea quæ praua fiunt præter rationē. Pleraq; enim ex talibus inconstantia sunt, & non ualde permanere, neq; morari solent. xxviii. Febricitantium non omnino leuiter, permanere, & nihil minui corpus, aut etiam magis q̄ pro ratione colliquari, malum est. Illud enim morbi longitudinē, hoc uero debilitatē significat. xxix. Incipientibus morbis si quid mouendum uidetur, moue: uigentibus uero, quietem agere melius est. xxx. Circa principia & fines, omnia debiliōra sunt. Circa uigores uero, fortiora. xxxi. Ex ægritudine bene cibum accipientes, nihil auferere corpus, malum est. xxxii. Plerunq; omnes male habentes, ab initio cibum bene capientes, & nihil auferentes, ad finem rursus cibum fastidiūt. At ab initio quidem ualde cibum auersantes, postea uero bene cibum capientes, melius liberantur. xxxiii. In omni morbo ualere mente, & bene se habere ad ea quæ exhibentur, bonum. contrarium uero, malum. xxxiiii. In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori morbus magis affinis fuerit, q̄ hi quibus nō affinis in aliquo horum existit. xxxv. In omni morbo partes circa umbilicum & pectinem, crassitudinem habere melius est. At uehēmēs tenuitas & eliquatio, praua est. Periculosa uero talis est etiā ad infernas purgationes. xxxvi. Sana habentes corpora, dum medicamētis purgātur, cito exoluūtur. Itemq; qui prauo cibo utuntur. xxxvii. Qui bene habent corpore, eos operosum est medicamentis purgare. xxxviii. Paulo deterior & potus & cibus, ue

rum iucundior, melioribus quidem, sed iniucundioribus præferendus est.

XXXIX. Senes iuuenibus plerūq; minus ægrotant. Quicunq; uero ipsi fiunt morbi diuturni, ut plurimum commoriuntur. XL. Raucedines & grauedines, in ualde senibus non concoquuntur. XLI. Qui exoluuntur sæpe & fortiter, absq; manifesta causa, derepente moriuntur. XLII. Syderationem fortem quidem soluere, impossibile est, debilem uero, non facile.

XLIII. Ex his qui strangulantur, & submerguntur, nondum autem mortui sunt, non reconalescunt quibus spuma circa os fuerit. XLIII. Crassif admodum secundum naturam, magis cito moriuntur, q̄p graciles. XLV.

Iuuenibus comitialibus liberationē faciunt mutationes, maxime ætatis, & regionum, & uictuum. XLVI. Duobus doloribus simul sentibus, non secundum eundem locum, uehementior obscurat alterum. XLVII. Circa generationem puris, dolores & febres magis contingunt, q̄p factio iam ipso.

XLVIII. In corporis motu, quum incœperit dolere, quiescere statim lassitudinem eximit. XLIX. Adfueti consuetos labores ferre, etiamsi fuerint debiles, aut senes, non adfuetis fortibus ac iuuenibus facilius ferūt. L. Ex multo tempore consueta, etiamsi deteriora fuerint, inconsuetis minus molestarē solent. Oportet igitur etiam ad inconsueta transmutationem facere. LI.

Multum & repēte euacuare, aut replere, aut calefacere, aut frigefacere, aut omnino quomodocunq; corpus mouere, periculosum est. Et omnis multitudo naturæ contraria est. Quod uero paulatim fit, tutum est, tum aliàs, tum si ex altero ad alterum transitus fit. LII. Omnia secundum rationem facienti, si non secundum rationem fiant, non transire oportet ad aliud, manente eo quod uisum est ab initio. LIII. Quicunq; uētres humidos habēt, dum quidem iuuenes sunt, melius degunt q̄p hi qui siccos habent. Verum ad senectutem deterius degunt. Resiccantur enim plerunq; senescentibus. LIIII. In corporis magnitudine iuuentutem quidem degere, liberale est & non indecorum. Senectutem uero degere, inutile, & deterius paruitate.

SECTIO TERTIA.

Mutationes temporum maxime pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua iuxta rationem hoc modo. II. Naturarum aliæ quidem ad æstatem, aliæ uero ad hyemem, bene aut male se habent. III. Morborum alij ad alia tempora, bene aut male se habent: & ætates quædam ad tēpora, & regiones, & uictus. IIIII. In temporibus quum eadē die, modo calor, modo frigus fit, autūnales morbos expectare oportet. V. Austri auditū grauantes, caliginosi, caput grauātes, torpidi, dissoluentes. Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur. Si uero Aquilo fuerit, tusses, fauces, alui duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectoris. Quum hic dominatur, talia in morbis expectare oportet.

VI. Quū æstas fit ueri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. VII. In siccitatibus febres acutæ fiunt, & si quidem annus amplius talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, plerunq; tales etiam morbos expectare oportet. VIII. In constantibus temporibus, si tempestiue tempestiua reddantur, morbi constantes & iudicatu facilissimi fiunt. In inconstantibus autem, incōstantes, & qui difficulter iudicātur. IX. In autumno morbi acutissimi

tiffimi, & omnino mortiferi, Ver autem saluberrimum & minime lethale.

x. Autumnus tabidis malus. xi. De temporibus si quidem hyems sicca & aquilonaris fuerit, Ver autem pluuiosum & australe, necesse est æstate febres acutas, & lippitudines, & dysenterias fieri, maxime mulieribus, & uiris natura humidioribus.

xii. Si uero hyems australis, & pluuiosa, ac clemens fiat, Ver autem sicum & aquilonare, mulieres quidem quibus partus ad uer instat, ex omni occasione abortiunt. Quæ uero pariunt, impotentes ac morbosos pueros pariunt, ita ut aut statim pereant, aut tenues ac morbosi uiuant. Alijs autem dysenteria, & lippitudines sicca fiunt. Senioribus uero defluentes breui perimentes.

xiii. Si uero æstas sicca fiat & aquilonaris : autumnus autem pluuiosus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & raucedines ac grauedines : quibusdam etiam tabes.

xiiii. Si uero aquilonaris & aquarum exors autumnus fuerit, his quidem qui humidas naturas habent, & mulieribus commodus erit. Reliquis uero sient lippitudines sicca, & febres acuta, & grauedines. Quibusdam uero etiam atræ bilis.

xv. Ex anni uero constitutionibus, in summa siccitates pluuiosis salubriores sunt, & minus lethales. xvi. Morbi in pluuiosis quidem pleurunt, fiunt, febres longæ, & alui fluxiones, & putredines, & comitiales, & syderationes, & anginæ. In siccitatibus uero, tabes, lippitudines, arthritides, uirinæ stillicidia, & dysenteria.

xvii. Quotidianæ uero constitutiones, aquilonares quidem corpora compingunt, & robusta, & ad motum idonea, & bene colorata, & melius audientia faciunt, & uentres reficcant, & oculos mordent, & si circa thóracem aliquis dolor prius est, magis affligunt. Australes autem corpora dissoluunt, & humectant, & grauem auditum, ac capitis grauitatem, & uertigines faciunt. In oculis autem & corporibus ægrum motum, & uentres humectant.

xviii. Secundum tempora uere quidem & prima æstate, pueri, & qui his ætate cohærent, optime degunt, & maxime sani sunt. Æstate uero & autumno aliquandiu, senes. Reliquo autumno & hyeme, mediam ætatem habentes.

xix. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt. Quidam tamen magis in quibusdam ipsorum & fiunt, & exacerbantur. xx. Vere infania, & atræ bilis, & comitiales, & sanguinis fluxiones, & anginæ, & grauedines, & raucedines, & tusses, & lepræ, & impetiginæ, & uiriliginæ, & pustulæ ulceroas plurimæ, & tubercula, & morbus articularis.

xxi. Æstate uero & quidam ex his, & febres continuæ, & ardentæ, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & uomitus, & alui profluuia, & lippitudines, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & papulæ sudorosæ.

xxii. Autumno autem & ex æstiuis multi, & febres quartanæ, & erroneæ, & splenes, & hydropes, & tabes, & urinæ stillicidia, & intestinorum leuitates, & dysenteria, & coxendices, & anginæ, & anhelationes, & uoluuli, & comitiales, & infania, & atræ bilis.

xxiii. Hyeme uero pleuritides, peripneumonix, grauedines, raucedines, tusses, dolores pectorum, laterum ac lumborum, capitis dolores, uertigines, syderationes.

xxiiii. In ætatibus autem talia contingunt, paruis ac recens natis pueris feruida oris ulcera, uomitus, tusses, uigilia, timores, umbilici inflammatio-

nes, aurium humiditates. **xxv.** Ad dentitionem uero accedentibus, gingiuarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maxime ubi dentes caninos producant, tum crassissimis pueris, tum his qui duros uentres habent. **xxvi.** Senioribus autem fientibus, tonfillæ, uerticuli in occipitio intro luxationes, anhelationes, calculorū generationes, lumbrici rotundi, ascariides, uerrucæ, tumores glandularum circa aures oblongi fatyriasmī appellati, strumæ, & alia tubercula, maxime uero prædicta. **xxvii.** Adhuc uero senioribus, & ad pubertatem accedentibus, pleracq̃ ex his, & febres diuturnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones. **xxviii.** Plurimæ uero affectiones pueris iudicatur, partim in quadraginta diebus, partim in septem mensibus, partim in septem annis, partim ad pubertatem accedentibus. Quæ uero permanferint pueris affectiones, & non exolutæ fuerint circa pubertatem, aut foemellis circa mensium eruptiones, diuturnæ fieri solent. **xxix.** Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, comitiales, & alij morbi, maxime uero prædicti. **xxx.** His uero qui hanc ætatē excesserunt, anhelationes, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alui profluvia diuturna, bilis sursum ac deorsum effusiones, dysenteriæ, intestinorum leuitates, hæmorrhoides. **xxxi.** Senibus autem spirandi difficultates, & defluxiones cum tussi, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articularum dolores, nephritides, uertigines, syderationes, mali habitus, pruritus rotius corporis, uigiliæ, alui, oculorum, & narium humiditates, uisus hebetudines, glaucedines, auditus grauitates.

SECTIO QVARTA.

I. Prægnantes medicamētis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & usq̃ ad septimum. Minus uero has, Iuniores autem & seniores foetus uereri oportet. **II.** In medicamētorum usu, talia ex corpore ducere oportet, qualia etiam sponte prodeuntia commoda sunt. Contrario autem modo prodeuntia, sedare. **III.** Si qualia oportet purgari, purgētur, cōfert & facile ferunt. Contraria uero difficulter. **IIII.** Medicamentis purgare oportet æstate quidē, superiores magis: hyeme uero inferiores. **V.** Sub canē, & ante canem, operosæ sunt medicamentorū purgationes. **VI.** Graciles, & facile uomētes, sursum purgare oportet, uitantes hyemem. **VII.** Difficulter uomentes, & moderate carnosos, deorsum, uitantes æstatem. **VIII.** Tabescentes autē, uitantes superiores. **IX.** Atrabiliarios uero plenius inferiores. Eadem ratione cōtraria apponens. **X.** Purgare oportet in ualde acutis, si humor turget, eadem die. Morari enim in talibus malum est. **XI.** Quibus tormina, & circa umbilicū dolores, & lumborum dolor, qui neq̃ a medicamento, neq̃ aliàs soluitur, in hydropem siccū firmatur. **XII.** Quibus alui intestinorum leuitate affecti, eos hyeme sursum purgare malum est. **XIII.** Ad ueratrum, his qui nō facile sursum purgātur, ante potionem corpora humectare oportet, ampliore cibo ac quiete. **XIIII.** Vbi biberit quis ueratrum, ad motus quidem corporū magis ducere oportet, ad somnos autem & quietē minus. Declarat autē nauigatio, quod motus corpora turbat. **XV.** Vbi uolueris magis ducere ueratrum, corpus moueto. Vbi uero sistere, somnum facito.

facito, & ne moueto. **xvi.** Veratrū periculosum est sanas carnes habentibus. Conuulsionem enim inducit. **xvii.** Sine febre existenti cibi fastidium, & oris uentriculi morsus, et uertigo, & os amarescens, medicamento sursum purgante opus habere significat. **xviii.** Dolores supra septū transversum, qui purgatione opus habent, sursum uersus purgatione indigere significant: qui uero infra, deorsum. **xix.** Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur non sitiunt, non cessant prius quā sitierint. **xx.** Non febrientibus si fiat tormen, & genuum grauitas, & lumborum dolor, deorsum medicamento purgante opus habere significat. **xxi.** Egestiones alui graues, uelut sanguis niger, sua sponte prodeuntes, & cum febre, & sine febre, peiores sunt. & quanto plures fuerint peiores colores, tanto magis malū est. Cum medicamento uero melius, & quanto plures fuerint colores, non malum est. **xxii.** Quibuscūq; morbis incipientibus, si atra bilis, aut sursum aut deorsum prodierit, lethale est. **xxiii.** Quibuscūq; ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex uulneribus, aut aliā attenuatis, atra bilis, siue qualis sanguis niger subierit, postridie moriūtur. **xxiiii.** Dysenteria si ab atra bile incepterit, lethalis est. **xxv.** Sanguis sursum quidem qualiscūq; fuerit, malus est, deorsum uero bona sunt nigra subeūtia. **xxvi.** Si à dysenteria occupato, ueluti carnes subierint, lethale est. **xxvii.** Quibus in febribus sanguinis multitudo erumpit undecūq; his in refectionibus alui humectantur. **xxviii.** Quibus biliose sunt egestiones, surditate siente cessant. Et quibus surditas, biliosis egestionibus sientibus cessat. **xxix.** Quibus in febribus sexta die rigores fiūt, difficulter iudicant. **xxx.** Quibus exacerbationes fiunt, quacūq; tandem hora febris dimiserit, si postridie eadē qua antea hora corripuerit, difficulter iudicant. **xxxi.** Delassatis in febribus, ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus fiunt. **xxxii.** Quibuscūq; resurgētib; ex morbis, si quid doluerit, isthic abscessus fiūt. **xxxiii.** Sed & si ante morbū quid doluerit, isthic morbus incumbit. **xxxiiii.** Si à febre occupato, tumore nō existēte in faucibus, suffocatio derepente cōtingat, lethale est. **xxxv.** Si à febre occupato collū repente obuersum fuerit, & uix deglutire poterit, tumore nō existēte, lethale est. **xxxvi.** Sudores febricitanti si inceperint, boni sunt tertia die, & quinta, & septima, & nona, & undecima, & decimaquarta, & decima septima, & uigesima prima, & uigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos iudicāt. Qui uero non sic fiunt, dolorē significant, & longitudinē morbi, & recidiuas. **xxxvii.** Frigidi sudores cū acuta quidē febre sientes, mortē significant: cū mitiore uero, morbi longitudinē. **xxxviii.** Et ubi in corpore sudor est, illic morbū esse declarat. **xxxix.** Et ubi in corpore frigiditas aut caliditas, isthic morbus est. **xl.** Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat. **xli.** Sudor multus ex somno, citra manifestā causam fiens, corpus multo alimēto uti significat. Si uero cibum nō capiēti hoc fiat, significat quod euacuatione opus habet. **xlvi.** Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens: frigidus maiorē, calidus mino-

rem morbum significat. XLIII. Febres quæcunq; non intermittentes per tertiam fortiores fiunt, magis periculosa sunt. Quocunq; uero modo intermiserint, quod sine periculo sint significant. XLIII. Quibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. XLV. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores, ex febribus longis fiunt, hi pluribus cibis utuntur. XLVI. Si rigor incidat febre non intermittente, ægrotus iam debilis, lethale est. XLVII. Excreationes in febribus non intermittentibus, liuidæ, & cruentæ, & graueolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At profecedentes, bonæ, & per alui egestiones, & per urinas. Si uero nõ aliquid ex conducentibus excernatur per hos locos, malum est. XLVIII. In non intermittentibus febribus, si externæ quidem partes frigidæ fuerint, internæ uero ardeant, ac sitim habeant, lethale est. XLIX. In febre nõ intermittente, si labium, aut palpebra, aut superciliũ, aut oculus, aut nasus distorqueatur: aut non uideat, aut nõ audiat, æger iam debilis existens, quicquid horum fiat, propinqua mors est. L. Vbi in febre non intermittente, difficultas spirandi, & delirium fit lethale est. LI. In febribus abscessus, qui non soluuntur ad primas iudicationes, longitudinem morbi significant.

LII. Quicunq; in febribus, aut alijs ægritudinibus, ex uoluntate lacrymantur, nihil absurdum est. Qui uero non ex uoluntate, absurdum. LIII.

Quibus circa dentes in febribus uiscosa adhærent, his fortiores febres fiunt.

LIIII. Quibus plerunq; tussis sicca, parum irritantes, in febribus ardentibus, hi non ita ualde siticulosi sunt. LV. Ex glandularum tumoribus febres omnes malæ sunt, exceptis diarijs. LVI. Febricitanti sudor oboriens febre non remittente, malum. Moram enim trahit morbus, & multam humiditatem significat. LVII. A conuulsione, aut distentione neruorum uexato, febris accedens morbum soluit. LVIII. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. LIX. Tertianæ exacta in septem circuitibus ad summum iudicatur. LX. Quibus in febribus aures obsuerunt, his sanguis e naribus effusus, aut aluus exturbata, morbum soluit.

LXI. Febrientem si non in diebus imparibus febris dimiserit, recidua re solet. LXII. Quibus in febribus morbus regius fit ante septimum diem, malum. LXIII. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres soluuntur. LXIII. Quibus in febribus morbus regius septima, aut nona, aut decimaquarta accedit, bonum, si non præcordium dextrum durum fiat: sin minus, non bonum. LXV. In febribus circa uentrem æstus uehemens, & cordis siue oris uentriculi morsus, malum. LXVI. In febribus acutis conuulsiones, & circa uiscera dolores fortes, malũ. LXVII. In febribus, ex somnis, timores aut conuulsiones, malum. LXVIII. In febribus spiritus offendens, malum. Conuulsionem enim significat. LXIX.

Quibus urinæ crassæ, grumosa, pauca, non sine febribus, ubi copia ex his successit, tenuis prodest. Tales autem maxime prodeunt his quibus ab initio, aut breui subsidentiam habent. LXX. Quibus in febribus urinæ conturbata, uelut iumentis, his capitis dolores, aut adfunt, aut aderunt. LXXI.

Quibus septima die morbi iudicatur, his nubeculam habet urina, quarta die rubram

rubram, & alia secundum rationem. LXXII. Quibus urinæ pellucidæ, albæ, malæ. Maxime autem in phreniticis comparēt. LXXIII. Quibus præcordia eleuata, permurmurantiâ, lumborum dolore accedente, his alui humectantur, si non flatus erumpant, aut urinæ copia prodeat. In febribus autem hæc. LXXIII. Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa, & crassa, & alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. Si uero etiam ex naribus sanguis eruperit, breui admodum soluitur. LXXV. Si quis sanguinem aut pus mingat, rhenum aut uesicæ ulcerationē significat. LXXVI. Quibus in urina crassa existente, caruncula parua, aut ueluti pili simul exeunt, his de rhenibus cernuntur. LXXVII. Quibus in urina crassa existente, furfuracea quadam simul minguntur, his uesica scabie affecta est. LXXVIII. Qui sua sponte sanguinem mingunt, his in rhenibus uenæ ruptionem significat. LXXIX. Quibus in urina, arenosa subsidunt, his uesica calculo laborat. LXXX. Si quis sanguinem mingat, & grumos, & urinæ stillicidium habeat, & dolor incidat in imum uentrem, & ani ac scorti intercapedinem, partes circa uesicam affectæ sunt. LXXXI. Si quis sanguinē & pus mingat, & squamas, & odor grauis sit, uesicæ exulcerationem significat. LXXXII. Quibus in urinaria fistula tuberculum nascitur, his suppuratione facta & eruptione, solutio fit. LXXXIII. Mictio noctu multa fiens, medicam alui egestionem significat.

SECTIO QUINTA.

I. **C**onuulsio ex ueratro lethalis est. II. Ex uulnere cōuulsio lethalis est. III. Sanguine multo effuso cōuulsio aut singultus accedēs, malū. IIII. Ex superflua purgatione, conuulsio aut singultus accedens, malum. V. Si quis ebrius derepente uoce priuetur, conuulsus moritur, si nō febris corripuerit, aut ubi ad horam qua crapulæ soluuntur peruenit, loquatur. VI. Quicunq; à distentione antrorsum ac retrorsum corripuntur, in quatuor diebus pereunt. Si uero has effugerint, sani fiunt. VII. Quibuscunq; morbi comitiales ante pubertatem fiunt, trāsmutationem habent. Quibuscūq; uero uiginti quinque annos natis fiunt, his plerunq; cōmoriuntur. VIII. Quicunq; pleuritici fientes, in quatuordecim diebus non repurgantur, his ad suppurationem transitio fit. IX. Tabes maxime fit ætatibus, ab anno decimo octauo, usq; ad trigessimum quintum. X. Quicunq; anginam effugiunt, his ad pulmonē uertitur, & in septem diebus moriuntur. Si uero has effugerint, suppurati fiunt. XI. Qui tabe infestātur, si sputum quodcūq; rufiſſimo reiecerint, graue olet, dum prunis inſicitur, & capilli de capite defluerint, lethale est. XII. Quibuscūq; tabe laborantibus capilli de capite defluerint, hi alui profluuiū accedente moriuntur. XIII. Quicunq; sanguinē spumofum spuunt, his ex pulmone eductio fit. XIII. A tabe occupato, alui profluuiū accedens, lethale est. XV. Quicunque ex pleuritide suppurati fiunt, si in quadraginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fuerit, liberantur. Si uero non, ad tabem tranſeunt. XVI. Calida frequenter ea utentibus, has noxas inducit, carniū effœmationem, neruorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia.

Hæc

Hæc quibus mors. **XVII.** Frigida uero conuulsiones, antrorsum ac retrorsum distentiones, nigrores, rigores febriles. **XVIII.** Frigida inimica ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ. Calida uero grata.

XIX. Quæcunq; perfrigerata sunt, excalefacere oportet, præterquam à quibus sanguis erumpit, aut erupturus est. **XX.** Ulceribus frigida mordax, cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrefacit, rigores febriles inducit, conuulsiones, distentiones. **XXI.** Quandoq; uero in distentione sine ulcere, iuueni carnosio, ætate media, frigidæ multæ affusio, caloris reuocationem facit. Calor autē hæc soluit. **XXII.** Calida suppuratoria est, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem, cutem mollit, attenuat, dolores eximit, rigores, conuulsiones, distentiones mitigat, capitis grauitatem soluit. Plurimum autem cōfert ad ossium fracturas, maxime denudatas. Ex his autem maxime his qui in capite ulcera habent, & his quæ à frigiditate moriuntur, aut ulcerantur, & herpenibus exedētib; sedi, pudendo, utero, uesicæ. His calida grata est & iudicans. Frigida uero inimica & occidens. **XXIII.**

In his frigida uti oportet unde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsas partes, sed circa ipsas unde fluit. Et quæcunq; inflammationes, aut flammei ardores, ad ruborem & subcruentum colorem ex nouo sanguine tendunt, ad eas ipsas. nam ueteres nigrefacit. & ad sacrum ignem non exulceratum. nam exulceratum lædit. **XXIII.** Frigida uelut nix, glacies, peccatori inimica sunt, tusses mouēt, & sanguinis eruptiones, ac defluxiones inducunt. **XXV.** Tumores in articulis, & dolores absq; ulcere, & podagricas affectiones, & conuulsiones: Horum plurima frigida multa affusa leuat, & attenuat, & dolorem soluit. Torpor enim dolorem soluit. **XXVI.** Aqua quæ cito calescit, & cito perfrigeratur, leuissima est. **XXVII.** Quibus bibendi appetentiæ noctu ualde sitientibus, si obdormierint bonum est.

XXVIII. Menses ducit aromatum suffitus. Multis autem modis etiam ad alia commodus esset, si non capitis grauitatem induceret. **XXIX.**

Prægnantes medicamentis purgare oportet, si turgēt humor, quarto mense, & usque ad septimum. Minus uero has. Iuniores uero & seniores foetus uereri oportet. **XXX.** Mulierem uterum gerentem ab aliquo acuto morbo corripit, lethale est. **XXXI.** Mulierem uterum gerens secunda uena abortit, & magis si maior fuerit foetus. **XXXII.** Mulieri sanguinem uomenti, mensibus erumpentibus solutio fit. **XXXIII.** Mulieri mensibus deficientibus, sanguinem ex naribus fluere, bonum est. **XXXIII.** Mulieri uterum gestanti si aluius multum fluxerit, periculum est ut abortiat.

XXXV. Mulieri quæ ab uteri strangulationibus uexatur, aut difficulter parit, sternutatio accedens, bonum. **XXXVI.** Mulieri menses decolores, & non eodem tempore semper fientes, purgatione opus esse significant.

XXXVII. Mulieri uterum gestanti, si mammae repente graciles fiant, abortit. **XXXVIII.** Mulieri uterum gestanti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestans alterum abortit. Et si quidem dextera gracilis fiat, masculinum: si uero sinistra, foemellam. **XXXIX.** Si mulier quæ neque prægnans est, neque peperit, lac habet: menses ipsius defecerunt. **XL.** Mulieribus quibuscunq; ad mammas sanguis colligitur, infaniam significat.

XL I. Mulierem si uelis cognoscere, an prægnans sit, ubi dormire uolet, aquam mulsam bibendam dato. Et si quidem tormen habuerit circa uentrē, prægnans est. Si uero nō, prægnans non est. **XL II.** Mulier prægnans si quidem masculum gestat, bene colorata est. Si uero foemellam, male colorata.

XL III. Si mulieri prægnanti ignis facer in utero fiat, lethale est.

XL IIII. Quæcunq; præter naturam tenues existentes, uterum gestant, abortiunt priusquam crassescant. **XL V.** Quæcunq; uero moderate corpus habentes, abortiunt bimestres & trimestres, sine causa manifesta, his uteri acerabula muco plena sunt, & non possunt foetum continere præ grauitate sed abrumpitur.

XL VI. Quæcunq; præter naturam crassæ existentes non concipiunt in utero, his omentum osculum uteri comprimit, & priusquam attenuentur, non concipiunt. **XL VII.** Si uterus in coxam incubens, suppuratus fuerit, necesse est curationem ex medicamentis, per linamenta ipsi adhibere.

XL VIII. Foetus masculi quidem in dextris, foeminae uero in sinistris magis. **XL IX.** Vt secundæ excidant, sternutatorio indito, nares & os apprehendito.

L. Mulieri menses si cohibere uoles, cucurbitam q̄ maximam ad mammas appone. **LI.** Quæcunq; uterum gestant, his osculum uterorum clausum est.

L II. Mulieri uterum gestanti si multum lac ex mammis fluat, debilem foetum significat. Si uero solidæ fuerint mammae, saniorum foetum significant. **L III.** Quæ corrupturæ sunt foetus, his mammae graciles fiunt. Si uero rursus duræ fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non corrumpunt.

L IIII. Quibus os uterorum durū est, his necesse est osculū uterorum clausum esse. **L V.** Quæcunq; in utero habentes, à febribus corripuntur, & fortiter attenuantur sine manifesta occasione, difficulter pariunt & periculose: aut abortum facientes periclitantur.

L VI. In fluxu muliebri, conuulsio & animi deliquium si accedat, malum est. **L VII.** Mensibus pluribus prodeuntibus morbi fiunt, & non prodeuntibus, ab utero morbi contingunt. **L VIII.** Ex intestino recto, & utero inflammato, urinæ stillicidium accedit, & ex rhenibus suppuratis urinæ stillicidium accedit. Verum ex hepate inflammato, singultus accedit.

L IX. Si mulier in uentre non concipit, uelis autem scire an conceptura sit, uestimentiis circumtectam ex infernis suffito. Et si quidem odor per corpus tibi procedere uideatur ad nares & ad os, scito quod ipsa non propter seipsam infœcunda est.

L X. Si mulieri uterum gestanti purgationes prodeunt, impossibile est foetum sanum esse. **L XI.** Si mulieri purgationes non prodeunt, necq; horrore, neque febre accedente: uerum cibi fastidia ipsi accidunt, hanc in uentre habere existimato.

L XII. Quæcunq; frigidos ac densos uteros habent, non concipiunt: & quæcunq; humidos habent uteros, nō concipiunt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quæcunq; siccis magis & adustis. Præ inopia enim alimēti corruptitur semen. Quæcunq; uero ex utrisq; temperamentum habent moderatū, tales foecundæ fiunt.

L XIII. Similiter autem in masculis. Aut enim propter corporis raritatem, spiritus extra fertur, ut semen non deducat; aut propter densitatem, humor non procedit foras: aut propter frigiditatem non cōcalefcit, ut ad hunc locum cōgregetur: aut propter caliditatē, hoc idē cōtingit.

L XIIIII. Lac dare caput dolētibus, malū. Malū etiam

etiam febricitantibus, & quibus præcordia eleuata permurmurantia, & siticulis. Malum & quibus biliofæ alui egestiones in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multi egestio facta est. Conuenit autem exhibere tabescentibus, non ualde multū febricitantibus, & in febribus longis, debilibus, nullo ex prædictis signis præsentate, sed præter rationem consumptis. LXXV. Quibus tumores in ulceribus apparent, non ualde cōuelluntur, neq; insaniant. His autē derepente dissipatis, retrorsum quidem cōuulsiones & distentiones fiunt: antroorsum uero, insaniam, lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi magis fuerint tumores. LXXVI. Si in uulneribus fortibus ac prauis, tumor non appareat, magnum malum. LXXVII. Tumores laxi boni, crudi mali. LXXVIII. Dolenti posteriorem capitis partem, uena recta in fronte secta prodest. LXXIX. Rigores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput. Verū & uiris magis posteriore corporis parte q̄ anteriore, uelut ex cubitis ac femoribus. Sed et cutis rara est. Indicat autem pilus. LXXX. Qui à quartanis corripuntur, non ita ualde à conuulsionibus corripuntur. Si uero prius corripiantur, & quartana insuper accedat, cessant. LXXXI. Quibus cutis circūtenditur arida ac dura, hi sine sudore moriuntur. Quibus uero laxa ac rara, cum sudore moriuntur.

LXXXII. Morbo regio laborantes, non ita ualde flutuosi sunt.

SECTIO SEXTA.

I N diuturnis intestinorum leuitatibus, ructus acidus accedēs, qui prius nō erat, signum bonum. II. Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, morbosius sani sunt: quibus uero uice uersa, salubrius. III. In longis intestinorū leuitatibus, cibi fastidium malum, & cum febre peius. IIII. Ulcera circūglabra maligna sunt. V. Dolores in lateribus, & in pectoribus, & in alijs partibus, an multū differunt, considerandū est. VI. Rhenum affectiones, & quæ circa uesicam consistunt, operose sanantur in senibus. VII. Dolores circa uentrē fientes, sublimes quidē leues sunt, non autem sublimes, fortiores. VIII. Hydropicis fientia ulcera in corpore, non facile sanantur. IX. Latæ pustulæ non ualde pruriginosæ sunt. X. Caput dolenti & circūdolenti, pus, aut aqua, aut sanguis fluens per nares, aut os, aut aures, soluit morbum. XI. Atrabiliaris, & Phreniticis, hæmorrhoides accedentes, bonum. XII. Hemorrhoidas sananti diuturnas, si non una seruata fuerit, periculum est hydropem aut tabem accedere. XIII. A singultu detento, sternutationes accedentes soluunt singultum. XIIIII. Ab hydropem detento, ubi aqua in uenis ad uentrem cōfluxit, solutio fit. XV. A profluuiio alui longo correpto, uomitus sponte accedens, soluit alui profluuium. XVI. A pleuritide aut peripneumonia occupato, alui profluuium accedens, malum. XVII. Lippientem alui profluuiio corripit, bonum. XVIII. Vesicam dissectam habēti, aut cerebrū, aut cor, aut septum transuersum, aut tenue aliquod intestinum, aut uentriculum, aut hepatis, lethale est. XIX. Vbi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut neruus, aut genæ pars tenuis, aut præputium, neq; augetur, neq; coalescit. XX. Si in uentrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari. XXI. In insanientibus, uaricibus aut hæmorrhoidibus accedentibus

bus, infan̄iæ solutio fit. **XXII.** Quicunq; dolores ex dorso ad cubitos descendunt, uenæ sectio soluit. **XXIII.** Si timor & tristitia multo tēpore perseveret, atrabiliariū hoc signum est. **XXIII.** Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit. **XXV.** Ignem sacrum ab externis intro cōuerri, non bonū; ab internis uero extra, bonū. **XXVI.** Quibus in febribus ardētibus tremores facti fuerint, mentis emotio soluit.

XXVII. Quicunq; suppurati aut hydropici, secantur aut uruntur, hi pure aut aqua acruata effluente, omnino moriuntur. **XXVIII.** Eunuchi nō laborant podagra, neq; calui fiunt. **XXIX.** Mulier non laborat podagra, si non menses ipsi defecerint. **XXX.** Puer non laborat podagra, ante ueneris usum. **XXXI.** Oculorū dolores meri potus, aut balneū, aut fomentum, aut uenæ sectio, aut medicamenti potio soluit. **XXXII.** Balbi ab alui profluuiō longo maxime corripuntur. **XXXIII.** Acidum rucū habentes, non ita ualde pleuritici fiunt. **XXXIII.** Quicunq; calui fiunt, his uarices magnæ non fiunt. Quibuscunq; uero caluis uarices accedunt, hi rursus hirsuti fiunt. **XXXV.** Hydropicis tussis accedens, malum.

XXXVI. Urinæ difficultatem soluit uenæ sectio. Secare uero oportet internas. **XXXVII.** Ab angina detento tumorem fieri foris in collo, bonum est. **XXXVIII.** Quibuscunq; occulti cancri fiunt, eos nō curare melius est. Si enim curantur, citius moriuntur. Si uero non curentur, multū tempus perdurant. **XXXIX.** Conuulsio fit aut à repletionē, aut euacuationē. Sic autem & singultus. **XL.** Quibuscunq; citra præcordiū dolores fiūt, absq; inflammationē, his febris accedens dolorem soluit. **XLI.** Quibuscunq; suppuratum quid in corpore existens, significationem de se nō præbet, his propter puris aut loci crassitudinē, sui significationē nō exhibet. **XLII.** Morbo regio laborantibus hepar durū fieri malum est. **XLIII.** Quicunq; splenicis dysenteria corripuntur, his longa accedente dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorum leuitas, & pereunt. **XLIII.** Quibuscunq; ex urinæ stillicidio uoluulus accedit, hi in septem diebus pereunt, si non febre accedente urina satis fluxerit. **XLV.** Vlcera quæcunq; annua fiūt, aut diūtiorē tempore durant, necesse est os abscedere, & cicatrices cauas fieri. **XLVI.** Quicunq; gibbosi ex anhelatione, aut tussi fiunt, ante pubertatem pereunt.

XLVII. Quibuscunq; uenæ sectio, aut medicamentū conducit, his uere uenam secare, aut medicamentū purgans exhibere conuenit. **XLVIII.** Splenicis dysenteria accedens, bonum. **XLIX.** Quicunq; podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammationē, in quadraginta diebus restituntur. **L.** Quibus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est febrem, & bilis uomitū accedere.

LI. Quibuscunq; sanis derepente dolores fiūt in capite, & statim uoce intercepta iacent, ac stertunt, in septē diebus pereunt, si non febris apprehendat.

LII. Considerare uero oportet etiam sub oculis apparitiones in somnis. Si enim albæ partis quid subapparuerit, non commissis palpebris, si id nō ex alui profluuiō, aut medicamenti potionē fuerit, malum signum & ualde lethale est.

LIII. Desipientiæ cum risu quidem fientes, securiores sunt: cum studio uero serio, periculosiores. **LIII.** In acutis affectionibus, quæ cū febre fiūt, inctuosæ respirationes, malū. **LIV.** Podagricæ affectiones uere & autūno

ut plurimum mouentur. LVI. Atrabiliaris morbis periculosi humorum à loco ad locum decubitus, aut syderationē corporis, aut cōuulsionem, aut infaniam, aut cæcitatem significant. LVII. Syderationes uero maxime fiunt, ætate à quadragesimo anno usq; ad sexagesimum. LVIII. Si omentū exciderit, necesse est putrefieri. LIX. Quibuscunq; à coxendicum morbo uexatis, coxa excidit, & rursus incidit, his mucī accedunt. LX. Quibuscunq; à coxendicum morbo diuturno uexatis, coxa excidit, his crus tabescit, & claudicant, si non uisti fuerint.

SECTIO SEPTIMA.

I Nacutis morbis frigiditas extremarum partium, malum. II. Ex offe lægrotante, caro liuida, malum. III. Ex uomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. IIII. Ex sudore horror, non bonum. V. Ex infania, dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum. VI. In morbo diuturno cibi fastidium, & meracæ alui egestiones, malum. VII. Ex multo potu rigor, & delyrium, malum. VIII. Ex tuberculi intus ruptione, exolutio, uomitus, & animi deliquium fit. IX. Ex sanguinis fluxu delyrium, aut etiam conuulsio, malum. X. Ex uoluulo uomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut delyrium, malum. XI. Ex pleuritide peripneumonia, malum. XII. Ex peripneumonia phrenitis, malum. XIII. Ex ardoribus uehementibus conuulsio, aut distentio, malum. XIII. Ex plaga in caput, stupor, aut delyrium, malum. XV. Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum. XVI. Ex puris sputo, tabes, & fluxus, malum. Postquam uero sputum supprimitur, moriuntur. XVII. Ex hepatis inflammatione singultus, malum. XVIII. Ex uigilia conuulsio, aut delyrium, malum. XIX. Ex ossis denudatione, ignis sacer. XX. Ex igne sacro, putrefactio, aut suppuratio. XXI. Ex forti pulsu in ulceribus, sanguinis eruptio. XXII. Ex dolore diuturno partium circa uentrem, suppuratio. XXIII. Ex meraca alui egestione, dysenteria. XXIII. Ex ossis dissectione delyrium, si ad uacuum usq; processerit. XXV. Ex medicamenti portione conuulsio, lethale. XXVI. Ex dolore forti partium circa uentrem, frigiditas extremarum partium, malum. XXVII. Mulieri uterum gerenti, tenefmus accedens abortire facit. XXVIII. Quodcunq; os præsectum fuerit, aut neruus in corpore, necq; augetur, necq; coalescit. XXIX. Si à pituita alba detento, uehemens alui profluuium accedat, soluit morbum. XXX. Quibuscunq; spumosa alui egestiones sunt in alui profluuijs, his de capite pituita defluit. XXXI. Quibuscunq; febricitantibus, in urinis subsidentiæ crassiores polentæ partes referentes fiunt, longū morbum significant. XXXII. Quibus uero biliosæ subsidentiæ, ab initio tenues, acutum morbū significant. XXXIII. Quibuscunq; disparatæ urinæ sunt, his uehemens turbatio in corpore est. XXXIII. Quibus in urinis bullæ superstant, rhenum affectiones significant, & morbum fore longum. XXXV. Quibus pingue est id quod superstat, & acruatum, his rhenum affectiones, easq; acutas significat. XXXVI. Quibus uero iam nephriticis ex rhenibus affectis prædicta signa accidunt, doloresq; circa musculos spinales fiunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futuros.

ros expecta. Si uero dolores magis circa internos locos fiant, etiam abscessus magis intus fore expecta. XXXVII. Quicumq; sanguinē uomunt, sine febre quidem, salutare est: uerum cum febre, malum. Perfrigerantibus autem & adstringentibus curare oportet. XXXVIII. Defluxiones in uentrē sup-
 pernum, in uiginti diebus suppurantur. XXXIX. Si quis sanguinē min-
 gat, & grumos, & urinæ stillicidium habeat, & dolor incidat in ani ac scorti in-
 tercapedinem, & in uentrem ac pectinem, partes circa uesicam ægrotare si-
 gnificat. XL. Si lingua derепente impotens fiat, aut aliqua corporis pars
 syderata, atrabiliarium tale existit. XLI. Si senioribus nimium purgatis sin-
 gultus accedat, non bonum est. XLII. Si febris non à bile habeat, aqua mul-
 ta calida in caput affusa, febris solutio fit. XLIII. Mulier ambidextra non
 est. XLIII. Quicumq; suppurati uruntur, si quidem pus purum fluat & al-
 bum, euadunt. Si uero subcruentum, & carnosum, ac graueolens, pereunt.
 XLV. Quicumq; hepar suppuratum uruntur, si quidem pus purum fluat, &
 album, superstites euadunt. In tunica enim pus his inest. Si uero uelut amurca
 fluat, pereunt. XLVI. In doloribus oculorum, ubi merum bibendum de-
 disti, & multa calida lauisti, uenam secato. XLVII. Hydropicum si tussis
 uexet, desperatus est. XLVIII. Urinæ stillicidium, & urinæ difficultatē,
 uini potus & uenæ sectio soluit. Secare uero oportet internas.
 XLIX. Ab angina detento, tumor & rubor in pectore accedens, bonum.
 Foras enim uertitur morbus. L. Quibuscumq; corruptum fuerit cerebrum,
 in tribus diebus pereunt. Si uero has effugerint, sani fiunt. LI. Sternuta-
 tio fit ex capite, percalescēte cerebro, aut uacuo quod est in capite perhumescen-
 te. Aer enim qui intus est, foras erumpit. Strepitum uero edit, quia transitus est
 ipsi per angustum. LII. Quibuscumq; hepar circumcirca dolet, his febris ac-
 cedens soluit dolorem. LIII. Quibuscumq; sanguinem de uenis auferre
 conducit, his uere uenam secare conuenit. LIII. Quibus inter uentrem
 & septum transversum pituita conclusa est, & dolorem exhibet, non habens exi-
 tum ad neutrum uentrem, his per uenas ad uesicam conuersa pituita, morbi so-
 lutio fit. LV. Quibus hepar aqua repletum, ad omētum eruperit, his uen-
 ter aqua impletur, & moriuntur. LVI. Anxietatem, oscitationem, horro-
 rem, uinum æquali mēsurā aquæ ammixta potum soluit. LVII. Quibus
 in urinaria fistula tubercula fiunt, his suppuratione facta & eruptione, soluitur
 dolor. LVIII. Quibus cerebrum cōcussum fuerit ex aliqua causa, eos sta-
 tim uoce priuari necesse est. LIX. Corporibus humidis carnes habenti-
 bus, famē inducere oportet. fames enim corpora siccat. LX. Vbi in toto
 corpore mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calefit, aut color alius
 ex alio mutatur, longitudinem morbi significat. LXI. Sudor multus, cali-
 dus aut frigidus, semper fluens, humorem abducere oportere significat, forti-
 quidem superne, debili uero, inferne. LXII. Febres non intermittentes, si
 per tertiam fortiores fiant, periculosæ sunt. Quocumq; uero modo intermiserint,
 sine periculo esse significat. LXIII. Quibus febres longæ sunt, his aut tu-
 bercula, aut ad articulos dolores fiunt. LXIII. Quibus tubercula diuina,
 aut ad articulos dolores, ex febribus fiunt, hi cibis pluribus utuntur.
 LXV. Si quis febricitanti cibum det, quem sano exhibet, sano quidem ro-

bur, ægroto uero morbus est. LXXVI. Quæ per uesicam prodeunt inspice-
 cere oportet, an qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minime similia his sunt, ea
 morbosiora sunt. Quæ uero similia sanis, ea minime morbosa. LXXVII. Et
 quibus alui egestiones, si stare permiseris, & non moueris, subsistunt ueluti ra-
 menta: si pauca fuerint, modicus morbus est: si multæ, multus. His cõfert sub-
 purgare aluum. Si uero non purgata aluo, sorbitiones dederis, lædes. & quan-
 to plures dederis, magis lædes. LXXVIII. Quibuscunq; cruda deorsum
 secedunt, ex atra bile sunt: si plura, copiosiore: si pauciora pauciore.

LXXIX. Exscreationes in febribus non intermittentibus liuidæ, & cruen-
 tæ, & graeolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probe secedentes, bonæ, &
 per aluum, & per uesicam, & ubi sanè quid secedens constitit non purgatum,
 malum. LXXX. Corpora quocunq; quis purgare uoluerit, fluida facere o-
 portet. Et si quidem sursum, sistere aluum. Si uero deorsum, humectare.

LXXXI. Somnus, uigilia, utraq; modum excedentia, morbus.

LXXXII. In non intermittentibus febribus, si externæ quidem partes frigi-
 dæ fuerint, internæ uero ardeant, & febris habeat, lethale est. LXXXIII. In
 febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distor-
 queatur: aut non uideat, aut non audiat, æger iam debilis existens: quicquid ho-
 rum fiat, propinqua mors est. LXXXIII. Ex pituita alba, hydrops acce-
 dit. LXXXV. Ab alui profluuiio, dysenteria. LXXXVI. A dysenteria,
 intestinorum leuitas accedit. LXXXVII. Ex corruptione, abscessus ossis:

LXXXVIII. Ex sanguinis uomitu, tabes, & puris purgatio sursum. Ex ta-
 be, fluxus ex capite. Ex fluxu, alui profluuiū. ex alui profluuiio, suppressio pur-
 gationis sursum uersus, ex suppressione, mors. LXXXIX. Qualia etiam
 sunt in uesicæ ac alui egestionibus, inspicere oportet, et in his quæ per carnes ex-
 cernuntur, & sicubi alibi à natura recedat corpus, si parum, paruus est morbus:
 si multum, multus: Si uero ualde multus sit recessus, lethale hoc est.

LXXX. Quicunq; supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non ita ual-
 de sani fiunt. Minus enim periclitantur, quorum naturæ, & ætati, morbus affi-
 nis fuerit. LXXXI. Quibuscunq; in ægritudinibus oculi ex uoluntate
 lachrymantur, bonum. Quibus uero citra uoluntatem, malum.

LXXXII. Quibus in febribus quartanis sanguis ex naribus fluxerit, ma-
 lum est. LXXXIII. Sudores in diebus iudicatorijs fientes, uehementes
 & ueloces periculosi sunt, qui expelluntur ex fronte uelut guttæ, & aquæ salien-
 tes, & frigidi ualde ac multi. Neceffe est enim talem sudorem prodire cū uiolen-
 tia, & doloris excessu, ac expressione diuturna. LXXXIII. Ex morbo
 diuturno, etiam alui defluxus, malum. LXXXV. Quæcunq; non sanant
 medicamenta, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sa-

nat. Quæ ignis non sanat, ea incurabilia
 putare oportet,

HIPPOCRATIS COILIBER

PRÆNOTIONVM, IANO CORNAS

rio Medico Physico interprete. *pronostica*

MEDICVM prænotionem adhibere, optimum esse mihi uis-
detur. Prænotens enim & prædicēs apud ægrotos, & præ-
sentia, & præterita, & futura, & quæ ipsi ægroti relinquunt
exponens, fidem utiq; fecerit, quod ægrotorum res magis
cognoscat, quare audebunt homines seipfos medico com-
mittere. At uero curationem optime fecerit, ubi prænouerit
futuras affectiones. Sanos equidem facere omnes ægrotos
impossibile est, hoc enim præstātius esset, quàm prænotescere in posterum euen-
tura. Quandoquidem uero homines moriuntur, alij priusquàm medicum uocent,
præ uolentia morbi: alij uero accito etiã medico, derепente uita decedunt, qui-
dam ubi unam uixerunt diem, quidam tempore paulo diutiore, anteaquàm medi-
cus per artem aduersus singulos morbos repugnet: itaq; nosse oportet talium
affectionum naturas, quantum corporum uires excedūt. Simul uero & si quid
diuini in morbis inest, etiã huius prænotionem ediscere. Ita enim merito ad-
mirationi fuerit, & medicus bonus extiterit. Nã quos superstites manere possi-
bile est, eos adhuc magis recte conseruare poterit, ex multo tempore antea con-
siliū adhibens ad singula. & tum morituros, tum seruandos, prænotens ac
prædicens, à culpa exors fuerit. Considerare porro hoc modo conuenit in mor-
bis acutis, primū quidem faciem ægroti, an similis sit his quæ in sanis sunt, ma-
xime uero an ipsa sibi ipsi. Ita enim optima fuerit, si uero maxime contraria simi-
li fuerit, horrendissima est. Talis autem fuerit, nasus acutus, oculi caui, tempo-
ra collapsa, aures frigida ac contracta, & extremitates aurium auersa, & cutis
circa frontem dura & circumtenta ac arida, & color totius faciei pallidus. aut es-
tiam niger, & liuidus, aut plumbeus. Siquidem igitur in principio morbi
facies talis fuerit, & nondum ex alijs coniecturam facere licuerit, interrogare o-
portet, num uigilauerit homo, aut alui excrementa ualde liquida sint, aut fames
aliqua ipsum teneat. Et si quidem horum aliquid confiteatur, minus graue esse
putandum est. Iudicantur autem & cognoscuntur talia in die ac nocte, si ob-
has causas facies talis fuerit. Si uero nihil horū esse dicat, neq; in prædicō tem-
pore confidat, nosse conuenit morti proximum esse. At si uetustiore existen-
te morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis fuerit facies, de his interrogare
oportet, de quibus etiam prius iussi: itemq; alia signa considerare, & in uniuersa
facie, & in corpore, & in oculis. Si enim lucem fugiant, aut inuoluntarie la-
chrymētur, aut distorqueantur, aut alter altero minor fiat, aut albas partes ruben-
tes habeant, aut uenulas liuidas aut nigras in ipsis habeant, aut lemæ ac sordes cir-
ca oculos appareant, aut etiam instabiles, aut eminentes, aut caui uehementer
facti, aut squallentes & obscuro fuerint: aut color totius faciei alteratus fuerit.
Hæc omnia mala & perniciofa esse putandum est. Considerare uero con-
uenit etiam oculorū subapparitiones in somnis. Si enim albæ quid partis sub-
apparuerit, palpebris non commissis, si id non ex alui profluuiō, aut medica-

menti potione fuerit, aut egrotus non ita dormire consueuerit, malum signum & ualde lethale est. **S**i uero retorta, aut contracta fiat, aut liuida, aut pallida palpebra, aut labium, aut nasus, cum aliquo ex alijs signis, morti proximū esse sciendum est. Lethale est etiam habere labia resoluta, & pendentia, & frigida, & albicantia facta. **D**ecumbentem ægrotum à medico deprehendi conuenit in latus dextrum aut sinistrum, & manus, & collum, & crura modice inflexa habentem, & totum corpus flexibile situm. Ita enim plurimi ex sanis decumbunt. Optimi autem sunt decubitus qui sanorum decubitus similes existunt. **A**t uero supinū iacere, & manus, & collum, & crura extenta habere, minus bonum est. **S**i uero etiam pronus fiat, & de lecto ad pedes delabatur, magis horrendum est. **S**i uero nudos quoque pedes habere comperiat, nec admodum calidos: et manus, & collum, ac crura inæqualiter dissecta, ac nuda, malum est. Anxietatem enim significat. **L**ethale est & hiantem semper dormire: & crura supini iacentis ualde incuruata esse ac complicata. **A**t in uentrem decumbere, si quis non sit aduetus dum sanus fuit ita dormire, delirium significat, aut dolorem locorum circa uentrem. **C**eterū erectum sedere uelle ægrotum in morbi uigore, in omnibus morbis acutis malum est, pessimū aut in peripneumoniacis pulmone inflammato. **D**entibus stridere in febribus, quibus non familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est. Verum prædicere oportet ab utrisque periculum futurū. Si uero etiam delirus hoc faciat, perniciosum ualde iam existit. **V**lcerus autem siue prius factum fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim periturus est homo, ante mortem liuidum ac siccum erit, aut etiam pallidum & siccum. **A**t de manu latione ita sentio. Quæ in febribus acutis, aut peripneumoniacis, aut in phrenitide, aut capitis dolore, ante faciem feruntur, et frustra uenantur, & festucas legunt, & floccos de uestibus euellunt, & de pariete paleas detrahunt, eas omnes malas & lethales esse. **S**piritus densus dolorem significat, aut inflammationem, in locis supra septum tranuersum. **Q**ui uero magnus expiratur, & per multum temporis interuallum, delirium indicat. **S**i uero frigidus enaso & ore expiretur, ualde iam perniciosus est. **B**onam autem spirationem ualde magnam uim habere ad salutem, in omnibus acutis morbis putare cōuenit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus iudicantur. **S**udores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus iudicatorijs fiunt, & febrem perfecte submouent. Boni uero sunt, qui per totum corpus sientes, hominem facilius morbum ferre faciunt. Qui uero tale quid non effecerint, incommodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & tantum circa caput & faciem sientes, & circa ceruicem. Hi enim cum acuta quidem febrem mortem præsignificant: cum mitiore uero, longitudinem morbi. **E**t qui per totum corpus fiunt, similiter significant his qui circa caput. **A**t uero miliiformes, & solum circa collum sientes, mali sunt. Qui uero cum guttis fiunt, & euaporant, boni sunt. Considerare porro conuenit sudores in summa, fiunt enim aliqui propter corporum exolutionem, aliqui propter inflammationis uigorem. **P**ræcordium optimū est doloris exors, & molle, & æquale, tum in dextra, tum in sinistra parte. **A**t in inflammatum, aut dolorem exhibens, aut dextræ partes inæqualiter affectæ ad sinistras: hæc omnia obseruare oportet. **S**i uero etiam pulsus inerit in præcordio, turbationem significat aut delirium. Verum

oculos

Oculos talium in superintueri oportet. Si enim oculi frequentes moueantur, furiosos hos fore timor est. **Tumor** in praecordio durus existens & dolorosus, pessimus quidem est si per totum fuerit praecordium. Si uero fuerit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. **Significat** autem eiusmodi tumores, in principio quidem, mortem breui affuturam. **Si** uero uiginti dies transgrediatur, tum febris detinens, tum tumor non confidens, ad suppurationem conuertitur. **Cōtingit** autē his in primo circuitu, etiā sanguinis eruptio ē naribus, & ualde prodest. Verū interrogare cōuenit, an caput doleant, aut hebetem uisum habeant. Si enim horū quid fuerit, ad eum locū repit. **Magis** tamen in iunioribus quinq; ac triginta annis, sanguinis eruptionē expectare conuenit. **At** uero molles tumores, & doloris exortes, et qui digito cedunt, diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. **Si** uero transgrediatur sexaginta dies febris detinens, & tumor non confidat, suppuratū fore significat & hunc, & eum qui in reliquo uentre est eodem modo. **Quicunq;** igitur tumores dolorosi sunt, & duri, & magni, periculum mortis breui affore significant. **Qui** uero molles, & doloris exortes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt. **Ceterum** tumores in uentre minus faciunt abscessus, quā hi qui sunt in praecordijs. Minime uero hi qui sub umbilico consistunt, ad suppurationem conuertuntur. **Sanguinis** uero eruptionem, ex supernis locis maxime expectare oportet. **Omniū** autem tumorū diuturnorum circa hos locos, suppurationes cōsiderare cōuenit. **Sunt** autē suppurationes hinc fientes hoc modo cōsiderandae. **Quae** cūq; extra uertitur, optimae sunt, quae paruae sunt, & q̄ maxime foras eminentes, & in acutum fastigiatae. **Quae** uero magnae sunt, & latae, & minime in acutum fastigiatae, pessimae sunt. **Quae** cūq; uero intro rūpuntur, optimae sunt quae nihil cum externo loco cōmunicant, sed sunt cōtractae, & doloris exortes, & totus externus locus cōcolor apparet. **At** uero pus optimum est, si est album & aequale, & leue, & q̄ minimē graueolens. **Quod** uero huic contrariū est, pessimum est. **Aquae** porro inter cutem, ex acutis morbis obortae, omnes male sunt. **Neq;** enim à febre liberant, & ualde dolorosae sunt, ac lethales. **Incipiūt** autē plerūq; à laterū mollitudine, & à lumbis: aliquae uero etiā ab hepate. **Quibus** igitur à laterū mollitudine & lūbis, principia fiūt, his & pedes intumescūt, & alui profluuia diuturna ipsos tenent, quae neq; dolores ex laterū mollitudine à lumbis soluūt, neq; uentrem molliunt. **Quibus** cūq; uero ab hepate aequē inter cutē oriuntur, his tusses tussiediūq; prōpitudo accedit, & nihil memorabile expuūt, & pedes tumēt, & uenter nō egerit nisi dura, & coactus, & circa aluum fiūt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte, tum cōsistentes, tum confidentes. **Caput** autē & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est, ubi & uenter, & latera calida sunt. **Optimū** uero est & totū corpus calidum esse, ac molle. **Cōuerti** autē cōuenit facile aegrotū, & in atollēdo se leuē esse. **Si** uero grauis esse appareat, & reliquo corpore, & manibus, & pedibus, magis periculosum est. **Si** uero supra grauitatē, ungues & digiti liuidi fiāt, mors eueftigio expectanda est. **At** si digiti ac pedes penitus nigrescūt, minus perniciosi sunt q̄ liuidi. **Verū** et alia signa cōsiderare oportet. **Si** enim facile ferre uideatur malū, et aliud quoddā ex salutarib. ad hęc signa subindicet, morbū ad abscessum uerti spes est, ita ut eger quidē superstes māsurus sit, corporis uero partes nigrefactae casurę.

Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale. Quod uero ad somnos attinet, quemadmodum secundum naturam cōsuetum nobis est, interdiu uigilare oportet, noctu dormire. Si uero hoc fuerit transmutatum, peius est. Minime uero lædi æger poterit, si dormiat mane ad tertiam partem diei. Qui uero ab hoc tempore fiunt somni, deteriores sunt. Pessimum autem est non dormire, neq; noctu, neq; interdiu. Aut enim præ dolore ac afflictionibus uigiliæ adsunt: aut delirium aderit ab hoc signo. Egestio alui optima est, mollis & cohærens, & secundum horam, in qua etiam à sano egeretur. Iuxta copiam uero, pro ratione ciborum ingestorum. Tali enim contingente exitu, uenter infernus sanus fuerit. Si uero liquida fuerit egestio, conducit neq; fridere, neq; frequenter esse, & paulatim secedere. Delaisatur enim homo ex frequenti defessu, & uigilias utique contraxerit. Si uero sæpe aceruatim egerit, periculum est ne in animi deliquium incidat. Quin & iuxta copiam ingestorum egerere oportet, bis aut ter in die, & noctu semel. Plura uero mane, quemadmodum in consuetudine est homini. Inspissari autem oportet egestionem, morbo ad iudicationem tendente. Sit autem subfulua, & non ualde graueolens. Commodum est & lumbricos rotundos cum egestione prodire, morbo ad iudicationem tendente. Oportet autem in omni morbo mollem esse uentrem, & iuxta mole præditum. At uero aquosum ualde, aut album, aut pallidum, aut uiride, aut uehementer rufum, aut spumosum stercus egerere: hæc omnia mala sunt. Malum insuper est & quod exiguum est, & uiscosum ac album: & quod subpallidum aut subuiride ac leue. His uero magis lethalia fuerint stercora nigra, aut pinguis, aut liuida, aut æruginosa, & male olentia. Quæ uero uaria sunt, diuturniora quidem his sunt, nihilo minus autem perniciofa. Sunt autem talia, ramentosa, & biliosa, & cruenta, & prafina, & nigra, aliquando simul inter se exeuntia, aliquando particulatim. Flatum porrò sine strepitu ac crepitu prodire, optimum est. Melius autem est & cum strepitu exire, quam is hic reuolui. & qui sic progressus est flatu, aut dolere quid hominem significat, aut delirare: nisi sua sponte homo ita flatum emittat. Cæterum præcordiorum dolores ac tumores, si fuerint recentes, & non cum inflammatione, soluit murmur in præcordio obortum, & maxime quidem si pertransierit cum stercore, & urina ac flatu. Sin minus, etiã ipsum per se si transierit prodest. Prodest item si subdescenderit ad infernos locos. Optima uero est urina, quum fuerit alba subsidentia, & leuis & æqualis, per totum tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim & securitatem, & morbum fore breuem. Si intermiserit, & aliquando quidem pura mingatur, aliquando uero subsidet album ac leue, diuturnior fit morbus, & minus securus. Si uero fuerit & urina subrubra, & subsidentia ipsius similis, & leuis, diuturniorem quidem hæc morbum quàm prior significat, sed ualde salutarem. At subsidentia in urinis crassiores polentæ partes referentes, prauæ sunt. His autem peiores sunt, laminosæ. Albæ uero & tenues ualde malæ sunt. Verum his deteriores sunt furfuraceæ. Nubeculæ quæ feruntur in urinis, albæ quidem bonæ sunt: nigræ uero malæ. Quandiu uero fulua fuerit urina & tenuis, morbum inconcoctum esse significat. Si uero & diuturna fuerit talis existens, periculum est ne sufficere homo possit, donec urina fuerit concocta. *Leu. thalio*

thaliores autem sunt urinæ, & foetidæ, & aquosæ, & nigrae, & crassæ. At tum in uiris, tum in mulieribus, nigrae urinæ pessimæ sunt. In pueris autem aquosæ. Quicumq; urinas tenues & crudas mingunt multo tempore, si alia ueluti superstitibus futuris signa fuerint, his abscessum expectare oportet ad locos infra septum transuersum. Sed & pinguetudines superne instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. Sūt enim colliquationis signa. Considerare uero cōuenit in urinis in quibus nubeculae sunt, an superne aut inferne sint: & quales habeant colores. Et quæ quidem deorsum ferūtur, cū coloribus relatis, eas bonas esse putare, ac laudare. Quæ uero sursum ferūtur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare. Nec uero decipiat te, si uesica morbu aliquē habens, eiusmodi urinas reddiderit. Non enim totius corporis signū est, sed ipse per se uesicæ. Vomitus cōmodissimus est, ex pituita ac bile q̄ maxime permixtus, & nō crassus ualde, neq; multus. Nam meraciores, deteriores sunt. Si uero id quod uomitū reiectū est prasini fuerit coloris, aut liuidum, aut nigrum: quicumq; horum fuerit colorū, malum esse putandū est. Si uero omnes colores idem homo uomit, ualde perniciosum hoc est. Celerrimam autē mortem significat liuidus uomitus, si graueolens fuerit. Omnes uero subputridi ac foetidi odores, in omnibus uomitibus mali sunt. Sputū uero in omnibus doloribus, qui circa pulmonem & costas fiunt, cito ac facile expui cōuenit, & flauum sputo ualde permixtum apparere. Si enim longe postea, post principium doloris, expuerit quod flauū est, aut fuluum, aut quod multam tussim inducit, & non ualde permixtum est, deterius est. Nam & flauum meracum, periculosum est: & album ac uiscolum & rotundum, inutile est. Malum est & quod uiri de est ualde, itemq; pallidum, & quod spumofum. Si uero ita fuerit meracū, ut etiā nigrū appareat, hoc ipsum deterius est q̄ illa. Malum etiā est si nihil repurgetur, neq; emittat pulmo, sed plenus ferueat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonē morbis, & antecessisse, & succedere, malū est. At in alijs morbis lethalissimis sternutationes profunt. Sputum autē flauū, sanguine permixtum nō multo, si in pulmonis inflammatione, in principio morbi reijciatur, salutare est, et ualde prodest. Si uero septimo die, aut posterius, minus securū est. Omnia sputa mala sunt, quæ dolorē nō sedant. Pessima uero sunt nigra, uelut descriptū est. Quæ uero dolorē sedant, omniū optima existūt. Quicumq; dolores ex his locis nō sedantur, neq; ad sputorū purgationes, neq; ad stercorū alui subductionē, neq; ad uenæ sectiones, & uictus rationē ac medicamētā, eos ad suppurationē uerti sciendū est. Ex suppurationib. quæcūq; dum sputū adhuc biliosum est suppuratur, perniciosæ ualde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cū pure expuatur: & hoc potissimū si morbo ad septimum diem progresso, suppuratio ab hoc sputo procedere incipiat. Timor autē est eum qui talia expuit moriturū esse decimaquarta die, si nō aliquod bonum signū ipsi acciderit. Sunt autē bona hæc: facile ferre morbum, bene spirare, à dolore liberatū esse, sputū facile tussiedo reijcere, corpus equaliter calidum ac molle apparere, sitim nō habere, urinas & alui egestionem, & somnos, & sudores, uelut descriptum est: hæc singula nosse conuenit accidere ut quæ bona sint. Nam omnibus his sic contingentibus, homo nō morietur. Si uero aliqua ex his accesserint, aliqua non, non ampliore tēpore uita producta, decimaquar

ta die homo peribit. Porro mala signa his contraria sunt: ægre ferre morbum, spiritum magnum & densum esse, dolorem non sedari, spiritum uix tussiendo renescere, ualde sitire, corpus inæqualiter à febris teneri, uentrem quidem ac costas fortiter calidas esse, frontem uero & manus ac pedes frigidos. Urinas autem & alui egestiones, & somnos, & sudores, uelut descriptum est: hæc singula nosse oportet mala esse. Si enim ita accesserit horum aliquid ad sputum, peribit utique homo priusquam ad decimumquartum diem peruenerit, aut nono die, aut undecimo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quod hoc sputum lethale sit ualde, & non perducatur ad decimumquartum diem. Proinde & mala & bona signa expendentem ex his prædictiones facere oportet. Ita enim potissimum ueritatem consequi quis poterit. At uero aliæ suppurationes rumpuntur, plurimæ quidem uigesimo die, aliæ uero trigesimo, aliæ quadragesimo, aliquæ uero ad sexaginta dies perueniunt. Considerare uero futuræ suppurationis principium oportet, suppuratione facta ab ea die qua primum homo febricitauit, aut si forte ipsum primum rigor apprehendit: & si pro dolore grauitatem sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat. Hæc enim in principijs suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationum fore expectare oportet ad prædicta tempora. Si uero suppuratio fuerit in altero latere solum, uertere & considerare oportet in his, num aliquem habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius: & reclinato ægro in latus sanum, interrogare ipsum, an uideatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere. Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo grauitas affuerit. Ceterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris non dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu uero amplior: et sudores multi oboriuntur, tussisque ac tussendi promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuunt: & oculi caui fiunt, et maxillæ ruborem contrahunt, & ungues quidem manuum curuantur, digiti uero calefcunt, & potissimum summi: & in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetunt, & pustulæ per corpus enascuntur.

Quæcumque igitur suppurationes diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis ualde habere oportet. Quæ uero breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his, qualia in principijs fiunt. Simul autem & si aliquantulo difficilius spirauerit homo. At uero quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet. Si quidem enim dolor in principijs fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans, ad uigesimalium diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si uero quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necessario uero est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, et sputationem, ante puris eruptionem. Ex his autem maxime superstites manent hi quos febris eodem post eruptionem die dimiserit: & qui cibos cito appetuerint, & à siti liberati fuerint: & si uenter parua & compacta egresserit, & pus album & leue & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur. Ac optime quidem sic ac celerrime liberantur, Sin minus, hi quibus proxima his contigerint. At uero intereunt hi quos febris non dimiserit, aut ubi ipsos dimissile putata fuit, rursus recalcens apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetuerint, & si uenter liquidus fuerit, & pus pallidum siue

siue uiride; & liuidum expuerint, aut pituitosum & spumosum. Si hæc omnia cōtulerint, pereunt. Quibus uero ex his quædam accesserint, quædam nō, horum aliqui intereunt, aliqui in multo tempore superstites euadunt. Verū ex omnibus signis quæ adsunt, tum in his, tum in alijs omnibus, cōiecturam facere oportet. Quibuscūq; ex inflāmato pulmonis morbis, abscessus circa aures sunt; & suppurantur, aut ad infernas partes, ac fistulantur, hi superstites euadūt. Verum huiusmodi sic cōsiderare oportet. Si & febris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputū pro ratione non prodierit, neq; biliosæ, neq; solutu faciles, & meracæ alui egestiones fuerint, neq; urina ualde multa, & multam subsidentiā habens; indicatur autem superstes futurus ab omnibus reliquis salutariis signis: tunc abscessus huiusmodi fore sperandū est. Fiunt autē partim ad infernas partes, quibus uidelicet inflāmatio aliqua circa præcordia affuerit; partim in supernis, quibus præcordiū molle & doloris exors permāserit, et ubi spirandi difficultas, quæ per tēpus aliquod affuit, deserit citra aliam manifestā causam. Cæterū abscessus ad crura, in pulmonis inflāmationibus fortibus ac periculosis, omnes quidē utiles sunt, optimi uero sunt, qui dum sputū iam in mutatione est fiunt. Si enim tumor & dolor fiat, sputo pro flauo purulento fiente, & foras procedente: ita securissime homo superstes euaserit, & abscessus absq; dolore celerrime sedabitur. Si uero sputum nō bene processerit, neq; urina subsidentiā bonā habens apparuerit, periculum est claudum fore articulum, aut multum molestiarū exhibiturū. At si euanescent & recurrant abscessus, sputo non prodeunte, febreq; permanente, horrendū est. Periculū enim est ne deliret homo & moriatur. Ex suppuratis à pulmonis inflāmatione, seniores magis intereunt. Ex alijs autē suppurationibus, iuniores magis moriuntur. Dolores cum febre fientes, circa lūbos et infernas partes, si septum trāsuerfum attigerint, infernas partes relinquentes, perniciosi ualde sunt. Proinde alijs quoq; signis animū aduertere oportet. Nam si quod etiā ex alijs signis malum apparuerit, desperatus est homo. Si uero assiliente ad septum trāsuerfum morbo, alia signa non mala accesserint, hunc suppuratum fore multa spes est. Quicunq; uero suppurati uruntur, quibus quidem purū pus fuerit, & album, & non foetidum, hi seruantur: quibus autem subcruentū, & cœnosum, hi pereunt. Porro uesicæ duræ & dolentes, penitus quidē horrendæ ac perniciosæ sunt, perniciosissimæ uero quæ cū febre continua fiunt. Etenim dolores ab ipsis uesicis ad occidendū sufficiunt, & alui non egerunt hoc tempore, nisi durum quiddam, & hoc coactæ. Soluit autē urina purulenta micta, quæ albam ac leuē subsidentiā habet. Si uero neq; ab urina quicquam remiserit dolor, neq; uesica molliatur, & febris continua fuerit, in primis circuitibus morbi ægrum moriturum esse timor est. Atq; hic modus potissimū pueros corripit septennes, donec ad quintūdecimū annum peruenerint. / Febres iudicantur in isdem numero diebus, ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pereunt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis nitentes, quarto die desinunt, aut prius. Malignissimæ uero, & signis horridissimis fientes, quarto die aut prius occidūt. Primus igitur ipsarum insultus sic desinit. Secundus autē, ad septimū produci tur. Tertius ad undecimū. Quartus ad decimūquartū. Quintus ad decimūseptimū. Sextus ad uigesimalū. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis, per quatuor ad

ad uiginti, ex additione definunt. Nō potest autem quicquam horum integris diebus exacte numerari. Neq; enim annus, & menses, integris diebus numerari possunt. Postea uero eodem modo, iuxta eandem additionem, primus circuitus quatuor & triginta dierum est, secundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum. At in horū principijs difficilimū est cognoscere eos qui in plurimo tempore iudicabuntur. Similima enim sunt ipsorū principia. Verum à primo die animaduersionē facere oportet, & prout singuli quaternarij adduntur considerare, & nō latebit te quo uertetur morbus. Fit autē & quartanarū febrium constitutio ex huiusmodi ordine. Qui porrò morbi in breuissimo tempore iudicabuntur, faciliores cogniti sunt. Maxime enim differentia ab initio ipsa sunt. Qui enim superstites ab ipsis euasuri sunt, facile spirantes, & doloris exortes sunt, & noctu dormiunt, aliāq; signa securissima habent. Qui uero morituri, ægre spirantes fiunt, delirantes, uigilantes, aliāq; signa pessima habentes. Viginti igitur his ita contingentibus, coniectare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta unamquāq; additionem, tendentibus ad iudicationē morbis. Iuxta eandem rationem mulieribus quoq; iudicationes fiunt ex partu. Capitis dolores fortes & cōtinui cum febre, si quidem lethaliū signorum quid accesserit, perniciosi ualde sunt. Si uero absq; talibus signis, dolor uiginti dies transierit, & febris tenuerit, sanguinis à naribus eruptionem, aut abscessum quandam ad infernas partes expectare oportet. Sed & q̄ diu dolor recens fuerit, similiter sanguinis à naribus eruptionem, aut puris eruptionem sperare cōuenit, cum alias, tum si dolor circa tempora & frontem fuerit. Verum sanguinis eruptio magis expectanda est iunioribus triginta quinque annis, senioribus uero puris eruptio. Auris dolor acutus cum febre cōtinua ac forti, horrendus est. Periculum est enim deliraturum esse hominē, ac periturū. Proinde quum hic modus minime tutus sit, cito mentē aduertere oportet etiam alijs signis, à primo statim die. Pereūt autem iuniores homines septimo die, & adhuc citius, ex hoc morbo. Senes uero longe tardius. Nam & febres & deliria minus ipsis accidunt, & hac de causa aures antea suppurantur. Verum his quidem ætatibus recidiuæ morbi cōtingentes, plurimos occidūt. At uero iuniores priusq; suppuretur auris, pereūt. Nam si pus album effluerit ex aure, spes est iuuenem superstitem euasurum esse, si sane & aliud quoddam bonum signū ipsi accedat. Fauces exulceratæ cum febre, horrendæ sunt. Verum si quod aliud item signum accedat, ex his quæ antea mala esse iudicata sunt, in periculo hominē uersari prædicandū est. Anginæ horridissimæ sunt, & citissime accidūt, quæ neq; in faucibus quicquam conspicuum faciūt, neq; in ceruice: uerum plurimū dolorē exhibent, & erecta ceruice spirationē inducunt. Hæ enim eodem die suffocant, secūdo item ac tertio & quarto. Quæ uero alioqui similiter dolorē exhibent, attolluntur autem, & in faucibus rubores faciunt, perniciosæ quidem ualde sunt, uerū prioribus magis diuturnæ, si rubor fuerit magnus. Quibuscūq; uero fauces et ceruix simul rubuerint, hæ anginæ diuturniores sunt, & ex ipsis maxime euadūt, si & ceruix, & pectus ruborē habuerit. & erysipelas ignis sacri non intro recurrerit. Si uero neq; in diebus iudicatorijs dissipetur erysipelas, neq; tuberculū ad externā partem cōuertatur, neq; pus tulsiendo reſciat, facileq; ac sine dolore degere uideatur, mortem significat, aut ruboris recidiuam. Securius est autē tumorem & ruborem

borem quæ maxime foras uerti. Si uero ad pulmonem uertatur, & delirium inducit, & quidam ex ipsis suppurati plerumque fiunt. Gurguliones periculosi sunt ut & refectentur, & scarificentur, quæ diu rubicundi fuerint & magni. Nam inflammationes ad hos succedunt, & sanguinis eruptiones. Quare tales alij machinamentis attenuare conari oportet hoc tempore. Quum uero totum iam fuerit secretum, quod sanè uuam appellant, & fiat extrema gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est rem aggredi. Præstat tamen & aluo subducta, chirurgia hac uti, si & tempus permittat, & homo non stranguletur. Quibus febres cessant, neque signis solutorijs apparentibus, neque in diebus iudicatorijs, his reuersuras esse expectandum est. Quæcumque febris longiorē moram traxerit, homine alioqui ad salutē disposito, ita ut neque dolor teneat ob inflammationē, aut ob aliquā aliam manifestam causam: huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulū, uel maxime infernum. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breuiori tempore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare uero statim oportet abscessum, si febris detinens uiginti dies transmiserit. Senioribus autem minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At uero huiusmodi abscessum expectare oportet febre continua existente. Verum ad quartanā deducetur, si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad autumnū appropinquauerit. Quemadmodū autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt: Ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, et senioribus. Cæterū hæc nosse expedit, abscessus magis hyeme fieri, tardiusque cessare, & minus recurrere. Quicumque uero in febre non lethali, dixerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis obscurum quiddam apparere, si et osculi uentris morsus huic accefferit, ei biliosus uomitus aderit. Si uero etiam rigor accefferit, & partes infra præcordium fridas habuerit, citius adhuc uomitus aderit. At si quid biberit aut ederit sub hoc tempus, ualde cito uomet. Porro quibus horum dolor fieri incœperit primo die, hi quarto magis quæ quinto premuntur: septimo uero liberantur. Plerique tamen ipsorum tertio die dolere incipiunt, uexantur autē maxime quinto, liberantur nono, aut undecimo. Qui uero incœperint quinto die dolere, aliaque iuxta rationem priorū ipsis fiant, his ad decimūquartum morbus iudicatur. Fiunt autē hæc & uiris, & mulieribus, maxime in tertianis. Iunioribus uero fiunt quidem & in his, uerū magis in continuis febribus, & in sinceris tertianis. Quibus cunctisque uero in huiusmodi febre caput dolētibus, pro eo quod obscurum quiddam præ oculis appareat, uisus hebetudo contingit, aut splendores ob oculos obuersantur: & pro osculi uentris morsu, in præcordiorum dextra aut sinistra parte aliquid tenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione: sanguinē de naribus his, pro uomitu fluxurum esse expectandum est. Magis tamē & hic in iuuenibus sanguinis eruptionē expectare oportet, his autem qui triginta sunt annorum, & seniores adhuc, minus: uerum uomitus in his expectari debent.

At uero pueris conuulsiones fiunt, si febris fuerit acuta, & ueter non egresserit, & uigilarint, & terreantur, & eiularint, & colorē mutarint, & uiridem siue pallidum, aut liuidū, aut rubrum contraxerint. Fiunt autē hæc propiusime quidem pueris nuperrime editis, usque ad septimū annum. Seniores autem pueri, & uiri, non amplius in febribus corripiuntur conuulsionibus, si non quid ex signis

fortissimis ac pessimis accesserit, qualia sanè in phrenitide fieri solèt. Perituros porò & superstites futuros, tum pueros, tum alios, ex omnibus signis cõiecta re oportet, pro ut singulis de singulis per scripta sunt. Atq; hæc & de acutis morbis, & de his qui ex ipsis fiunt, dico. Qui uero recte prænoscere uolet, & superstites futuros, & morituros: & quibus per plures dies, & quibus ad pauciores morbus duraturus est: eũ signa omnia ediscere, & iudicare posse conuenit, ita ut uires ipsorum inter se cõferendo expendat, quemadmodũ per scriptũ est, & de alijs, & de urinis, & de sputis, ubi simul & pus & bilem ægrotus tulsien do reiecerit. Quin & impetus morborum semper populariter grassantiũ cito animaduertere oportet, & temporis constitutionem nõ ignorare. Probe tamen id nosse expedit de coniecturis certis, & alijs signis, & nõ ignorare, quòd in omni anno, & omni tempore, mala malum, bona bonum significant. Nam & in Libya, & Delo, ac Scythia, præscripta signa uera comperiuntur. Proinde sciendum est, minime difficile esse, in ñsdem regionibus posse aliquẽ plerq; ex ipsis assequi, si memoria tenens ipsa, iudicare ac recte expendere sciat. Cæterum nullus morbi nomen desiderare oportet, quod hic nõ est adscriptum. Omnes enim qui in prædictis temporibus iudicantur, ex ñsdem signis cognosces.

HIPPOCRATIS COI PRÆ

DICTIONVM LIB. I. IANO COR
nario Medico Physico interprete.



*propheticus hunc apellat. et in
quodam sensu spiritus.*

O P O R O S I in principijs fientes, cum capitis, lumborum, præcordij, colli dolore, uigilantes, num phrenitici sunt: Nasus in his destillans perniciosus, tum aliàs, tum quarto ab initio die. Alui proluuium ualde rubicundum, malũ quidem est in omnibus morbis, nõ minime uero in prædictis. Linguae asperæ & resiccatae, phreniticae. In turbatis uigilantibus, urinae decolores, nigrae, innatantes, in sudoribus, phreniticae. Infomnia etiã in phreniticis manifesta sunt. Scretatio frequens, si sanè & aliud quoddam signum affuerit, phrenitica sunt. Qui relinquuntur in præcordio ardores, febre perfrigerata, mali sunt, tum aliàs, tum in sudoribus. Prædebilitatorum desipientiae pessimæ, uelut etiã Thrasynonti.

Phreniticae uehementer affectiones, tremulae desinunt. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum sorditate & uigilans, cito insaniam affore denũtiant. Loci circa fauces in acutis morbis dolorosi, graciles, parui, suffocatorijs, quando hiarit æger ut os claudere & aperire non facile possit, mentis emotionem portendunt. Ex talibus phrenitici fiunt, & perniciosae affecti. In phreniticis in principio mansuetudo. Verum frequenter transmutari, malum id est, & sputatio mala est. In phreniticis alba alui egestio, malum: quemadmodum & Archecrati. Num & in his torpor fit: Rigor in his pessimus. Quibus melancholico modo mente motis, tremores accedunt, malignum hoc est.

Mente moti acute, ubi in super febrerint, cum sudore phrenitici fiunt.

Phrenitici paucibili, strepitum ualde percipientes, tremuli. Ex uomitu naufragando oborta, clangorosa uox, oculi puluillum incumbentem habent

tes, infaniam portendunt: quemadmodum etiam Hermozogæ uxor, infania acute correpta, uoce destituta mortua est. In febre ardenti sonitibus aurium accedentibus, cum uisus hebetudine, & grauitate in naribus accedente, melancholico modo mente mouentur. Mentis percussiones cum uoce clangorosa, linguæ conuulsiones tremulæ: & uoces tremulæ fientes, mortem alienant. duricies in his perniciofa est. Linguæ tremulæ signum sunt mentis non firmæ. In biliosis meracis alui egestionibus, spumosa florulentia mala, tum aliàs, tum si cui lumbi antea doluerint, & mente motus fuerit. Rari circa latus in his dolores, desipientiam significant. Vocis interceptiones cum singultu pessimæ. Vocis interceptiones cum exolutione pessimæ. In uocis interceptione, spiritus ueluti his qui strangulantur præ manibus expositus, malus est. Num & talis mentem emouet? Modice feroces mentis emotiones, ferinæ sunt. Molestæ ferre morbū cum perfrigeratione, si nō sine febre exsudent partes supernæ, phrenitim portendit: quemadmodum etiam Aristagoræ. Sed & perniciosum hoc est. Frequentes in phreniticis permutaciones, conuulsoria. Urinæ quæ minguntur à non recordantibus, nec cōmonefactis, perniciofæ. Num his minguntur uelut si subsidentiam conturbasses?

Palpitantes per totum, num uoce destituti moriuntur? Sputaciones in phreniticis cū perfrigeratione, nigra reuomuntur. Surditas, & urinæ non confidentes, ualde rubicundæ, innatantes, mentis emotionem portēdunt. His morbo regio corripī malum est. Mala est & ex morbo regio fatuitas. Hos uoce quidem destituti, uerum sentientes esse contingit. Arbitror autem & aluos his perumpere, uelut contigit Hermippo, & mortuus est. Surditas in morbis acutis & turbulentis cōsequens, mala.

Mentis emotiones tremulæ, obscuræ, palpatoria, ualde phreniticæ sunt. Velut & Didymarcho in Co. Torpores ex rigore, non ualde apud seipos sunt. Dolores circum umbilicum palpitanter, habent quidem aliquid quod mentem emouet. Verum circa iudicationem his spiritus aceruatus cum prompta tensione penetrat. Et dolores circa furam, in his mentis emotionem faciunt. / Si innatarit quid in urina, dolore circa femur dissipato, mentis emotionē portendit. & qualia circa aurium sonitus contingunt, talia existunt.

In aluo liquida, lassato, caput dolenti, siti-culoso, uigilanti, obscure loquēti, impotenti, quibus talia sunt, his timor est ut mente moueantur. Exudantes & maxime circa caput, in morbis acutis sub moleste ferentes, malum, tum aliàs, tum in urinis nigris. & turbidus spiritus in his malus. Impotentia præter uacuatorum ualorum rationem contingentes, nō existentē ualorum uacuatione, malum. Alui interceptæ, sed paruæ, nigra, uelut caprarum stercora ad necessitatē coacte emittentes, nasus in his erumpens, malum. Quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore fastidioso ac nauiseabundo, hi si exudent malū est. Num his tremores fiunt? Sed & uox uelut in rigore conspicua? Extremitates si in utranq; partem cito transmutentur, malum est. Et sitis huiusmodi, mala est. Ex moderatō ferox respōsio, malum. Vox acuta, his præcordia intro trahūtur. Oculis hebes, malus: & fixus ac caliginosus, malus. Vox acuta clangorosa, mala. Dentium stridor perniciosus est, quibus non & fanis familiaris est. Suffocatio in his ualde mala. Faciei bonus color, & uehemens toruitas, malum. Egestio-

nes alui desinentes in spumosas meracas, exacerbatoriae sunt. Urinarum in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones, pessimae. Perniciosa si citra signa, leuia facta fuerint, mortem significant. In morbis acutis biliosis ualde albae, spumosae, circubiliofae egestionis, malae. Mala item & urinae eius modi. Num his hepar dolorosum est? Vocis interceptiones in febris cō uulso modo fientes, ad mentis emotionem cum silentio deueniunt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortē inducunt. Febres ex praecordiorū doloribus malignae. Sitis praeter rationem soluta in acutis morbis, mala est. Sudor multus cū febris acutis fiens, malus est. Et urinae dolorosae, malae sunt. Et rubicundae ex his florulentiae detentae, itēq; aeruginosae, malae sunt: & paruas apparere ueluti stillas. Et uomitus cū uarietate, mali sunt, tum aliās, tum si propius inter se procedant. Quaecumq; in diebus iudicatorijs, cum anxietudine, absq; sudore perfrigerantur, malum est: Et quae ex his insuper rigerint, mala sunt. Vomitus meraci, anxiosi, mali. Sopor num ubiq; malus est? Ignorantia cū rigore, malum. Malum item obliuio. Perfrigerationes ex rigore nō recalescētes, malae sunt. Sudantes ex perfrigeratione recalescētes, malum. In his ardor dolorosus in lateribus, & insuper rigere, malū est. Aestuosifrigores aliquatenus perniciosi: & flamma facies cum sudore in his mala est: In his posteriorū partium frigiditas, conuulsionem accersit. Exudantes uigiles recalescētes, malum. Ex lumborum recursu, oculi distortio malū. Dolor in pectus firmatus cum torpore, malus. Hi si insuper febrīāt, acute ardentes, moriūtur. Qui nigra reuomit, cibos auersantur, deliri sunt, iuxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem aut clausum habent, eos medicamentis purgare nō oportet. Perniciosum enim est: Neq; intumescētes, uertiginosos, in leuiter uagando deficientes, cibos auersantes, decolores: Neq; in febre fractos, si porososi fuerint. Perniciosum enim est. Oris uentriculi dolor, cū praecordio distento, & capitis dolor, malignū, & quidpiam anhelosum. Num hi repente moriuntur: uelut in Dyfode. Huic etiam urinae uehementer fermentatae, erant ualde rubicundae. Colli dolor malum quidem in omni febre, pessimum autem his quibus timor est ut insaniant. Febres soporosae, lassatoriae, caliginosae, uigilias inducentes, exudantes, malignae. Horrores frequentes ex dorso, celeriter translabentes, molesti, urinae interceptionem dolorosam significant. Qui anxie se iactantes, citra uomitum exacerbantur, male habent. Perfrigeratio cum duricia signum malum. A uentre tenuia nō sentienti prodire, ei qui est apud seipsum, perniciosum: uelut Hepatico. Vomitiones exiguae biliosae malae, tū aliās, tum si insuper uigila uerint aegri. Nasus in his destillans, perniciosum est. Quibus ex partu alba detinentur cum febre, surditasq; adest, & in latere dolor acutus, hae perniciose mente mouētur. In febris ardentibus subperfrigeratibus, egestionibusq; alui biliosis aquosis frequentibus, oculorū distortio signum malū est, tum aliās, tum si stupore prehensi detineantur. Siderationes repentinae ei qui exoluit ac diutine insuper febrīāt, perniciosae sunt: quale quiddam passus est Numenij filius. Ex lumborum dolore ad os uentriculi recursiones, febriculosae, horridae, reuomentes aquosa tenuia multa, mente motae, uoce destituta, nigrorum uomitu facto moriuntur. Oculi cōfractio in morbo acuto, mala. Num anxie

anxie se iactantibus citra uomitum, lumbos dolentibus, si ferociter mente mo-
 ti fuerint, spes est ut nigra per aluum prodeant? Fauces dolorosae, gra-
 ciles, cum aegre tolerabili molestia, stragulatoriae, perniciosae acutae. Quibus
 spiritus retrahitur, uox autem stragulatoria est, & uertebra intro consi-
 det, his in fine uelut contrahente quodam spiritus fit. Caput dolentes,
 & stupore detenti delirantes, aluo intercepta, oculum ferocem praeseferentes,
 florescentes, opisthorono posteriorum partium conuulsoria distentione cor-
 ripiuntur. In oculorum distortionem, febriculoso, lassato, rigor pernicio-
 sus. Et soporosi in his, malum. In febribus ad praecordium dolores, sine
 uoce, si sudore non soluantur, maligni sunt. His dolores ad coxas, una cum fe-
 bre ardente, & si aluus aceruatim eruperit, perniciosum. Quibus uoces
 cum febribus deficientes post iudicationem, hi trementes ac soporosi mori-
 untur. Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducentes, stuporis de-
 tentionem inferentes, praecordia uariata, & uentris tumor, cibis interceptis,
 in sudoribus: Num his turbidus spiritus, & geniturae simile quid superueni-
 ens, singultum indicat? Sed & aluus spumosa, biliosa, insuper egerit? Splen-
 didum in his mictum prodest. Venter autem his insuper turbatur. Quibus *seruio. p. 205.*
 bus sopor fit spumosis prodeuntibus, his febris exacerbatur acuta. Ex
 capitis dolore uocis interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxan-
 tur in seipos, fiunt que morbi reuertentes diutius durantes, His insuper rige-
 re, non malum est. Manus tremulae, caput dolentes, collum dolentes,
 subsurdi, mingentes nigra densata: quibus haec sunt, his nigra uentura esse
 expectare oportet, perniciosum. Vocis interceptiones cum exolutione,
 stupore detinente, perniciosae. Lateris dolor, ex sputis biliosis, citra ra-
 tionem si euauerit, mente mouentur. Ex colli dolore, soporoso, sudan-
 ti, aluus inflata, si sane ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sub-
 luta: ex his ea quae biliosa non sunt supprimuntur. Talia uero si seruentur re-
 tenta, longius aegrotat. Num itaque proluuia quae biliosa non sunt, meliora
 sunt? & flatuoso tumori profuerint? Alui circumtensio, ad necessitatem
 liquida demittens, cito intumescens, habet quid conuulsorium, uelut etiam
 Aspasij filio. Superrigere his perniciosum. Ex his conuulsus factus ac infla-
 tus, ubi diutius aegrotasset, ori putrefactio uiridis superuenit. Quibus
 circa lumbos tenues diuturni dolores, ad praecordium se reuoluentes, & ci-
 borum fastidium inducentes una cum febre: his ad caput dolor intentus pro-
 gressus, repente conuulsorio modo occidit. Affectiones insuper rigen-
 tes, & quae ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum uigilijs, & delirio
 in somnis, aliquando urinas inuoluntarie emittentes, in conuulsiones sopo-
 rosas desinunt. A principio exudantes urinis concoctis, ardentes qui ci-
 tra iudicationem perfrigerantur, breui circum circa ardentes: Torpidi item,
 soporosi, conuulsi, perniciose affecti sunt. Vterum gerentibus capitis do-
 lores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt. Fortassis autem his etiam
 conuulsorium quid pati contingit. In faucibus gracilibus dolores strag-
 gulatorij, habent quid conuulsorium, tum alias, tum a capite aborti, Velut
 etiam Thrasynontis consobrinae. Tremores conuulsorij fientes in su-
 doribus

doribus, reuerti solent. Iudicatio his fit ubi superriguerint. Superrigent hi ardore circa uentrem prouocati. Lumborum dolor, & capitis dolor, & oris uentriculi dolor, cum excreatione uiolenta, conuulsorium quid habet.

A uentre subliuida, turbulenta: & lotia tenuia ac aquosa, suspecta. Fauces exasperatae parum, & ueter murmurans inanibus ad egerendum surrectionibus, & frontis dolores, & palpantes, delassati, in stragulis ac uestimentis dolorosi. Quae ex his augentur, difficilia sunt. Somnus multus in his conuulsorius, & dolores in frontem graues, & mictio difficilis.

Vrinae suppressio quibus rigores, & in conuulsorijs affectionibus: uelut & ipsa ubi inhorruit, sudauit. Meracae desinentes purgationes, omnibus quidem exacerbatoriae sunt, His uero etiam ualde. Ex talibus etiam circa aurem abscessus exurgunt. Turbulentae ferocissimae est somno excitationes, conuulsoriae sunt tum aliam, tum cum sudore. Et colli, & dorso perfrigerationes apparentes, sed & per totum corpus: In his etiam spumosa mictiones, una cum animi deliquio, & oculorum obscuratio, conuulsionem prope adesse significant.

Cubiti ac colli dolores conuulsorii. A facie autem hi. In faucibus sonitus frequentes, cum saliuae sputatione. In his in somnis sudores, boni. Num & sudore leuari, plurimis non malum est?

Dolores ad infernas partes, his toleratu faciles. In febribus exsurgentes caput dolentes, alio intercepta, conuulsi fiunt. Subfriabiles liuidae alui egestiones, perfrigerantes non sine febre, malae sunt. Rigores ex his uescicam & uentrem occupantes, dolorosi. Proinde soporem his habere aliquid conuulsorii, non sane mirum apud me fuerit. Quae in acutis uomitorio modo trahuntur, mala sunt. Et albae alui egestiones, difficiles. Non uiscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perueniunt. Num ex his soporosi torpidi fiunt? Morbi ex talibus diutius durant. Num circa iudicationem hi arescentes difficulter spirantes?

Quae ex lumbis ad collum ac caput progressa sunt, & leuis syderationis modo resolverunt, conuulsoria fiunt & mentem emouentia. Num & soluuntur talia conuulsione? Ex talibus uarie aegrotant, & per eadem progressi.

Conuulsiones in his quae ab utero strangulantur sine febre, faciles sunt, uelut etiam Dorcadi. Vesica intercepta tum aliam, tum cum capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quae in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciosa. Num id quod tale est, etiam mentem emouet?

Num & osium circa tempora dissectiones, conuulsionem accersunt? aut si quis ebrius uerberetur, aut sanguis multus effluat in principijs, num hoc facit conuulsionem? In sudore sputa defluentia febricitanti, leuia sunt. Num ad dies aliquot alui humectantur? arbitror. Num his ad articulos abscessus fiet? Quae modice ferociter mentem emouent, atrabiliaria sunt. Si uero a muliebrium purgationum retentione fuerint, ferina. Haec uero saepius

pius

pius accidunt. Num & cōuulsæ sunt hæc Num & uocis interceptiones cum sopore, conuulsoriæ sunt? uelut coriarij filix, quæ muliebribus purgationibus præsentibus affici coepit.

Quibus conuulsis oculi intente reluctant, neque apud seipos sunt, & diutius ægrotant. Sanguinis eruptiones ex contrario, malæ sunt: uelut in splene magno si ex dextra nare fluat.

Et circa præcordia eodem modo res se habet. Verum cum sudore hoc peius est.

Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus, perfrigescencia maligna ac praua. Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluum transitus, malus.

Praua sunt etiam ualde rubra. Num uero quarto die hæc sanguinis eruptio contingit? Soporosi ex his conuulsione moriuntur. Num nigris præegressis, & uentre tumefacto? Vulnera sanguinem fundentia, exudantia, maligna. Sic affecti loquentes latenter moriuntur.

Post modicam sanguinis eruptionem, & nigrorum egestionem, in acutis surditas malum. Sanguinis egestio in his perniciosissima. Verum surditatem soluit.

Lumbis dolentibus oris uentriculi dolores accedentes, signa hæmorrhoidum fluxionis futuræ sunt. Arbitror autem & hos prægreissæ hæmorrhoidum eruptionis signum esse.

Sanguinis eruptiones statis temporibus fieres, siticulosæ, difficiles ac exoluentes, si sanguinem non effuderint, in comitalem morbum finiunt.

Morbi qui statim turbulentisunt, insomnes, sanguinem de naribus stilantes, sexta die alleuati, noctu affligerunt, postridie exudarunt, in somnumque delati mentem emouerunt, hi large sanguinem fundent. Num & aquosa urina tale quid significat? Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alui male afficiuntur, si non urinæ concoctæ fuerint.

In iudicatorijs perfrigerationibus, sanguinis eruptiones fortes pessimæ sunt. Capite grauati, iuxta sinciput dolentes, insomnes, sanguinem profundunt, tum aliàs, tum si quid ad collum contendat.

Vigilijs infestati, derepente cum inquieta iactatione, sanguinem fundunt, tum aliàs, tum si quid antea perfluxerit. Num ubi inhorruerunt? Colli dolores, oculi ualde rubicundi, sanguinis eruptionem significant.

Quibus aluo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent, Num aluus intestinorum leuitate corripitur, & obdura fit, aut ascarides insunt, aut utrunq;?

Quibus ex lumbis recursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os uentriculi dolentes, saniosis ac serosis humoribus pleni, large sanguinem profundunt. Sed & aluus his turbulentis erumpit.

Quibus ex sanguinis eruptione larga ac frequenti, nigrorum multorum fit egestio, hi suppressa aluo dolorosi sanguinem profundunt. Cum quadam uero fluxione, facile ferunt.

Num hi multos frigidos sudores excludunt? Conturbata in his urina non mala, neq; id quod genituræ simile in ipsa residet. Verum frequenter hi aquosa mingunt.

Quibus in surditate & torpore parua est à naribus destilatio.

Z 4 latio.

latio, ea habet quid difficultatis. Vomitus his confert, & alui perturbatio.

Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his menses muliebres decurrunt. At collum in his dolorosum, sanguinis eruptionis e naribus signum est.

Et per nares sanguinē effundere spes est, ea quæ caput concutiunt: Et quæ aurium sonitum faciunt, sanguinem profundunt, aut menses deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor consequetur. Fortassis autem & dysenteriam facient. Et circa uentrem palpitationes cum præcordij intensione sublonga ac tumente, sanguinis eruptionem significant. Inhorrescunt autem hi. Quæ larga, uiolenta, multa ex naribus fluxerint, aliquando ad conuulsiones adducunt. Venæ sectio soluit. Frequentes & paulatim fientes ad egerendum surrectiones, sufflauæ, uiscosæ, modica stercoracea habentes, cum præcordij ac lateris dolore, morbo regio participant. Num autem his suppressis hi exoluuntur? arbitror sanè: & sanguinem profundunt? His tensio lumborum, & dolores in his, sanguinis eruptionem significant.

Præcordij tensio, cum capitis grauitate ac surditate, & quæ ad hæc cōsequenter diuexant, sanguinis eruptionem indicant. Undecimo die sanguinis stillicidia difficilia, tum aliàs, tum si superstillauerint. Qui in horribus simul iudicatorie exudarunt, postridie uero postquam inhorruerunt præter rationem uigilant, eos sanguinem effusuros esse arbitror. Quibus ab initio largæ sanguinis eruptiones, rigor fluxionem sistit. Ex sanguinis eruptione, rigores longi. Quibus capitis dolores, ac colli dolores, & totius corporis impotentia quædam, sanguinis eruptiones soluant. Sed e tempore sic soluuntur. Urinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, cito & modice concoquuntur, malæ sunt. Et perfrigerari hoc modo malum est. Subsoporati, morbo regio affecti, non ualde sentientes, quibus singultus, his alius erumpit, fortassis & suppressa est. Hi exoluuntur. Num his etiam abscessus iuxta aures fiunt? Suppressæ cum rigore urinæ malæ, tum aliàs, tum si antea sopor apprehenderit. Num iuxta aures abscessus parotides dictos, in his fore spes est? Ex torminoso subsidentia limosa subleuida, mala est. Num ex præcordijs dolet puto dexterum? & exoluitur? Num abscessus iuxta aures talibus parum dolorosi? Alius erumpens his in omnibus perniciofa est. In anxiosis quibusdam uigilijs abscessus circa aures maxime. Ex uoluulis graeolentibus, in febre acuta, præcordijs sublimibus diutius permanētibus, abscessus circa aures oborti occidunt. Ex surditate leniter abscessus circa aures fiunt, tum aliàs, tum si anxiosum quippiam succedat, & soporosus inter hos adhuc magis. Abscessus iuxta aures leuiter syderatis mali sunt. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, cum stuporis detentione, abscessus iuxta aures producant. Conuulsio, tremor, anxietas, cum stuporis detentione, paruos circa aures abscessus exacerbant. Num quibus abscessus sunt iuxta aures, capitis dolore affecti sunt? Num & supernis partibus exudant, num insuper rigēt quoque aliquo modo? Deinde & alius erumpit, & soporosus quippiam habent? Num & aquosæ urinæ alba innatantia habentes, & quæ uarie exalbidæ sunt, ac foetidæ, abscessus iuxta aures faciunt? Num quibus tales urinæ, frequentes sanguinis e naribus

naribus stillæ profluunt: num & lingua his leuis est? Quibus magnum & frequentem spiritum habentibus, morbus regius, & febres acutæ cum præcordijs duris perfrigeratæ sunt, num his abscessus magni ad aures consistunt?

Soporosa, anxiosa, præcordia dolentia, uomitoria parua symptomata. In his abscessus iuxta aures oboriuntur. Antea uero & ea quæ circa facièm fiunt.

Aluo nigra stercorea egerente, sopor insuper apparens, abscessum iuxta aures producit. Tufsiculæ quæ sunt cum sputatione, abscessum circa aurem submouent. In capitis dolore sopor & iurditas, circa aurem abscessum aliquem eructat. Præcordij distentio cum sopore anxioso, ac capitis dolore, abscessus circa aurem attollit. Dolorosi aurium abscessus, circa iudicationem dissipati, mali sunt.

HIPPOCRATIS COI PRAE

DITIONVM LIB. II. IANO COR 1

nario Medico Physico interprete.



EDICORVM prædictiones narratur multæ, & uariæ, & admirandæ, quales ego quidem neq; ipse prædixi, neq; alium aliquem prædicere audiui. Sunt autem aliquæ ex ipsis huiuscemodi. Hominem perniciose affectum esse, & medico ipsum curanti, & alijs uideri. Verum medicum alterum superuenisse ac dixisse, Non peribit hic homo, uerum cæcus euadet.

Item ad aliū qui omnino male habere uidebatur, ingressum prædixisse, hominem quidem euasurum esse, uerum manum claudam habiturum. & ad alium quendam qui similiter superstes fore non putabatur, dixisse, ipsum quidem sanum fore, uerum pedum digitos nigrefactos putrefactione corrumpendos esse. Et aliæ huiuscemodi prædictiones in tali prædictionis specie dicuntur. Alius autem prædictionis modus est, euentibus ac negotiationibus tractantibus prædicere, alijs mortem, alijs insaniam, alijs alios morbos: & ad hæc omnia, etiam ea quæ prioribus temporibus facta sunt prædicere, ac omnia uera narrare. Alia porro adhuc forma prædictionum est, athletas & eos qui morborum causa exercentur ac se fatigant cognoscere, si quid aut circa cibum deliquerint, aut alteratum quippiam ederint, aut potu uberiore usi fuerint, aut deambulationem intermiserint, aut res ueneas quasdam exercuerint. Horum omnium nihil illos later, adeo ut etiam minima quæcque, in quibus non paruerit homo, exacte cognoscant. Hi omnes prædictionum modi esse feruntur. Ego uero talia quidem non uaticinabor, Verum signa scribam, ex quibus & sanos futuros homines, & morituros coniectare oportet: & tum breui tempore, tum longiore, sanos futuros, aut perituros. Scriptum est autem à me & de abscessibus, quomodo singulos considerare conueniat. Arbitror autem & eos qui de claudicationibus prædixerunt, alijs que eiusmodi, confirmato iam morbo prædixisse, & quum iam manifestum esset, quod abscessus non esset recursurus, si modo intelligentiam habuerunt: multo sanè magis quam priusquam abscessus fieri inciperet. Spero item & alia prædixisse, magis humano more quam refertur, quæ uidelicet euentibus & negotiationibus tractantibus

stantibus prædixisse dicuntur, mortes, & morbos, & insanias. Atque hæc mihi uidentur talia facta esse, & nulla mihi uidetur esse difficultas prædicendi, si quis circa talia studium ac curam adhibere uelit. Primum etenim aqua inter cutem laborantes, & tabidos, quis non cognouerit: Deinde deliraturi non diu latere possunt, si quis nouerit quibus his morbus cognatus est, aut prius aliquando in saniuerunt. Si enim hi homines ebriosi fuerint, aut carnes uorauerint, aut uigilauerint, aut in frigore aut calore inconsiderate uersati fuerint, multus timor est ex tali uictus ratione, ipsos deliraturos esse. Et eos qui hæmorrhoidas habent, si quis hyeme multo potu uti uiderit, & bono colore præditos, de his prædicere licet, quod ad uer multa spes sit sanguinis eruptionis, ut & decolores & aquatici sub æstatem fiant. Verum omnia hæc addiscere ac prædicere oportet, si quis in talibus studijs palmam ferre expetat. Licet enim ex scriptis prædicere, & mortem, & insaniam, & bonam habitudinem. Possem autem referre & alia multa huiusmodi, sed quæ facilima cognitu sunt uisum est mihi scribere. *Consequo* autem ut quam prudentissime agant, tum in reliqua arte, tum in huiusmodi prædictionibus, illius probe memores, quod si cui successerit prædictio, is apud ægrotum intelligentia præditum in admiratione fuerit. Si uero quis aberrarit, supra hoc quod odio habetur, fortasse etiã insanire uidebitur. Quapropter iubeo, ut tum alias omnes, tum has prædictiones prudenter faciant: quãquam sanè & audiam, & uideam, neque iudicare recte homines ea quæ dicuntur ac fiunt in arte, neque narrare. Cæterum de his qui exercetur ac laboribus se fatigant, eas asseuerationes quas afferunt hi qui ipsas asserunt, neque esse puto, neque si quis putat prohibeo. A nullo enim signo, neque bono, neque malo, læduntur suspensiones, cui signo fide habita quis sciat, an recte pronunciatum sit, aut secus: alioqui per me licet ut si quis uelit credat. Non enim ego impedimento sum. Arbitror autem si quid uerit ab ipsis dicitur, aut his qui de his qui exercetur asseuerant, aut illis qui prius scripti sunt: primum quidem hunc qui cognouit, ex signis coniecisse. Deinde uero ambigue & humano more prædixisse. & simul eos qui id narrant monstris quam factum fuit recensere. Nam neque in morbis facile est peccata cognoscere, etiam si decumbant homines, & uictu parum nutriente utantur, ut non adeo multa intruere opus sit eum qui hæc considerandi curam suscepit. Alij enim bibunt solum. Alij ad hoc quod bibunt, aut sorbitionem, aut cibum paucissimum assumunt. Necessè igitur est eos qui uberiore potu usi sunt, magis difficulter spirare, & plus urinæ eijcere. Eos uero qui sorbitionem aut cibum auxerunt, magis & sitire, & febrire. Si uero quis utrisque, & potu & cibo, immodice usus fuerit, ad hoc quod febricit, & difficulter spirat, etiam uentrem circumtentum & maiorem habebit. Licet porro & hæc, & alia omnia experimentis optime explorare, quæ & habemus, & omnibus recte utimur. Primum equidem & intelligentia, & oculis cognoscere facile est, hominem in eodem loco decumbentem, & exacta uictus ratione utentem, si non paruerit, aut obambulando, aut multa edendo. Deinde qui manibus contrectauit uentrem ac uenas, minus falli potest, quam qui non contrectauit. Et nares in febrientibus quidem, & multa & bene significant. Odores enim multum inter se differunt. At uero in sanis & recto uictu utentibus, haud scio qua re uel in hoc experimento faciendo uti possim. Postea audiendo, uocem & spiritum auribus cognoscere datur, quæ in sanis non

non similiter sunt manifesta, sed qualiter etiam antea. Quod si etiam mores morborum ac ægrotorum didicerit medicus, non tamen quicquam prædicere oportet. Non enim difficilius spirabit homo, morbo adhuc errante, & febriet acutiore febre, & uenter intentus fuerit. Quare propter hæc nō tutum est prædicere priusquam statum accipiat morbus. Verum post hoc tempus, quicquid præter rationē acciderit, dicere oportet. Manifesta uero sunt mala, quæ propter ægri inobedientiam fiunt. Nam & spirandi difficultates, & alia huiusmodi postridie sedabuntur, si ob peccatum fiant. Si igitur quis hanc iudicationem considerans dixerit, non delinquet. Atq; ego quidem hunc considerandi modum nunc consulo, tum de his qui domi manent, tum de his qui exercentur, itemq; de alijs omnibus, qualia peccata committant. At exactam illam narrantes rationem & audio, & derideo. Quum enim parum inobedientes fuerint homines, haud scio quomodo id deprehendere possim. Si uero maiora fuerint peccata, quem in modum considerare oporteat scribam. Oportet autem primum hominem, in quo quis per inobedientiam admissa cognoscere uolet, per totum diem intueri, & in eodem loco, & eadem hora, sole præsertim recens orato. hoc enim tempore subeacuatus fuerit, & adhuc ieiunus est, & nullo labore fatigatus est, præterquam matutinis deambulationibus, in quibus minime inobediens est, si sanè ubi de somno surrexit homo, ad deambulandum prodierit. Quare necesse est eum qui iusta uictus ratione utitur, hac hora maxime æqualiter habere, & coloris, & totius corporis constitutionem. Quapropter & is qui huius considerationis curam gerit, acutissimus fuerit & mente, & oculis, eo tempore. Contemplari præterea oportet hominis mentem, & mores, & corporis uires. Alij enim alia facilius aut difficilius imperata faciunt. Primum igitur is cui inedia imperata est, si plura comederit & biberit, per hæc manifesta fiet, et tumidius corpus ipsius apparebit, et plenius ac coloratius erit, si non excrementa alui male ipsi processerint. Erit item animosior ad ferendum laborem. Considerandum etiam an ructum edat, aut à flatibus urgeatur. Hæc enim fieri solent his qui ræ affecti sunt, propter hoc peccatum. Si uero dum edere multa cogitur, & fortiter laborare, aut cibum imperatum non ederit, aut ebrius factus fuerit, aut à cœna larga non obambulauerit, hoc modo explorare oportet. Si quidem cœnam non ederit, solito autem more deambulauerit, iucundior aspectū præ se feret, & uegetior ac operosior in exercitijs erit. Verum alui egestio modica et cōpacta maxime in hoc fuerit. Si uero cœna sumpta non deambulauerit, ructum utiq; edet, & flatuosus fuerit, & plenitudo nō minor apparebit, & inter laborandum magis q̄ antea sudabit, & difficulter spirabit, ac grauis erit. & transitus alui maiores, ac minus uiscosi his fuerint. Quod si neq; cibum consumperit, neque deambulauerit, pigrior utiq; fuerit ac tumidiior. Si uero ebrius factus fuerit, sudabit magis q̄ antea, & difficulter spirabit, & ipse seipso grauior erit ac humidior. Sed & lætior erit, si nō caput ipsi affligatur. Quod si uxore semel usus fuerit, uegetior utiq; erit, & magis solutus. Si uero sæpius rem peregerit, durior euadet, & squallorē quendā habebit, & decoloratior ac magis lassatus erit. Porro egestiones alui procedere oportet his qui laboribus exercētur, quādiu parū ederint, ac parum potauerint, modicas & duras, atq; hoc quotidie. Si uero tertio quoq; die, aut quarto, aut ex longiore interuallo

Lyra Sahitaki

uallo prodierint, periculum est aut febrī, aut alui profluuiō corripiendos esse. Quæcunq; uero egestiones liquidiores sunt, q̄ ut in transitu cōformentur, hæc sanè omnes peiores sunt. At uero his qui multum edunt, & multum laborant, egestionis trānitum mollem, oportet esse siccum, & copiam ciborum in gestorum pro ratione laboris. Procedunt autem ab æquali ciborum copia, his quidem qui minimum laborant, plurimæ egestiones. his uero qui plurimū laborant, modicæ, si sani fuerint, & iusta uictus ratione utantur. Nam ad hæc cōiecturam facere oportet. Liquidiores autem egestiones, & sine febribus fiētes, & quæ septima die, aut citius iudicātur, cōmodæ sunt si semel una uice omnes fiant, & nō reuertantur. Si uero insuper febrerint homines, aut alui profluuiā redierint, si longa fuerint, penitus mala sunt, siue biliosa fuerint, siue pituitosa, siue cruda; & uictus ratione propria, singula opus habēt, itemq; medicamentis alia alijs. Cæterum urinam iuxta portionis copiam mingere oportet, & semper æqualem, & q̄ maxime aceruatim, et momento paulo crassiores, q̄ id quod in potu acceptum fuit. Si uero fuerit aquosa, & copiosior q̄ pro eo quod bibi imperatū est, significat hominem nō obedire, sed copiosiore potu uti: Aut nō posse renutrirī, q̄ diu talia urinam faciunt. Si uero paulatim stridat urina, aut medicamentis hominē opus habere significat, aut morbum aliquē circa uesicam habere. At sanguinem mingere, raro quidem & sine febre ac dolore, nihil mali significat, sed lassitudinū solutio fit. Si uero sæpius mingat, & aliquid ex his accesserit, malum est. Verum prædicere oportet, siue cū dolore mingatur, siue cū febre, fore ut insuper pus mingat, atq; ita dolores ac afflictiones quiescant. Crassa uero urina albam subsidentia habens, aut circa articulos dolorem aliquem, aut tumore significat. Aliæ uero omnes subsidentia in urinis eorum qui exercentur, à morbis circa uesicam fiunt, id quod ipsi manifestum faciunt. Cum doloribus enim erūt, & tales ut difficulter quis ab ipsis liberari possit. Atque hæc quidem de his scribo, & huiusmodi alia dico. Cæterum ex his qui exactam ac certam prædictionum rationem prædicant, cum aliquibus ipse conuersatus sum, cum aliquorum uero filijs ac discipulis rem conuulsi, quorundam uero scripta accepi. Quare quū probe sciam qualiter quisq; ipsorum sentiat, & exactas certitudines nusquam cōpererim, hæc scribere aggressus sum. At uero de aqua inter cutem, & tabidis, & podagris, & his qui à morbo sacro appellato corripiuntur hæc dico, ex aliqua quidem parte de omnibus idem. Nam qui hos morbos congenitos habet, is ægre ab ipsis liberari potest. Reliqua uero singulatim scribam de singulis. Eum qui ab hydropē, siue aqua inter cutem correptus est, & superstes esse uolet, bonis uisceribus præditū esse oportet, ita ut natura se exerat, simulq; facile concoquat, & bene spiret, sitq; sine dolore, & totum corpus æqualiter tepidum habeat, & non circa extremas partes colliquat. Melius est autē ut tumores potius habeat in extremis partibus. Optimum uero est neutrum horum habere. Nam molles ac graciles esse conuenit extremas partes, itemq; uentrē ad contactum mollem. Tussim uero adesse nō oportet, neq; sitim, neq; linguam resicari, tum reliquo tempore, tum post somnos, quādo hæc ualde fieri solent. At cibos libenter accipere oportet, & ubi multum satis comedit, non affligi. Alium uero ad medicamēta quidem celerem habere, reliquo autē tempore egerere recremētum molle efformatum.

Vrinam

Urinam autem apparere cōuenit, pro studiorū rationē, & uinorum mutatione transeuntē. Laborem uero ferre oportet facile, & lassitudinis exortem esse. Ac optimum quidem est hominē ita per omnia dispositū esse, & sic securissime sanus fieri poterit. Sin minus, plurima ex his habeat. Nam spes erit ut superstes euadat. Qui uero nihil horum habuerit, sed contraria, eum desperatū esse scito. Qui autem pauca horū habuerit, quæ bona esse dixi, si hydrope laboranti ad sint, huic exiguæ spes restant. Cui uero multum sanguinis sursum ac deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa aqua repletum iri timor est, atq; hic hydrops breuissimi temporis est, & ex quo paucissimi euadunt. Verum de hoc alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores facti emarcescūt ac rursus attolluntur, hi magis cōualescunt q̄ illi qui ex sanguinis eruptione implentur. Verum fallunt hi hydropes ipsos ægrotos, faciuntq; ut ipsi à medicis discedant ac pereant. De tabescentibus quod ad sputum ac tulsim attinet, eadem dico quæ de pectore suppuratis scripsi. Oportet enim eum qui probe liberari uolet, facile sputū per tulsim reijcere, & id esse album, & æquale, & eiusdem coloris, & ab inflammatione alienū. Quod uero à capite defluit, ad nares conuerti, febrem aut non inuadere, ut ne à cœnis prohibeatur, neq; sitiat. Venter autem egerat quotidie, & id quod egerit sit durum, copia pro ratione ciborum ingestorū. Hominem uero q̄ minime tenuem esse oportet. Pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum. & os ipsius paruū sit, & robuste carnosum. Qui cūq; enim hæc omnia habuerit, maxime superstes erit. Qui uero nihil horū habet, interitui proximus. Qui cūq; uero pectore suppurati facti fuerint, dum iuuenes sunt, ex humorū illapsu, aut fistula, aut alio quopiam humore iuscemodi, aut ex abscessus recurfu, hi nō euadunt, nisi ualde multa bona signa ipsis accesserint. Pereunt aut homines hi ad autumnū. Sed & ex alijs morbis longis pleriq; ad hoc tempus maxime moriūtur. Cæterum ex alijs minime superstitēs manent & uirgines, & mulieres, quibus ex suppressis mēsis tabes oborta est. Si uero aliqua uirgo, aut mulier euasura est, & aliorū signorum bonorū multa accedere oportet, & mēses splendide ac pure apparere, aut nulla spes est. Qui uero ex sanguinis eruptione, pectore suppurati fiunt, & uiri, & mulieres, & uirgines, non minus euadunt. Verum signis omnibus tum suppuratorum, tum tabescētium collectis, & superstitem futurum, & periturū prædicere oportet. Maxime uero euadunt ex sanguinis eruptione, hi quibus dolores sunt atrabiliarij, & in dorso, & in pectore: & qui post eruptionem minus dolent. Nam & tusses non ualde insuper accedunt, & febres pleræq; perseverant, sitim facile ferentes. At reuersiones eruptionis sanguinis maxime fiūt his, si non abscessus succedant. Optimi uero sunt abscessus sanguinolentissimi. Quibus autē, in pectoribus dolores insunt, & per tempus attenuātur, & tulsiant, ac difficulter spirant, neq; febribus insuper corripientibus, neq; suppuracionibus succedentibus, eos interrogare oportet, quū tulsiant & difficulter spirent, an & compactum quiddam & modicū odorem habens tulsiendo reijciant. De podagricis hæc dico. Quicūq; aut senes sunt, aut circa articulos callos tofaceos concretos habent, aut ærumnose uiuūt, ac siccam aluum habent; hi omnes sani fieri non possunt humana arte, quātum ego noui. Sanant quidē hos optime, dynteria si successerint. Sed & alię eliquationes ualde profunt, quæ ad infernos

locos repunt. Qui uero iuuenis est, & circa articulos nondum tofaceos callos concretos habet, & accurate uiuit, & laboris amans est, & aluum bonā habet ad obediendū pro studiorū ratione, hic sanè medicum intelligentiā habentem nactus, sanus fieri poterit. Ex his porro qui à sacro morbo corripuntur, difficillime quidem liberantur hi quibus à puero contigit morbus, & simul ad uilem ætatem peruenit. Deinde hi quibus corpore in uigore ætatis cōstituto factus est, & fuerit à uiginti quinque annis, usque ad annum quadragesimū quintū.

Post hos autē, quibus factus fuerit morbus, nullam significationē præbēs ex qua corporis parte initiū sumat. At quibus ex capite initiū capere uidetur, aut à latere, aut à manu, aut pede, facilius curatur. Verū differunt etiā hæc morbi genera. Qui enim à capite initiū sumunt, ex his grauisissimi sunt. Deinde qui à latere. Qui uero à manibus ac pedibus, maxime sanari possunt. Cæterū horū curam aggredi oportet medicū, qui medendi modum nouit, si homines fuerint iuuenes, & laboris amātes, nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis stupore attonito sideratus fuerit. Nam hæc atrabiliaria mētis emotiones, nō sunt conducibiles. Alij uero qui ad infernas partes cōuertuntur abscessus, boni sunt. Longe uero optimi & hic sunt, qui sunt sanguinolētissimi. Quicūque uero senes apprehēdi incipiūt, maxime moriūtur. Et si nō pereant, statim celerrimeque per se liberantur, à medicis autē minime opem ferunt. At quibus pueris oculi repete distorti fuerūt, aut maius quoddam malū perpessi sunt, aut tubercula sub ceruicē oborta sunt, aut uocem graciliorē adepti sunt, aut tusses sicca diurnæ adherent, aut maioribus factis dolor procedit ad uentrem, & non exturbatur, aut in lateribus distortiones habēt, aut uenas crassas circa uentrē uaricosas, aut omentum descendit, aut testis magnus factus est, aut manus tenuis & impotens, aut pes aut tibia tota clauda facta est, citra aliam causam: his omnibus morbū antea factum fuisse, scire oportet, præ his uniuersis. Et plurimi qui pueros educāt, si interrogētur confitebuntur: quosdā uero etiā res latet, negātque se scire quicquam tale factum esse.

Qui porro de ulceribus cognoscere uolet, quomodo singula finient, eum primum hominum species perscrutari oportet, tum eas quæ meliores sunt ad ulcera, tum quæ deteriores. Deinde ætates nosse, in quibus singula ulcera curatu difficilia existunt. Locos item in corporibus perceptos habere, quantum alijs ab alijs differūt. Sed & alia qualia in singulis accedunt tum bona, tum mala, nosse oportet. Si quis enim omnia hæc nouerit, is sanè sciet etiam quomodo singulorū euentus contingeret. Qui uero non nouerit hæc, nō nosse poterit quales fines ulcerum erūt. Species equidē bonæ sunt hæc. Leues, & cōmodatæ, & bonis uisceribus præditæ, & neque ualde carnosæ, neque duræ. Iuxta colorem uero sit species alba, aut nigra, aut rubēs. Hæ enim omnes bonæ sunt, si puræ sunt. Si uero pallidus color ammixtus fuerit, aut color ipse pallidus aut liuidus fuerit, peius est. Species uero quæ præscriptis cōtrariæ sunt, eas deteriores esse scito. At uero quod ad ætates attinet, tubercula quidē suppurata fiunt, & strumosa hæc plurimos pueros occupāt, & facillime ex ipsis liberantur. Senioribus uero pueris & adolescētibus, minus quidem oriūtur, uerum difficilius ab ipsis liberantur. Viris autē talia quidem tubercula nō ualde fiunt, uerū cæria græcis dicta, ad modum faui concreta, horrenda: & cancri occulti submersi, & ex pustulis nocturnis herpes, donec sexaginta annos transmiserint. Senibus

bus aut nihil talium tuberculorum accedit, uerum cancri & occulti, & summas partes occupantes, & comoriuntur. Caeterum ex locis subalares difficiliore curatu sunt, & laterum mollitudines, ac femora. Nam & morae in ipsis fiunt, & reciduae. Ex articulis periculo maxime obnoxij sunt magni digiti, & praesertim pedum. Quibus aut in obliqua linguae parte ulcus fit diuturnum, in his dentes consistere oportet, an quis iuxta illam ulceris partem acutior sit. Vulnera magis lethalia sunt, quae in uenas crassas in collo ac inguinibus, infliguntur. Deinde quae in cerebrum, & in hepar. Postea quae in intestinum & uescicam. Sunt autem haec omnia perniciose ualde, non tamen ita ut nemo ex his euadat, uelut putatur. Nam & loci qui haec nomina habent, multum inter se differunt, & iisdem modi. Multum etiam differt corporis ipsius hominis structura. Aliquando enim neque febricitat, neque inflammatur fauciat. Aliquando etiam citra causam febricitat, et aliqua corporis pars omnino inflammatur. At quando is qui ulcus habet delirat, & facile fert uulnus, tunc uulnus aggredi oportet, uelut iuxta medicinae & accidentium rationem, euentum habiturum. Moriuntur enim homines ab omni generis uulneribus. Multae enim uenae sunt & tenues, & crassae, quae sanguinem fundentes occidunt, si gliscere ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia temporis occasione si quis pertundat, corporibus prodesse sentiat. Multa uero uulnera in locis uilibus ac non malis esse, & nulla re graui uidentur, & tamen sic dolore affligit plaga, ut respirare non possit. Alij uero praeter uulneris dolore, quod sane graue nulla re erat, spiritum quidem duxerunt, uerum delirarunt, & febrientes mortui sunt. Quicumque enim aut corpus febricitans habent, aut mentem turbatam, talia patiuntur. Sed neque haec admirari oportet, neque formidare, illud expedito, quod & animae & corpora hominum plurimum differunt, & uim maximam habent. Quaecumque igitur uulnera tempus nanciscuntur, aut corpus & mentem huiusmodi, aut ita gliscentem sanguinem, aut magnitudine tanta fuerint, ut homo ad curationem adduci ab eius contemptu non possit, ab his quidem discedere oportet, qualiacumque tandem fuerint, diarijs animi deliquijs exceptis: alia uero omnia aggredi, quae reces sunt incussa, quo & febris effugiatur homines, & sanguinis eruptiones, & nomas ulcerum proserpentes, hi qui euadent. Exactissime uero et ad plurimum tempus, eorum quae grauissima sunt custodia facere oportet. Nam ita facere iustum est. At uero nomae lethalissimae sunt, quarum putredines profundissimae & nigerrimae ac siccissimae existunt. Praeae etiam sunt ac periculosa, quae nigra saniem remittunt. Albae uero ac mucosae putredines, minus quidem occidunt, magis autem reuertuntur, & diuturniores sunt. Herpetes autem minime omnium ulcerum quae depascendo proserpunt, periculosi sunt, uerum maxime difficulter submoueri possunt, quemadmodum cancri occulti. In omnibus autem talibus febrem superuenire una die confert, & pus est albidissimum ac crassissimum. Commodat & corruptio nerui, aut etiam ossis, aut etiam amborum, tum in profundis, tum in nigris putredinibus. Nam in corruptionibus pus multum fluit, & putredines soluit. Porro ex capitis uulneribus lethalissima sunt quae ad cerebrum pertingunt, uelut etiam antea scriptum est. Grauiasunt et huiusmodi omnia. os nudum magnum, os infarctum, os diffraetum. Si uero etiam osculum ulceris paruum fuerit, fissura uero ossis aliquandiu permanserit, periculosius est. Haec autem omnia grauiora sunt, si & iuxta futura sunt, & ex locis semper periculosiores summi in capite existunt. Caeterum in omnibus me-

morabilibus uulneribus interrogare oportet, si adhuc recentes fuerint **plagæ**, aut etiam iactus fuerint, an cōciderit homo, aut an in soporem altiorē collapsus sit. Si enim horū quippiam factū fuerit, ampliore custodia opus habet, nimirū quum cerebrum uulnus tunc perceperit. Si uero non recens sauciatus fuerit, ad alia signa respicere oportet, ac cōsiliū capere. Optimū quidem igitur est, neq; febrile cum qui ulcus in capite habet, neq; sanguinē in super ipsi erupisse, neq; inflammationē, neq; simul ullum aliquem dolorem accessisse. Si uero quid horum apparuerit, securissimum est ut in principio fiat, & modico tempore permaneat. Conducit autem in doloribus, etiam inflammationes ex ulceribus accedere. In sanguinis autem eruptionibus, pus in uenis apparere. Quæ uero in acutis morbis conferre febribus scripsi, ea etiam in his fieri conducit, & eadem hic quoq; bona esse assero, contraria uero mala. At incipere febrem in capitis uulnere quarta die aut septima, aut undecima, ualde lethale est. Iudicatur autem plerisq; si quidem quarta uulneris die febris inceperit, ad undecimam. Si uero septima die febris inchoarit, ad decimam quartam, aut decimam septimam. Si uero undecimo febrile inceperit, ad uigesimalam: quemadmodum in febribus descriptum est, quæ absq; manifestis causis fiunt. Cæterum in principijs febrū, siue delirium accesserit, siue alicuius membri sideratio, periturū hominem sciendum est, si non omnino aut ex optimis signis aliquod accedat, aut corporis uires adsint. Verum cōsiderabis modum. Nam homini adhuc spes salutis, sed claudū fieri articulum in quē incubuit necesse est, etiam si superstes maneat homo. Porro uulnera in articulis, quæ quidem magna sunt, & neruos cōiungentes penitus præsecant, clarū est quod claudos efficiant. Si uero ambiguum fuerit de neruis, quomodo se habeāt, si quidem fuerit acutū telum quod rectū uulnus fecit, melius est obliquo. Si uero graue & obrusum fuerit id quod uulnerauit, nihil refert. Sed plagæ profunditatem & alia signa considerare licebit. Sunt autē hæc. Pus si in super accedat ad articulū, duriorem fieri necesse est. Si uero etiam tumores simul permāserint, hunc locū ad multū tempus durum esse necesse est, & quū sanum iam est ulcus, tumorem permanere necessariū est, simulq; flecti ac extendi, quæcunq; dum articulus incuruus est, curantur. Quibus uero etiā neruus elapsurus esse uidetur, securius de claudicatione prædicere licet, tum aliàs, tum si inferiorum neruorū aliquis fuerit exolutus. Ex his autem cognosces neruum qui excidet. Pus album & crassum, multo tempore defluit, doloresq; ac inflammationes circa articulū in principijs fiunt. Eadē fiunt etiam si os elabetur. At uero dissectiones in cubiti gibbis, præsertim quæ sunt cū inflammatione, ad suppurationē perueniunt, sectionesq; ac uisiones.

Medulla uero spinæ si ægrotarit, siue ex lapsu, siue ex alia aliqua causa, siue sua sponte, homo & cruribus impotens fit, ut neq; si tangatur percipiat, & uentre ac uesica, ut circa prima tempora, neq; stercus, neq; urinam egerat, nisi ad necessitatem. Quum autē uetustior factus fuerit morbus, nō urgente homine, & stercus prodit, & urina. Moritur autem postea, nō multo interposito tempore.

Quod si uero cuiusdam fauces implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, cui neq; caput antea doluit, & qui neq; tussim habuit, neq; uomuit, neq; febre correptus fuit, neq; dolorē habuit, nec pectoris, nec dorsi, huius considerandæ sunt nares, & fauces, an ulcus aliquod habere compareat in hoc loco

co, aut hirudinem. Oculi porro lippientes optime permūtantur, si & lachryma, & sordes, et tumor, simul fieri inceperint. Si uero lachryma sordī fuerit permixta, & non ualde calida: Sordes autem alba fuerit & mollis, & tumor leuis solutus: Si ita hęc se habuerint, oculus cōglutinabitur ad noctes, ut doloris exorsit, atq; hoc modo res minime periculosa fuerit, ac minime diuturna. Si uero lachryma procedit multa & calida, cum paucissima sorde, ac paruo tumore, atq; hoc ex altero oculo tantum, tunc diuturnū ualde fit malum, uerū non periculosum, et doloris exors est hic modus. Et iudicationē in his maxime expectare oportet, primam quidem ad uigesimam diem. Si uero hoc tempus trāsmittat, ad quadragesimam expectāda est. Si uero neq; in his diebus sedetur, in sexaginta iudicatur. Per tōtum autem tempus hoc, sordem considerare oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maxime sub iudicationis tempus. Si enim desinet, hęc faciet. At si utriq; oculi hęc perpetiantur, in maiori periculo sunt, ne ulcerentur. Verum iudicatio breuioris temporis erit. Sordes autem sicce ualde dolorosæ sunt, sed cito iudicantur, si non uulnus acceperit oculus. Si uero tumor magnus fuerit, dolorisq; exors & siccus, periculo uacat. Si uero cū dolore fuerit, malus est si siccus sit, & periculum est ne ulceretur oculus ac conerescat. Sed et grauis est tumor, si lachrymā coniunctam habeat, itemq; dolorē. Si enim lachryma procedit calida ac falsa, periculū est & pupillam exulcerari, & palpebras. Si uero tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, uiris quidem palpebrarū euerisionem prædicere oportet: mulieribus autem & pueris exulcerationem ac euerisionem palpebrarum. At si sordes pallidæ aut liuidæ fuerint, & lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & uigilię his accesserint, necesse est ulcus in oculo factum esse, & timor est: quoq; ut talis rumpatur. Prodest autem febris accedens, aut dolor ad lumbos innixus. Prædicere uero his futura oportet, ita ut respectus & ad tempus habeatur, & ad ea quæ ex oculo fluunt, & ad dolores itemq; uigilias. Postquam uero & oculum contueri datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram prominuerit oculus, malum est & difficile ut sedetur: Si uero & putredo tali suberit, penitus inutilis oculus redditur. At uero alios ulcerū modos prædicere oportet, locos considerando, & putredines, & profunditates. Necessariū enim est iuxta ulcerum uehementiam cicatrices fieri. Quibus igitur rūpuntur oculi, & postea prominent, ut extra locū oculus sit, his & tempore, & arte, opē ferre nō datur, ad hoc ut uideant. Paruæ uero oculorum transmotiones sedari possunt, si nihil mali accesserit, et homo iuuenis fuerit. At ulcerum cicatrices, quibus nihil aliud mali affuerit, omnes & à temporibus, & ab arte, opem ferre posse putandū est, maxime recētissimas, & in iuuenū corporibus. Cæterum ex locis maxime oculi lædūtur, si exulcerantur, deinde pars quæ est supra supercilia, postea quicquid uicinissimum his locis fuerit. Pupillæ uero flauescentes, aut argenti speciem referentes, aut ceruleæ, nō bonæ sunt. His autem paulo meliores sunt, quæ aut minores apparent, aut ampliores, aut angulos habentes, siue ex causis tales factæ fuerint, siue sua spontæ. Caligines & nubeculæ, & cicatrices subalbicantes, leuigātur ac delentur, si nō uulnus aliquod in eo loco accesserit, aut prius cicatricem habuerit in hoc loco, aut unguem pterygion dictū. Si uero

splendicās cicatrix in nigra oculorū parte fiat, partem aliquam nigredinis dealbat, adeo ut si multo tempore permaneat, & aspera & crassa, etiam memoriam sui relinquat. Porro iudicationes quemadmodū in febribus scripsi, ita & hic se habent. Verum signa edoctū, iuxta differētiās lippitudinū prędictionem facere oportet, quū pessima signa accesserint, diuturnarū lippitudinū, uelut de singulis perscriptū est: quū uero apparuerint optima signa, breuiū. Tunc enim septima die desituras esse prędicendū est, aut prope hoc tēpus, & alioqui securas esse putandum est. Reciduias autē expectare oportet his, quibus melius habere contingit, neq; in diebus iudicatorijs, neq; signis bonis cōspectis. Omnium uero maxime urinę statū in oculorū affectionibus cōsiderare oportet. Nā temporū occasiones repentinę sunt. Dysenterię si quidē cum febre inuaserint, aut uarijs alui egestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut pręcordij, aut uētris: aut quę dolorosę fuerint, aut cibos intercipiūt, sitimq; inducūt: hęc omnes malę sunt. Et qui sanē plurima horū malorū habuerit, citissime peribit. Cui uero paucissima talium affuerint, huic plurimę spes sunt. Moriūtur autem ex hoc morbo maxime pueri quinquennes, & seniores adhuc, decēnes. Reliquę uero ætates minus. At quę dysenterię cōmodę sunt, hęc mala hęc non inducūt. Verū sanguine & ramētis egestis, desituerūt septima die, aut decimaquarta, aut uigesima, aut quadragesima, aut intra hęc tēpora. Huiusmodi enim egestiones, etiā eos qui prius sunt in corporibus, morbos sanāt, antiquiores quidē diutius re tēpore, recentiores autē in paucis diebus submouere possunt. Nam & quę ueterum gestant, etiā ipsę euadunt superstitēs magis ad partū, & ex partu, & foetus cōseruant, sanguine & ramētis egestis, etiā per multos mēses: nisi dolor ipsius affuerit, aut aliud quoddā malum signū ex his quę in dysenterijs fieri scripsi, accesserit. Si uero aliquod illorū apparuerit, & foetui perniciē significat, & pręgnanti periculū, si nō post foetus effugiū, & secūdę exolutionē, ipsa dysenteria eadem die, aut post modicū tempus desinat. Leuitates porro intestinorum, henterię gręcis appellatę, quę quidē sunt cōtinuę & diuturnę, & per omnē horam, & cū strepitibus, & sine strepitibus exturbātur, & similiter noctu ac interdiu incumbentes, & egestione subeunte aut ualde cruda, aut nigra & leui ac graueolente: hęc omnes malę sunt. Nam & sitim inducunt, & potum nō ad uescam promouēt, ut per urinam eijciatur, & os exulcerāt, & ruborem eleuatum in facie efficiūt, & maculas solares uarios colores habētēs. Simul autē & uentres emollitos, & sordidos ac rugosos reddunt. Ex talibus autē homines impotētes fiunt, ad cibū capiendum, ad deambulandū, ad faciendū alia quę facere debēt. Estq; morbus hic grauissimus senioribus. Vehemens est etiam uiris. Reliquis autē ætatibus multo minor. Quisquis autē neq; in ætatibus his est, quas male tractari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex signis habet, quę mala esse scripsi, hic securissime dispositus est. Indiget autem curatione hic morbus, donec & urina pro ratione eius quod in potu acceptū est, procedat, & corpus ab ingestis cibis augmentū capiat, & a malis coloribus liberatū fuerit. At uero alia profluentia alui, quę sine febre sunt, & breui tēpore durant, & mitia existunt. Aut enim eluta sedabūtur, aut sua spēte. Prędicere autē oportet excretionē subtus erumpentē desiturā esse, quum tangētū uentrem manu nullus motus occurrerit, & in sine egestionis flatus penetrarit. Sedes autē euertuntur ac procidunt, uiris

uiris quidē, quos ubi hēmorrhoidas habent,alui profluuiū corripit: pueris autē calculo laborantibus, & in dyfenterijs longis ac meracis: Senibus uero quibus mucī agglutinati infunt. Porro ex mulieribus, quæ magis aut minus in utero cōcipere solent, ita considerationē facere cōuenit, primū quidem specierū, Paruæ enim ad cōceptionem præstantiores sunt maioribus, tenues crassis, albæ rubicūdis, nigræ liuidis. Quæ item uenas conspicuas habent, meliores sunt quæ quibus nō apparent. Carnē autem uberiorē habere, aniculæ malū est, mammas aut tumidas ac magnas, bonū. Atq; hæc quidē ad uisum exposita sunt. Verum interrogare oportet etiam de mensuris purgationibus, an omnibus mēsi- bus cōpareant, & an copia fatis magna, & an boni coloris sint, & æquales in sin- gulis temporibus, & in iisdem mēsi diebus. Sic enim has fieri oportet. Lo- cum uero in quo cōceptio fit, quem sanē uterū nominamus, sanū esse oportet, & siccū, ac mollem. Sit item neq; retractus, neq; pronuus, neq; os ipsius sit auer- sum, neq; cōcluium, neq; euersum. Fieri enim nō potest ut cōceptio fiat, quod- cūq; tandem taliū impedimentorū affuerit. Quæcūq; igitur mulieres in utero cōcipere nō possunt, uerū pallidæ apparēt, neq; febre, neq; uisceribus in causa existētib; hæc capite se dolere dicēt, & mēses sibi male ac meracos prodire. Si- ue aut breui, siue longo tēpore, ipsis sic affectus mēses non cōparuerint, uteri in his purgatione opus habēt. Quæcūq; uero bene coloratæ sunt, & carnē multā ac pinguē habent, & uenulas occultatas, & dolore carēt, & mēses his aut omni- no nō apparent, aut modici & meraci prodeunt: Hic modus difficilissimus est ad cogendū ut concipiant. Si uero mensibus cōparentibus inculpatæ, & mulier sic corpore disposita fuerit, & non cōceperit, locus in quo est uterus in causa est, ut fecūda foetu fieri nō possit. Aut enim reuulsus est, aut euerfus. Nā & alia quæ isthic fiūt, cū doloribus decoloratione q; ac colliquatione fiūt. Quibus porro ul- cus factū fuerit in utero, siue ex partu, siue ex tuberculo, siue ex alia quadam cau- sa, his febres & inguinū tumores succedere necesse est, et dolores in his locis. Si uero & puerperij purgamēta simul fuerint intercepta, hæc mala si fuerint, o- mni- no meraciora sunt & diuturniora. Et ad hæc præcordiorū ac capitis dolores. Ulcere autem facto & sanato, locum hunc leuiorē ac duriorē fieri necesse est, & minus concipere posse. Si uero solum in sinistra parte fiat ulcus, & mulier in utero concipiat, siue dum adhuc habet ulcus, siue ubi iam sana est, masculū ma- gis enixurā esse spes est. Si uero in dextra parte ulcus fiat, & mulier cōcipiat, foe- mineū magis fore foetum expectandū est. At si febres corripiant cōcipere non- potentē, & attenuata sit muliercula, interrogare oportet, an uteri ulcus aliquid habeant, aut aliud quippiā ex malis de quibus scripsi. Si enim in hoc loco nihil mali subesse apparuerit, quod causa sit attenuationis, & quod cōcipere nō possit, sanguinē uomiturā esse mulierē expectandū est, mēses autem tali necessario euauerunt. Si uero febris soluta fuerit à sanguinis eruptione, & mēses compa- ruerint, in utero cōcipiet. Si uero priusquā sanguis erūpat, alui excremēta liqui- da facta fuerint prauo modo, periculū est periturā esse mulierē antea quæ sangui- nem uomat. Quæcūq; in utero se cōcepisse putāt, & non cōceperunt, & per multos mēses falluntur, mēstruis purgationibus nō apparētibus, & uētres au- geri ac moueri uident: hæc & caput dolēt, & collū, & præcordia, & in māmīs lac ipsius nō est, nisi modicū quiddā, atq; id aquosum. Postq; uero uētris tumiditas

exoluta fuerit, ac molles factæ fuerint, in utero concipient, si nō aliud quoddam impedimentum ipsis fiat. Nam hæc affectio bona est ad mutationem in utero faciendam, ut post hoc tempus in utero concipiant. At his quæ cōceperunt, dolores hi non fiunt, nisi familiares his fuerint capitis dolores, & lac in māmīs gignitur. At uero eas quæ à diuturnis fluxionibus uexantur, interrogare oportet an caput doleant, & lumbos, & infernā uentris partem. Interrogandæ sunt etiam de dentium stupore, & uisus hebetudine, & aurium sonitu. Quæcūq; autem dum ieiunæ sunt, subbiliosa uomunt per multos dies, quū neq; uterum gestent, neq; febricitent, eas interrogare oportet an lumbricos rotundos simul uomāt. Si enim hoc nō confitētur, prædicendū est ipsis futurū esse. Fit autē hic morbus maxime quidē mulieribus, deinde uero etiā uirginib; alijs autē hominibus minus. Quibuscūq; uero sine febris dolores fiūt, mortē quidē non inducūt, uerum pleriq; diuturni sunt, & multas mutationes ac reciduias habent. Modi autē hi sunt. Primum quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leues, aliqui multo grauiorēs. Utrosq; uero hoc modo cōsiderare oportet. Quicūq; hebetem uisum habent, & rubor quidam ipsis fit in oculis, & pruritus frontem uexat, his sanguis sua sponte manans opitulatur. Atq; hic modus necessario simplex est.

Quibus uero dolores circa caput & frontem, ex magnis uentis fiunt, & ex frigidibus quū uehementer calfacti fuerint, eos grauedines quidem maxime perfectæ liberant, profunt autē & sternutationes, & mucī in naribus fientes, magis quidem sua sponte, sin minus, coacte. Grauedines autē fiunt perfectæ, adeo ut & tusses succedant, & sternutationes succedentes si dolores non sedauerint, necesse est tubercula & decolorationes his succedere. Quibus autē dolores sine manifestis causis fiūt, & diuturni, & in toto capite, suntq; ipsi & graciles, & debiles, his prædicendū est morbū longē grauiorē priore esse. Si uero etiā ad colulum, & ad dorsum dolor descendat, caput relinquens, & rursus ad caput recurrat, adhuc grauior fit. Verū omnium horū grauisimus est, si ex capite ad collū ac dorsum tendat. Utilitates autem his ex abscessibus fore expectandū est, aut ubi pus per tussim retecerint, aut hæmorrhoidas habent, aut pustulas in corporibus enatas, Confert etiā caput surfures habens.

Torpores & puncturæ pruriginosæ uelut ab urtica, quibus per caput discurrunt, aliquādo per totum, aliquādo per aliquam partē: Sæpe uero & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putatur, uelut per caput discurrere, hos interrogare oportet, an etiam ad summam linguā punctura illa procedat. Si enim hoc fecerit, perfectus morbus fit, & qui difficilius submoueri possit. Verum absq; hoc facilis est. Modi uero utilitatū consequendarū ex abscessibus cōtingent, ueluti antea scriptū est. Sed tamē abscessus minus in his succedūt, quā in illis. Quoscūq; uero unā cum doloribus uertigines corripiunt, malum egre exolubile ac furiosum existit. Senibus autem maxime hic modus fit. At alij morbi circa caput, & uiris, & mulieribus, cum securitate uehemētissimi sunt, & diuturniores. fiunt autem & adolescentibus, & uirginibus in ea pubertatis ætate, & maxime circa mensium progressum. Mulieribus uero in capitis doloribus, alia quidem omnia fiunt, quæ & uiris. Verum puncturæ illæ pruriginosæ & affectiones atrabiliaria, his minus quā uiris, si non menses penitus aboliti fuerint. Quibus colores dum iuuenes sunt, prauī sunt ad multum tempus, & continenter, non tamen morbi

regij modo: hi siue uiri sint, siue foeminae, caput dolent, & lapides ac terram comedunt, & haemorrhoidas habent. Pallidi uero cum uirgine colores qui diurni sunt, & morbus regius uehemens non est, alia quidem eadem facere solent, uerum pro lapidum ac terrae esu, praecordia hos magis affligunt quam alteros.

Quicumque uero multo tempore pallidi apparent, & facies in tumore eleuatas habent, eos caput dolere sciendum est, aut circa uiscera dolorem habere, aut in sede malum aliquod in seipsis. Ex his autem apparentibus, plerisque non unum aliud quod horum malorum apparet, sed plerumque multa, aut etiam omnia. Qui nocte uident, quos sane nyctalopas uocamus, hi morbo corripiuntur iuuenes, aut pueri, aut etiam adulescentes, & liberantur sua sponte, aliqui in quadraginta diebus, aliqui septimo mense, quibusdam uero & per totum annum permansit. Quapropter de tempore coniectare oportet, ita ut & ad morbi robur, & ad aegritatem respicias. Abscessus autem his profunt insuper apparatus, & ad infernas partes fluentes. Verum non ualde accedunt, propter iuuentutem. At mulieres non corripiuntur ab hoc morbo, neque uirgines quibus menses comparent. Quibus autem lachrymarum fluxiones diurnae fuerint, & hi nyctalopes sunt, eos interrogare oportet an caput doluerint antea quam haec reuelarunt. Quicumque dum neque febricitant, neque decolores sunt, saepe & uerticem & tempora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum in facie, aut grauius loquantur, aut dentes doleant, his sanguinem per nares erupturum esse expectandum est. Quibus uero ex naribus sanguis fluit, hi alioqui sani esse uidentur, hos autem uel splenem in tumore eleuatum habere conperies, uel caput dolere, & splendicans quiddam ipsis ob oculos obuoluitur. Plerisque uero horum simul & caput & splenem, hoc modo se habere apparent. Gingiua uitiata, & ora graueolentia his sunt quibus splenes magni. Quicumque uero habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neque oris graueolentia, horum tibiae ulcera praua habent, & cicatrices negras. Quibus partes sub oculis uehementer attolluntur, eos magnos habere lienes conperies. Si uero etiam in pedibus tumores accesserint, aqua etiam habere uidebuntur. Verum & uentrem, & lumbos inspicere oportet. At uero distorsiones in facie, si nulli alij corporis parti comunicent, cito sedantur, aut sua sponte, aut ad necessitatem coactae: reliqui uero syderati sunt. Quibus una cum hoc quod mouere non possunt, morbosa corporis pars attenuatur, hi in sanitatem restitui non possunt. Quibus autem colliquationes non accesserint, hi sani euadent. Caeterum de tempore quando sani erunt praedicandum est, respectu habito ad uim morbi, & ad tempus, & ad aetatem hominis, & ad anni tempus, ita ut eius rei memor sis, quod uetustissimi morbi, & pessimi, & qui reuoluuntur, grauisime obediunt: itemque hi qui sunt in uetustissimis corporibus. Sed & autumnus & hyems, ad tales morbos submouendos minorem commoditatem exhibent quam uer & aestas. Dolores porro in humeris fixos, qui quidem ad manus descendunt, torporesque ac dolores inducunt, his abscessus non succedunt, uerum nigram bilem uomentes sanantur. Qui uero isthic in humeris manent, aut etiam ad dorsum progrediuntur, eos puris, aut atrae bilis uomitu effugiunt. Verum de his ita considerationem facere oportet. Si quidem enim facile spirauerint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos uomituros esse spes est. Si uero difficilius spirauerint, & in faciem ipsis color incurrit

rit, qui prius non erat, siue rubicundus siue niger, eos magis pius sputuros esse sperandum est. Ad hæc uero considerandum est etiam, an in pedibus tumores sint. Nam & hoc signū in his cōsentit. Atq; hic morbus uiris uehementissimus esse solet; à quadragesimo anno usq; ad sexagesimum. Qua ætate etiam coxendicū morbus maxime affligit. Porro de coxendicū morbo sic considerationē facere oportet. Quibuscūq; senioribus & torpores uehementissimi sunt, & perfrigerationes tum lumborū, tum crurum: & qui pudendū arrigere nō possunt: & quibus aluus nō egerit, nisi ad necessitatē coacta, & prodit ipsis multus stercoreaceus mucus: his maxime diuturnus morbus erit, prædicendūq; est annum ut minimū duraturum esse morbū, ab eo tempore quo incepit, & opem ad uer & ætatem expectādam esse. At uero iuuenibus nō quidem minus doloris inducit coxendicū morbus, uerū breuior est. Nam quadragesimo die liberantur: Sed neq; torpores uehementes accedunt, neq; perfrigerationes crurū ac lumborum. Quibus autem hic morbus est quidē in lumbis ac cruribus, non autem affligit ad eō ut decumbant, cōsiderare oportet an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur. Si enim ambo hæc habet, diuturnus fit morbus. Interrogandū insuper est, an in femore torpores in sint, & ad poplitem progrediantur, & si hoc cōfiteatur, rursus interrogandū, an & per tibiā ad summū pedem procedant. Quicūq; enim plerāq; horū confelsi fuerint, his dicendū est, quod crura ipsis aliquādo calida, aliquando frigida fiant. Quod si morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes uertatur, eos cōfidentes esse iube. Quibuscūq; uero coxas & lūbos non relinquēs, ad supernas partes cōuertitur, malum id esse prædicēdum est. At quibus circa articulos dolores fiunt, & tumores, & sedantur, nō podagrico modo: in his cōperies uiscera magna, & in urina subsidentiā albam. Et talis si tempora eleuarit, dicit se sæpe dolere, dicit etiam sudores sibi nocturnos oboriri. Si uero neq; in urina subsidet talis subsidentiā, neq; sudores fiunt, periculū est ne aut claudicant articuli, aut affectio abscessus humore melli similis, quem melicerida uocāt, sub ipsis nascatur. Fit autem hic morbus his quibus in puericia & iuuentute sanguis ex naribus fluere solitus desit. Proinde interrogandū est de sanguinis eruptione, an in iuuentute facta fuerit: & an pruriginosa uelut ab urtica pūcturæ, & in pectore, et in dorso insint: et quibus alui dolores fortes inducant, citra exturbationes: & quibus hæmorrhoides fiant. Hoc enim horum morborum principium est. Si uero etiam malo colore præditi sint hi homines, interrogandū est an caput doleant, Hoc enim fatebuntur. Quibus uero ex his alui dolores in dextris fuerint, dolores his uehementiores fiunt, & præsertim quū ad præcordium iuxta hepar, reliquæ doloris fuerint. His autē doloribus prodest strepitus statim in aluo obortus. Postquam autē dolor quieuerit, urinā crassam ac cum uirore pallidam mingūt. Atq; hic modus nequaquā lethalis est, uerū ualde diuturnus. Quū autem iam uetustus fuerit morbus, homines ab ipso cæcutiunt. At de sanguine interrogare oportet, an in iuuentute fluxerit, & de uisus hebetudine, & de urinæ euacuationis pallore, itemq; de strepitibus an insint, & succedentes profint. Hæc enim omnia fatebuntur. Impetigines & lepræ, & uiriliginēs albæ, leucæ appellatæ, quibus quidē iuuenibus aut pueris aliquid horum factum est, aut paulatim conspectum in multo tempore augetur: his

his non putare oportet abscessum esse, eam papularum eruptionē, sed morbum. Quibus uero horū aliquid factū est multum & derepēte, hoc sanè fuerit abscessus. Fiunt autē leuca quidem ex lethalissimis morbis, qualis est & morbus tabidus appellatus. Leprae uero & impetigines, ex morbis ab atra bile factis. Ex his autē facilius sanantur ea quae in maxime iuuenibus fiunt, & quae recētissima sunt, & in mollissimis ac carnosissimis corporis partibus producuntur.

HIPPOCRATIS COI COA

CAE PRAENOTIONES, IANOCOR-
nario Medico Physico interprete.



VI ex rigore perfrigerantur, caput ac collum dolentes, uoce destituti, insuper exudantes, postquam se recollegerint moriuntur. Molestē ferre morbum cū perfrigeratione, pessimum est. Perfrigeratio cū duricia perniciosa est. Ex perfrigeratione, timor, & tristitia praeter rationē, in conuulsionem finit. Ex perfrigeratione urinas intercipi pessimum est. Ignorantia cū rigore, malum. Malū item obliuio. Soporosi rigores aliqua tenus perniciosi, & flammeus in facie color, cū sudore, in his malignus est. In his frigiditas posteriorū partium conuulsionem accersit. Et in summa, posteriorū partium frigiditas, cōuulsoria est. Ex dorso horrores frequentes, & cito transeūtes, aegre tolerari possunt. Urinae enim interceptionē dolorosam significant. Insuper exudare, his pessimum est. Rigor cōtinenter uexans, corpore iam debili existente, lethalis est. Qui frequēter exudant, ac insuper rigent, perniciosum hoc est, & in fine suppurationē habere comperiuntur, uentresq; perturbatos. Rigores ex dorso molestiores sunt. Qui uero decima septima die rigore habuit, & quarta ac uicesima insuper riguerit, malignum hoc est. Horrore affecti, caput dolentes, exudantes, malignū id est. Horrore affecti, multū insuper exudantes, difficili malo implicātur. Rigores multi torpidi, maligni sunt. Quibus sexta die rigores fiunt, hi aegre iudicātur. Quibus sanis horrores frequētes sunt, hi ex sanguinis fluxione suppurantur. Horror & spirandi difficultas in doloribus, signa tabis sunt. Ex pulmonis suppuratione, & circa uentrē aliquando ac clauiculae dolores, & anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat. Horrore affecti, anxij, delassati, lumbos dolentes, aluos humectas habent. Affectio nes insuper rigentes, & quae ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum uigilijs ac delirio in somnis, aliquādo urinas inuoluntarie emittentes, in conuulsionem desinunt. Continui rigores in acutis, praui sunt. Ex rigore, cum capitis dolore exolutiones, perniciosae. Cruentae in his urinae pravae. Rigor cū distentione neruorū in posteriora occidit. Qui in horruerūt & exudarūt iudicatorio modo, & postridie praeter rationem horruerunt, si quis nō uigilijs infestetur, neq; concoxerit, ei sanguinē erupturū esse puto. Urinae cū rigore suppressae, male et cōuulsoriae, tū aliās, tū si quis antea graui sopore pressus fuit. Spes autē in his est abscessus retro aures fore. Rigores uelut in febre tertiana, si in media inordinata febre exacerbentur, ualde maligni sunt. Si uero contrario conuel-

conuellentibus modo exacerbentur, cum rigore & febre, perniciosum est. Vocis interceptiones ex rigore, soluuntur tremore: Et insuper rigentes tremores succedentes iudicant. Qui ex rigore cum capitis dolore exoluuntur, in periculo uersantur. Cruenta urina his mala est. Quibus rigor, his urinae suppressio. Conuulsio in febre, manuum ac pedum dolores, maligni sunt. Malignus est & doloris ex femore progressus. Neque genuum dolor bonus est. Sed & surarum dolores maligni sunt, mentemque emouent, tum alias, tum si urinae subsidencia in medio innatet. Febres ex praecordiorum dolore malignae sunt, sopor in his pessimus est. Qui frequenter exudare cum praecordij intensione non cessant, plerumque maligne habent, & dolores in summum humerum ac claviculam incumbentes, in his prauis sunt. Febres tertianae naturam referentes, cum anxietudine, malignae sunt. Vocis interceptiones in febre malae sunt. Lassati, caligantes, uigilantes, soporosi, exudantes, recalescentes, male habent. Lassati cum horrore si exudarunt iudicatorio modo, recalcati in morbo acuto, male habent, tum alias, tum si circa haec sanguis de naribus stillarit. E regio morbo abunde colorati, moriuntur, alba uero alui egestio in his praecedit. Febres tertianae naturam referentes erroneae, in pares dies translapsae, difficiles sunt. Anxietudines in diebus iudicatorijs, si in his sine sudore perfrigerentur, & omnes qui sine sudore perfrigerantur citra iudicationem, male habent. Et qui insuper riguerunt ex his, ubi uomuerunt meraca, anxij, tremuli in febre, malum. Qui ex rigoribus, paruis sudoribus perfrigerantur, malum. Exudantes, uigilantes, recalescentes, malum. Qui insuper exudant in febre, maligne habent. Quibus biliosa est alui egestio, his circa pectus morsus & amaritudo, malum est. In febribus inflata aluo, flatulentus non erumpere malum. Lassati, singultientes, stupore detenti, mali.

Prater consuetudinem quid facere, uelut est, proponere sibi aliquid, & expectare aliquid, prius non consuetum, aut contrarium, malum est, & mentis emotioni proximum. Qui morbi in malis signis leuantur, & qui in bonis non remittunt, difficiles sunt. Qui exudant, & maxime capite, in morbis acutis submoleste ferentes, malum, tum alias, tum si urinae sunt nigrae & turbidus spiritus in his malus. Extremae partes si in utraque partem cito transmutentur, malum est, Sed & sitis huiusmodi mala est. Ex moderato ferox responsio, malum. Vox acuta, malum. Praecordia his intro trahuntur. Qui ex perfrigeratione sudorosa cito recalescunt, malum. Qui in acutis exudant submoleste ferentes, malum. Qui praeter rationem nulla existente uasorum euacuatione, impotentes fiunt, malum. In febre tractus uelut a uomitu, in creatio nem definens, malum. Torpor in utraque partem cito translabens, malum.

Sanguinis stillae pusillae, mala. In acuto morbo sitis praeter rationem soluta, malum. Qui ad manum exiliunt, male habent. Quibus cum febre ardente, tumores somnolenti, torpidi fiunt, his dolor in latus superueniens leuis siderationis ac resolutionis modo occidit. Suffocatio in acutis, aegris at tenuatis, perniciofa. In perniciosis iam parui tremores, & uomitus aruginosus. Qui in potibus substrepunt, & submurmurant in siccis, & qui difficulte deglutiunt spiritu tussiente, perniciose habent in acutis perfrigeratis.

Rubores in manibus ac pedibus, perniciosi. Efflares & refracti, in somnis leuiter

leuiter suspicientes, morbo regio abunde colorati moriuntur, alba alui egestio in his praecedit. In febribus mentis emotiones taciturnae, in eo qui uoce priuatus non est, perniciosae sunt. Liuores fientes in febre, breui mortem affore significant. Quibus in febre dolore lateris fiente, aluus multa aquosa ac biliosa egerit, hi alleuantur. Quibus uero inediae consequenter accedunt, ac sudores, cum bono faciei colore, & aluo liquida, ita ut adsit etiam aliquis cordis, seu potius oris uentris dolor, hi ubi longius aegrotarunt, peripneumonicorum modo moriuntur. Febrienti si atra bilis in principio, sursum aut deorsum prodierit, lethale est. Qui cum perfrigerationibus, non sine febre, superne exudant, moleste ferentes & phrenitici, in acuto morbo perniciosae habent. Dolores modice acuti, ad clauiculam ac sursum transeuntes, perniciosi. In longis perniciosis morbis, sedis dolor lethalis est. Si debiliter iam affecti, non uideant, aut non audiant, aut labium, aut oculus, aut nasus ipsis distorqueatur, lethale est. In febribus inguinis dolor, morbum diurnum significat. In febribus iudicationes impeditae ac sublatae, temporis quidem diurnitatem inducunt, non autem perniciosae sunt. Febres ex doloribus uehementibus diurnae. Mentis emotiones tremulae, palpatoriae, phreniticae sunt, & dolores circa suram, in his mentem emouent. Quicumque in febre continua, uoce destituti iacentes, oculis coniuuantes nictant, hi si postquam sanguis ipsis ex naribus fluxit, & ubi uomuerunt loquantur, & ad seipsos redeant, seruantur. Si uero haec non fiant, difficulter spirantes facti breui moriuntur. Qui melius habuerunt, si postridie exacerbentur, malum est. Si tertia die cohibiti, quarta exacerbentur, malum est. Num & tales exacerbationes phreniticae sunt? Quibuscumque desinunt febres, non in diebus iudicatorijs, his reciduae fiunt. Qui in principio tenues, cum capitis pulsu, & urina tenui, ad iudicationem acerbantur, his nihil miri est si & mentis emotio insuperque uigiliae accedant. In morbis acutis, motus, iactatio, somnus turbulentus, quibusdam conuulsionem significat. Turbulentae cum ferocia excitationes mentem emouentes, malae sunt, itemque conuulsoriae, tum alias, tum cum sudoribus. Conuulsoriae etiam uidentur colli ac dorso perfrigerationes, immo etiam totius corporis. In his mictiones sunt pelliculosae. Deliria cum sopore, conuulsoria. Mentis emotiones, modice feroces, ferinae sunt, sed & conuulsiones significant. In morbis longis, uentris praeter rationem tumores, conuulsorij. Affectiones statim turbulentae, uigilias inducentes, sanguinem de naribus stillantes, sexta die alleuantes per noctem, uerum postridie rursus affligentes, exudantes in somnum delatae, mentem emouentes, large sanguinem fundunt, & morbos soluunt, Aquosa urina talia significat. Qui cum relatis, ab atra bile mente moti, tremuli fiunt, maligne habent. Delirium in spiritu & sudore, lethale est. Lethale est & in spiritu ac singultu. Infomnia in phrenitide euidencia bona sunt. In phrenitide egestiones alui albae, & torpor, malum, Rigor his pessimus est. In phreniticis in principijs affectiones mansuetae, ac frequenter transmutationem habentes, male sunt. Quibus ab atra bile mente motis, tremores fiunt, malum est. Qui ab atra bile mente moti, tremuli fiunt, ac saliuam fundunt, num sane phrenitici sunt? Mente moti, acute insuper febrientes, phrenitici fiunt. Phrenitici paru bibentes, strepitum ualde percipientes, tremuli, aut conuulsi. In uehementer phreniticis

niticis, tremores lethales sunt. Deliria circa necessaria, pessima. Quæ ex his exacerbantur lethalia sunt. Mentis percussiones, uoce clangorosa, linguæ conuulsiones tremulæ, & uoces tremulæ fientes, mentē alienāt. Duricies in his perniciofa est. Prædebilitatorū deliria pessima. Affectiones in phreniticis frequenter transmutationē habentes, cōuulsoriae, prauæ. Phrenitici cum perfrigeratione saluam fundentes, uomitum nigrū indicant. Qui uarie ægrotant, & frequenter soporosi mente mouentur, his nigrū uomitum expectandum esse dicito. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, stupefactoria sunt. Tumores iuxta aurē, in morbis lōgis parui sunt: Sanguinis fluxiones ac uertigines in super apparētes, perniciofa. Febres uertiginosæ, & cū uoluulis, & sine uoluulis, perniciofa. Anhelosis febris postea acuta. Cū præcordio intēto perfrigeratis, magnus circa aurem tumor. Quibus in febre dolores circa lumbos & infernas partes fientes, septū transuersum contingunt, infernas partes relinquētes, perniciosi sunt, tum aliàs, tum si aliud quoddam signum prauum accedat. Si uero alia signa nō fuerint praua, suppuratum fore timor est. Pueris febris acuta, & aluus suppressa, cum uigilijs, & calcitrare, et colorem mutare, & ruborem habere, cōuulsorium est. Affectiones statim turbulentæ, uigilias inducentes, & nigra compacta egerētes, partim sanguinem fundunt. Affectiones cum uigilijs & anxietudine repentina, sanguinem fundunt, tum aliàs, tum si quid etiā antea profluxerit. Num & qui modice perfrigerati postea horruerunt: At qui circa exacerbationes tussiuūt, & parum exudant, maligne habent. Ad latus dolore ac suffocatione accedente, hi suppurantur. Quibus in febribus continuīs pustulæ per totum corpus erumpunt, lethale, si non purulentus abscessus fiat, maxime autem circa aurem his fieri solet. In morbo acuto externas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sitire, malum est. Febres cōtinuæ per tertiam diem augescētes, periculosa. Quibus febris aliquando intermittit, periculo uacat. In febribus longis, aut tubercula, aut dolores, in articulis fiunt: & si facti fuerint, non sunt inuiles. Capitis dolor in morbo acuto, præcordiū reuulsum, non profusente ex naribus sanguine, ad phrenitidem deuenit. Febres typhicæ, bilis sursum ac deorsum effusione non accedente, non soluuntur. Morbus regius ante septimum diem accedens, malum. Septimo uero ac nono, & undecimo ac decimo quarto, iudicatorius est, si non præcordia induret: sin minus, ambigua res est. Frequētes per eadem recidiuæ, circa iudicationē sanguinolentæ, nigrorum uomitum faciunt, fiunt autē & tremulæ. Dolores qui in tertianis febribus exacerbantur, tertianarū generis morbum faciunt, & grumofum sanguinem egerunt. In febribus secundū uenam quæ est in collo, pulsus ac dolor, in dysenteriam desinit. Color qui sæpe in calore trāsmutatur, utilis est.

In biliosis spiritus magnus, & febris acuta, cū præcordij intensione, iuxta aurem abscessum facit. Qui ex morbis lōgis se refocillātes bene cibū accipiūt, & nihil proficiūt, hi maligne recidiuā incidūt. Quibus in febribus uenæ in tēporibus pulsant, et facies sana est, et præcordiū nō molle, diurnū morbum significat, & nō desinentē citra multi sanguinis ex naribus fluxū, aut singultum, aut cōuulsionē, aut coxendicū dolorem. In febre ardente si aluus eruperit, mortale est. Ex alui dolore laborioso, febris ardens, perniciofa. In febribus

febris ardentibus, si aurium sonitus accedant, cum uisus hebetudine, & grauitate secundum nares, melancholico modo ab atra bile mente mouentur, sanguine ipsis non erumpente. Tremores in febribus ardentibus, mentis percussio soluit. In febre ardente fluxio sanguinis ex naribus, quarta die, mala est, si non aliud quid boni coinciderit. Verum quinta minus periculosa est. Qui ex febribus ardentibus aliquantulum perfrigeratibus, cum egestionibus alui aquosis ac biliosis laborat, oculis malum est, tum alias, tum si stupidi fiant. Febris ardens rigore superaccedente soluitur. Febres ardentes recidiuare solent, & ubi per dies quatuor significationem de se praebuerunt, postea exudant. Sin minus, septima die. Febres ardetes quatuordecim dies diiudicant, aut alleuantes, aut perimentes. Ex febre ardente, abscessu purulento circa aurem non fiente, non ualde seruantur. Lethargici, tremuli ex manibus, somnolenti, discolors, tumidi, pulsibus tardi sunt, & partes sub oculis eleuatas habent, et sudores insuper accedunt, & aluus biliosas, & intemperatas subtumidas habent. Si uero ob aridas habuerint, urinae & egestionis alui latenter ipsis progrediuntur, urina uelut iumentorum est, potum non expetunt, neque aliud quicquam. Postquam uero resipuerint, collum dolorosum se habere dicunt, & sonitus per aures transire. Qui uero ex lethargicis seruantur, plerumque pectore suppurati fiunt. Quibuscumque in febribus tremores circa iudicationem cessant, his temporis progressu abscessus dolorosus suppuratus in articulos fit, & uesica dolorosa. Febricitibus quibus rubores sunt in facie, & dolor capitis fortis, et uenarum pulsus, his sanguinis fluxio plerumque contingit. Quibus autem cibi fastidia sunt, & oris uentriculi morsus, & multum saliuarum, his uomitus fit. Quibus uero ructus adfunt, & flatus, strepitus ac eleuationes uentris, his fit alui exturbatio. Qui diutius secure ex febre continua laborant, citra dolorem aut inflammationem, aut aliam causam, his abscessus expectandus est cum dolore ac tumore, & magis in infernis partibus. Expectare autem oportet abscessus, his magis qui trigessimum annum egressi sunt, & tunc expectare abscessus oportet, ubi uiginti dies febris transmiserit. Senioribus autem minus fiunt, & ubi multo tempore febres durant. At intermittentes & erroneo modo inuadentes, autumno maxime in quartana leniter transeunt, & hoc magis his qui triginta annos excefferint. Abscessus autem hyeme magis fiunt, & tardius desinunt, & minus recurrunt. Quibus uero saepe recidiua contingit, his si semestris tempus transmiserint, tabes coxendicum leniter accedit. Quaecumque signa febris se opponunt, & non abscessus significationem habent, maligna sunt. Febres quae nec in diebus iudicatorijs, nec post solutoriū signum decesserunt, recidiuam.

Acuti morbi in diebus quatuordecim iudicantur. Tertianae exquisita in quinque aut septem circuitibus, aut ad summum in noue iudicatur. Quibus febris incipientibus, sanguis de naribus sternutatione fiente destillat, & urina subsidentiam albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat.

Morbi acuti iudicantur, sanguine de naribus fluente, in die iudicatorio: & sudore multo fiente, & urina purulenta ac uetri formam referente, prodeunte, & bonam subsidentiam habente, & aceruatim exeunte: Abscessu item memorabili fiente, & aluo mucosa & cruenta derepente egerente: & uomitibus non prauis fientibus circa iudicationem. Somni profundi, non turbulenti, firmam iudicationem significant. Turbulenti uero cum dolore corporis, incostantes sunt. Septima die,

aut nona, aut decimaquarta, fluxiones sanguinis à naribus fiētes, plerunq; febres solunt: Similiter & alui fluxio biliola, & qualis in dysenteria fieri solet: & genium ac coxendicū dolor: & urina concocta ad iudicationē. In muliere uero etiam menstruæ purgationis fluxus. Quibus in febribus sanguis abunde undecunq; profluit, his in refectionibus à morbo alui humectantur. Qui in febribus exudant, caput dolentes, aluo suppressa, cōuulsi fiunt. Mentis emotiones modice feroces, & ferinum, & cōuulsionem significant. Cōuulsio in febre fiens, & eadem die desinens, bona est. Conuulsio in febre fiens, sedat febrem eadē die, aut postera, aut tertia. Si uero tēpus in quo incepit transgrediatur, & nō desinat, malum est. Febres intermittētes, uerū inæqualiter calefcētes, aluo inflata, pauca egerente, in his post iudicationē lumborum dolore sequuto, alui erūpunt. At amburētes ad manū, torpidæ, siticulosæ, anxiosæ, in his aluo suppressa grauati exoluuntur. Quādoq; uero & rubicundæ in pedibus ambustiones, eadem significant. Hybernæ febres quartanæ, leniter in acutos morbos transeunt. Capitis dolor pertinax cū febre acuta, & alio signo maligno, lethale est. Cæterum sine signo malo, transgrediens uigesimali diem, sanguinis aut puris fluxum è naribus, aut abscessus ad infernas partes significat: fluxiones quidē iunioribus trigintaquinq; annis, senioribus uero, abscessus. Si uero circa frontem ac tempora fuerit dolor ille pertinax, fluxiones.

Quibus capitis sunt dolores, & sonitus auriū, citra febrem, & uertigo, & uocis tarditas, & manuū torpor, eos aut syderatos, aut comitiales, aut obliuiosos fore expecta. Qui caput dolent, stupore correpti, delyrantes, aluo suppressa, oculo ferociēte, florulenti, hi in posteriorē partem cōuelluntur. Capitis succussionsiones, oculi rubicūdi, mente manifeste emouētes, perniciosæ sunt. Non cōmoriuntur hæc, sed circa aurem tumorē faciunt. Capitis dolor, cū sedis & pudendorū dolore, & torporem, & impotentia inducit, & uocem resoluuit.

Hæc horrenda nō sunt, uerū somnolenti ac singultientes fiunt nono mensis. ex quibus soluta uoce, in idem restituiuntur. Qui in capitis dolore ascari das habent, his surditas & sopor cōsequens, abscessus circa aurem exfusitat.

Qui caput dolent, stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundū habentes, sanguinē effundunt. Capitis cōcussionsiones, & auriū sonitus, sanguinem effundunt: aut mulieri menses deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor cōsequatur: fortassis autem dysentericis fluxiones. Capite grauati, iuxta sinu caput dolētes, uigilijs infestati, sanguinē effundūt, tum aliàs, tum si quid ad cololum se extendat. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate, uigilantibus, cito infania excitant. Quibus capitis ac colli dolor est, sed & totius corporis tremula quædam impotentia, sanguinis eruptio soluit. Quin & tempore hæc soluiuntur. Verum uesicæ in hoc supprimuntur. In acutis capitis doloribus, & in torpidis cū grauitate, conuulsiones fieri solent. Capitis dolorē soluit pus per nares, aut sputa crassa, & nō olentia. Soluit item ulcerum eruptio. Quandoq; & somnus, & alui fluxus. Capitis dolor moderatus, cū siti cibū capiente, aut cū sudore nō soluente febrē, abscessus in gingiuis, aut circa aurem significat, aluo nō exturbata. Capitis dolor soporosus cū grauitate, conuulsoriū quid facit. Caput dolentes, siticulosi, aliquatenus uigilantes, obscuri cognitu, impotētes, ex aluo liquida delassati, num mente mouētur.

Caput

Caput dolentes, furdastri, manibus tremuli, collū dolentes, mingētes nigra condensata, uomētes nigra, perniciose habent. Caput dolentes, exudātes, aluum suppressam habentes, cōuulsioni obnoxij sunt. Sopor ubiq; malus est. Soporosi in principijs sientes, cū capitis, lumborū, colli præcordij dolore, uigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tum aliās, tum quarto ab initio die. Malum est etiā alui proluuiū ualde rubicundum. Soporosi ab initio exudantes, urinis cōcoctis ardentēs, uerū citra iudicationem perfrigescentes, & breui rursus ardentēs, torpidi, soporosi, conuulsi, perniciose habent. Somni soporosi, & perfrigerationes, perniciosi sunt.

Soporosis delassatis, furdis factis, aluo erumpente si rubicunda egesta fuerint circa iudicationē profunt. Soporosi, anxiosi, præcordiū dolentes, parū uomentes, abscessus iuxta aurē habent. Antea uerō circa faciem tumores cū fopore. Morbi derepente mentē percellentes cū anxietudine, sanguinē profundunt. Soporosa, anxiosa, dolorosa præcordia, frequēter parū spuentia, Tumores circa aurē habent. Soporosi, num aliquid cōuulsorij habēt?

Affectiones soporosa, fatuitatē inducentes, stuporis detentionē inferētes, præcordia uariantia, & uentrē tumidum habentes, cibum fastidientēs, aluo suppressa exudantes, num his turbidus spiritus, & genitura simile quid pertransiens, singultū significat? Num & aluus biliosa insuper egerit? Splendidū in his mictum prodest. Ventres quoq; his insuper turbātur. Cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in septem moriuntur. Has uero si effugerint seruantur. Quibus autē ex his relectis, os disparatū repertū fuerit, hi pereunt. Caput dolentibus ex posteriore parte ossa rupta habētibus, fluxio ē nare larga crassa, mala est: Hi ubi oculū antea doluerint, rigent. Num & iuxta tēpora ossium disruptiones conuulsoriae sunt? Auris dolor pertinax, cum febre acuta, & alio quodam signo aliquantū maligno, iuuenēs quidē septima die occidit, & citius delirio correptos, si non multum pus effluxerit ex aure, aut sanguis ē naribus, neq; aliud quoddā bonum signū compareat: Seniores aut tardius, & minus tollit. Nam & aures suppuratione præueniunt, & minus delirant. Verum multi ex his recidiuant, atq; sic pereunt.

nam
Surditas in acutis ac turbulentis confesquens, malum. Malū etiā in longis. In his autē dolores etiā ad coxas deducit. In febribus surditas, aluū sistit. Aures frigida, & pellucida, & contracta, perniciofa. Tinnitus in acutis, & sonitus in auribus, lethale. Sonitus aurium, cum uisus hebetudine, & narium grauedine, mentē emouet, & sanguinē profundit. Quibus surditas cū capitis grauitate, & præcordij intensione, & ad splendorē turbatio, sanguinē profundit. In febre acuta aures obsurdescere, furiosum est. Valde surdi, in accipiēdo tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum. Accedente aegritudine surditas, & urina subrubicūda subfidentia nō habens, sed id quod in medio innatat, mentē emouet. Morbo regio corripī, in his malū est. Mala est & ex morbo regio fatuitas. Hos uoce priuari, sentientes tamen esse cōtingit. Fortassis aut et aluus malē his afficitur. Quæ circa aurē dolorose excitatur, perniciofa sunt. Rubores circa aurē ex prægresso dolore, in febribus sientes, signū quidem sunt erysipelatis in facie futuri, Sed & cōuulsiones ex talibus fiunt, cū uocis interceptione ac exolutione. Tumores circa aurē ex plurimis graueolentibus cum febre acuta, et præcordio in-

tento, tardius excitati, occidunt. Tumores circa aurē leuiter syderatis, mali. Tumores circa aurē in longis morbis nō suppurantes, lethales. Alui uero his deorsum feruntur. Num quibus abscessus sunt iuxta aures, caput dolent. Num & supernis partibus exudant. Num & in super rigent. Num & alui erumpunt, & quid soporosum habēt. Num & aquosa est urina, alba innatātia habens, & aliquantū uaria, exalbida, graueolētia. Abscessus iuxta aurē submouent tussiculā cū sputationibus fientes. Urinā in abscessibus retro aures cito & modice maturescētes, malae sunt. & sic perfrigerari, malū est. Abscessus circa aurē in morbis diuturnis suppurati, nō ualde albo & inodoro pure, occidūt, & maxime mulieres. Abscessus iuxta aurē, ex acutis morbis maxime in febribus ardētibus fiunt. & si nō iudicationem fecerint, & maturescāt, aut ex naribus sanguis fluxerit, aut urinā subsidentia crassam habuerint, aegri pereunt. Pleriq; uero taliū tumorum antea propulsantur. Verū considerare oportet in super etiā ipsas febres, siue auescant, siue remittant, atq; sic pronūciare. Ex surditate ac torpore, de naribus aliquid destillare, difficultatis aliquid habet. Vomitus his cōueniet, & alui turbatio. Ex surditate leniter abscessus iuxta aures fiunt, tum aliās, tum si quid nauseae accēdat. Sed & soporosus ex his, etiā magis abscessus ad aurē fiunt. Surditatē ex febribus, sanguinis e naribus fluxio soluit: itemq; alui turbatio. Facies quae ex tumida humiliatur, & uox leuior ac debilior fiens, & spiritus rarior ac leuior, remissionē in sequētem diem significat. Faciei corruptio, lethalis. Verum minus, si propter uigilias, aut famē, aut alui exturbationē fiat: Et si id quod propter hanc corruptū est, sedetur per diem ac noctē. Talis aurē fuerit, oculi caui, nasus acutus, tempora collapsa, aures frigidāe ac cōtractāe, cutis dura, color pallidus aut niger. Liuescēs uero ex his palpebra, aut labiū, aut nasus, breui lethale est. Faciei bonus color, & toruitas, in morbo acuto, malū est. Frōtis ex his cōtractio, phrenitidis signū est. Circa faciē color bonus, & sudores nō febrētibus, stercora uetusta subesse significat, aut uictus rationē inordinatā. Rubores circa nasum, alui humescēntis signa sunt. Dolores circa praecordia aut pulmonē si suppurētur, malū est. Oculorū puritas, et albas ipsorū partes, ex nigris aut liuidis puras fieri, iudicatoriū est. Si igitur cito purgentur, celerē iudicationē significat. Si tarde, tardiorē. Caligo oculorū, aut si alba ipsorū pars rubescat, aut liuescat, aut uenulis nigris impleatur, bonū non est. Malū est etiā lucis splendorē fugere, aut lachrymari, aut distorqueri. Et alterū minorē fieri, malū est. & oculos frequēter agitare, ac iactare, aut paruas lemas ac sordes circa ipsos, aut concretionē tenuem albicantē habere: aut albā partem maiorē fieri, nigrā uero minorē: aut nigram sub palpebrā supernā occultari. Mala est etiā oculorū cavitās, & expressio ualde foras, & splendoris extritio, ut pupilla extēdi nō possit. Et extremitatū palpebrarū curuitas, & oculi fixi, & assidue nictare, et colores permutare, et palpebras inter dormiendū non committere, perniciosum est. Malus est et oculus peruersus. Oculorū rubor in febre fiens, alui diuturnā malignā affectionē significat. Circa oculos pustularū eruptiones in uiriū refectionibus, aluū propere faciūt. In oculorū distortionē, febrētī, lassato, rigor perniciosus. et soporosus in his, male habēt. Viro lippietī, febre superueniēte, solutio. Sin minus, periculū est ne caecus fiat, aut pereat, aut utrūq;. Quibus lippietibus ca-

pitit dolor accedit, & ad multū tempus cōcomitatur, periculū est ne cæci fiant. Lippienti alui profluuiū sua spē prodiens, utile est. Oculorū obscuratio, & oculus fixus caliginosus, malū. Oculorū obscuratio, cū animi deliquio, breui cōuulsionem inducit. Oculorū rectitudo in morbo acuto, & motus uelox, & somnus turbulentus, & uigilia, & quādoq; sanguinis è naribus stillationes, nihil boni. Qui febres ad tactū non adurentes habet, phrenitici sūt: & magis si sanguis fluxerit. Lingua quæ in principio quidē inhorruit, in colore uero permanet: progressu autē tēporis exasperatur, & liuescit, & rūpitur, lethalis est. Si uero ualde nigrescat, in quartadecima die iudicationē fore significat. Periculosissima autē est nigra, & cū uirōre pallida. Linguā circa bifidam sui partē, uelut salua alba obduci, febris remissionis signū est, si quidē id quod superinductū est crassum fuerit, eadē die. Si uero tenuius, posttridie. Si uero adhuc tenuius, tertia die. Eadē significat etiam huiusmodi, si circa summā linguā fiant, uerū minus. Lingua tremula cū rubore iuxta nasum, & aluo liquida, si reliqua sine signis sint circa pulmonē, malū est, & celeres purgationes, perniciosas significat. Lingua citra rationē tenera siens, & cū cibi fastidio nauseabūda, cū frigido sudore, ex aluo liquida, nigrorū uomituum signū est: lassitudo in his mala est. Linguae tremulae quibusdā etiā aluum liquidā quādoq; faciūt. Denigratae uero in his, celerē mortem significāt. Num lingua tremula mentē nō firmā significat? Linguae asperæ & resiccate, phreniticæ sunt. Dentes collidere aut stridere, quibus nō familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est: iam uero deliryās si hoc faciat, penitus lethale est. Perniciosum autē est et resiccati dentes. Dētis corruptio, abscessum circa gingiuā factū soluit. Ex dentis corruptione, uehēmēs febris superaccedēs, et deliryū, lethale est. Si uero seruētur, ulcera suppurabūt, & ossa discēdēt. Quibus circa palatū humoris collectio fit, plerūq; suppuratur. Dolores uehēmētes circa maxillas, periculū est ne ad ois educationē deueniāt. Labiū contractū, alui biliosæ eruptionē significat. Sanguis de gingiuis, ex aluo liquida, perniciosus. Sputi excreationes in febre, liuida, nigra, biliosæ, si quidē supprimātur male sunt, secedētes uero pro ratione, utiles. Quibus falginosa sputa, ac tussis supprimūtur, his corpus uelut à putulit rubescit. Verū ante obitū exasperatur. Sreatio frequēs, si sanē & aliud quoddā signū affuerit, phrenitidē indicat. Vocis interceptiones cū exolutione, pessimæ. Modice feroces mētis emotionēs, malæ & feruē sunt. Quibus uox cū febre deficit, et cū iudicatione intercepta, tremuli moriūtur. Vocis interceptiones in febre cōuulsorio modo fiētes, ad mētis emotionē cū silentio deueniūt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortē inducūt. Vocis interceptionēs cū exolutione stupefactorio modo, perniciosæ sunt. Voces cōfractę post medicamētī sumptionē, nū prauę sunt. Pleriq; horū exudant, & uētres humectos habēt. In uocis interceptione spiritus, uelut his qui strāgulantur, præ manib. expositus, malus est. Num & mentē emouet? Ex capitis dolore uocis interceptionēs si sint, febricitātes cū sudore laxātur in seipos, sūtq; morbi reuertētes diutius durātes. his insuper rigere, malū nō est. Mētis emotiones cū uocis interceptione, perniciosę. Vocis interceptiones insuper rigētibus, lethales. Tales autē leniter caput dolēt. Vocis interceptiones cū exolutione, in febre acuta, sine sudore, sunt quidē lethales, minus uero q̄ cū sudore.

Verum diurnitatē temporis significant, fortassis autē & qui ex recidua tale quid patiūtur, tutissimi sunt. Perniciosissime autē ex talibus habēt quibus sanguis ex naribus fluit, & quibus alui humectantur. Vox acuta, planctū referens, & oculorū obscuratio, cōuulsorium est. Dolores his ad infernas partes, tolerati faciles sunt. Cum uoce tremula, solutio alui præter rationem, in his moram trahētibz diurnis, perniciosa est. Frequentes subsoporate uocis interceptiones cōsistentes, tabem præsignāt. Spiritus qui densus quidem & paruus est, inflammationē & dolorem in locis principalibus significat. Magnus autem & per multum tempus, deliriū aut conuulsionem. Et frigidus quidem lethalis est, lethalis autē est & febriculofus & fuliginofus. Verū minus quæ frigidus. & qui magnus foras exspiratur, paruus uero intro: & paruus foras, magnus uero intro, pessimus sanē est, et morti propinquus. Itemque extendens, & urgens, & obscurus, & dupla intro reuocatio, ueluti superinspirantibus. Bona autē spiratio, in omnibus morbis qui cū febre acuta sunt, & in quadraginta diebus iudicatur, magnum momentū ad salutem habet. Collum durum & dolorofum, & maxillarū colligatio, & uenarū iugularū palpitatio fortis, & tendinum distentio, perniciosa sunt. Dolores in faucibus gracilibz strangulatorij, à capitis dolore originē trahentes, cōuulsorij sunt. Frigiditates colli ac dorsi apparētes, Sed & totius corporis cōuulsoria, in his mictiones fiunt crassiflorem farinā referentes. Quibus circa fauces irritamenta sunt, his tumores circa aurem leniter erūpunt. Fauces dolorofæ, graciles, cū ægre tolerabili molestia, perniciosa acute sunt. Quibus spiritus retrahitur, & uox strangulatoria est, & uertebra intro cōsidet, his in fine uelut contrahente quodā spiritus fit. Fauces modice exasperatæ, & alius uanis conatibus nitens, frontis dolores, ægri palpando contrectantes, dolorosi: quæ ex his augetur, difficilia sunt. Dolores fortes circa fauces, tumores circa aurem, & conuulsiones efficiunt. Colli item ac dorsi dolores. Cum febre acuta cōuulsiones perniciosa. Colli & cubitorū dolores, cōuulsorij. A facie autem hi, & secundum fauces. Pallidi, graciles, saliuā sputantes, In his in somnis sudores boni sunt. Num & sudore leuari, plurimis nō malum est: Dolores ad infernas partes his tolerati faciles sunt. In dorsi ac pectoris dolore, mictio cruenta suppressa, perniciosa est dolorosa. Colli dolor malum: quidē in omni febre, pessimū autē his quibus timor est ut etiam insaniant. In pectoris dolore febriculoso, alius turbata, torpida, nigrarum egestionū signa sunt. Dolores parui in a-cutis iuxta fauces graciles, in gracili ubi hiarit, nō facile os cōtrahente, mentem emouent. Ex his phrenitici perniciosa habent. Fauces exulceratæ in febre, cum alio signo ex his quæ difficilia sunt, perniciosa sunt. In febribz de repente suffocari, & deglutire non posse, citra tumore, malum est. Collū conuertere nō posse, neque deglutire, ut plurimū lethale est. Præcordiū molle esse cōuenit, & doloris exors, & æquale. At inflammatū, aut inæqualiter se habēs, aut dolens, signū est ægritudinis nō leuis. Tumor uero in præcordijs durus et dolorofus, pessimus quidē est si iuxta omnes partes fuerit. Ex his aut qui ab una parte sunt, minus periculosus est qui à sinistris est. Significat aut in principio quidē tales, mortē citā. Si uero uiginti dies transmittant, febre manēte, suppurationē. Cōtingit aut his in primo circuitu, etiā sanguinis eruptio è naribz, et ualde prodest

prodest. Plerūq; enim hi caput dolent, & uisus obscuratur, & magis in his sanguinis eruptionē affore expecta. In aetatibus autē annorū trigintaquinq;. Senioribus uero minus. At uero molles & doloris exortes tumores, diuturniores indicationes faciūt, & minus periculosi sunt. Sed & hi sexaginta dies trāsgredientes, febre manēte, suppurantur. Cōsimilia uero significāt & tumores circa uentrem, his qui sunt in præcordijs. Verū minus suppuratur hi q̄ illi. Minime uero qui sub umbilico cōsistunt. & fiunt etiam hi quidē in tunica, illi uero sursum diffusi. Lethales autē sunt ex ipsis, quicūq; intro ruptū fuerint, ex reliquis autem suppurationibus, quæ quidē foras rumpūtur, optimū est ut in breuissimam & acutissimam molem colligatur: quæ uero intro, ut neq; dolore, neq; colore, foris se manifestas faciāt. Contrariū autē pessimū est. Quædam uero ex his propter puris crassitudinē, nullam de se significationem præbent. Porro reeentes in præcordijs tumores, si nō cum inflammatione fuerint, & dolores ab ipsis, soluit murmur in præcordio obortū, & maxime quidē si pertransierit per urinas, & alui egestiones. Sin minus, si etiā ipsum pertrāsierit. Prodest autē & si subdescēderit ad infernos locos. Pulsus in præcordio cū tumultu, mentis emotorius est, & magis si oculi frequēter moueantur. Oris uentriculi dolor, & pulsus præcordiorū, febre perfrigerata, malū, tum aliās, tū si in super exudarint. Dolores ad præcordiū irruentes, tum aliās mali sunt, tum si aluos humectent. Peiores autē sunt, si breui fiant, & tumores circa aurē ex his emergētes, maligni sunt, & aliæ suppurationes. Oris uentriculi dolores cū tormine, uētris animalcula erūpere faciunt. Oris uētriculi dolor seniorē frequenter impetens, mortē repentinā significat. Quibus præcordia eleuātur, aluo suppressa, malū est, maxime autē in morbis tabidis lōgis, & quibus alui humectantur, in præcordio inflāmatiō suppuratoria est, quibus ante mortē nigra per aluum subeunt. Præcordiorū distentio cū sopore anxioso, in caput dolente, abscessus circa aurē attollit. Post præcordiorū tumorē, biliosus spiritus magnus & febris acuta, abscessus circa aurē attollit. In dolore præcordiorum submurmurātū, lumborū dolor superaccedēs in febribus, uētres ut plurimū humectat, si nō flatus eruperit, aut urinæ copia prodierit. Ex præcordio diuturne afflicto, & aluo graueolenti, abscessus circa aurē, occidit. Quibus a præcordiorū doloribus, aluus paulatim subuiscosa egerēs, pauca stercoracea effundit, num etiam sanguinē effundit. Quibus dērepente dum sine febre sunt, præcordij & oris uentriculi dolor, & circa crura, ac infernas partes, & aluus in tumorē eleuata est: soluit uenæ sectio, & alui fluxio. His febrile nociuū est. Longæ enim & uehemētes febres fiunt, & tusses, & spiritus & singultus fiunt. His autē ad solutionē tendētibus, dolor fortis coxarū, aut crurū, aut puris sputum; aut oculorū priuatio succedit. Quibus dolores præcordiorū, oris uentriculi, hepatis, partiū circa umbilicū, hi sanguine per aluū egesto, seruātur: non autē egesto, moriūtur. Quibus præcordia nō mollia, facies sana, nō liberantur citra multi sanguinis ex naribus fluxū, aut conuulsionē, aut coxendicū dolorē. Dolores ad præcordia in febre, uoce intercepta, sine sudore soluti, malum est. His ad coxendices dolores fiunt. Iuxta uentrem in febre palpitationes, mentis emotiones inducunt. Sanguinis autē fluxio horrorē efficit. Dolores in febre ad præcordia exilientes, sine sudore soluti, maligni sunt. His ad coxendicū

xendices dolores fiunt, et ipsi una cum febre ardente, alius deorsum erumpens, perniciosum est. Dolores circa umbilicū palpatorij, habent quidē & aliquid mētis emotorium, uerum circa iudicationē pituita his acuatim copiosa cum dolore penetrat. Post aluum suppressam, præcordia subleuata in tu morem, mala sunt, maxime tabescētibus iam diu, & quibus alui humectantur.

Anxietatem in præcordio sentientibus, tumores circa aurem oborti, ipsos occidunt. Duricies circa uentrem cū dolore, in febrilentibus cum horrore, cibum auersantibus, si aluo insuper parū humectata, purgationem non faciunt, ad suppurationē peruenient. Dolor supra umbilicum, & lumborū dolor, si medicamentis nō soluantur, in hydropem siccū desinunt. Dolores ex lumbis diuturniores, qui febre tertianæ generis modo exacerbātur, grumofum sanguinem egerere faciunt. Dolores in lumbis, sanguinis fluxionē inducunt.

Ex lumborū dolore sanguinis fluxiones largæ fiunt. Quibus ex lumborum dolore, recursus ad caput, & manus torpidæ, & oris uentriculi dolores, & aurium sonitus, his sanguis large profluet. Sed & alui his deorsum erumpunt, & mens turbata est ut plurimū. Ex dorsi dolore ægritudinis principia difficilia sunt. In lumborū dolore pertinaci, & ampliore alui subductione, à ueratro uomere spumosa multa prodest. Spinæ distortionē ac spirandi difficultatem, sanguinis fluxio soluit. In lumbis dolētibus oris uentriculi dolores insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt, etiā prægressæ. Affectiones ex lumbis ad collū & caput transeūtes, leuis siderationis modo resoluentes, conuulsoriæ, mētis emotoriæ sunt. Num tales etiā soluuntur cōuulsionibus? Aut talium alui ægrotant per eadem prodeuntia? Ex lumborū doloris recursum, oculorum distortio, malum. Dolor in pectus firmatus torpore, malus in febre est. Hi repente pereunt. Ex lumborū dolore reuersiones ad os uentriculi febriculosa, horrore inducentes: Sic affecti reuomentes tenuia aquosa, mente moti, uoce destituti, nigrorū uomitu facto moriuntur. Diuturni circa lumbos, & tenue intestinū dolores, & ad præcordia dolores, si ægricibos auersentur unā cum febre, his dolor intentus ad caput progressus, repente ipsos occidit conuulsorio modo. Quibus lumborum dolor est, hi male habent. Num his tremores fiunt, & circuli rubicundi in tibijs in rigore? Num lumbos dolentibus, cibos fastidientibus, nō uomētibus, modice ferociter mente motis, spes est nigra proditura esse? Lumborū dolor in uentriculi os dolente, cum excreatione uiolenta, habet quid conuulsorium. Rigor unā cum iudicatione aliquatenus horrendus est. Lumborū dolor sine causā manifesta sepe impetens, maligni morbi signum est. Lumborū dolor cum sopore anxioso, malus est. Lumborū distentio ex muliebriū mensium multitudine, ad suppurationē tendit, & uarie prodeuntis uiscosi, graueolentes, strangulatorij menses ex prædictis, ad suppurationem tendunt. Arbitror autē tales etiam aliquantū delirare. Quibus lumborū dolor, et lateris, sine causā manifesta, hi regiū morbum incurrūt. Perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus in diebus iudicatorijs uehemētes, pessimæ sunt. Vice uersa sanguinē erumpere, malū est, uelut in splene magno ex dextris, & circa præcordia eodē modo se res habet. Vulnura sanguinē fundentia, insuper rigētia, maligna. Sic affecti loquētes latenter moriuntur. Affectiones quæ quinta die sanguinē large fundunt

fundunt; sexta in super riguerunt, septima perfrigerata fuerunt, & repente recalescunt, in his alui male afficiuntur. Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluum egestio, mala. Mala autem sunt & rubicunda ualde & æruginosa. Quarta die tales fiunt sanguinis eruptiones. Soporosi ex talibus cõuulsi moriuntur, nigris prægressis, & uentre tumefacto. Post sanguinis eruptiones, & nigrorum egestiones, in acuto surditas, malum. Sanguinis egestio his perniciofa. Surditas autem soluit. Quibus sanguinis eruptiones plures, huius temporis progressu alui male afficiuntur, si non urina concocta prodierit. Num & aquosa urina tale quid significat? Quibus ex sanguinis eruptione larga frequenti, multa sit alui cum nigris egestio, ea autem suppressa, sanguinis fluxiones: hi aluum dolent, unam uero cum quibusdam flatibus, facile tolerant. Num tales multis frigidis sudoribus exudant? Conturbata in his urina, mala non est: neque id quod generatur simile in ipsa residet, uerum plerumque hi aquosa mingunt. Quibus de naribus in surditate ac torpore pauca destillant, habent quid difficultatis. Vomitus his cõducit, et alui perturbatio. Magnæ in principijs sanguinis eruptiones, circa refectioem aluos humectant. Fluxiones ex naribus largæ per uim suppressæ, quandoque conuulsiõem prouocant. Venæ sectio soluit. Unde circa die fientes sanguinis stillationes, difficiles sunt, tum aliàs, tum si bis super stillauerint, & rursus stillauerint. In sanguinis fluxione multa, aut singultus, aut cõuulsiõ, mala est. In his qui decolores usque ad septem annos uires recoligunt, & spiritus in uis acruatus, & terræ cõcupiscentia, sanguinis corruptionem ac exolutionem significat. In morbis longis parua comparantes sanguinis fluxiones, perniciofæ sunt. Vertigines ab initio sanguinis narium fluxio soluit. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus perfrigescentia, maligna sunt. Sanguinis detractio in perfrigeratione torpida, mala est. Qui aluo suppressa sanguinem effundunt, & unam cum sanguinis effusione in super rigent, his aluum uelut ex intestinorum leuore lubricam hæc faciunt, itemque durat, & ascaridas, aut ambo. Sanguinis fluxiones statis temporibus fientes, siticulosæ, si sanguinem non effuderint, comitialis morbi mortem inducunt. Ex hæmorrhoidæ parum apparente, uertigines obortæ, paruum ac modicam siderationem significat, soluit uenæ sectio. & quicquid hoc modo apparuerit, mali aliquid significat. Palpitantes per totum, num etiam uoce intercepta moriuntur? Tremores cõuulsorij fientes in sudoribus, reuerti solent. Iudicatio his fit, ubi super riguerint. Superrigent autem hi ardore circa uentrem prouocati. Somnus multus in his cõuulsorius, & ad frontem grauitates, & mictio difficilis. Conuulsiões antea non cognitæ in strangulatis ab utero, faciles sunt. Conuulsoria sine sudore sputa defluentia in febriente, leuia sunt, His in super alui aliquantum humectatur. fortassis autem & ad articulos aliquid abscedet. Quibus cõuulsis oculi intente relucet, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Quæ cõuulsorio modo exacerbatur, cum stuporis detentione, abscessus iuxta aurem excitant. Tremulis, anxiosis, parui iuxta aurem tumores conuulsiõem significant, aluo male affecta. Conuulsiões & tetanicas distentiones febris accedens soluit. Conuulsiõ ex uulnere lethalis est. Conuulsiõ in febre ficiens, perniciofa est. Minime uero pueris. Seniores septem annis in febre non corripiuntur cõuulsiõ. Sin minus, pernicio

niciofum est. Conuulfionē foluit febris fuperueniēs acuta, quæ prius non fuit. Si uero fuit prius, iam exacerbara. Prodeft & urinæ tranfitus uitri fpeciē referēs, copiofus, & alui fluxus, & fomni. At repētinas cōuulfiones foluit febris, alui fluxus. In cōuulfionibus uocis interceptio diu durans, mala eft: parua autem, aut linguæ fiderationem, aut brachij, aut dextrarum partium fignificat. Soluitur autem urinis multis aceruatis derepente prodeuntibus. Sudores autē paulatim fientes profunt, Aceruati uero, itemq; fanguinis detractiones acerrimæ lædunt. In diftentionibus & ante & retro fientibus, & in tergū folū contingentibus, fi maxillæ foluantur lethale eft. Lethale eft etiam fudare in diftentione in dorfum fiente, & corpus diffolui, & in eadem affectione renomere per nares, aut clamare, aut nugari, fi ab initio uox intercepta fuit. In pofteram enim diem mortem fignificat. Febriles in dorfum diftentiones, urinæ genituræ fimiles foluunt. Anginæ quæ neq; in collo, neq; in faucibus, quicquā conspicuum faciunt, uerum fuffocationē uehementem ac fpirādi difficultatem inducunt, eadem die & tertia occidūt. Quæ uero tumores & ruborem in collo accipiunt, in cæteris quidem confimiles funt, uerū diuturniores. Quibuscunq; uero & fauces, & ceruix, & pectus, fimul rubuerint, diuturniores funt, & ex ipfis maxime feruantur, fi non recurrerint rubores. Si uero difsipentur, neq; tuberculo foras conuerfo ac collecto, neq; pure leniter ac fine dolore excreato, neq; in diebus iudicatorijs, perniciofæ funt. Num etiam fuppurati fiunt? Securiffimum autē eft ruborem & abfcelfus q̄ maxime foras uerti. Eryfipelas uero foris quidem accedere, cōmodum eft, intro autem conuerti, lethale. Cōuertitur autem intro, quū difparente rubore pectus grauatur, & difficilem fpirationem habet. Quibus uero anginæ ad pulmonē uertuntur, partim in feptē diebus pereūt, partim euadentes fuppurati fiunt, fi nō educitio pituitofa furfum ipsis fiat. Quibus per pulfationis uenarum uehementiā, ftercus derepente per aluū fecedit, lethale eft. In anginis fputa gracilium fubarida, malum. Anginofis in linguis tumores, citra figna difparentes, perniciofi: & dolores difparentes citra manifeftam caufam, perniciofi funt. In anginis qui nō breui cōcocta exfpuunt, perniciofe habent. In angina dolores ad caput, citra notas, cū febre, perniciofi. In angina dolores ad crura, citra notas, cum febre, perniciofi. Ex anginis citra iudicationē præcordij dolor, cum impotentia ac torpore fiens, occidit occulte, etiam fi ualde manfue te habere putent. Ex anginofis citra notas attenuatis, dolor ad pectus & ad aluum progressus concitatus, pus egerere facit, aliàs autē eius qui exoluitur tale eft. In anginis omnia perniciofa funt, quæ non manifefcunt dolorē faciunt. Sed & ad crura dolores diuturni procedunt, & difficulter fuppurantur. Ex angina fputa uifcofa, craffa, ualde alba, quæ uiolenter educuntur, mala funt. Et omnis eiufmodi maturatio, mala. Purgatio multa deorfum, tales leuis fiderationis modo perimit. Ex angina, fubarida frequentia fputa, cū tuffi, lateris dolorem inducētia, perniciofa: itemq; ea quæ inter potandum per tuffim fubemergūt: & deglutitio uiolenta, mala. Pleuritici quibus in principio fputationes penitus purulentæ funt, tertia die moriuntur, aut quinta. Si uero has effugerint, nō multo melius habentes, feptima, aut nona, aut undecima fuppurari incipiunt. Quibus fupra autem rubor, & fimiliter ueluti pleuritici calefcunt, & aluus biliofis ac graueolentibus

tibus exturbatur, hi uigesima ac quadragesima die periclitantur. Vbi uero has effugerint, seruantur. Pleuritides siccae ac sine sputo difficilimae sunt. Horrendae quoque hae in quibus dolores superne sunt. Pleuritides sine conuulsionibus, grauiores sunt his quae cum conuulsionibus fiunt. Quibus pleuriticis in principio lingua biliosa fit, hi septima die iudicantur. Quibus autem tertia aut quarta die, circa nona. Bulla subliuida fiente in lingua, in principio, qualis est ferri tincti in oleum, difficilior solutio contingit: & iudicatio quidem ad decimum quartum diem peruenit, sanguinem autem plerumque spuunt. Sputum in pleuriticis tertia die maturari ac exspui incipiens, citiores solutiones facit, uerum posterius, tardiores. In doloribus pleuriticorum commodum est aluum molliori, sputa colorari, strepitus in pectore non fieri, urinam bene procedere. His autem contraria, difficilia sunt: itemque sputum dulce fieri. Biliose simul & sanguineae pleuritides, plerumque nona aut undecima die iudicantur, & maxime sanantur. Quibus autem pleuriticis in principio quidem dolores molles sunt, quinta uero aut sexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimam perueniunt, & non ualde seruantur, periclitantur autem maxime septima die ac duodecima. Vbi uero his septem dies effugerint, seruantur. Quibus pleuriticis strepitus sputi multus in pectore est, & facies tristis, & oculus morbi regni colore infectus, ac caliginosus, hi pereunt. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, in quadraginta a ruptione diebus expuunt. Sputum in omnibus pleuriticis ac peripneumoniacis facile ac cito expui conuenit, & flauum sputo ammixtum esse. Quod uero longe post dolorem educitur flauum, aut non mixtum, & multam tussim inducens, malum est. Prauum autem penitus est flauum meracum, & uiscosum, & album, & rotundum, & cum uiore pallidum ualde, & spumosum, & liuidum, & aëruginosum. Peius autem aliquanto est id quod ita meracum est, ut nigrum appareat. At sanguine non multo permixtum flauum, in principio quidem salutare est, septima uero die, aut posterius, minus tutum. Sanguineum uero ualde, aut liuidum, statim in principio periculosum est. Prava sunt etiam sputa spumosa, & flaua, & nigra, & aëruginosa ac uiscosa, & quaecumque cito colorantur. At mucosa ac fuliginosa, & cito colorantur, & securiora sunt. Quae uero intra quintum diem ad coctionem colorantur, meliora sunt. Omne porro sputum non soluens dolorem, malum est: soluens autem, bonum. Quicumque uero cum bilioso purulentum educunt, aut seorsim, aut permixtum, plerumque decima quarta die moriuntur, si non mali aut boni quippiam ex praescriptis superueniat. Sin minus, pro ratione, maxime autem his quibus eiusmodi pus septima die incipit. Bonum uero est & in his & in omnibus circa pulmonem morbis, facile ferre morbum, a dolore liberatum esse, sputum facile educere, bene spirare, & sine siti esse, & totum corpus aequaliter calefcere, ac molle esse. Et ad haec somnos, sudores, urinas, alui egestiones, bonas esse. Mala aut sunt his contraria. Si quidem igitur omnia bona ad hoc sputum accesserint, seruari homo poterit. Si uero partim affuerint, partim non, non ultra decimum quartum uita producta peribit. Quod si contraria signa accedant, citius etiam. Quicumque uero dolores in his locis non sedantur, neque ad exspuitiones, neque ad uenarum sectiones, ac uictus rationes, suppurantur. Quibuscumque autem ex peripneumonia abscessus circa aurem, aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur ac fistulantur, hi superstites euadunt. Fiunt autem his quibus & febris, &

dolor affuerit, et sputum pro ratione nō prodierit, neq; bilioſæ alui egeſtiones, ſolutuq; faciles ac meracæ fiunt, neq; urina craſſa ualde, & multam ſubſidentiã habens: & alia ſalutaria habuerint. Fiunt aut̃ ad infernas quidẽ partes, his quibus circa præcordia inflãmatio fit: ad ſupernas uero, quibus præcordiũ molle & doloris exors fuerit, & ubi per tẽpus aliquod difficulter ſpirauerint, ac citra manifeſtam cauſam ceſſauerint. At abſceſſus ad crura in periculoſis inflammacionibus pulmonis, omnes quidem commodi ſunt, optimi autem, ſputo puruſento pro ſtauo ſiente. Non procedente uero ſputo ſecundũ rationem, neq; urina bonã ſubſidentiã habente, periculum eſt claudum fore hominẽ, aut multum moleſtiarũ exhibitura res eſt. Si uero recurrerint abſceſſus, febre conſequentē, & ſputo nō procedente, periculum eſt ne moriatur ac deliret. Quicũq; uero peripneumonici nō purgati ſunt iudicatorijs diebus, ſed mente moti quatuordecim dies effugerũt, eos periculũ eſt ſuppuratos fieri. Peripneumoniã ex pleuritide trãſmutatã, ſecuriores ſunt his quæ ab initio fiũt. Corpora exercitata ac denſa citius à pleuriticis ac peripneumoniciſ morbis pereũt q̃ in exercitata. Grauedines & ſternutacionẽs in morbis circa pulmonẽ, & anteceliſſe, & ſuccedere, malũ eſt. Reliquis autẽ ſternutatio non incommoda eſt. Peripneumoniciſ quibus lingua tota alba ac aſpera fit, ambæ pulmonis partes inflamatæ ſunt. Quibus uero dimidiũ, una iuxta quã apparet. Et quibus ad unam clauiculã dolor fit, his ſuperna pulmonis ala una ægrotat. Quibus autẽ ad ambas clauiculas dolor fit, ambæ ſupernæ pulmonis alæ ægrotãt. Quibus iuxta mediã coſtam, media. Quibus ad diſcriminationẽ, inferna. At totam unam partem dolentibus, omnia iuxta hanc partẽ dolent. Siquidem igitur aortæ appellatæ, utrinq; appẽdentes pulmonis partes, ualde inflamatæ ſunt, ut ad latus aſideant, hac corporis parte reſoluũtur, et liuores foris circa coſtam habẽt. Hos aut̃ ueteres ic̄tos, ſiue ſyderatos uocabãt. Si uero nō ualde inflamatæ ſunt, ut nō aſideant: dolor quidẽ fit, per totum, non tamen reſoluũtur, neq; liuores habent. Quibus uero totus pulmo inflamatus fuerit, unã cum corde, ut ad latus allabatur, hi toti reſoluũtur, & iacet æger frigidus, ſenſus exors. Moriturq; ſecũda aut tertia die. Si uero etiam ſine corde cõtigerit, minus diu uiuunt. Quidam autẽ etiam ſeruantur. Qui ſuppurati fiũt, maxime ex pleuritide ac peripneumonia, eos calores comitantur, interdium tenues, noctũ uehemẽtiores, & nihil memoratu dignũ ſpuunt, & circa collũ ac clauiculam ſudant, et oculi caui fiũt, maxillæ uero rubẽt, digiti ſummi deterius caleſcũt ac aſperãtur. Vngues curuãtur, ac perfrigerãtur, & circa pedes tumores habẽt, & circa corpus puſtulas, & abſtinent à cibis. Diuturnæ igitur ſuppuraciones, ſigna hæc habẽt. Quæ uero breui rũpuntur, ex notis ad eas cõſequentibus cognoscere oportet, & ex doloribus in principio. Simul aut̃ & ſi aliquãto difficilijus ſpirauerit homo. Rũpuntur autẽ plurimæ ſuppuraciones, partim uigeſima die, partim quadreſima, partim ſexageſima. Quibus igitur dolor in principio incumbit intẽtus, & ſpirãdi difficultas, & tuſis cũ ſputatione, ad uigeſimũ diem aut citius, eruptionem expecta. Quibus autem leuiora hæc ſunt, iuxta rationẽ. Supputare autem oportet tempus, à quo primũ doluit, aut grauatus fuit, aut febrijt, aut ſi quando rigor corripuit. Neceſſe eſt aut̃ præcedere & dolorẽ, & ſpirandi difficultatẽ, & ſputationẽ, ante ruptionẽ. Quibus igitur & febris ſtatim poſt ruptionem decedit

dit, & cibū appetunt, & pus facile educitur album, in odorū, leue, eiusdem coloris, & à pituita liberum, & aluus parua compacta egerit, plerunq; breui seruantur. Quos uero & febres sequitur, & sitis, & cibi fastidium, & pus liuidum, aut cū uiore pallidum, aut pituitosum, aut spumosum, & aluus insuper liquida fit, moriuntur. At quibus aliqua ex prædictis accesserint, aliqua non, horum aliqui pereunt, aliqui multo tēpore seruantur. Qui suppurati futuri sunt, primum saluginosum spuunt, deinde dulcius. Quibus in pulmone tubercula sūt, pus educunt ad dies quadraginta post ruptionē. Has uero transgredientes plerunq; tabidi fiunt. In lateris dolore, stillatio sanguinis de naribus, mala est. Quos suppuratos mitius habentes, sputorū graueolentiæ sequuntur, eos recidiua occidit. Qui ex pleuriticis exspuūt purulenta, subbiliosa, rotūda; aut purulenta subcruēta progressio tēpore, perniciose habent. Perniciose itē qui nigra fuliginosa spuunt; aut quibus uelut à uino nigro sputa fiunt. Quicunq; sanguinē spumosum spuunt, dextrū præcordium dolentes, de hepate spuunt, & multi pereunt. Quibus dum cōcutiuntur pus cœnosum & graueolens prodit, plerunq; pereunt. Quibus à pure specillū coloratur, uelut ab igne, plerunq; pereunt. Cum lateris dolore, non tamen pleuriticō, & turbulenti tenuibus lenibus, hi phrenitici euadunt. In morbis pulmonis ualde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt. Cum raucedine, sputa uiscosa, saluginososa, mala. Si uero etiam quid attollatur iuxta pectus, in his malum est. Dolores ad collum his attenuatis perniciosi. Raucedo cū tussi, & aluo liquida, pus educit. Quibus in peripneumonia urinæ crassæ in principio, deinde ante quartū diem attenuatur, lethale est. Qui in peripneumonijs siccis pauca concocta educūt, horrēda res est. Rubores in pectoribus sublati, talibus perniciosi sunt. Lateris dolor in sputo bilioso, præter rationē euanescentes, mentem emouet. Febres intermittentes ob suppurationē, pleræq; sudorificæ sunt. Suppuratis surditas oborta, cruentā egestionem significat. His ad finem nigra prodeunt. Lateris dolor cū febre diuturna, puris educationē fore significat. Horrore affecti frequenter ad suppurationē deueniunt. Sed & febres tales ad suppurationē perducit. Quos ex lateris dolore cibi fastidia sequuntur, oris uentriculi dolore ac sudore aliquantulū uexantur. Facie flores habente, & aluo liquidiore, suppurationes circa pulmonē habent. Eræctæ ceruicis spirationes facit hydrops siccus. Cōuulsiones omnes quidem molestæ sunt, & dolores in principio in rētos inducūt, & postea quoq; aliquos cōmonefaciunt. Verum difficilissima sunt circa thoracē, & maxime periculosa. Quibus est uomitus sanguinis, febris multa, & dolor circa mammā, thoracem, & dorsum; quibus hæc omnia fiunt, breui moriuntur. Quibus autem non omnia, neq; ualde, tardius. Inflammati autē sunt diebus quatuordecim ad summum. Sanguinem spuuentibus confert, ut sint sine febre, & tussiant, ac doleant leuiter, & ut sputum tenue fiat ad dies bis septē. Febrile uero & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinē recentē semper spuere, in cōmodum est. Quibus latus subleuatur in tumorē ac calidius est, & inclinatis in alterū, grauitas aliqua impedere uidetur, his pus ex una parte est. Suppuratis pulmonem per aliu pus secedere, lethale est. Quicunq; uulnerati in thoracem, externa uulneris parte sanati sunt, interna nō, periclitantur ne suppurati fiant. Quibus aut

debilis inducta est intus cicatrix, facile refringitur. Ex peripneumoniacis suppurationibus seniores magis pereunt, ex reliquis iuniores. Quibus suppuratis dum concutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus puris habent hi, quibus paucis, si difficilius spiraret & meliorem colorem habeant. Quibus autem strepitus quidem nullus fit, uerum difficultas spirandi fortis, & unguis liuidus, hi plerumque sunt pure, & perniciose habent. Qui spumofum sanguinem uomunt, dolore infra septum transversum non existente, de pulmone uomunt. Et quibus quidem magna in ipso uena rupitur, multum uomunt, & in periculo uersantur. Quibus uero minor, minus educunt, & securiores sunt. Quibus tabidis sputum in ingruam nidorem olet, & capilli de capite fluunt, pereunt. Quibus tabidis in mare expuentibus, pus ad fundum sedit, breui pereunt. Sit autem mare in aeneo uase. Quibus tabidis capilli ex capite defluunt, a profluuium alui moriuntur.

Et quibus tabidis alui profluuium accedunt, moriuntur. In tabescentibus sputa suppressa, mentem ad nugae garriendas emouent. His spes est haemorrhoidem apparere posse. Tabes periculosissimae sunt, a ruptione uenarum crassarum, & a defluxu de capite. Aetates periculosissimae sunt ad tabem, ab anno decimo octauo, usque ad trigessimum quintum. Pruriginosa corpora post aluum suppressam, in tabidis mala sunt. In habitibus tabescentibus cum febre, fluxiones ad gingiua & dentes conparentes, malae sunt. In omnibus in tumorem eleuata praecordia, mala sunt, in tabidis autem pessima. Ex his qui diutina tabe perniciose consumpti sunt, aliqui ante finem rigore apprehenduntur. Pustularum eruptiones uelut ferro lancinatae, habitus tabem significant. Difficiliter spirantes ex putredine, multa cruda educentes in tabe, perniciose habent.

Quibus hepaticis multum est sputum cruentum, siue subputridum, siue biliosum meracum, statim perniciosum est. In hepatico colliquatio cum rauedine, malum, tum alias, tum si aliquantum tussiat, Hepar dolentes, os uentriculi dolentes, soporosi, rigorem habentes, & aluum turbatum, tenues, cibum auerfantes, multum exsudantes, purulenta per aluum egerunt. Hepar de repente circa dolentibus, febris accedens dolorem soluit. Qui sanguinem spumofum spuunt, praecordium dextrum dolentes, de hepate spuunt, & moriuntur. Quibus hepar uisus, uelut amurca prodit, lethale est. Hydropes ex morbis acutis dolorosi fiunt, ac perniciosi. Incipiunt autem plerique a laterum mollitudine, aliqui etiam ab hepate. His igitur quibus a laterum mollitudine initium sumunt, pedes tument, & alui profluuium diurna sequuntur, aluum non mollientia, neque dolores ex lumbis & laterum mollitudine soluetia. Quibus uero ab hepate, tussis adhuc prompte oboritur, & pedes tumet, & aluus dura egerit, eaque ad necessitatem coacta, & tumores circa ipsam fiunt, partim in dextera, partim in sinistra, & rursus sedantur. In hydropicis siccis, urinae stillicidia mala. Mala etiam urinae paruas subsidentias habentes. Hydropicis comitialis morbi affectiones accedentes, perniciosae sunt, & inter se signa praua sunt, & aluos humectant. In biliosis aluus turbata, egeres parua geniturae similia, mucofa, & dolorem circa pubem inducentia, & urinae non facile solubiles prodeutes, ex talibus in hydropem desinunt. Hydropico febrienti, urina parua, & turbata, perniciofa est. In aqua inter cutem incipiente, alui profluuium aquosum fiens, citra cruditatem, morbum soluit.

In hydropico sicco sui significationem praemittente, tormina circa intestinum tenuerunt.

nue incidētia, mala sunt. Ex hydropicis comitiales perniciosi. Hydrops qui ad curationē remisit recurrens, desperatus est. Hydropicis circa uenas aqua, in aluū prolapsa, solutio fit. Dysenteria intēpestiue suppressa, abscessus in costis, aut uisceribus, aut in articulis facit. Num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut uisceribus fit? Dysentericis uomitus biliosus in principio, malus est. Quibus ex dysenteria acuta, humor ad purulentiam deuenit, his id quod superstat, ualde albū ac multū erit. Dysentericæ, subrubræ, limosæ, largæ egestiones alui, in flāmeis ualde rubicundis coloribus solutæ, in sania timorē inducunt. Dysenteria nō longa splenicis comoda est, longa uero mala, desinente enim si hydropes, aut intestinorū leuitates fiunt, lethale est. In intestinorū leuitatibus, cū animalculis, dolores tormine soluti, partes circa articulos tumefaciūt, ex talibus squamulæ rubicundæ pustulosa: hi ubi exudarūt uelut flagris cæli rubeſcūt. Qui in longis intestinorū leuitatibus, unā cū animalculis, tormina patiūtur, & doloribus afficiuntur, his soluis intumescūt. Insuper rigere his malū est. Intestinorū leuitates cū spirādī difficultate, & lateris pūctura, in tabē desinunt. Voluulosis uomitus, & surditas, malū. Vesicæ duræ & dolētes, omnino quidē malæ sunt, pessimæ uero cū febre cōtinua. Nā dolores ab ipsis uescicis, ad occidendū sufficiunt, et alui his nō ualde egerūt. Soluti aut hos urina purulenta prodīēs, albam ac leuem subſidentiam habens. His uero non solutis, neq; uescica mollescēte, in primis circuitibus, agrū moriturum esse timor est. Fit autē hoc maxime à septē annis, usq; ad decimū quintum. Calculosi ita figurati, ut lapis ad urinariū meatū non illabatur, facile mingūt. Quibus tuberculū est circa uescicā, quod mingēdi difficultatē inducit, ad omnis generis figuras uexātur. huius aut solutio fit, pure erūpente. Quibus urina clandestine allabitur ad pudendū, exoluūtur desperati. In urinæ stillicidio uoluulus accedēs, septima die perimit, si nō febre accedente urina aceruatim prodeat. Torpores, & sensus stupiditates, præter morē sientes, futuræ syderationis signū sunt. Qui ex uulnere impotētes sūt corpore, febre quidē accedente citra rigorē sanantur: nō autē accedente, syderati sūt dextra aut sinistra parte. Syderatis si hæmorrhoides accedant, utile est: Si uero frigiditates & torpores, malū. In syderatis ex spiritus ægralatione, sudor accedens, lethale. Rursus aut in his ipsis si febris accedat, solutio fit. Syderationes derepēte exolutorio modo sientes, febre in super tēporis progressu accedēte, perniciosæ sunt. Quibus ex aliqua ægritudine, ad aquam intercutē res deuenit, his alui siccæ excrementa caprini stercoreis pilulis similia egerunt, cū eliquatione mucosa, & urina nō bona, & distentiones circa præcordia, & dolores ac tumores circa uentrē, & dolores circa laterū mollitudinē, et iuxta spinæ musculos accidūt: febres itē, & sitis, & tussis sicca sequuntur, & circa motus spirādī difficultas, & crurū grauitas, & à cibis abstinent, & paucis ingestis expleuntur. Hydropas leucophlegmatias appellatos, alui profuuiū sedat. At tristitia cum silentio, & hominū auerſationes, leniter eo modo affectos occidūt. Qui ex timore cū perfrigeratione mente mouentur, febres cū sudoribus, & somni uocem aliquantū intercipientes, hæc soluūt. Ex infania, ad raucedinem cū tussi, fit dilcessus. In furiosis cōuulſio accedens, dissipatio nem facit. Mentis emotiones taciturnæ, nō quiescentes, oculis circūspiciētes

entes, spiritū extra efferentes, pernicioſæ ſunt. Faciūt aut̄ & leues ſyderationes diurnas. Sed & ita affectū ad inſaniam deueniūt. Qui uero in uentris turbatione ita exacerbantur, his nigra circa iudicationem prodeunt. Quibus ſanis hyeme circa lumbos frigiditas, & grauitas ex leui cauſa, & aluus ſuppreſſa, ſuperno uentriculo probe officiū ſuum præſtante, his coxædicum morbus, aut rhenum dolor, aut urinæ ſtillicidiū fortassis contigerit. Quibus infernæ partes aſſiguntur, pruritibus antea fortibus obortis, his arenofa urina fit, & ſupprimitur. Qui uero ex his pernicioſe habent, his mens obtorpeſcit. Qui circa articulos rubicundas in ſuperficie puſtulas habent, in ſuperçq̄ rigorem, hi circa uentrē & inguina rubefiūt, uelut ex plagis doloroſis, & moriūtur. Morbo regio affecti, nō ita ſubtili ſenſu præditi, quibus ſingultus ſunt, hisalui erūpunt. Fortassis autē & ſuppreſſio fit, hi uiridanti pallore inſiciuntur. Dolores iuxta latus, in febris tenuiter cōſiſtentes, citra notas, uenæ ſectio læſerit, ſiue cibum auerſetur æger, ſiue præcordiū ſublime habuerit: & in perfrigeratione, nō ſine febre torpidos, ſanguinis detractio lædit: & putantes ſe melius habere, hi moriuntur. Caput & pedes, & manus, perfrigerari, aluo & lateribus calidis, malum eſt. Optimū autem eſt, totum corpus ſimiliter calidū ac molle eſſe. Cōuerti autem conuenit facile ægrotū, & in attollendo ſe leuem eſſe. At grauitas totius corporis, & manuū ac pedum, mala eſt. Si uero etiam ad grauitatem liuidi ſiant digiti ac ungues, mors propinqua eſt. Si uero penitus nigreſcant, minus pernicioſi ſunt liuidis. Verū etiam alia cōſiderare oportet. Si enim facile fert morbum, & aliud quoddā ex bonis ſignis ſubindicat, morbus ad abſceſſum uertitur, & partes corporis nigrefactæ decidūt. Teſtes & pudenda reuulſa, malū ſignificant. Flatum ſine ſtrepitu ac crepitu prodire, optimum eſt. Melius autē eſt & cum ſtrepitu exire, q̄ iſthic reuolui, etiam ſi tali modo progreſſus, dolorē & deſipientiā ſignificet: ſi non uolens homo ultro flatum ita emittat. Vicus liuidū & ſiccum, aut cum uirore pallidū, lethale eſt. Decubitus optimus eſt, uelut quis ſanus ſolitus fuit. At ſupinū iacere, cruribus extentis, bonū non eſt. Si uero etiam delabatur pronus ad pedes, deterius eſt. Lethale autē eſt & hiare, & dormire ſemper, & crura ſupine iacentis ualde incuruata eſſe ac cōplicata. In uentrē autem decumbere, ſi quis non ſit adſuetus, delyriū ſignificat, & dolores circa uentrē. At pedes nudos habere & manus, ſi quis nō uehementer calidus ſit, et crura diſiecta, malū eſt. Anxietatē enim ſignificat. Cæterū erectum ſedere uelle, malū eſt in acutis, peſſimū autem peripneumoniacis ac pleuriticis. Dormire uero oportet noctu, interdium uigilare. Contrariū autem malum eſt. Minime uero lædi æger poterit, ſi dormiat mane ad tertiam diei partem, Verū poſtea ſomni mali ſunt. Peſſimū autem eſt nō dormire, neq̄ die, neq̄ nocte: aut enim præ dolore & afflictione uigilant, & aut hoc ſigno delyrabit. Quibus tēpora ſecantur, cōuulſio ex cōtrarijs ſectioni partibus oboritur. Quibus cerebrū concuſſum fuerit & doluerit, percuſſis, aut aliàs lapſis, hi ſtatim uoce priuantur, & neq̄ uident, neq̄ audiunt, & plerūq̄ moriuntur.

Quibus cerebrū uulneratur, febris plerūq̄ ac bilis uomitus accedit, & corporis ſyderatio, atq̄ tales pernicioſe habēt. Ex ruptis capitis oſſibus, diſſimilima cognitū ſunt ea, quæ circa futuras rūpuntur. Rumpūtur autem maxime à graibus ac rotūdis telis, & ex his quæ ex ſubcōtrario afferūtur, & nō ex pla-

no

no loco. At uero de quibus ambigū est, rupta ne sint an nō, iudicare oportet, exhibitio ad manducandū in utraq; maxillam asphodeli caule, aut ferula, ita ut animaduertere iubeas, an os aliquod ipsi strepere uideatur. Nam fracta strepere uidentur. Progressu uero tēporis, fracta partim septima, partim decima quarta, partim etiā aliter significationē de se praebent. Nam & carnis ab ossē discessus fit, & os liuidū, & dolores sanie effluente. Hæc autē ægre iam auxiliū admittunt. Quibus omentū excidit, necesse est putrefieri. Si intestinū quoddam ex gracilibus dissectū fuerit, nō coalescit. Nerus dissectus, aut genæ tenuis pars, aut præputiū, non coalescit. Quodcūq; os in corpore relectū fuerit, aut cartilago, nō augetur. Ex uulnere conuulsiō accedens, mala est.

Ex uulnere bilis uomitus accedens malū, & maximē in capitis uulneribus. Neri crassi si uulnerantur, plerunq; claudi fiunt, & si obliqui uulnerantur præsertim, & si musculorū capita, maxime in femoribus. Moriuntur maxime ex uulneribus, si quis cerebrū fauciatus fuerit, aut spinalē medullam, aut hepatis, aut septū transversum, aut cor, aut uesicam, aut uenā crassam. Moritur autē etiam, si in arteriam & pulmonē ualde magnæ plagæ fiant, ita ut pulmone percusso, paucior spiritus per os procedat, q̄ is est qui ex uulnere elabatur. Moritur autē qui in intestina uulnerati sunt, siue ex tenuibus aliquod, siue ex crassis uulnerati fuerit, si per transversum fiat plaga, & magna. Si uero parua & recta, quidam euadūt. Minime uero moriūtur uulnerati in partibus corporis ubi hæc nō sunt, aut ab his q̄ longissime ab sunt. At uero uisus obscuratur in uulneribus frontibus in supercilium, & paulo altius. Prout aut uulnus recētius est, maxime uident. cicatrice uero diutius tardante ac fenescēte, magis obscurari contingit.

Fistulæ difficilimæ sunt, quæ in cartilaginosis & ex carnibus locis sunt, & caruæ sunt, & procedunt ac sanie manant semper, & carūcula in osculo ipsis inest. Curata aut faciliores sunt, quæ in mollibus & carnosis et nō neuosis existunt.

Morbi hi ante pubertatē non fiunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, uarix circa tibiā, fluxus sanguineus, cancer nō cōgenitus, uiriligo leucodicta nō à natura inrita, defluxus medullæ spinalis, hæmorrhoides, uolulus chordeus appellatus non cognatus. Horū morborū nullū ante pubertatē fore expectandū est. Verū ab anno decimo quarto, usq; ad quadragesimū secundum, natura corporis morborū omnis generis ferax fit. Rursum ab hac ætate, usq; ad annos sexaginta tres, nō sūt struma, neq; lapis in uesica, nisi prius existat, neq; de fluxus medullæ spinalis, neq; nephritis, nisi ex alia ætate comitentur, neq; hæmorrhoides, neq; fluxus sanguineus, nisi prius fuerit. Hi usq; ad senectutē absunt morbi.

In mensibus muliebribus qui aquosi ante partus prodeūt, mali sunt. Ora feruida aphthæ ulcere affecta, uterum gestantibus, non sunt bona. Num & alui humectantur. Dolores ex laterum mollitudine, ad intestinum tenue transeuntes, in morbis longis, ex corruptione foetus non ualde purgata, perniciosi sunt. Quæ ex partu ac foetus corruptione multa repente concitata, supprimūtur, difficilia sunt. Rigor his infestus est, & alui turbatio, tum aliās, tum si præcordium doleant.

Uterum gestantibus dolores capitū soporosi, cum grauitate fientes ac conuulsiōne, plerunq; mali sunt.

Quibus dolores pertinaces ex mētib; circa supernam partē, & intestinū tenue, aluos humectant, aliquantū cibos auersantur. His circa iudicationē, delationes

tiones in somnū fiunt, & impotētes ex capitis dolore exsudant, ac perfrigerantur. Tales recidiuæ plerisq; fientes post remissionē, cito occidunt. Spiritus qui cū suspirijs extra feruntur, & colliquatio præter rationē, in uterum gestantibus abortū facit. Dolor uentris post partū, in his purulēta purgat. Torpidæ, & præsertim in motibus, cū impotentia fractæ, circa iudicationē uexatæ, anxiosæ, multū exsudant. Alui his humectæ, malū. Menses nō supprimi cōmodum est, ex talibus comitiales morbi fiūt, ut arbitror, quibusdā uero uentris subductiones diurnæ, quibusdā hæmorrhoides. Prægnātibus præcordij dolor, malū. & alui his subeūtes, malū. et insuper rigere his malū. Dolor uētris in talibus, minus malū, si limosa purgētur. Quæ ex talibus facile pariūt, post partū uehemēter molestantur. Prægnātibus tabescentibus quibus rubor in facie fit, stillationes de naribus fiētes hūc auertunt. Quibus ex partu prodeūt alba, his uero suppressis cū febre surditas, & dolor acutus ad latus fit, mente mouentur, & perniciosē habent. In gestantibus uterū salfuginosa, significant post partū molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes indurāt. singultus in his, malū. Ad pedes & ad lūbos distētionē ex mēsis, suppurationē inducūt, itēq; ea quæ de aluo uiscosa graueolētia cū dolore prodeūt. Strāgulationē quoq; ex præscriptis suppurationē faciūt. Vterinæ in uentriculis duricies dolorosæ acute, perniciosum. Vterū iam gestātibus ex feruido ulcere fluxiones dolorosæ, malū. Hæmorrhoids his pessimū. Quibus aluo tumefacta, ad pudendū rubor deuenit, mēsis. albis humidis derepēte progressis, in longis febribus moriūtur. Cōuulsionis, si mēses in principio apparuerint, febre nō accedente, solutio fit. Vrinæ tenues cū aliquātula nubecula in medio cōsistente, rigore significant. Si à quarta die sanguinis fluxus fiat, diurnitatē significat, & aluus erūpit, & crurū tumores. Vterū gerentibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt, fortassis aut his etiā conuulsoriū quid pati contingit. Quæ ante partū, iuxta modū bilis sursum ac deorsum erūpentis, doluerunt, facile quidē pariunt, uerū si febricitent, maligne habēt: tum aliās, tum si circa fauces quid uexet, aut aliquod signū in febre malignum appareat. Aquosa ante partus erūpentia, mala. Vterū gestātibus salfuginosæ iuxta fauces fluxiones, malū. Ante partū rigore habere, & partus circa dolorē, periculosi. Vterū gerētibus ex feruido ulcere fluxiones, malum: cōuulsæ, exolutæ, & postea perfrigeratæ excalescūt acute. Sed & difficiles fiūt prægnātibus tumores circa tenue intestinū, quales circa eminentias oculi uteri fiūt, erectæ ceruicis spirationē inducentes. Num tales tumores gemellorū partum significant: Num & cōuulsionem tales tumores faciūt. Quæ suspiriosum efferunt spiritū in febribus, abortiunt. Horrorē habentibus, lassitudine affectis, capite grauatis, menses erūpunt. Ad manum torpidæ, obaridæ, sitis exortes, menses multos emittentes, suppuratæ fiunt. Alba derepente ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit, & ad femur impetus, in his tremor difficilis est. Ora feruido, aphtha appellato, ulcere affecta, uterū gestantibus aluos humectant. Prægnātes præægroatēs ante partus insuper rigēt. Torpefactoriæ exolutiones difficiles quidē ex partibus contingūt, & mentē emouētes, nō tamen perniciosæ. Sed & mensiū copiā præsignificant. Quæ in partu os uentriculi prædoluere, paulo post eiciunt. Horrores, lassitudines

dines, capitis grauitates, colli dolores, menses extrudunt. Circa iudicationē tale fiens cum tulsicula rigore in super inducit. Quibus puellis erectae ceruicis spiratio cōtingit uterum gestantibus, his mammae suppurantur, & menses apparere in principio, malū est. Infantiae febres acutas turbulentas nō bilioso os uetriculi dolenti soluunt. In sterilibus, & nō parietibus sanguinis uomitus ad cōceptionē prodest. Caligines mensibus multis comparatibus soluuntur.

Quibus mulieribus ex febribus dolor mammarū fit, sputatio cruenta non feculenta oborta, soluit dolores. Cōuulsiones ex utero affectio sine febre fa- ciles sunt, uelut etiā Dorcadi. Quibus ex rigore febris lassatoria, menses de- currunt, collum in his dolorosum sanguinis eruptionē inducit. Vomitus minime molestus est ex pituita ac bile permixtus, uerū ne ualde multus uomatur. At meraciore uomitiones deteriores sunt. Prasinus aut uomitus, et niger, & liuidus, malus est. Si uero etiā omnes colores idē uomuerit, perniciosum est. Celerrimā autem mortē significat liuidus, & male olens. Est etiā lethalis ruber uomitus, & maxime si cū necessitate dolorosa uomatur. Qui anxie se iactan- tes, citra uomitū exacerbantur, male habēt, itemq; qui lancinantur citra uomitū. Parui uomitus biliosi sunt, tum aliās, tum si uigilauerint. In nigris uomitibus surditas non nocet. Pauci fientes, celeres, biliosi, meraci uomitū mali sunt in alui subductione uberiore, & pertinaci lumborū dolore. Ex uomitibus anxietates, clangores, oculi concretionē lanuginosam habentes, sur- riosa. Acute infantia correpti, uoce intercepta, ita affectū moriuntur. In uomitū si quis siticulosus fit, & sitis exors fiat, malū est anxiosis uigilantibus. Abs- cessus iuxta aurē maxime fiunt anxiosis. Aluo turbata suppressa, breui ue- lut culicum punctura erumpunt, & ad oculos lachrymosus abscessus deuenit.

In meracis uomitibus singultus, malus, mala etiā cōuulsio. Similiter etiā in- nimis purgationibus ex medicamentis. Qui uomituri sunt, antea sputatio- nes faciunt. Ex ueratro cōuulsio, perniciosa. In omni purgatione redun- dante, frigiditas cū sudore, perniciosa est: & qui in super uomitū siticulosi in his, malum. Anxiosi, lumbos dolentes, aluo humectantur. Purgationes ualde rubicūdorum, nigrorū, à ueratro, malae sunt: & cū talibus exolutio, mala.

A ueratro uomere rubicūda, spumosa, pauca prodest, facit tamen duricias, & suppuraciones magnas abducit. Sunt aut hi qui talia uomunt aliās & pectus dolorosi, & in rigoribus exudantes, & testes intumescunt, quod si cōtigerit in- super rigent & gracilescunt. Frequentes per eadem recidiuae uomitoriae, circa iudicationem nigrorum uomitum faciunt, sūt item tremulae. Sudor optimus quidē est, qui febrē in die iudicatorio soluit. cōmodus aut est & qui le- uat, frigidus uero, & circa caput solum ac collū fiens, malus est. Nam & tēporis diurnitatē, & periculū significat. At frigidus in febre quidē acuta, lethalis est. In mitiore uero, diurnitatē significat. Sudor unā cum febre fiens in acuto morbo malus est. Vrīna in febre albam habens & leuē subsidentia firmata, celerē dimissionē significat. Celerē etiā ea quae ex indiffereta, pinguedinē qua- dam habens, exauescit. At subrubra, & subsidentia subrubra habēs & leuē, si quidē ante septimū diem prodeat, septima die liberat. Post septimū uero, tar- dius, aut omnino post tēpus aliquod diuturnius, & quae in quarto die nubecula subrubra habet, septimo liberat, si reliqua iuxta rationē habeat. Ceterū tenuis et biliosa

bilioſa, & uix tenuem ac exiguā ſubſidentiam habens, & quæ ad melius, ac de-
 terius mutatur, diuturna eſt. Hæc aut̄ diutius cōſequens, aut temporis diutur-
 nitate circa iudicationē fiēte, periculo nō uacat. Aquoſa uero & alba perpetuo,
 in diuturnis morbis difficulter iudicat, & ſecura non eſt. Nubeculæ in uri-
 nis albæ quidem & inferne, cōmodæ ſunt: rubicūdæ uero, & nigræ, ac ſuidæ,
 difficiles ſunt. Periculoſa urina eſt bilioſa, non ſubruba, in acutis: & quæ
 craſſiores farinae partes refert, albas habens ſubſidentias: & quæ uaria eſt colo-
 re ac ſubſidentia, & maxime in fluxionibus de capite. Periculoſa eſt & quæ ex
 nigra in tenuem bilioſam trāſmutatur: & quæ ex ſubſidentia diuellitur: & quæ
 ex cōpactis quibuſdā innatātib, ſubſidentia habet ſubliuidā, limoſam. Num
 ex talibus præcordiū dolent: dextrū arbitror, aut etiā cum uirore pallidi ſiunt:
 & abſceſſus circa aurē dolentes: His paululū erumpens aluus, pernicioſa eſt.

Vrina quæ derepente citra rationē paulatim cōcoquuntur, malæ ſunt: &
 in ſumma, quæ citra rationē matura eſt, in morbo acuto, mala eſt. Mala eſt etiā
 ualde rubicunda ex his, florulentiam æruginoſam cōtinens. Alba uero & diffu-
 ſa pellucida urina, mala eſt, maxime ſi in phreniticis comparet. Mala eſt quoq;
 quæ poſt potū cito mingitur, & præſertim pleuriticis ac peripneumoniacis. Ma-
 la eſt & quæ ante rigore oleoſa mingitur. Malæ ſunt & in acutis uiridātis pallo-
 ris, nō exiſtentes in colore. Pernicioſa eſt urina nigrā ſubſidentia habens,
 & nigra. In puenis uero tenuis, magis q̄ craſſa. Verū in tenuibus uice uerſa q̄
 in craſſis. Et grandinoſa genituræ ſimilis diſuſa, eadēq; doloroſa. Pernicioſa
 etiā eſt omnis quæ latēter mingitur. At peripneumoniacis pernicioſa eſt quæ
 in principio quidē cocta eſt, poſt quartū uero diē attenuatur. Pleuriticis uri-
 na cruēta, caliginoſa, cū ſubſidētia uaria, indiſcreta, lethalis eſt plerūq; in quatu-
 ordēcim dieb. Lethalis eſt itē in pleuriticis breui praſina, nigrā ſubſidentia habens,
 aut furfuracē. Verū in febre ardēti ſtupēfactorio modo detētis, peſſima
 eſt urina ualde alba. Urina cruda multo tēpore manēs, alijs ſignis ſalutaribus,
 abſceſſum & dolore ſignificat, & magis in partibus ſub ſepto trāſuerſo. Si uero
 dolores in lumbis oberrarint, ad coxā, & in febre, & ſine febre. At quæ emitti-
 tur urina pinguedinē habens in ſubſidētia, febrē ſignificat. Cruēta uero in prin-
 cipio miſta, diuturnā, turbata, cū ſudore, recidiuā. Alba uelut iumentorū, capi-
 tis dolore, pelliculoſa, conuulſionē. Quæ ſputo ſimiles ſubſidēcias, aut limoſas
 habet, rigore indicat: Quæ aranei telis ſimiles, colliquationē. At in febribus er-
 roneis nigræ nubeculæ, quartanā indicāt. Decolores autem, nigra innatātia in
 medio habentes, cū uigilijs & turbatione, phrenitidē, puluerulentę cū ſpirandi
 difficultate, aquā inter cutē. Urina aquoſa aut turbata friabili aſperitate, aluū
 liquidam fore ſignificat. Verū tenuis ualde urina ſi denſa fiat, num ſudorem fu-
 turum indicat: iam uero factum, ſpumofa in ſeipſam conſidens. In tertianis
 cū horrore uelut nubeculæ nigræ, horrore inconstantis indicia ſunt. Et
 pelliculoſa urinae, & cum horrore ſubſidentes, cōuulſoriae ſunt. Urina bo-
 nam habens ſubſidentiam, derepente non habens, dolore & mutationem ſigni-
 ficat. At ſubſidentiam habens turbata deſinens, rigorem circa iudicationē. For-
 taſſis autē & in tertianā aut quartanā tranſitionē. In pleuriticis urina ſub-
 rubrā habens leuem ſubſidentiam, ſecuram iudicationem ſignificat. Cum leui
 uirore ac pallore florulenta, albam ſubſidentia habens, etiā celerem. At rubi-
 cunda

cunda ualde & florulenta, subsidentiam cū uirore pallidam, leuem, sinceram habens, diuturnū ualde turbulentū morbum qui in alium trāsmutatur, nō tamen perniciosum. Alba uero aquosa, subsidentia crassas polentæ partes referentem, fuluam habens, dolorē & periculum significat: & quæ cū uirore pallida est, fuluam, crassas polentæ partes referentē subsidentia habēs, tempus & periculum significat. Vrinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, cito & modice cōcoquuntur, malæ sunt, & perfrigerari hoc modo, malum est. Vesica intercepta tum aliàs, tum cū capitis dolore, habet quid cōulsoriū. Quæ in his cū torpore exoluuntur, difficilia sunt, nō tamen perniciofa. Num & aliquantū mente mouentur. Rhenum dolor repentinus, cū urinæ suppressione, calculorum aut urinarū crassarum mictionē significat. Tremores senioribus in febre fiunt, atq; sic cōparentes, fortassis calculos per urinam ægris eijciunt.

Vrinæ suppressio, & grauitas in imo uentris, plerūq; stulicidium urinæ significat futurū. Sin minus, aliū morbum ex quo ægrotare solet. In biliosis urinæ interceptio, breui occidit. Vrina in febre densitatē habens diuulsam, recidiuam aut sudorē significat. In febribus longis, tenuibus, erroneis, urinarum tenuium mictiones, splenicæ sunt. In febre aliàs aliarū urinarū mictiones, morbum produciunt. Vrinæ quæ minguntur à non recordantibus nec cōmonestatis perniciofæ sunt. Num his minguntur uelut si subsidentiam cōturbasset? Quibus urinæ pauca, grumosa, non sine febre, copia ex his progressa tenuis prodest. Prodit autē talibus ab initio, aut breui subsidentia habet. Quibus urinæ cito subsidentia habent, hi cito iudicantur. Comitiali morbo laborantibus urinæ tenues et crudæ, præter morem, sine repletionem, morbi inuasionē significant, tum aliàs, tum si quis dolor, aut cōulsio, in summū humerum, aut collum, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulentum informū uiderit. Parua cōparere, uelut sanguinis stillas, & urinā, & uomitū, & alui egestionem, penitus quidem malum est. Pessimū uero si propinque inter se prodeant. Alui egestio optima est mollis, cohærens ac compacta, subfulua, nō ualde graueolens, prodiens hora cōsuetæ, copia pro ratione ciborum ingestorū. Spissum aut fiat ad iudicationē. Cōmodum est & lumbricos rotundos exire simul ubi ad iudicationē tendit. In acutis spumosa, circūbiliosa alui egestio, mala est. Mala item ualde alba. Adhuc uero peior est quæ farinæ ac sterquilinij speciem refert. Sopor in his malus est, & cruenta egestio, & uacuum uacuatō præter rationē. Alui interceptio, parua nigra, uelut caprarum stercorea, ad necessitatē coacta emittens, nasus his erumpens, malū. Viscosa meraca, aut alba alui egestio, mala est. Mala est & abūde multū fermentata, subpituitosa. Præterea item ex cōpactis quibusdā innatibus, subsidentia subliuida, purulenta, cū biliosa. Sanguinē splendidum egerere, malū est, tū aliàs, tum si quis dolor affuerit. Spumosa, circūbiliosa alui egestio, mala est. Sed & morbū regiū ex talibus incurrit. In biliosis alui egestionibus spumosa florulenta, mala est, maxime ei cui lūbi doluerint, & mēte motus fuerit. Num autē his dolores? Tenuis spumosa alui egestio, aquosam cū uirore pallidā habens subsidentia, mala est. Mala etiā purulenta, & nigra cruenta mala, cū febre, & aliàs, et uaria, abūde bile colorata egestio, mala est, tātōq; deterior quantū colore magis horrida est, præterq; in medicamentorū usu, in hoc enim periculo uacat, si

non copia excedat. & tenuis, mollis egestio, in febre mala est. Mala quoque sicca, friabilis, decolor, tum aliàs, tum si aluum humectet. Nigris uero antea egressis occidit. Liquida alui egestio, & acruatim, & paulatim fiens, mala est. altera enim uigilias, altera exolutionem facere poterit. Liquida subtenuis alui egestio perfrigescens, non sine febre, mala est. Rigores in his uescicæ & uentrem corripunt. Aquosa uero ualde non desinens in acutis, mala; & magis si etiam fitim non habuerit. Valde rubicunda egestio in alui profluuio, mala est. Mala quoque ualde cum uirore pallida, aut alba, aut spumosa, aut aquosa. & parua, & uiscosa, & leuis, & cum uirore subpallida, mala est. Et soporosis torpescit liquidanda egestio, pessima est. Lethale autem & aluum sanguine manare, multa grumosa egestione, itemque alba ac liquida, cum uentre in tumore eleuato. Egestio alui nigra uelut sanguis, & cum febre, & sine febre, mala est. Mala item omnes uariæ abunde ex bile coloratæ. Egestiones desinens in spumosas meracas, omnes quidem exacerbant, conuulsos autem etiam ualde. Ex talibus abscessus iuxta aurem emergunt. At quæ ualde liquidæ fiunt, & rursus compactæ, meraca, stercoraceæ egestiones, longitudinem morbi significat. Valde rubicunda in febre delirium. Alba stercoracea morbo regio difficilis est, itemque liquida quæ seposita ruborem capit. In sanguinis eruptionibus uiscosa egestio nigris uariata, maligna est, maxime autem ualde albidis. Valde alba egestio in febre, non bene iudicat. Aluus turbulenta paruis frequentibus ad egerendum progressibus, maxillas intendit. Soluit etiam rubores in facie fientes. Stercoracea cum contentione egestio, alui afflictionem significat. Pituitosa uero acute cum oris uentriculi dolore, dysenteriam; fortassis autem & lumborum dolorem. Talibus alui circumtensio ad necessitatem liquida demittens, citius restitans, habet quid conuulsorium, Insuper rigere his perniciosum est. Quibus nigra per aluum prodeunt, frigidum sudorem excludunt. Quibus aluus ab initio turbatur, urinæ uero paucae sunt, & progressu temporis aluus quidem siccatur, uirina uero tenuis redudat, his abscessus ad articulos fiunt. Progressus ad egerendum paulatim fientes, horrorem ac rigorem inducunt, & quibus larga sit egestio difficilimum est quartanis incipientibus. Frequentes ad egerendum progressus paulatim fientes, pauca stercoracea subuiscosa habentes, cum præcordij & lateris dolore, morbum regium denotant. Num his suppressis hi cum uirore pallidi fiunt. Arbitror autem & hoc sanguinem effundere. At dolores in lumbis, in his sanguinem fundentibus, sanguinem egerunt splendidum. Cum sopore, & capitis dolore, calefcere in super, perniciosum est. Viscosæ, biliosæ, magis abscessus iuxta aurem faciunt. Quicunque tumores aluo humecta eleuantur, cum doloribus, malum. Aluo uero suppressa, & nulla alia re nouata, cito rumpitur, & malignus est. Vomitiones in his malæ & ferinæ. Quibus & flammeis & ualde rubicundis solutis, graueolens, larga, subrubra fit, hi ne insaniant timor est. Corpus squallidum aluum male affectam significat. In his ualde rubicundæ, instar purulentæ carunculæ, egestiones maxime prodeunt. Ad aluum biliosam mollem stercoracea egerentem, ardores comparentes, tumorem iuxta aurem faciunt. Biliosas egestiones surditas sedat, & surditatem sedat biliosa alui egestio. Pustulæ serpiginosæ supra inguina, ad laterum mollitudinem ac pubem fientes, aluum male affectam significant. Exolutio

lurio dolorem soluens, aluum maxime humectat. Iuxta sedem dolorosae super purationes aluum turbant. Lethales egestioniones sunt, pinguis, nigra, liuida cum graucolentia, & biliosa habens in se simile quiddam ciceri aut fabis frētis, aut ueluti floridos sanguinis grumos, & quae odore similis est egestionioni in fanzium, & uaria eademque diuturna, Talis autē fuerit cruenta, rametosa, biliosa, nigra, praesina, & simul, & permutatis uicibus. Lethalis quoque omnis est quae sentum aegri fugiens exit. Qui potum difficulter deglutiunt spiritu tulsiente, eructatio subtracta intro reuoluta dolorem uentris significat. Mala sunt etiam egestioniones ualde rubrae aëuginosae in quartanis. Et tales sanguinis fluxiones soporosae sunt, ex his cōuulsione moriuntur, nigris antea egressis. Exolusiones alui repentinae praeter rationē, in diuturnitate temporis consumptis, unā cum uocis tremula interceptione, perniciose habent. Tenuis nigrorum egestioniones horridae, meliores talibus sunt. Tales profunt maxime in aetate ante uigorem. Pruriginosae affectiones omnibus nigrorum egestionem significant, & uomitū grumofum. Et tremulae affectiones cum morfu ac capitis dolore, nigras egestioniones significant. Ante tales, uomitus prodit, & ubi uomuerunt, multae tales insuper detrahuntur. Quibus in alui turbatione exacerbatur morbus, circa iudicationem nigra inferne prodeunt. Ex aluo diutine affecta, uomentibus, biliosis, cibum fastidientibus, sudor multus cum impotentia repentina, occidit. In medicamentorum usu, in defluxione, tenuis abunde sanguis eliquefcens, malum est. Duricies circa uentrem cū dolore, in febribus cum horrore cibos auerfantibus, aluo parum ad purgationem humectata, non suppurantur. Unā cum febre aluus turbata saluginoso modo, soporosos, torpidos, non ualde comitatur. Ex aluo liquida lassatos, caput dolentes, siticulosos, uigilantes, ualde rubicūda egestionione solutos, timor est ad insaniam deuenturos esse, si difficulter spirauerint. Ad hoc ubi quis cum uisore pallefcit, bene spirare noxium non est aluo insuper probe egerete. Aduftae egestioniones cōtentionem habentes, aluum male affectam significant. Biliosis aluus turbata, parua, frequenter egerens, distendentia cum paucis mucosis, dolorem circa tenue intestinum haec faciunt, & urinam non facile prodeuntem, ex talibus ad hydropem desinunt. Linguae tremulae quibusdam alui eruptionis futurae signum sunt. Quibus ardor fit, & ad egressas egestioniones alui, insuper exfudant, his febris exacerbatur. Ex aluis liquidis perfrigeratio cum sudore, mala. Ex aluis liquidis, sanguis de gingiuis defluens, lethalis est. Alui egestio pura superueniens, soluit febrem acutam cum sudore.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE CAPITIS VVLNERIBVS, IANO COR-
nario Medico Physico interprete.



N VLLVM capitis vulnus leuiter contemni debet. Sæpe enim cutis sola cõtusa ferro, aut alia aliqua re, si nõ diligenter, & cū quadam cautione curetur: ueluti si sanguis cõcretus non ex- purgetur, aut aliud quiddã negligatur: ulcus in crudescẽs nõ parum molestiã exhibet, & aliquãdo etiam febrẽ inducit: & medico quidẽ negotia, ægroto uero periculum nõ minus af- fert. Verum hoc multo magis cõtingit, si caluaria, & cerebri mēbranã rumpuntur. Quare si non singula hæc diligenter medicus curauerit, sæpe mortis causa existit. Et de his quidẽ omnibus etiã alibi diximus, sed & nunc dicendũ est. Primũ igitur capite uulnerato interrogare oportet: per quid uul- neratũ sit. Deinde quid homo fecerit, quũ uulneratus fuit. Postea qua parte uul- nus inflicturn sit. Nam hominum capita nihil inter se similiter habent, neq; su- turã capitis in omnibus eodẽ loco consistunt. Verũ quisquis ex priore capitis parte prominentiã habet: est aut̃ prominentia, rotũda ossis pars eminẽs præ alia: huius futurã cõsistunt in capite, uelut litera græca tau T pingitur. Breuiorem enim lineã ad prominentiã transuersam cõstitutam habet. alterã uero lineã per mediũ caput, sed secundũ longitudinẽ ad collũ semper habet. Qui uero ex posteriore capitis parte prominentiam habet, huius futurã etiã cõtrario priori modo cõsistunt. Breuior enim linea ad prominentiã transuersa cõsistit. longior aut̃ per mediũ caput, secundũ longitudinẽ ad frontẽ semper cõstitutã est. Quis- quis aut̃ ex utraq; capitis parte, & anteriore, & posteriore, prominentiã habet: huic futurã sunt similiter cõstitutã, uelut litera græca H scribitur. Consistunt aut̃ longã quidem lineã ad utraq; prominentiã transuersã. Breuis aut̃ per me- diũ caput, secundũ longitudinẽ ad utraq; longã lineam definẽs. At qui neutra parte ullam prominentiam habet, hic futuras habet uelut litera græca X pingi- tur. Consistunt autẽ hæc lineã, altera quidẽ transuersa ad tẽpora pertingens, alte- ra uero secundũ longitudinẽ, per mediũ caput. Duplex aut̃ est os iuxta mediũ caput. durissimã uero ac densissimã suprema ipsius pars existit, & infima quã est ad mēbranam. Cõsimilis est color ossis sub carne. cõsimilis est color ossis in ferne. Secedit autẽ à supremo ac infimo ossẽ, à durissimis ac densissimis, ad mol- lius, ac minus densum, & cõmunius, ad duplicatã laminam. Est aut̃ duplicata la- mina cauißsima, ac mollissimã, & maxime antrosa. Est aut̃ & totum os capitis, excepta ualde modica suprema ac infima parte, spõgiã simile. & habet os in se- ipso caruculas similes multas humidã, & si quis ipsas digitis cõterat, sanguis utiq; ex ipsis prodierit. Sunt etiã in ossẽ uenulã tenuiores ac cauiore, sanguine plenã. Quod igitur ad duriciã, & molliciem, & cauitatẽ attinet, sic habet. Quod uero ad crassitudinẽ ac tenuitatem, hoc modo. Vniuersi capitis os tenuissimũ est ac debilissimũ, quod est circa sinciput: & carnem paucissimã ac tenuissimã hac parte os in seipso habet: et cerebrũ hac capitis parte plurimũ subest. Et quia hæc ita se habent, ut & uulnera, & tela æqualia sint magnitudine, & minora: & similiter uulneratus quis sit, & minus; os hac capitis parte & magis contundi-

tur

aur, & rumpitur, & magis intro contusum cedit, & lethaliora, ac ad curandum, & effugiendā mortem, difficiliora sunt uulnera hac parte, q̄ alibi in capite. & ut sint æqualia uulnera, & similiter uulneratus quis sit, & minus: homo ubi etiā aliās ex uulnere moriturus est, breuiore tempore moritur, qui hac parte capitis uulnus habet, q̄ qui alia.

Cerebrum enim & citissime & maxime iuxta sin ciput sentit mala, quæ & in carne, & in osse fiunt. Sub tenuissimo enim osse, ac modica carne, cerebrum est hac parte: & plurimū cerebrum sub sin cipite iacet.

Cæterum ex reliquis ossibus id quod circa tempora est debilissimū est. Cōmissura enim est infernæ maxillæ ad caluariā, & motus in tēporibus sursum ac deorsum, uelut articuli: & auditus prope ipsum est: & uena per tempora exten ta est, caua ac fortis. Omni uero capitis osse robustius est os uerticis: et quod est retro aures, robustius est q̄ totum quod in anteriore parte est: & carnē ampliorē ac profundiorē in seipso hoc os habet.

Et sanē his ita se habētibus, si quis & uulneribus, & telis, omnibus æqualibus ac similibus, & maioribus ac minoribus, similiter sit uulneratus, & magis: hac capitis parte os minus rumpitur, & cōtunditur, & si homo aliās moriturus est ex uulnere, si in posteriore capitis parte uulnus habet, diutius durans tēpore morietur. In lōgiore enim tēpore os suppuratur, & deorsum ad cerebrū transpuratur, propter ossis crassitudinē: & paucius etiam cerebrū hac parte subest: & plures moriē effugiunt ple runq; ex his qui posteriore capitis parte uulnerati sunt, q̄ qui anteriore. Sed & in hyeme diutius tēpore uiuit homo q̄ in æstate, quisquis etiā aliās moriturus est ex uulnere, quacūq; capitis parte uulnus habeat. At uero sedes telorum acutorum ac leuiorū, ipsæ in seipsis sientes in osse, & cū fissura, & cōtusione, ac in trō celsione: fiunt aut hæ similiter, & in anteriore & in posteriore capitis partet: ex his mors nō contingit secundū iustitiā, etiam si contingat. Sutura uero in ulcere si cōpareat, osse denudato, quacūq; capitis parte ulcere siente, debilissimus æger est ad resistendū uulneri ac telo, si in ipsam futurā telum incubuerit: & maxime omnium si telum in sin cipite, iuxta debilissimā capitis partem incussum fuerit, & futuræ circa ulcus, si ita cōtingat, fuerint, & telum ipsas futuras cōtigerit.

Vulneratur porro os in capite tot modis. Singulorū aut modorum plures species fracturæ in uulnere fiunt. Os uulneratū rumpitur, & ossi fissurā continenti ac ambientis necesse est contusionē accedere, si ruptū fuerit. Nam telum quod os rumpit, idem hoc etiā os, aut magis, aut minus contundit, id ipsum uidelicet os, in quo fissurā rumpit. Atq; hic unus modus est. Species aut fissurarum omnigenæ fiunt. Nam & tenuiores, & ualde tenues conspiciæ fiunt. Quædam uero neq; statim post uulnerationē, neq; in diebus, in quibus dolorum utilitas mors homini contingere potest. Rursus aut aliquæ fissuræ crassiores ac ampliores fiunt, quædam uero etiā ualde amplæ. Et aliæ quidē in longiorē modum rūpuntur, aliæ uero in breuiorē. & aliæ rectiores sunt, aliæ etiā ualde rectæ, aliæ uero curuiores & curuæ ac profundiores. aliæ aut ad infernā partem, & per totū os. Poterit aut & os in sua ipsius natura cōtundi, ita ut nulla fissura ad contusionē ossi accedat. Atq; hic secundus modus est. Species aut contusionis plures sunt.

contusionis species.

Nam & magis, & minus cōtunditur, & altius ac per totū os, & minus in altum ac per totū os, & in ampliorē & minorē, tū longitudinē, tum latitudinē. Verū harū specierū nullam oculis intuētī cognoscere datur, qualis nam specie existat, & quanta magnitudine. Neq; enim etiam si sint contusa, & malum factum sit, an

contusa sint, oculis uidere conspicuū fit, statim post uulnerationē: quemadmodum neq; aliqua fissurā uideri possunt, quæ rupto osse procul absunt. Intrō etiam cedit os ex natura sua, unā cum fissuris: aliās enim non intrō cesserit. Nam quod intrō cedit, abrupturq; ac fragitur, intrō cedit ab alio osse, quod in sua ipsius natura manet, & sic sanē fissura adest intrō celsioni. Atq; hic tertius modus est. Intrō autē cedit os per multas species. Nam & maior ossis pars, & minor intrō cedit: & magis ac profundius deorsum, & minus ac magis in superficie. Quin & sede teli in osse contingente, fissura utiq; ad sedem accesserit, & ad fissuram etiam cōtusionem magis aut minus accedere, necesse est, si quidē & fissura accedat ea parte qua & sedes facta est: & fissura fit in osse continente & sedem, & cōtusionem. Atq; hic quartus modus est, in quo sedes teli fit in osse. Sedes autē uocatur, quū manēte osse in sua ipsius natura, telū quod in os incubuit, manifestū fecerit ubi incubuit. Verū in singulis modis plures species fiunt. Et de cōtusione quidē ac fissura, si ambo hæc ad sedem accedant, & si contusio sola fiat, iam dictū est, quod multæ species & contusionis, & fissuræ fiunt.

Hæc autē sedes ipsa in seipsa, longior ac breuior fit, & curuior ac rector, & orbicularior: & multæ aliæ species talis modi sunt, prout etiā figura teli fuerit. & eadē etiam profundiores deorsum, & magis & minus, & angustiores, & ampliores. & ualde amplæ, si dissectione intercisa fuerit. Quanta autē dissectio in longitudinem ac latitudinē fiat, in osse sedes est, si alia ossa dissectionem ambientia in sua ipsorum natura manserint, & nō unā cum dissectione intrō cesserint ex sua natura. Nam si ita contingat, intrō celsio fuerit, & nō amplius ossis sedes. Si uero alia capitis parte uulneratur, & ulcus habet homo, et os carne denudatum est, quintus hic modus est: & hanc calamitatē ubi facta est, nulla re iuuare queas. Nam si passus est hoc malū, nō est quod ex ipso exquirere possis, an passus sit hoc malum, neq; qua capitis parte: & ex his fracturæ modis ad perforationē deuenit, tum si contusio ad uisum incōspicua est, tum si aliquo modo manifesta fuerit: & fissura si incōspicua uisui fuerit, & ad uisum manifesta. Sed & si sede teli in osse fiente, fissura ac contusio ad sedem accedat: & si cōtusio sola accedat ad sedem, absq; fissura: hæc quoq; ad perforationē deuenit. At uero os quod ex sua natura intrō celsit, parū perforatione opus habet: et quæ maxime intrō celsurunt, & maxime fracta sunt, & perforatione minime opus habēt. Neq; sedes ipsa in seipsa fiens, absq; fissura ac cōtusione, perforatione indiget. Neq; dissectio ipsa, si magna ac ampla fuerit. Dissectio enim & sedes idem sunt. Cæterū primū spectare oportet in uulnerato, qua capitis parte, et num in debilioribus, uulnus habeat: et capillos cōsiderare circa ulcus, an dissecti sint à telo, & an intus sint in uulnere: quod si est, periculum est os carne nudū esse. Itaq; dicere oportet, os aliquā læsionem à telo habere. Atq; hæc longe prius cōsiderasse ac dixisse oportet, antequam hominem contingas. Vbi uero iam contigeris, clare nosse conari, an nudum carne os sit, aut non. & si quidem oculis cōspicuum fuerit os nudum, bene habet: Sin minus, specillo cōsiderato. & si quidem in uentris os carne nudum esse, & non sanum à uulnere, eius quod in osse est ditionem primum facere oportet, inspiciēdo & quantū sit malum, & quo opere opus habeat. Oportet etiam uulneratū interrogare ut passus sit, & quo modo. Si uero nō conspicuū fuerit os, multo adhuc magis interrogationē facere oportet, an habeat quid mali, aut nō habeat: & si nudū est os, ut factum sit, & iuxta quem

quē modum. Nam cōtusionēs & fissuras in osse nō apparentes, & tamen præsentes, ex vulnere responsione cognoscere primū conari oportet, an tale quid passum sit os, aut nō passum. deinde ratione et opere exquirere, citra specilli ad motionem. Specilli enim admotio nō indicat, an tale quid mali os passum sit, & an habeat quid in seipso, aut non passum sit. Sed sedem teli indicat specillum, & an intro cesserit os ex natura sua, & an uehementer fractum sit os: quæ etiā oculis conspicua uidenti cognoscere datur. Rūpiunt autē os & obscuris fissuris, & manifestis: et cōtunditur obscuris cōtusionibus: et intro ex sua natura maxime cedit, quū alter ab altero fauciatur, de industria fauciare uolens: aut quum ex altiore loco fit iactus, aut plagæ ictus, uter tandē fuerit, magis q̄ ex plano loco: & si contineat manu telum, siue iaciat, siue percutiatur, & si fortior debiliorem uulnerat. Ex his uero qui cadentes uulnerantur ad os, aut in ipsum os, is qui ex altissimo loco cadit, & in durissimū ac obtusissimū: huic periculum est ut os & rumpatur, & contundatur, & intro cedat ex sua natura. Ei uero qui ex plano magis loco cadit, & in molliorē, os minus hæc patitur, aut etiam nō patitur. Quæcunq; uero illabentia in caput tela, ad os uulnerant, ex his id quod ex altissimo loco illapsum est, & minime ex plano, & quod durissimum ac obtusissimū, & grauissimum ac minime leue est, & quod minime acutum ac molle: hoc & rumpit os, et cōtuderit. & maxime sanē periculum est ut os hæc patiatur, quum & hæc fiant, & è directo aduersus telum, os fauciari cōtingat, siue ex manu percussiat, siue iactū suscipiat, siue quid ipsi incidat, siue ipse collapsus faucietur, ita ut quomodocūq; fauciatus, osse aduersus telū occurrat. Quæ uero tela ex obliquo os fauciant, minus & os rūpunt, & intro ad caput contundunt, etiamsi carne fuerit os denudatū. Nam quædam uulnera ita inflicta, neq; denudant os carne. Profecto ex telis maxime os rūpunt, & manifestis, & obscuris fissuris, & cōtundunt, et ex natura sua os intro cedere faciūt, quæ sunt rotūda, & orbiculata, & undiquaq; plana, & obtusa, & grauiā, & dura: & carnem hæc contundūt, & maturā faciunt, ac cōcidunt: & ulcera hūt à talibus telis in obliquū. Sed & in circuli, subcaua, & suppurata magis fiunt, ac humida sunt, & diutius tempore purgātur. Necessè est enim carnes cōtulas ac cōcitas: pus fieri ac cōsumi. At tela oblonga, multū tenuia, & acuta, & leuia, carnē magis dissecant q̄ contundunt, & os eodem modo. Et sedem quidē inducit id ipsum quod etiā dissecauit. Dissectio enim & sedes idem sunt. Verū nō ualde os cōtundunt talia tela, neq; rumpūt, neq; ex natura sua intro cedere faciūt. Cæterū oportet supra cōspectum tum, quicquid tandē apparuerit in osse, etiā de omnibus his interrogationē facere. Nam magis & minus fauciati signa hæc sunt, si uulneratus soporē altiore incidit, & caligo offusa fuerit, & uertigo, & si ceciderit. Quū autem os carne denudatū à telo fuerit, & circa ipsas futuras ulcus fieri cōtingerit, difficile est sedē teli deprehendere, quæ in alio osse manifesta est, an in sit in osse, aut nō in sit, & an sedes facta sit in ipsis futuris. Occultat enim ipsa futura, asperior existens res liquo osse, & nō satis clarū est ubi in ipso futura est, & ubi ossis sedes, si nō ualde magna sedes fiat. Accedit etiā ruptio ad sedē, plerūq; & ipsa in futuris fiens, & fit etiā hæc ruptio rupto osse deprehensio difficilior, eo quod circa ipsam futuram ruptio fit, si rumpitur, ut plurimū. Prociue enim est hac parte os rūpi ac dissolui, propter ossis hac parte debilitatē ac raritatē, & propterea quod parata

sit futura ut rumpatur ac dissoluatur. Nam reliqua ossa futurā ambiētia rptionis
 exortia manere possunt, eo quod robustiora sunt q̄ futura. Verum ruptio cir-
 ca futurā fiens, etiā dissolutio futuræ est, & nō facile est deprehēdere, neq̄ si à te-
 li sede fiat in futura, ubi rupta fuerit ac dissoluta. Verū difficilius est deprehēde-
 re fissuram ex cōmisione. Fallunt enim & mentē, & uisum medici hę futuræ, fis-
 suræ specię referentes, & reliquo osse asperiores existētes, nisi uehēmēter disse-
 ctæ fuerint ac dissolutæ. Dissectio autē & sedes idē sunt. Proinde si circa futuras
 uulnus factū fuerit, & ad os telū incubuerit, animaduersionē habere oportet, ac
 inuenire quod os passum sit. Nam ab æqualibus magnitudine telis, & similib.
 ac multo minoribus, & similiter & multo minus uulneratus, longe magis malū
 accipit, qui in osse in futuras telū recepit, q̄ qui nō in futuras id recepit. Et ple-
 raq̄ horū perforare oportet. Verū ipsas futuras perforare nō oportet, sed sece-
 dendo in propinquo osse perforationē facere, si perfores. Porro de curatio-
 ne uulnerū in capite, & quo modo deprehēdere oportet affectiones in capite fi-
 entes nō manifestas, ita mihi uidetur. Vicius in capite nullo humore humectā-
 re cōuenit, ac ne uino quidē: neq̄ cataplasmate integere, neq̄ linamēto curatio-
 nem facere. Neq̄ uero cōprimere oportet ulcus in capite, si nō in fronte fuerit,
 aut in loco pilis nudato, aut circa supercilium & oculū. Hic enim sientia ulcera,
 cataplasmatīs ac deligatione magis opus habēt, q̄ in alijs capitis partibus. Cō-
 tinet ac ambit reliquū caput totam frontē, partes autem ulcus ambiētes, in qua
 cūq̄ tādem parte ulcera fuerint, inflāmantur ac intumescūt, propter sanguinis
 inflexionē. Oportet autē neq̄ ea quæ in fronte sunt ulcera, per omne tempus ca-
 taplasmatīs integere ac deligare, sed postq̄ inflāmatio sedata est, & tumor seda-
 tus, à cataplasmatīs ac deligatione cessare. At in reliquo capite ulcus, neq̄ lina-
 mentis, neq̄ cataplasmatīs, neq̄ deligatione curare oportet, si nō & sectione os-
 pus habeat. Secare autē oportet ulceribus in capite ac frōre sientibus, qua parte
 os carne nudū fuerit, & lationē aliquā ex telo habere uisum fuerit. Vlcera ue-
 ro quæ nō habent sufficientē magnitudinē longitudinis ac latitudinis, ad osis
 inspectionē, an quid mali passum sit à telo, & quale id passum sit, & quantū ca-
 ro cōtusa est, & quantā os lationē habet, & rursum an illæsum sit os à telo, & ni-
 hil mali passum sit, & ad curationē, quali nam opus habet ulcus, & caro, et osis
 affectio: talia sanē ulcera sectione opus habēt. Si uero etiā os quidē carne fuerit
 denudatū, subcaua uero fuerint ulcera in obliquū, cavitatē q̄ plurimū resecare
 oportet, ubi nō facile est medicamēto quocūq̄ peruenire. Sed & orbiculariora
 ulcera, ac plurimū subcaua, etiā ipsa resecare oportet, circulo diuisim inciso se-
 cundum longitudinē pro hominis natura, ut lōgius fiat ulcus. At uero in capi-
 tis sectione, reliquæ quidē capitis partes securitatē habent dū secantur. Verum
 tēpora, & adhuc supra tēpora uenā, quæ per tēpora fertur, secare nō oportet.
 Cōuulso enim corripit sectū. Et si quidē sinistra tēpora secta fuerint, dextera cō-
 uulso corripit. Si uero dextera secta fuerint, sinistra cōuulso apprehēdit. Quū
 igitur ulcus in capite secas, osisum gratia carne denudatorū, scire cupiēs an ha-
 beat os quid mali à telo, aut nō habeat, secare oportet uulnus tanta magnitudi-
 ne, quāta sursum opus habere uisum fuerit. Secantē uero carnē ab osse diduce-
 re oportet, quæ ad mēbranam, & ad os existit. Deinde linamētum per torū ul-
 cus adhibere oportet, quod ulcus q̄ amplissimū in posterū diem faciat, cū mini-
 mo

de uuln. xviij cura-
 tione.

mo dolore, ubi uero linamentū adhibuisti, cataplasmate utere, quāto tempore etiam linamēto, ita ut mazam ex tenui polenta in aceto subigas, aut coquas, & tē maxime uiscosam facias. Postridie uero ubi linamentum exemeris, inspecto osse quod passum est, si non conspicua tibi sit uulneratio, qualis nam sit in osse: neq̄ cognoscas an os aliquid mali in se habeat, aut nō habeat: telum autē ad os peruenisse ac læsisse uideatur: radere oportet specillo rasorio, secundū longitudinem ac profunditatē pro hominis natura. & rursus si etiā tranuersum sit os, ruptionū gratia ad uisum inconspicuarū, & cōtusionis obscuræ gratia, quæ nō intro celsit ex natura alterius ossis capitis. Indicat enim ipsa ratio magis, si non etiā aliās cōspicuae fuerint hæc affectiones, ex telo in osse existētes. Et si sedē teli in osse uideris, tum ipsam teli sedem radere oportet, tum ambientia ipsam ossa, ne læpe ad sedē ruptio accedat, & cōtuso, aut sola cōtuso, & deinde lateat, quū non cōspicua existant. Post tē aut os scalpro raseris, si quidē ad perforationem tendere ossis fauciatio uideatur, perforare oportet, & citra perforationē tridū non excedere, sed in hoc perforare, tū aliās, tum tēpore calido, si ab initio curationē susceperis. Si uero suspiceris os ruptū, aut cōtusum esse, aut ambo hæc coniectura facta q̄ uehemēter fauciatius sit, ex uulnerati uerbis: & quod à fortidid cōigit qui fauciauit, si alius ab alio uulneratus fuerit: & quod telum quo uulneratus est, ex maleficorū telorum ordine fuit: deinde quod uerrigo & caligo ipsum corripuerit, & quod in soporem profundiorē incidit, & q̄ ceciderit: His ita fiētibus, si nō cognoscas an os ruptū sit, aut contusum, aut ambo hæc, neq̄ aliās uideas: super os aliquid maxime nigri coloris, nigro medicamēto liquato subactū, imponere oportet: & subextēto linteo oleo imbuto super ulcus, & deinde mazæ cataplasmate appposito deligare: postridie uero exoluto ac expurgato ulcere deradere. Et si sanū nō fuerit, sed ruptū ac contusum, reliquū quidē os rasum albū erit, fissura uero & cōtuso, quæ nigrū medicamentū eliquatū in se ipsam suscepit, in reliquo osse albo nigra erit. Cæterū hanc fissurā inspectā rursus secundū profunditatē radere oportet. Et si quidē radens fissurā hanc cōspectā nigrā exemeris, & deleueris è cōspectu sublata, contusio quidē ossis, aut magis aut minus facta fuit, quæ sanē etiā fissuram à scalpro rasorio deletā rupit. Verū minus horrēda hæc est, et minus negotij exhibuerit, fissura deleta. Si uero in profundo sit, & dū raditur deleri nolit, ad perforationē deuenit hæc calamitas. Sed perforare oportet, ac de cætero ulcus curare. Cauere autē cōuenit ne a liquid mali os cōtrahat ex carne, si male curetur. Nā & perforato ossi, et aliās de nudato, sed sano: & si læsionē aliqua ex telo habeat, & tamen sanū esse putetur, periculū magis imminet ut suppuratū fiat, etiā si aliās futurū non esset, si & caro os ambiēs male curetur, & inflāmetur ac cōstringatur. Ignescit enim, & multa flāma impletur. Et sanē os ex ambiētibus, carnibus in seipsum calorem & flāmam, & quæcūq̄ mala in seipsa habet caro, trahit, & ex his ita suppuratū fit. Malum est etiā humidam esse carnē in ulcere, & putrescentē, et ad multū tempus purgari. Quare suppuratū quidem tē celerrime ulcus facere oportet. Sic enim ambiēs ulcus partes tē minimū inflammabūtur, & ulcus citissime purū erit. Ne cesse est enim carnes cōcitas ac cōtusas à telo suppuratas fieri ac cōsumi. Post tē autem purgatū fuerit, siccius fieri ulcus oportet. Sic enim citissime sanū fiet, sicca carne germināte, & non humida. Et sic quoq̄ ulceri caro nō superincrescet. Eadem ratio mēbranae circum cerebrū est. Statim enim osse perforato & ex-

*perforatio mēbranae
fieri debet.*

cto, ac de mēbrana detractō, ipsam denudatā membranā purā q̄ citissime ac siccam facere oportet, ut ne ubi ad multū tempus humida sit, cōputrescat ac in tumorē attollatur. His enim ita fientibus, periculū est ipsam putrefieri. At uero os quod discedere à quouis alio osse oportet, ulcere in capite fiēte, & sede teali in osse existente, aut aliās osse plurimū denudato: discedit ubi plurimū exanguē factū est. Resiccatur enim sanguis ex osse, & à tēpore, & à plurimis medicamentis. Citissime enim discesserit, si quis ulcus q̄ citissime purgarit, & de cætero & ulcus, & os, tum maius, tū minus resiccauerit. Quod enim citissime resiccatur ac testaceū factū fuerit, ex hoc facto maxime dimittitur ab alio osse, quod sanguinolentū ac uiuū existit, & quū exanguē ac siccum fiat, à sanguinolento ac uiuo ualde discedit. Quæcūq; uero ossa intro cōtusa cedunt ex sua ipsorum natura, rupta aut etiā dissecta, ualde ampla, talia minus periculosa sunt, ubi mēbrana sana fuerit, & quæ pluribus fissuris & amplioribus intro rupta sunt, adhuc minus periculosa sunt, & ad detractionē faciliora fiūt, & nullū ex talibus perforare oportet, neq; periclitari ossa auferre conando, priusq; spōte sua emergant, priore forma exoluta. Emergūt autē carne subnascēte. Subnascitur autē ex duplicata ossis lamina, & ex sano osse, si superna ossis pars sola fuerit corrupta. Sic uero quā citissime & caro subnasci ac germinare poterit, & ossa emerferint, si quis ulcus q̄ citissime suppuratū redditū, purum faciat. Et si per totū os ambæ partes intro cōtusæ cesserint ad mēbranam, & superna ossis pars, & inferna, si quis similiter medeatur, ulcus celerrime sanū erit, & ossa quæ intro cesserūt celerrime emergūt ac reuertūtur. At uero puerorū ossa, & tenuiora & molliora sunt, ea de causa, q̄ sanguinolentiora sunt, & caua, & neq; antrosa, neq; densa, neq; solida: & à telis æqualibus ac debilibus, si similiter ac minus fuerint uulnerati, iunioris pueri uulnus, & magis & citius suppuratur, & in breuiori tēpore q̄ senioris: & si aliās ex uulnere moriturus est, iunior seniore citius perit.

Cæterū si os denudatū carne fuerit, animaduersione habita cognoscere conari oportet, si oculis uidere ac noscere nō datur, an ruptū sit os, et an cōtusum, aut solū contusum: & an sede teli facta, ad sit cōtusum, aut fissura, aut ambo hæc. Et si quid horū os passum fuerit, detractō sanguine, paruo terebello modice & cū cautione, os terebrare oportet. Tenuius est enim os, & minus profundū iuuenibus, q̄ senioribus. Quicūq; uero ex uulneribus in capite moriturus est, & fieri non potest ut sanus fiat ac seruetur, ex his signis dinotionē morituri facere oportet, & quod futurū est prædicere. Patitur enim hæc. Quū quis os fractū, aut ruptū, aut cōtusum, aut quocūq; modo fractū intelligens, per errorem deliquerit, & neq; raserit, neq; perforauerit, ueluti os nō opus habeat, & uelut os sanū existat: ante decimū quartum diem febris corripit ut plurimum in hyeme. In æstate uero post septimū diem febris corripit, & postquam hoc factum fuerit, ulcus colorem omittit, & ex ipso sanies pauca fluit, & quod inflammatum est ex ipso emoritur, & uiscosum fit, & apparet uelut salsamentū, colore fuluum, subliuidum. & os tunc corrumpi incipit, & fit ualde nigrum postremum pallidum aut ualde album euadens. Quum uero iam suppuratum fuerit, in lingua pustulæ oboriuntur, & desipiens æger moritur, & conuulsio pleuroscq; corripit in altera corporis parte: si quidē in sinistra parte capitis ulcus habeat, in dextra corporis parte cōuulsio corripit. Si uero in dextra capitis parte
ulcus

ulcus habeat, in sinistra corporis parte cōuulsio corripit. Sunt autē & qui syderati fiunt, atq; sic pereūt ante septimum diem in æstate, aut decimum quartū in hyeme. Similiter autē significant hæc signa, & in iuniore, si uulnus existat. Quapropter ubi intellexeris febrē inuadere hominē, & ex alijs signis aliquod ip̄i accedere, nō cunctari oportet, sed os usq; ad membranā perforare, aut scalpro rasorio deradere. Est enim & ad perforationē, & ad rasionē, facile ac expeditū. Deinde reliqua sic curare, prout cōducere uisum fuerit, respectū ad id quod fit habito. Quum uero in uulnere in capite, homine terebello perforato, aut nō perforato, osse autē denudato, tumor rubicūdus, ignis sacri speciē referens, accesserit in facie, & in oculis utrisq; aut altero: & si quis tumorē contingat, doleat: & febris corripiat ac rigor: & ulcus ipsum tum quod ad carnē attinet, tum quod ad os, bene habeat ad aspectum: & ambiētes ulcus partes bene habeant, excepto tumore qui in facie existit: & aliud peccatū nullū tumor habeat, quod ad reliquā uictus rationē attinet: Huius infernā aluum deorsum purgare oportet medicamēto, quod bilem ducit, & ubi sic purgatus fuerit, & febris dimittit, & tumor sedatur, & sanus euadit. Medicamentū uero dare oportet, ad uires hominis respiciēdo, prout robore ualidus fuerit. Cæterū de perforationis ac terebrationis usu, ubi ea necessitas ingruat, ut necesse sit hominē perforare, sic statuendum est. Si ab initio assumptam curationē administras, non oportet statim os ad membranā perforare ac excindere. Nō enim cōducit membranā osse denudatā esse, ad multū tempus male afflictam: sed postremū ubi madore corrumpti ac putrescere ipsam periculū est. Est & aliud periculum, si statim osse ad membranā perforato, ipsum auferas, ne in ipso opere membranā per terebellū uulneres. Verum terebrantē oportet, ubi iam ualde parū abest ut os sit perforatum, & os iam mouetur, à terebratione desistere, & sinere ut os sua sponte discedat. Nam in osse perforato, & à perforatione relicto, nihil mali accedere poterit. Tenuē enim iam id quod restat fit. Reliqua uero curare oportet, prout ulceri cōducere uisum fuerit. Terebrantē autem frequēter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquā immergere. Calescēs enim ex circumductione terebellum, etiam os excalfaciens ac resiccans adurit, & maius os perforationē ambiens discedere facit, q̄ aliās discessurum fuisset. Si uero etiam statim uolueris usq; ad membranā perforare, & postea os auferre, eodem modo frequēter eximere terebellum oportet, & in frigidam aquam demergere. At si nō ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam susceperis, ita ut posterior tarde ad curationem deuenias: terebello exsculpto statim os ad membranā perforare ac excindere oportet, & exempto sepe terebello speculari: tum aliās, tū per admotū specillum, circūcirca ipsius terebelli uia. Nam multo citius perforatur os, si suppuratū iam ac transpuratū perforaueris. & sæpe cōtingit ut nō profundū os sit, tum aliās, tū si ea capitū parte fuerit uulnus, qua tenuius magis q̄ crassum os ipsūm existit. Quare cauere oportet, ut in terebelli admotione ne fallaris, uerum qua parte crassissimū os esse uisum fuerit, in eam semper terebellum admotū adigito, ita ut frequēter cōsideres, ac cōmoueas os, et erigere coneris. Postq; autē abstuleris, reliqua uelut ulceri conferre uisum fuerit curato.

HIPPOCRATIS COI CHI

RVRGIAE OFFICINA, IANO COR
nario Medico Physico interprete.



vt similia, aut dissimilia, à principio, à maximis, à facilimis, ab his quæ undiquaq; penitus cognoscuntur: quæ & uidere, & tãgere, & audire licet: quæ & uisû, et tactu, & auditu, et naribus, & lingua, & intelligẽtia sentire licet: quæ & quibus cognoscuntur, omnibus cognoscere licet. Quæ uero ad chirurgiæ officinã. Aegrotãs. agẽs. ministri. instrumẽta. lumẽ. ubi, quomodo. quot, quomodo. quãdo. corpus. uasa commoda. Tempus. modus. locus. Agẽs aut sedens, aut stans, moderate ad seipsum, ad id quod tractatur, ad splendorẽ lucis. Lucis igitur species duæ sunt, altera cõmunis, altera artificialis. Cõmunis, in nobis nõ est. Artificialis, etiã in nobis est. Vtriuscq; uero duplices usus sunt, aut ad lucẽ, aut sub lucẽ. Sub lucẽ, & modicus usus est, & moderatio manifesta. Ad lucẽ uero, ex præsẽtib; ex cõferentibus luminibus, ad splendorẽ cõuertere oportet id quod tractatur, exceptis his quæ aut latere oportet, aut uidere turpe est: ita ut id quod tractatur ex aduerso sit luci, qui uero tractat ex aduerso eius quod tractatur, uerũtamen ut ne tenebras inducat. Sic enim & qui agit uidere poterit, & quod tractatur nõ uidetur. Ad seipsum uero, si quidẽ sedeat, pedes secũdũ rectitudinẽ sursum uersus è directo ad genua sint, distãtia aut parua in cõsistendo intercedat. Genua aut superiora sint inuicib; modice distãtia, pro cõmoda cubiti positione ac appositione. Vestitus expedite, distincte, æqualiter, similiter, cubitis, humeris. Ad id uero quod tractatur, ultra & prope, & sursum ac deorsum, et hac aut illac, aut in medio. Vtra quidẽ & prope termini sunt cubitorũ gibbi, ita ut in anteriore partẽ nõ excedãt genua, in posteriore costas. Sursum uero, ut nõ supra mammas, summas manus habeat. Deorsum, ut nõ inferius q̃ ut ubi pectus ad genua habet, summas manus angulares ad brachia figuret. et in medio quidẽ hoc modo se habet. Hac uero aut illac, ut nõ extra sedẽ: sed pro ratiõẽ cõuersionis & corpus, & operantẽ corporis partẽ producat. Si uero stet, utrisq; pedibus ex æquo insistere satis est. Agere utro oportet ita ut altero pede inscẽdat, nõ eo qui est ad manũ agẽtem, genu ad inguẽ sublato, uelut in sede, sed & alij termini r̃dẽ sunt. At qui tractatur, reliqua corporis parte tractãti inseruiat, aut stãs, aut sedẽs, aut decubẽs, quo q̃ facillime ita uelut figurã habẽs perseueret, seruãs subfluxionẽ, subsidetiã, euerсионẽ, decliuitatẽ. Sic quæ debet seruari & figura, & forma eius qui tractatur, in exhibitione, in tractatione, in habitu postea sequẽte. Ungues neq; præminere oportet, neq; deficere. Digitorũ uertices ad usum exercere, digitis quidem summis plerq;, indice ad magnũ admoto. Tota uero manu prona. ambabus aut aduersis. Digitũ extẽdere cogit magnũ quiddã in medio digitorũ positũ, & oppositũ facere magnũ digitũ indici. Morbum aut esse manifestũ est, per quẽ etiam lædũtur hi quibus ex natiuitate, & educatione, afueuit magnus digitus ab alijs cõtineri. Opera omnia exercere oportet utrisq; seorsim agẽdo, & ambabus simul. Similes enim sunt: ambabus cõiectando bene, pulchre, cito, non laboriose, concinnẽ, expedite. Instrumẽta quidem, & quãdo, & qualiter dicitur. Vbi oportet, ut ne quid impediãt opus, neq; impedimẽto sit inter accipiendũ circa operantẽ corporis partẽ. Si uero alius det, paulo prius paratus sit, & faciat

ciat ubi iusseris. Qui uero circa ægrotantē sunt, id quod tractatur exhibeant prout uisum fuerit. Reliquū autem corpus detineant, ut totum quiescat, tacentes, & præfecto obedientes. Deligationis species duæ sunt, quæ facta est, & quæ adhuc fit. Quæ adhuc fit, cito, nō laboriose, expedite, cōcinna. Cito quidem, perficiendo opera. Non laboriose, facile agēdo. Expeditio uero ad omnia parata est. Concinnitas aut iucunda aspectu est. Ex quibus uero exercitationibus hæc contingant, dictum est. Quæ facta est, bene, pulchre. Pulchre quidem, simpliciter, distincte: aut similia ac æqualia, æqualiter ac similiter: aut inæqualia ac dissimilia, inæqualiter ac dissimiliter. Species uero hæc sunt, simplex, rotunda in orbē, ascia, sima, oculus, rhombus, & semisecta: ita ut species cōgrua sit speciei & affectioni eius quod deligatur. Eius uero quod bene deligatur, duæ sunt species, roboris quidem, aut compressione, aut copia linteolorum, & partim quidem ipsa deligatio sanat, partim curantibus inseruit. Ad hæc igitur lex hæc est. In his autē maxima deligationis uis est. Compressio quidem, ut incūbentia non abscedant, neq; penitus innitantur: sed sint quidē firmata, non autē coacta: & minus quidē extrema, minime uero media. Nexus & filum procedant non deorsum, sed sursum, in exhibitione, & præparatione, & deligatione, & habitu postea sequente. Initia non super ulcus inijcere oportet, sed hinc aut illinc facere nexum. Nexum uero neq; in femita, neq; in opere, neq; illic ubi inane est, ut ne in uanum iaceat. Nexum autē & filum, mollia nō magna. Hoc tamen probe nosse cōuenit, q; omnis deligatio ad decliua et acuminata fugit, uelut in capite, ad partē supernam: in tibia, ad infernā. Deligare oportet dexter partes, in sinistras: & sinistras, in dexter: excepto capite. Hoc uero secundū rectitudinē. Verū cōtraria ex duobus initijs. Si uero ex uno, ad id quod simile est, ad subtilitatē: uelut est media pars capitis, & si quid aliud huiusmodi. Quæ uero mouētur, uelut articuli, qua quidē parte inflectuntur, q; minimis ac expeditissimis linteis obuoluere oportet, uelut poplitē: qua uero circūduntur, expasis ac latis, uelut est patella. Circūdare quoq; in super oportet, comprehensionis quidē gratia eorū quæ circa hæc sunt, appētionis uero uniuersi deligamētī, in quiescētibus & depressiorib. corporis partibus, qualis est et supra, et infra genu. Cōuenit autē in humero quidē, circūductio circū alteram alam: In inguine uero, circū alterā lateris mollitudinē: in tibia, supra suram. & quibuscūq; sursum cōtingit fuga, his inferne appētio cōuenit: quibus autē deorsum, uice uersa. Quibus uero nō est, uelut in capite, his in equalissima parte cōprehensiones facere oportet, & minime obliquo deligamēto uti. Nam stabilissimū postremū circumdatū, uel maxime uagabūda continet. Quibuscūq; autem neq; comprehensio, neq; appētio linteorum, cōmode se habet: his per fila appētionē facere cōuenit, ex iniectioe, aut cōsutione. Deligamēta sint pura, leuia, mollia, tenuia. Obuoluere uero oportet ambabus simul, aut utrisq; seorsim exercere. Conueniente autem deligatione uti, cōiectura ad latitudinē ac crassitudinem partium facta. Obuolutionis capita dura, æqualia, distincta sint. In quibus autem futurum est ut decidant, ea peiora sunt, q; si cito decidant. Quædam uero sunt eiusmodi, ut neq; cōprimere, neq; decidere oporteat. Quæ uero spectat deligatio, aut subligatio, aut ambo, hæc sunt. Subligatio quidem in causa est, ut aut disparata attrahantur, aut expassa contrahantur, aut contracta di-

ducantur

ducantur, aut distorta dirigantur, aut uice uersa. Preparare autem oportet lintea leuia, tenuia, mollia, pura, lata, non confuta, neque extuberantias habentia, & sana, ut extensionem ferant, & paulo praestantiora, non sicca, sed succo imbuta singulis affectionibus familiaria: ad ea quidem quae disparata abscesserunt, ita ut sublimia sedem quidem contingant, non tamen comprimant. Initiū autem sumere oportet ex sana parte, & ad ulcus desinere, quo id quidem quod subest excoletur, aliud autem non amplius colligatur. Deligare autem oportet recta quidem, in rectum: obliqua uero, oblique: in figura doloris exorte, in qua neque contractio, neque discessio contingat: ex qua ubi translatio sit ad appensionē, aut positionē, nō transmutent, sed similia habeant haec, musculos, uenas, neruos, ossa, & bene posita, & bene detēta. Appēsa uero aut posita esse cōuenit, in figura doloris exorte, quae est secundum naturā. In quibus uero discesserint, uice uersa. At quibus expassa sunt, cōtrahere oportet, quod ad alia quidem attinet eodē modo: ex multo uero tēporis spatio interposito cōtractionem facere oportet, & sensim progressu factō cōpressionem, primū minime, deinde magis, ita ut terminus quod maxime facta sit, mutuus cōtractus fiat. Quibus uero contracta sunt, diducere: cū inflammatione quidem uice uersa: sine hac autē, praeparatione quidem eiusmodi, deligatione uero cōtraria. Distorta uero dirigere oportet, quod ad alia quidem attinet, eodem modo, Verum quae quidem abierunt, ea reducere oportet, subligatione, agglutinatione, appensione. Contraria uero contrario modo.

Spleniorum longitudes, latitudes, crassitudes, multitudines. Longitudo, quanta est deligatio. Latitudo, quatuor aut trium digitorum, crassitudo, ut triplices aut quadruplices sint. Multitudo, ut dum circundantur non excedant, neque deficiant. Quibus uero ad directionem, in longitudinē circumdando, latitudinem ac crassitudinē defectu coniectare oportet, ita ut nō aceruatim expleamus. At uero linteorum subligationes duae sunt, prima, ex loco laeso ad supernas partes desinit: altera ex loco laeso, ad infernas. Iuxta locum affectum maxime comprimere oportet: Minime extremas partes: Reliqua uero pro ratione. Deligatio autē multam sani loci partem occupet. Deligamentorum multitudo, longitudo, latitudo. Multitudo quidem, ut ne superetur à loco laeso, neque per ferulas illisio fiat, neque pōdus, neque circūcirca inclinatio, neque effeminatio deligamenti cōtingat. Longitudo uero & latitudo, triū aut quatuor, aut quinque aut sex, cubitorum quidem longitudo, digitorū autem latitudo. Et affulcimentī circumductiones tot sint, ut ne comprimant. Mollia uero & non crassa sint haec omnia, pro longitudine, et latitudine, ac crassitudine partis affectae. Ferulae porro sint leues, aequales, iuxta extremitates simae, hinc atque illinc paulo minores deligatione, crassissimae autē ea parte qua extat fractura. Quaecumque uero partes incuruae sunt & excarnes, in his quae praeminēt cauendae sunt, uelut circa digitos & malleolos, aut positione, aut breuitate. Affulcimentis autem fulcire ac firmare oportet, nō comprimere primum. Ceratum molle, & leue, & purum sit. In aqua spectatur caliditas, multitudo. Caliditas, ut supra suam ipsius manū medicus affundat. Multitudo, ad laxandū quidem & attenuandum, plurima optima est. Verum ad incarnandum ac molliendum, moderata. Moderatio autē in perfusione ea est, quod dum adhuc attollitur pars, priusquam concidat desistere oportet. Primum enim attollitur. Postea uero

uero attenuatur. Positio sit mollis, æqualis, sursum uergens, in eminētibus corporis partibus, uelut calcaneo, & coxa, ut neq; refrangatur, neq; euertatur. Canalem toti potius cruri q̄ dimidio adhibere oportet. Ad affectionem tamen respicere oportet: & reliqua quæ lædere solēt manifesta sunt. Exhibitio uero, & distentio, & restitutio, & reliqua secundū naturā fiant. Natura in operibus est. operis actione quid illa uelit coniectandū est. Ad hæc autē ex quiescente, ex cōmuni, ex cōsuetudine. Ex quiescēte quidem ac remisso, rectitudines cōsiderare oportet, uelut in manus figura. Ex cōmuni uero, extēsiōnē & inflexionē, ueluti figura cubiti ad brachiū, quæ prope ad angularē accedit. Ex cōsuetudine, quod non alias figuras magis ferre possunt, uelut crura extensionē. In hac enim figura plurimum tēpus facillime durarint, nulla facta immutatione. In immutatione uero ex distētiōne, similia hæc habēt, ad habitū aut positionē, musculos, uenas, neruos, ossa, & bene posita, & bene detenta. Distentio fit maxime circa maxima, & crassissima, ac æqualia, & ubi ambo ossa læsa sunt. Secūdo loco ubi subiectū, minime ubi supernū. Si uero magis moderato fiat, detrimentū affert: pueris exceptis. Oportet autē ipsa paululū accliuia habere. Directionis exemplum, æquiuocū, coniugatum, simile, sanum. Defricitio potest soluere, ligare, incarnare, minuere. Dura, ligare. Mollis, soluere. Multa, minuere. Moderata, crassēfacere. Deligare uero oportet, primū ut is qui deligatur dicat, maxime se cōpressum esse circa læsam partē, minime circa extremas: & firmatum se esse, non cōpressum, copia linteorū, non robore: & hac die ac nocte paulo magis, postridie minus, tertia laxē. Reperiat autē postridie in extremis partibus tumor mollis. Tertia uero die deligatū solutū gracilius sit, atq; hoc per omnes deligationes. Secunda uero deligatione an iuste deligatū apparuerit discere oportet. Hinc autē magis & pluribus cōprimatur. Tertia adhuc magis, itemq; pluribus. Septima uero à prima deligatione soluta, inueniantur gracilia ossa ac depressa. At uero in ferulas deligata, si gracilia & pruritus exortia, & sine ulcere fuerint, sinere oportet usq; ad dies uiginti à læsione. Si uero quid suspectum sit, soluere in medio tēpore, & ferulas tertio quoq; die firmare. Appensio, positio, deligatio, ut in eodē statu sint custodire oportet. Figurarū summa hæc est, cōsuetudines, naturæ singulorū membrorum, species ex currendo, ambulando, stando, decūbendo, ex opere, ex remittēdo. Nam usus corroborat, ociū autem colliquat. Aut cōpressionē, aut copia linteorū. Quæcūq; uero effusio sanguine fugillationes, aut cōtusiones, aut uulsiones, aut tumores inflammationis exortes, ex uulnere oboriūtur, ad supernam partē plurimū, ad infernam etiam parum deligare oportet, ita ut manū aut crus nō habeat in decliue, & iniū supra uulnus ponat, ac maxime firmet, minime extremas partes, medio modo medias, ultimā partem ad supernas corporis partes distribuendo, deligatione, cōpressionē. Sed & hæc, copia magis q̄ robore. Maxime autē his linteana tenuia, leuia, mollia, pura, lata, sana debētur, utpote sine ferulis: & ubi perfusione uti oportet. At uero elapsiones aut luxationes, aut tortiones, aut distantia disparata, aut auulsiones, aut abruptiones, aut distortiones, ueluti mutilationes ad alterā partē uergentes, unde quidē excesserunt, remittendo deligare oportet: quò uero excesserūt, intēdendo deligamentū, ut ad cōtraria uergant deligata, etiā priusquā fuerint deligata, paulo magis q̄ ut ex æquo sint, & deli-

gamētis, & splenis, & appētionibus, & figuris, extēfione, defricione, directio-
ne: & hic etiā uberiore perfusione. Cæterū imminutiones multā sanā partē oc-
cupando deligare oportet, ut ex influxione, qua colliquata plus q̄ sua spē im-
minuta sunt, alia deligatione permutata, ad augmentū declinēt, & carniū effor-
mationē faciāt. Melius autē est ut & superna pars simul deligetur, uelut tibie &
femorū, & alterū crus cum sano crure, quo similis sit, & similiter quiescat, &
similiter alimentū excludant, & suscipiant. Linteorū uero copia, non com-
pessione utendū est, remittendo primū id quod maxime opus habet, & utens-
do defricione incarnante, & perfusione absq̄ ferulis. Fulcimenta porro ac
stabilimenta adhibere oportet, ueluti pectori, costis, capiti, & alijs quæ eiuſmo-
di sunt: partim pulsuū gratia, ut ne cōcutiantur: partim etiā distantiarū dispa-
ratarū gratia, circa iuncturas in ossibus capitis, quo firmētur. Et in tussibus, aut
sternutationibus, aut alio motu, qualia sūt circa thoracē & caput stabilimenta.
Horū omnium eadem sunt deligationis cōmoderationes. Qua enim parte læ-
siones sunt, maxime cōprimendum est. Supponere igitur oportet lanam mole-
lem, affectioni cōuenientem: deligare uero nō amplius cōprimendo, ut ne pul-
sus cōcutiantur: neq̄ amplius q̄ ut distantium iuncturarū extremitates mutuo-
se cōtingant. Neq̄ ut tusses & sternutationes fiant, sed ut prohibeantur, stabili-
mentum adhibeatur, quo neq̄ cogatur quid, neq̄ concutiatur.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE FRACTVRIS, IANO CORNAR

rio Medico Physico interprete.



PORTET medicum & luxationū, & fracturarū extēfiones
q̄ directissimas facere. Hæc enim iustissima natura est. Si ue-
ro quid uel hac, uel illac inclinari, ad pronā partem uergere
cōuenit. Minus enim hoc peccatū est q̄ ad supinā. Qui igitur
nihil præmeditati sunt, plerunq̄ nihil peccant. Ipse enim
qui deligatur manum porrigit, ut qui ita à iusta natura cogatur.
Qui uero sapientes sibi uidentur medici, hi sunt nimirum
qui peccāt. Studij igitur nō multi est manū fractam tractare, & quilibet ut ita di-
cam, medicus hoc potest. Verū cogor plura de hoc scribere, q̄ sciam medicos
esse, qui sibi sapiētes esse uidentur ex figuris manus in deligatione, ex quibus ip-
sos indoctos esse putare oportebat. Sed enim multa in hac arte hoc modo iudi-
cantur. Quod enim peregrinū est, quū nondū intellexerint an bonū sit, magis
laudant q̄ familiare, quod iam bonū esse sciūt: & alienū magis laudant q̄ pro-
be notū. Dicendū igitur, quæ nam medicorū peccata de natura manus, tū de-
docere, tum docere uelim. Nam & aliorū corporis ofsiū doctrinā hic sermo as-
fert. Manū itaq̄, de qua nobis sermo est, quidā pronam deliganā dedit, ille ue-
ro cogebat sic tenere uelut sagittātes, quū humerum inijciunt, atq̄ ita habētem
deligabat: hoc ipsum illi secundū naturā esse existimās, & in testimoniū adduce-
bat, tū omnia cubiti ossa, quod directionē inter se haberēt: tum coloris concor-
diam, quod ipsa per seipsam rectitudinē haberet, idq̄ hoc modo & externa &
interna parte. Hoc modo etiā dicebat & carnes, & neruos, à natura productos
esse

esse, & artē sagittandi in testimoniiū citabat. & hæc dicēs ac faciens, sapiens esse sibi uidebatur. Verū aliarum artium oblitus erat, & eorū quæ robore, et eorū quæ artificij operatur ac efficiunt: nō animaduertens aliam in alio figurā secundum naturā esse, & in eodē opere alias dextræ manus figuras secundum naturam esse, alias sinistræ, si ita cōtingat. Alia enim figura in iaculatione secundum naturā est, alia in fundæ iactu, alia in lapidis iactu, alia in pugilatu, alia in quiescēdo. Quos uero artes inuenire quis possit, in quibus non eadē figura manuum naturalis est: & in unaquaq; arte, aliter ad instrumentū quod quisq; habet, & ad opus quod perficere uult, manus figuratur. Ei uero qui sagittandi artem exercet, hanc figurā alterius manus optimā esse, cōsentaneū est. Cardiniformis enim brachij pars, in cubiti sede in hac figura innitēs, oīsibus cubiti & brachij rectitudinē facit, ueluti totū unū esset. & refractio articuli fracta est in hac figura. Verisimile est igitur hoc modo minime flexibilem & rigidissimū esse hunc locū, & nō superari, neq; remittere, dum à dextra manu neruus trahitur. & sic neruū quidē q̄ plurimū trahet, à firmissimo uero ac cōfertissimo emittet. Ex talibus enim sagittarū emissionibus, celeres & uehementiæ, et lōgiquitates fiunt. Deligationi uero cū arte sagittandi nihil cōmune est. Nam & ubi deligauit, si manū ita habiturus esset, multos utiq; dolores maiores uulnere adderet: & si flectere iuberet, neq; ossa, neq; nerui, neq; carnes in eodē permanerent, sed superata deligatione aliō transferrētur. Et quæ tandē est figuræ sagittarij utilitas? Et in hac parte fortasse nō peccaret is qui sibi sapiēs esse uidetur, si ipsum uulneratū sibi manū exhibere pēmitteret. Alius porrō medicus supinā manum præbēs ita extendere iubebat, atq; hoc modo habentē deligabat, hanc figurā naturalem esse putans, cōiectura ex colore facta: & ossa hoc modo secundum naturā esse existimans, eo q̄ os eminens circa manus iuncturā, ubi paruus digitus est, è directo esse apparet eius oīs, ex quo ulnā homines metiūtur. & hæc testimonia adducebat, quod secundum naturā hoc modo figura se haberet. & recte dicere putabatur. At uero si quidē manus supina extēdatur, uehementē utiq; doluerit. Cognoscere autē poterit hoc quisq; sua manu ita extēta, q̄ dolorosa est hæc figura. Nam & debilior uir, fortiorē ita manibus suis comprehensum, ut cubiti flexura supina frāgitur; quocūq; uoluerit duxerit. Neq; enim si gladiū in hac manu habeat, eo uti poterit, adeo uiolēta hæc figura est. Deinde si ubi deligauit quis, in hac figura finat; maior quidē dolor ubi obambularit, magnus autē etiā ubi decubuerit, sentietur. Quin & flectere manū si opus fuerit, omnino necesse est & musculos & ossa aliam figurā habere. Sed & citra reliquā perniciem, in hac figura hæc ignorabat. Os enim circa iuncturā manus eminēs, iuxta paruū digitū, hoc quidē cubiti est. Quod uero in flexura est, à quo ulnā homines metiūtur, id brachij caput est. Ille uero idē os esse, & hoc & illud putabat: itēq; multi alij. Est autē idē cū illo, is qui cubitus siue cubiti gibbus uocatur, in quē innitimur. Si quis igitur ita supinam manum habeat, tūc & os distortū apparet, & nerui à manus iuctura tendentes, ex interna parte & de digitis, distorti fiunt. Tendūt enim hi nerui ad os brachij, unde ulna mēsuratur. Tanta sanè ac talia sunt peccata, & ignorantia naturæ manus. Si uero uelut ego iubeo, manū fractam quis extendat, os quidē quod est circa paruū digitum, ad cubiti flexurā tendens, in directum cōuertēt, rectitudinem uero habebūt nerui à manus iuctura ad brachij summas partes

tendentes; & manus dum appensa excipitur, in cōsimili figura erit, in quali etiā erat dum deligaretur, ita ut neq; ambulanti, neq; decūbenti, ullus dolor aut fatigatio accedat. Desidere uero hominē ita oportet, ut ofsīs pars ad clarissimā presentē lucem cōstituatur, ne is qui extensionē trahat, circa sufficientē directionē fallatur. Nam periti artificis manū admotam, ne os quidē eminens in contactu latere poterit. Porro ex cubiti ofsibus ubi nō ambo fracta sunt, facilior curatio est, si supernū os sauciatū est, etiamsi crassius id existat: partim quod sanū subrentū fundamenti loco ipsi est, partim quod facilius occultari potest, nisi iuxta manus iuncturā sauciari cōrigerit. Crassa enim est caro quę superne innascitur, Infernū uero os excarne est, & nō facile occultari potest, & uehemētiore extēsiōne opus habet. Si uero hoc contritū nō fuerit, sed alterū illud, uilior extēsiō sufficit. At si ambo fracta fuerint, fortissima extēsiōne opus habēt. In puero etenim uidi extēta magis q̄ oportebat, Verū pleriq; minus q̄ oportet extēduntur. Cōuenit autē facta extēsiōne, uolis admotis dirigere: deinde cerato illito nō ita multo, ut ne deligamēta circūfluent, ita deligare, ut summā manum nō inferius cubiti flexura habeat, sed etiā paulo superius, ne ad summā partē sanguis influat, sed intercipiatur. Postea linteo deligare, initio eius supra fracturā iniecto, ita ut firmet quidem, nō tamen admodū premat. Postq̄ autē circūdedit eodē loco bis aut ter, ad supernā partem deligans distribuat, quo sanguinis influxiones intercipiātur, & illic desinat. Cōuenit autē prima lintea nō esse longa. Secundorū uero linteorū initium supra fracturā iniicere, ita ut semel circūdet eodem loco, deinde deorsum distribuat, & minus premens, & magis traducēs, quo linteū ipsi sufficiens sit, ad recurrendū eo ubi alterū desinit. Hic igitur lintea ad sinistram, aut dextrā deligētur, aut ad utram partē contulerit ad fracturæ figurā, et in utrā declinare expedierit. Postea uero splenia extēdere oportet modico cerato illita. Nam sic & mitius & stabilius se habent. Deinde sic linteis deligare alternatim, modo in dextrā, modo in sinistrā: & plerunq; inferne initio facto, sursum ducere: aliquādo etiā superne deorsum. Extremitates autē subaridas, & in acutū abeūtes, splenijs obuolutis curare oportet, ita ut copia opertiorū non totū aceruatim, sed particulatim corrigat. Insuper autē circa manus iuncturā siue articulū laxē circūdare splenia oportet aliās atq; aliās. Copia uero linteorum sufficiens primum, duæ partes sunt. Signa autē bene curati, & terminus recte deligati, hæc sunt: si interrogaueris ipsum an cōpressus sit, & si cōpressum quidē se esse dixerit, sed leniter, & maxime circa ipsam fracturā. Huiusmodi ita facta esse perpetuo dicere oportet eū qui recte deligatur. Signa uero mediocritatis hæc sunt. Ea die ac nocte qua deligatus est, ipse sibi ipsi uideatur non minus, sed magis cōpressus esse. Postridie uero tumorē paruum, mollē, ad summā manum obortū esse. Mediocritatis enim factæ à te cōpressionis signū hoc est. Desinēte autē die minus cōpressus esse sibi uideatur. Tertia uero die deligamēta laxa esse ipsi uideantur. Et si quid horū iam relatorū defecerit, noscere oportet deligationē moderata laxiorē esse. Si uero quid ex relatis abūdauerit, nosse oportet ultra modū cōpressum esse. Et ex his cōiectura facta, postea deligās aut laxabis, aut compri- mes magis. Resoluere autē oportet tertia die, ubi extēderis. Et si primū moderate deligati, hanc deligationē paulo magis q̄ illam cōprimere oportet, & initia supra fracturā iniicere, quemadmodū etiam antea. Si quidem enim hanc prius deliga

deligaueris, sanies ex hac ad extremitates hinc atq; illinc exhauritur. Si uero alia quã aliam partem prius cõpresseris, in illam ex cõpressa exhauritur. In intelligẽtia aut ad multa utilis existit. Sic igitur semper incipere oportet & deligationẽ, & cõprensionem ex hoc loco. Reliqua uero iuxta rationẽ, ita ut quãto longius à fractura digressus fueris, minus cõprimas, nunquã quidem laxa omninõ circũdando, sed adhærentia. Postea uero pluribus linteis deligare oportet in singulis deligationibus. Et si interrogetur, dicat se paulo magis cõpressum esse q̃ prius, & præsertim circa fracturã. Sed & alia, & circa tumorem, & circa dolorẽ, et circa alleuationẽ, pro prioris deligationis ratione fiant. Postq; uero tertius iam aderit dies, laxiora esse ipsi uideãtur deligamenta. Deinde resoluere oportet, & rursus paulo magis cõprimendo deligare, & hoc cũ omnibus linteis quibus deligandus erat. Et postea omnia ea ipsum apprehendant, quæ etiam in primis deligationũ circuitibus contigerant. Vbi uero tertius aderit dies, & septimus à primã deligatione, si quidẽ recte deligatus fuerit, tumor in summa manu, atq; hic non ualde magnus erit: locus aut qui deligatur, in omnibus deligationibus tenuior ac gracilior cõperietur: Verum in septimo etiam ualde tenuis, & ossa fracta magis mouentur, & facilius ad correctionẽ ducuntur. Et si hæc huiusmodi fuerint, facta coaptatione uelut ad ferulas adhibẽdas deligare oportet, paulo magis cõprimendo q̃ antea, si non dolor aliquis maior fuerit ex tumore qui est in summa manu. Postquã autem linteis deligaueris, ferulas circumponere oportet, & uinculis q̃ laxissimis circũdare, quietis saltem gratia, ut ferularũ appositio ad cõprensionem manus nihil faciat. Postea uero & dolor, & alleuatio, eodem modo fiant, uelut in primis deligationũ circuitibus. At uero ubi tertio die laxas esse dixerit, tunc postea ferulas firmare oportet, maxime quidem circa fracturã, sed & alia iuxta rationem, si quidem et deligatio magis laxa fuerit, q̃ cõprimat. Crassissimam autem ferulam esse oportet, qua parte extat fractura, non tamen multũ. Et ad hoc studium uel maxime adhibẽdum est, ut ferula è directo magni digiti non ponatur, sed hæc uel illac: immo neq; à directo parui digiti, qua parte os supereminet in manus articulo, sed hæc uel illac. Quod si ad fracturam conferrat, hac parte aliquas ferulas poni, breuiores ipsas alijs esse oportet, ut ne perueniant ad ossa præminentia, iuxta manus articulũ. Periculum est enim ulcerationis, & denudationis neruorũ. Oportet aut tertio quoq; die ferulis ualde leniter firmare, hoc cogitãtes, q̃ ferulæ deligationis cõseruandæ gratia apponuntur, nõ autem cõprensionis gratia alligantur. Si quidẽ igitur probe noueris, quod in prioribus deligationibus ossa sufficiẽter sunt directa, & neq; pruritus infestẽt, neq; ulla aliqua ulceratio suspecta sit: ita cũ ferulis deligatum finire oportet, donec uiginti dies transgressus fuerit. In triginta enim diebus uniuersis maxime exto cubiti ossa corroborantur. Certum tamẽ nihil est. Nam & natura à natura, & ætas ab ætate ualde differt. Postquam autẽ soluere, aquam calidã affundere oportet, & postea deligare, paulo minus cõprimendo q̃ antea, & paucioribus linteis q̃ prius. Et postea tertio quoq; die soluere, ac rursus deligare, ita ut minus cõprimas, & paucioribus linteis utaris. At uero si ubi ferulis deligatus est, ossa nõ recte posita esse suspiceris, aut aliud quid uulneratum uexet, in dimidio tẽporis spatio, aut paulo prius soluere, & rursus deligare oportet. Victus porro his quibus ab initio ulcera non facta fuerint, neq; ossa extra eminent, sufficit

aliquāto simplicior. Verū parciorē uictū utendū est ipsis, usq; ad diē decimū, ut qui iam etiā quiescant: & obsonijs tenellis utendū, quæ trāsitu mediocritatem exhibent. A uino uero & carnis esu abstinentū. Postea tamē sensim progressū factō reficiēdi sunt. Hic sermo uelut lex iusta posita est de fracturarū curatione, & quomodo tractare oporteat, & quomodo euentus sequi, ex iusta tractatione. Quicquid uero nō ita euentū habuerit, scire oportet, q̄ in tractatione quid defectuose, aut redūdanter factum est. Quin & hæc insuper in hoc simplici modo cōsiderare oportet, quæ nō ita ualde curare solent medici, et quidē quū omnem curationē, & totam deligationē corrūpere possint, si nō recte fiant. Si enimambo ossa fracta fuerint, aut infernū solū: is uero qui deligatus est, in fascia quadā manū exceptā ac appensam habeat, & plurima fasciæ pars circa fracturā existit, ita ut manus hinc atq; hinc pendeat: hūc necesse est reperiri os ad supernā partem distortū habentē. Si uero sic fractis ossibus, & summā manum in fascia habebet, & partē iuxta cubiti flexuram: reliqua uero cubiti pars nō sit eleuata: hic ad infernā partē os distortū habere cōperietur. Proinde in fascia molli latitudinē habente maximā cubiti partē, & manus articulū, æqualiter suspēdere ac eleuata gestare oportet. At uero si brachiū fractū fuerit, si quidē quis extētam manū in hac figura extēdat, musculus brachij extensus deligabitur. Postq; autē deligatus cubiti flexurā inflexerit, musculus brachij aliā figuram habebit. Iustissima igitur brachij extensio hæc est. Lignū cubitale aut paulo breuius, qualia sunt ligna quæ in foramina lignonū immittuntur, suspēdere oportet, hinc atq; illinc catena deligatū. Hominem uero in alta quapiam sede collocatū, ita manu superin cūbere oportet, ut lignū id sub ala sit moderate habēs, ut homo uix sedere possit, & ferē subleuatus sit, supposito postea alio quopiā fulcimēto, et coriaceo puluino uno aut pluribus subiectis, quo moderatā altitudinē habeat cubitus, ad rectū angulū obliquatus. optimū quidē est coriū latū ac molle, aut fasciā latā circū dare, & magnū aliquod pōdus appendere, quod moderate intēdere possit. Sin minus, uir aliquis robustus in hac figura cubiti, circa cubiti flexurā deorsum cōgat. At uero medicus erectus stans, & alterū pedem in altiore quopiā habēs, agressionē faciat, ita ut uolis os dirigat ac cōponat: facile autē dirigetur. Nā hæc extensio bona est, si quis ipsam recte præparet. Deinde deliget fasciarū principijs supra fracturā iniectis: & reliqua omnia, quemadmodū prius monuimus, tractet: & easdē interrogationes faciat: & iisdem signis utatur, an moderate habeat, aut secus. Et per tertium diem deliget, & magis cōprimat. Et septima aut nona die cū ferulis deliget. Et si suspicionē habeat, os nō bene positū esse, intermedio tēpore soluat, & ubi probe collocauit, rursus deliget. Corroboratur autē maxime os brachij in xl. diebus. Postq; uero hos excesserit, soluere oportet, & minus cōprimere, & paucioribus quoq; linteis deligare. Ceterū uictū quendā exquisitiore q̄ prius cōstituere oportet, & ad lōgius tēpus. Eius uero cōiecturam facere oportet, ad tumoris qui in summa manu est robur respiciēdo. Insuper autē & ad hæc animū aduertere oportet: q̄ brachiū à natura ad externā partē incuruatū est, & distortū solet, si nō bene curetur. Sed & alia omnia ossa, quæ à natura ad hanc partē distorta sunt, etiā dum curantur ubi fracta sunt, distortū solet. Ubi igitur tale quippiā in suspicionē uenerit, lata insuper fascia brachiū circū circa cōplecti oportet, & circū pectus deligare: et ubi quiescere uolet, inter cubiti

biti flexurā et costas, spleniū quoddā multiplex cōuolutū ac cōplicitum suppone: aut aliud quid quod huic simile existat. Hoc enim modo incuruatio ossis recta euadet. Cauere tamē oportet, ut ne minus ad internā partē uergat. Pes uero hominis ex multis ac paruis ossib. cōpositus est, quemadmodū etiā summa manus. Frāgūtur quidē nō ita ualde hęc ossa, si nō unā cū corpore, ab acuto aliquo aut graui uulnerato. Vulnerata igitur quomodo curare oporteat, in ulcerationū parte refertur. Si uero quid ē loco suo motū fuerit, aut digitorū articulis, aut aliud quoddā ex ossibus summi pedis, unūquodq; in suū locū cogere oportet, quēadmodū & ea quę in manu sunt. Curare uero oportet cerato, et spleniis & linteis uelut etiā fracturas, exceptis ferulis, eodē modo cōprimēdo, & per tertiu diē deligando. Interrogetur itē is qui deligatur similiter, uelut in fracturis, et de cōpessione facta, & an laxa sit deligatio. At uero sana fiūt in xx. diebus perfecte omnia, exceptis his quę cū tibię ossibus cōmunionem habēt, & cū ipsa ē directo. Cōducit aut hoc tēpore decūbere. At nō tolerant contēnentes morbū, Verū priusq; sani fiāt obambulant: & propterea plurimi nō perfecte sanantur, sed dolor ipsos sępe merito cōmonefacit. Totū enim corporis pōdus pedes uehunt. Qui igitur nondū sani iter faciūt, articuli moti male curātur, ideoq; aliās atq; aliās hi qui ad tibiā sunt dolent. Quę uero cū tibię ossibus cōmunionē habēt, & maiora alijs sunt, et ubi hęc mota sunt, diuturniorē medelā requirūt. Curatio tamen eadē est. Verū linteis & splenijs pluribus uti oportet: Et in totum hinc atq; illinc deligare, cōprimere itē uelut alia omnia, ea maxime parte qua emota sunt, & primas quoq; linteorū obuolutiones eodē modo facere. In unāquaq; uero resolutione, multa calida aqua uti oportet. In omnibus enim circa articulos læsionibus, multa aqua calida affundēda est. Cæterū cōpensiones & laxationes in ijsdem tēporibus eadē signa ostendūt, quę in superioribus: & relaxationes eodē fiant. Sani uero perfecte hi fiūt in xl. maxime diebus, si decūbere sustinuerint. Sin minus, eadem patiūtur quę prius relata sunt, & adhuc amplius. Porro qui cūq; saltu de alto quopiā loco factu, in calcaneum uehementer se fulciuerūt, his ossa quidem disparātur, uenulę uero sanguinē effundunt, carne circa os cōtusa, tumor aut accedit, & dolor multus. Os enim hoc paruū nō est, & supereminet quidē sub tibię rectitudinē, cōmunionē uero habet cū uenis ac neruis principalib. Tēdo aut posterior huic ossi annectitur. Hos curare oportet cerato, & splenijs, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus. Et ab his opus est etiā alijs q̄ optimis ac lenissimis. et si quidē mollis fuerit à natura cutis circū calcaneū, sic sinere oportet. Si uero crassa et dura ueluti quidā habēt, incidere oportet, æqualiter, & attenuare, ita tamē ut ne uulneretur. At uero talia bene deligare nō cuiusuis est. Si em deliget quis, quomodo alia circa malleolos deligātur, ita ut aliquādo circū pedē, aliquādo circū tendinē, fascię circūdentur: hęc cōstrictiones calcaneū separāt: qua parte cōtusio facta est. Atq; ita periculū est, ne calcanei os corrūpatur: & sanē si corruptū fuerit per omne æuū morbus durare potest. Nā & alia quę nō ex tali modo sunt, ipsum corrūpunt, sed in decubitu denigrato calcaneo, ex figurę neglectu: aut in tibiā uulnere fiēte periculoso, ac diuturno, & cōmunionem cū calcaneo habēte: aut in femore: aut ubi ex alio morbo diuturnus decubitus cōtingit. Attamē & talibus diuturnæ ac moleste affectiones fiūt, & quę sępe refringātur, si nō bona diligētia, & multa quie

te curentur. Quare etiam ea quæ ex tali modo corrumpuntur, supra aliquam læsionem, magna corpori pericula inducunt. Febres enim peracutæ oboriuntur, continuæ, tremulæ, singultuosæ, mentem contingentes, paucis diebus durantes ac occidentes. Fieri etiam possunt uenarum sanguifluarum liuores, uenarum natesæ, & cancerationes ex compressione. Fieri autem possunt hæc absque alia corruptione. Atque hæc quidem relata sunt, ubi uehementissimæ contusiones fiunt. Plurima tamen leniter circūcirca contunduntur, neque ullum magnū curationis studium exigunt, sed recte tamē tractare oportet. Quū uero uehemens in fulciendo illisio facta esse uisa fuerit, tunc sanè relata facere cōuenit, & deligationē plurimam facere circū calcaneum obuolutam, ita ut aliquādo ad summās pedis partes, aliquando ad medias, aliquando ad tibiæ partes, ex opposito lintea obuoluantur. Deligare in super oportet & uicina omnia, hinc atque illinc, uelut etiam prius dictum est, & uehementē compressionē non facere, sed cū multis linteis. Præstat autē & ueratrum bibendū dare eadem die, aut posttridie: & tertia die resolvere ac rursus deligare. Signa porro an recrudescant, aut non, hæc sunt. Quum sanguis è uenis effusus, & denigrationes, & his uicina, fiunt subrubra & subdura, periculum est ne recrudescant. At si quidē febre careat, sursum purgans medicamentū dandum est, uelut dictū est: itemque si nō continua febre laboret. Si uero cōtinua fuerit febris, medicamentū dandum nō est. Verum & à cibis, & à forbitionibus abstinentiū. Potu uero utendū aqua, non uino, sed fauorum cremore decocto, aut aceto mulso dulci. Si uero nō recrudescēt, sanguis è uenis effusus, & denigrationes, & uicina partes, cū uisore subpallidæ fient, & nō duræ. & bonum est hoc testimoniū in omnibus sugillatis, sanguine è uenis subter cutē effuso, quod nō recrudescant. Quæcūque uero cum duricia liuescūt, ea ut denigrescant periculum est. Cæterū hoc studio habere oportet, ut pes plerūque paulo altius reliquo corpore habeatur. Sanus autē fieri poterit in sexaginta diebus, si quiesuerit. At uero tibia duo ossa sunt, quorum alterum altero hac parte multo tenuius est, illa uero parte nō multo tenuius. Cohærent autē inter se iuxta pedem, & appendicem cōmunem habent. Verū in rectitudine tibiæ non cohærent, iuxta femur autē cohærent, & appendicē habent, & appendix discriminationem. Longius uero paulo alterū os est, quod secundū paruum digitum est. Et talis quidē est natura ossiū in tibia. Luxantur autē aliquando iuxta pedē ambo ossa, quandoque cū appendice, quandoque uero appendix tantū emouetur, quandoque alterū tantum os. Hæc autē minus molesta sunt, quæ ea quæ in articulo manus existunt, si quiescere homines sustineant. Curatio uero consimilis est uelut illorū. Nam et repositionē ex extēsiōne, uelut in illis facere oportet. Verū uehementiore extēsiōne opus habēt, quāto fortius est ea parte corpus. Plerūque tamē sufficiūt uiri duo, alter hinc alter illinc extēdentes. Si uero nō satis robusti fuerint, facile est uehementiorē extensionē facere. Aut em̄ rotæ modiolū, aut aliud quid huic simile defodere oportet, & molle quiddā pedī circū dare, et postea latis bubulis loris pede deligato, principia lororū aut ad pistillū, aut ad aliud lignū alligare, atque ita ligno in summū modiolū indito refringere, ita ut alij cōtra extēdāt humeris et poplite apprehēsis. potest etiā superna corporis pars necessitate hac extensionis urgeri, partim quidē si ita uoles, ligno rotūdo leuigato alte defosso, partem quandā ipsius supereminētē intra crura iuxta anī & scorti intercapedinem.

dinem applicato, quo corpus sequi prohibeat ad eos qui à pedibus extendunt. Deinde ad crus quod extēditur declinare nō oportet, sed aliquē à latere asiderē, qui nates retrudat, ne corpus circūtrahatur: partim uero si etiā circa alashine atq; illinc ligna affigantur, manus autē extētaxē feruentur, apprehendat autē quis circa genu, atq; ita contrā extendat: partim itē si quis uelit, alijs loris circa genu aut circa femur deligatis, & alio rotæ modiolō supra caput defosso, & loris ex ligno quopiā alligatis, & ligno ita in rotæ modiolū defixo, ad cōtrariam partem his qui à pedibus extēdunt, adtrahere potest. Quin & si uoles, pro rotarum modiolis trabem mediocrē sub lectum extēdes, deinde ad trabis hinc atq; illinc caput ligna fulciens ac refringens, lora ipsis alligata intēdes. Si uero & hoc uelis, asellis hinc atq; illinc cōstitutis, in ipsis extensionē facies. Sunt autē & alij multi extensionū modi. Optimū autē fuerit, si quis in magna ciuitate medicū agit, ut lignū habeat præparatum, in quo omnes necessitates insint, tum ad omnes fracturas, tum ad omnes articularū repositiones, ex extētione, ac uectium usu. Satis autē est si lignū fuerit & longitudine, & latitudine, & crassitudine tale, quales colūnx querneæ quadrāgulæ fiunt. Postq; autē sufficienter extēderis, facile iam est articulū reponere. Eleuatur enim in directū supra pristinam sedem. Dirigere itaq; manū uolis oportet, ita ut his partim in id quod eluxatum eminet innitaris, partim ab altera parte infra malleolū renitaris. Vbi uero reposueris, si quidē fieri poterit, extētū ita deligabis. Si uero præ loris impediaris, his exolutis distentionē facias, donec deligaueris. Deligare autē eodē modo oportet, & fasciarum initijs similiter in id quod luxatū eminet iniectis, & primis obuolutiōibus plurimis supra id factis, imō etiā splenjs plurimis supra id impositis, et cōpressionē maxime isthic fiēte. Sed & hinc atq; illinc multū insuper deligare oportet. Magis autē hic articulus cōpressionē opus habet, in prima deligatione, q̄ is qui in manu est. Postq; autē deligaueris, sublimius reliquo corpore deligatā partem habeat. Positum autē ipsis ita facere oportet, quo q̄ minime pes depēdeat. At uero attenuationē corporis ita facere oportet, prout talem uel talem uim ipsa luxatio habet. Aliqua enim parū, aliqua multū luxantur. In totū uero magis & lōgiore tempore, in uulneribus circa crura, q̄ his quæ circa manus fiunt, attenuare oportet. Nam & maiora & crassiora hæc quam illa sunt: & sanè etiam necessarium est quiescere corpus ac decūbere. Verū postea deligare articulum tertia die, neq; prohibet quicquam, neq; urget. & alia omnia similiter uelut superius relata curare oportet. Et si quidē quiete decumbet, sufficient quadraginta dies, si solum in suum locum ossa rursus defederint. Si uero quiescere nolet, non facile quidem crure uti poterit, & deligatione ad multum tempus uti cogetur. Quæcunq; uero ossa nō perfecte desident in suum locū, sed aliquid deficit, progressu temporis attenuatur coxa, & femur, & tibia. Et si quidem intro luxata fuerint, externa pars attenuatur. Si uero extra, interna. Plurima autem ad internam partem luxantur. Postquam uero ambo tibiæ ossa fracta fuerint, citra exulcerationem, extensione uehementiore opus habent. Extendere autem oportet quibusdam modis ex prædictis, si magnæ emotiones fuerint. Sufficiunt etiā à uiris fiētes extensiones. Plerunq; enim suffecerint duo uiri robusti, alter hinc, alter illinc distēdentes. Intendere autē oportet in directum, secundum naturam, & secundū rectitudinem tibiæ ac femoris, siue tibiæ fractæ,

siue

siue femoris ossa extēderis. Sed & deligare sic oportet utriusq; extētis, utrū tandem horū deligaueris. Nō enim eadem cruri & manui cōferunt. Nam ubi cubiti & brachij ossa fracta fuerint deligata, manus appēla excipitur. At si extēta deligaueris, figuræ carniū alterantur inter flectendū in cubiti flexura. Fieri enim nō potest, ut cubiti flexura ad multū tempus maneat extēta. Non enim sēpe in hac figura, sed in flexione esse cōsuevit. Quin & quū homines obābulare possint, ubi circa manum sauciati fuerint, opus habēt flexione in cubiti flexura. At crus quū & in ambulādo, & in stando cōsueuerit, aliquādo quidē extētū esse, aliquādo uero ferē extētū esse, ad infernā partem secūdum naturā: & sanē etiā ad hoc ut reliquū corpus uehat: propterea facile est ipsi extētum esse, ubi eius necessitatē habuerit. Quin & in cubilibus sēpe in hac figura est, ut uidelicet sit extētū. Postquam aut uulneratū fuerit, necessitas animi propositū in seruitutem adigit. Impotētes enim sūt ad se attollendū, adeo ut ne meminerint quidē, ut inflectant ac exurgāt: sed quiescūt in hac figura decūbentes. Propter has igitur causas, neq; extētionis, neq; deligationis figura eadem, manui & cruri cōducit. Si quidē igitur suffecerit extētio quæ per uiros fit, nihil aliud laboris frustra infumere oportet. Imperitiā enim arguit, machinas adhibere ubi ipsis nō est opus. Si uero nō sufficiens fuerit extētio per uiros, etiā ex alijs necessarijs quædā adhibere oportet, si quæ cōmoda fuerint. Quū aut satis iam extēta fuerint, facile est dirigere ossa, & ad naturā reducere, manuum uolis ac palmis corrigēdo ac coaptādo. Vbi uero direxeris, linteis deligare extēta, siue ad dextrā partē, siue ad sinistrā, circūducere prima lintea conducatur. Initia aut ipsorū supra fracturam injiciantur, & circū hanc primæ quoq; obuolutiones circūducantur, deinde deligando sursum ad tibiam distribuantur, uelut in fracturis dictū est. Cæterū lintea latiora esse oportet, & lōgiora, eaq; multo plura circa crus q̄ in manu. Vbi uero deligaueris, super planū quoddam & molle deponere cōuenit, ut neq; hęc, neq; illęc distorqueatur: neq; repandum, neq; gibbum fiat. Maxime aut cōfert puluinar, aut lineū, aut laneum, nō durum, laxū, per medium secūdū longitudinem subiectū, aut aliud quid quod huic simile existit. Nam de canalibus qui sub crura fracta subijciuntur, quid cōsulam ambigo, an supponere ipsos cōueniat, aut nō. profunt enim, nō tamen quantū putant hi qui ipsos supponūt. Nō enim quiescere cogūt canales, uelut illi putāt. Nam neq; dum reliquū corpus aut hęc, aut illęc uertitur, cogit canalis ut crus ne sequatur, si nō ipse homo huius rei curam habeat: Neq; rursus absq; corpore crus moueri canalis prohibet, uel in hanc, uel in illam partem. Quin & crudelius est lignum subijcere, si non simul molle quiddam in ipsum indatur. At utilissimū est in strato permittendo, & in progressibus ad alium exonerādam. Licet igitur & cum canali, & sine canali, & bene, & male moliri. Verū uulgo persuasum est, etiam medicū minus delinquare, si canalis subijciatur, etiā si minus hoc artē referat. Oportet enim super plano quopiā ac molli cubare crus ipsum, penitus in directum: alioqui necesse est deligationem superari à distortionē, quæ in posito cōtingit, quocunq; & quantuncūq; tandem inclinarit. Respondeat autem deligatus eadem quæ etiam prius dicta sunt. Nam & deligationem talem esse oportet, & tu morem ita attollī ad extremas partes, & laxationes ita, & religationes per tertium diem: & quod deligatur gracilius inueniri, & deligationes magis facere, &

pluri

pluribus linteis, & circū dare pedem laxē, si non uulnus ualde propinquū genu fuerit. Extēdere autē moderate, & dirigere ossa, in unaquaq; deligatione oportet. Si enim rectē cūretur, & tumor secundū rationem procedat: tum locus qui deligatur tenuior ac graciliōr erit, tū ossa adductu faciliōra, & extēnsioni magis obedientia. Postq̄ aut septimus aut undecimus aderit dies, ferulas apponere oportet, quemadmodū & in alijs fracturis dictū est. Cæterū ferularum loca tiones uitare oportet, & secundū malleorū rectitudinē, et supra tendinē, qui est in tibia pedis. At tibiæ ossa corroborantur in quadraginta diebus, si rectē cūretur. Si uero suspicionē habeas, os aliquod directione opus habere: aut de ulceratione aliqua timeas, intermedio tēpore soluere, & probe coaptata religare oportet. Porro si alterū tibię os fractum fuerit, extēnsione quidem debiliore opus habet, nō tamen deficere, neq; segniter agere, in extēdendo cōuenit. & maxime quidē omnes fracturas in prima deligatione, quantū eius fieri debet, extendere oportet: Sin minus, q̄ citissime. Quodcūq; enim os nō recto modo coaptatū deligans quis cōpresserit, locus maiori dolore uexabitur. Reliqua uero curatio eadē est. At uero ex ossibus his internū, tibia & prima tibia appellatū, molestiā maiōrē in curādo exhibet, & extēnsione magis opus habet: & si nō rectē coaptata ossa fuerint, occultari nō possunt. Est enim totū conspicuū et carnis exors, & hoc fracto, lōge tardius progredi eo crure poterint. Si uero externū os fractum fuerit, & multo facilius ferūt, & multo melius occultare possunt, etiā si nō bene fuerit coaptatū. Est enim carnosum, & cito in pedes cōsistunt. Plurimum enim oneris internū tibiæ os uehit. Nam simul & unā cū ipso crure, & oneris secundum crus rectitudine, maiōrē laboris partē internū os suffert. Femoris enim caput supernā corporis partē sustinet. Hoc autē intra crus est, & nō extra, sed secundum tibiæ rectitudinē: & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudinī magis appropinquat, & nō externæ: & simul crassius est internū q̄ externū, quēadmodū etiā id quod in cubito est, secundū parui digiti rectitudinē, tenuius est & lōgius. In articulo tamē inferno nō similis est ossis lōgioris cōstitutio. Inequaliter enim cubiti gibbus siue flexura, & poples flectūtur. Propter has igitur causas, externo quidē osse fracto, celeres progressus hūt, interno uero fracto, tardi.

At uero si femoris os fractū fuerit, extensionē præ omnibus facere oportet, ita ut ne defectuosius fiat. Amplior enim facta nihil læserit. Neq; em̄ si quis distātia ex uehemētia extēnsionis ossa deligauerit, fieri poterit ut deligatio ipsa teneat, ut ita distent: sed coeūt inter se ossa q̄ citissime, ubi intēdentes ipsa remiserūt. Crassissimæ enim ac fortissimæ quū sint hac parte carnes deligationē superabunt, nō ab ipsa superabūtur. Magnū enim dedecus est ac detrimentū, femur breuius efficere. Nam si quidē manus breuior fiat, & occultari poterit, & nō magnus est error. At crus si breuius fiat, claudū hominē efficiet. Sanum enim crus lōgius est, & id redarguit. Quare utilius fuerit, ut si quis male curādu sit, ambo potius crura fracta habeat, q̄ alterū tantū. Equilibris enim ipse sibi ipsi fuerit hoc modo. Postquā uero sufficiēter extēderis, directione ac coaptatiōe per manū uolas facta, eodē modo deligare oportet, uelut etiā prius scriptū est, iniectis etiā fasciarū initijs uelut dictū est, et deligatiōis distributione sursum uersus fiētē. & deligatus eadē respōdeat, uelut etiā prius; & doleat eodē modo, & melius habeat, & similiter rursus deligetur. & ferularū appositio eadē sit. Corroboratur autē

femur

femur in quinquaginta diebus. Insuper uero & hoc cōsiderare oportet, q̄ femur gibbosum magis est ad externā partem, q̄ ad internam, & magis ad anteriorem, q̄ posteriorem. In has itaq̄ partes etiā distorquetur, si non probe curetur, & sanē iisdem partibus etiā ipse seipso magis excarnis est, ut neq̄ occultari possit in distortionē. Si igitur huiusmodi quippiā suspectum habueris, machinari ea oportet, quæ in brachio distorto cōsuluimus. Pauca in super lintea circa coxam, & locū inter coxas & lumbos, circū dare oportet, quo & inguina, & articulus circa intermediā crurum ac inguinum partem plechada appellatam, insuper deligetur. Nam & aliās confert, & ut ne extremæ ferularum partes lædant, si ad nō deligata adhibeantur. Deficere aut̄ oportet semper ferulās, à nuda parte, & hinc atq̄ illinc multū: & positionē ferularum semper ita providere cōuenit, ut neq̄ super os aliquod circa articulos natura prominens, neq̄ super neruum circa articulū fiat. Tumores uero iuxta poplitem, aut circa pedem, aut iuxta aliā quampiā partem, ex cōpressionē eleuatos, multis lanis succidis probe carminatis, uino ac oleo respersis, cerato sublito, deligare oportet, & ubi prefferint ferule, citius laxare. Graciles aut̄ fieri poterint, si supra ferulas gracilibus lintis tumores deligaris, ab infima parte initio facto, ad supernā procedendo. Sic enim q̄ citissimē tumor gracilis fieri poterit, & transcēderit supra priores deligationes. Verū hoc deligationis modo uti nō oportet, si nō periculum fuerit in tumore, pustularū, aut denigrationis. Tale uero nihil fit, si nō quis ualde premat fracturā, aut suspensam habeat, aut manu scalpat, aut aliud quid quod irriter corpori allabatur. At uero canalē si quis sub ipsum femur supponat, qui poplitē non excedat, læserit magis q̄ profuerit. Neq̄ enim prohibuerit, quo minus & corpus, et tibia, sine femore moueatur. Noxius enim erit ad poplitē pertingens, & quod minime oportet, id facere impulerit. Minime uero oportet genu flectere. Omnē enim turbationē deligationibus inducit, & femore, & tibia deligata, quisquis genu flexerit. Neceffe enim erit propter hoc, musculos aliās atq̄ aliās aliam figurā haberet. Neceffe est etiā ossa fracta moueri. Præ omnibus itaq̄ faciendū, ut poples sit extentus. Videtur igitur canalis similiter prodesse, qui à coxa ad pedē usq̄ subiectus cōtineat, & aliās circa poplitē, fasciam cum canali laxè circū dare oportet: quemadmodū infantes in cunis fascijs obuoluuntur. Deinde si femur ad supernā partem distorqueatur, aut ad latus, melius ita contineri poterit unā cū canali. Cæterū calcanei summi ualde magnā curam habere cōuenit, ut & in tibiæ, & in femoris fracturis, apte se habeat. Si enim depēdeat pes, reliqua tibia firmata, necesse est iuxta anteriōrē tibiæ partē, ossa incurua esse. Si uero calcaneum quidē moderato altius fuerit firmatū, reliqua uero tibia aliquantulū eleuata, necesse est huic ossi, ut circa anteriōrē tibiæ partē, moderato cavius appareat: atq̄ hoc adhuc magis, si calcaneum hominis natura fuerit magnum. Sed & omnia ossa tardius corroborantur, si non secundum naturā posita fuerint, itemq̄ ea quæ nō in eadem figura quiescunt: & calli quoq̄ debiliores ipsis obducuntur. Atq̄ hæc quidem de his quibus ossa quidē fracta sunt, nō autem extra eminent, neq̄ aliās ulcus factū est. Quibus uero ossa fracta sunt simpliciter modo, & nō multihido, ita ut eadē die reposita sint, aut postridie in sedem suā recepta, & nullus timor sit fissorū ossiū discessionis: aut etiā quibus ulcus quidem factū est, ossa uero fracta nō extra eminent, neq̄ modus fracturæ talis est,

ut

ut sint segmēta à fissis ossibus separata: tales spes est simplici modo curari posse. Et quidem sanē neq; magni quippiam boni, neq; mali facientes, ulcera qui dem curant aliquo purgatorio, aut picatū ceratū, ut emplastrū cruentis uulneribus idoneū, aut aliud quid ex his quę facere solēt, imponētes: Ego uero eos laudo qui splenia uino imbuta, aut lanas succidas, aut aliud quid huiusmodi deligant: Vbi uero ulcera pura facta fuerint, & iam coalescūt, tunc multis linteis deligare, & ferulis dirigere conātur. Hęc quidem curatio boni aliquid facit, nihil autē magni mali: Ossa tamē non similiter in suam sedē firmari possunt. Verum corpora aliquāto tumidiora ea parte fiunt, q̄ sit oportunū, fiunt autē et breuiora his quibus utraq; ossa, aut cubiti, aut tibię fracta sunt. Alij uero rursus sunt, qui talia statim linteis curant, & hinc atq; illinc linteis deligāt, ulcus uero ipsum relinquunt, & perfrigerari sinunt. Deinde super ulcus purgatoriū aliquod imponunt, & splenijs uino imbutis, & lanis succidis curant. Hęc curatio mala est, & uerisimile est eos qui ita curāt, tum in alijs fracturis, tum in huiusmodi maxime imprudēter se gerere. Maximū enim est cognoscere quomodo initiū linteī iniijcere oportet, & qua parte maxime cōprimere: & quę utilitas contingat, si quis initiū linteī recte iniijciat, & qua maxime oportet parte premat: & quę detrimēta inducātur, si quis nō recte iniijciat, neq; quā maxime oportet premat, sed hinc atq; illinc id faciat. & dictū quidem est etiā in superioribus, quę ex utrisq; eueniāt. Testatur autē & ipsa hęc medicina. Necessē est enim ei qui ita deligatur, tum morē ad ipsum ulcus eleuari. Etenim si sanum corpus hinc atq; illinc fuerit deligatū, in medio uero relicū, iuxta relicū utiq; spatium maxime intumuerit ac decoloratū reddetur, quo modo ulcus hęc nō perpetietur: Necessē igitur est, ut ulcus quidē decoloratū sit, et labijs euersum ac protuberās, uerū lachrymosum & nō suppurans: ossa uero etiā quę discessura nō erant, discedant: sed & pulsans, & febriēs ulcus fuerit. Coguntur autē propter tumorē cataplasmata in super imponere, quod & ipsum incōmodū est his qui hinc atq; illinc deligātur. Pondus enim inutile ad reliquū pulsū accedit. Postremū uero deligationē resoluunt, ubi iam malum ipsis recrudescit, & de cætero citra deligationē curant. Neq; uero minus, etiā si aliud quoddam eiusmodi uulnus acceperint, eodē modo curāt. Non enim deligationē hinc atq; illinc factā, & ulceris perfrigerationē, in causa esse putant, sed aliud quoddā infortunium. Attamen de hoc tam multa nō scripsissem, si non certo scirem incommodam esse hanc deligationē, & multos esse qui ita curent, & magni momēti esse hanc rem dediscere, & testimonio hęc esse, quod recte scripta sint ea quę prius scripta sunt, siue maxime premēdæ sint, siue minime ipsæ fracturæ. Oportet autē ut in summa dicam, his quibus nō est futuri discessus ossis expectatio, eandem curationē adhibere, ueluti his quibus os fractū fuerit, ulcus autē non habent. Nam & extētionēs, & directionēs ac coaptationēs ossiū eodem modo facere oportet, & cōsimilem deligationē. Super ipsum enim ulcus spleniū tenue duplex, picato cerato illiū deligandū est, & circumsitæ partes cerato albo illinēdæ. Verum lintea, & reliqua latiora, aliquantū fissa sint magis, q̄ si nō ulcus haberēt: & id quo primū deligāmus, multo latius sit ipso ulcere. Quę enim angustiora sunt q̄ ulcus, cinctū ulcus tenēt, id quod fieri nō cōuenit, sed prima circūductio totum ulcus cōprehendat, et linteū hinc atq; illinc præmineat. Itaq; secundū ulceris rectitudinē, linteū iniijcere oportet,

& premere paulo minus, quæ si ulcus non habent. Distribuenda uero est deligatio, uelut etiã prius dictum est. Linthea autem semper quidem mollis modi sint, magis tamen in talibus, quæ si ulcus non esset. Copia uero lintheorum non minor sit prius relatis, sed etiã aliquanto amplior. Si uero deligatus fuerit, uideatur is sibi linthea firmata quidem esse, non autem compressa: dicatque super ulcus maxime firmata esse. Eadem autem tempora esse oportet, ad hoc ut magis firmata esse uideantur, & ad hoc ut magis laxa uideantur, quemadmodum etiam in superioribus dictum est. Deligatio etiã postea facienda per tertium diem, ita ut omnia postea faciamus cõsimili modo, uelut prius dictum est, præterquam quod in totum, minus aliquanto hæc quam illa cõprimenda sunt. Quod si secundum rationem, quæ fieri par est, facta fuerint, gracilior quidem semper cõperietur ulceris pars, graciliores autem & reliquæ omnes, quæ à deligatione cõtinentur: & suppurationes citiores erunt, quam in ulceribus aliter curatis: & quæcumque cariculae in uulnere denigratae sunt & mortificatae, citius abrumpuntur ac excidunt in hac curatione, quam in alijs: & ad cicatricem citius peruenit ulcus, si hoc modo quam si alio curetur. At omnium horum causa est, quod et locus circa ulcus gracilis sit, & quæ circumfusa sunt gracilia omnia fiunt. In reliquis igitur omnibus cõsimiliter curare oportet, uelut ossa sine ulcerationibus fracta. Verum ferulas apponere non oportet. Et propterea linthea his plura esse debent quam alijs, & quod minus cõprimantur, & quod ferulae tardius apponantur. Si tamem ferulas apposueris, non secundum rectitudinem ulceris appones, sed ita ut laxæ adhibeantur, prouidendo ut nulla magna ab ipsis cõstrictio fiat. Dictum autem hoc quoque est in his quæ prius scripta sunt. Victus autem rationem exquisitiorem, & longiori tempore cõstituere oportet, his quibus ab initio ulcera fiunt, & quibus ossa extra emittuntur. & ut in summa dicatur, in uehementissimis uulnerebus, exquisitiore, eoque diuturniore, uictu uti cõuenit. Eadem etiã curatio ulcerum est in his quibus ossa quidem fracta sunt, sed ulcus ab initio non fuit, Verum inter medendum factum est, aut ulcere lintheis magis cõpresso, aut à ferularum infleu, aut ab alia quapiam causa. Cognoscitur autem tales fracturae, an ulcus subsit, & dolore, & pulsibus. & tumor qui in extremis partibus est, talibus durus efficitur, & si digitum admoueris, attollitur: sed & cito rursus subterfugit. Si igitur tale quid suspicatus fueris, soluere oportet: & si quidem pruritus circa subligationes fuerit, aut alia quapiam parte deligata, cerato picato pro altero uti. Si uero horum nihil fuerit, uerum ipsum ulcus irritatum, reperitur nigrum ualde aut impurum: & futurum est ut & carnes suppurentur, et nerui in super excidant, hos omnino perfrigerare non oportet, neque quicquam has suppurationes uereri, sed curare in reliquis omnibus cõsimili modo, uelut eos quibus ab initio ulcus factum est. Lintheis uero deligare incipere oportet ualde laxis, à tumore qui in extremis partibus consistit, atque ita deligationem distribuere semper sursum uersus, nusquam quidem cõprimendo, sed maxime super ulcus firmado, super alia uero minus. & prima quidem linthea hæc munda sint, & non angusta. Copia uero lintheorum tanta sit, quanta est si cum ferulis deligatio fiat, aut paulo minor. Super ipsum autem ulcus sufficiens est plenium cerato albo illitum. Siue enim caro, siue neruus denigratus fuerit, excidet. Talia enim acribus curare non oportet, sed mollibus, uelut ambusta. Deligare uero postea per tertium diem conuenit, ferulas autem non apponere. Quiescere uero magis quam prius, & modico cibo uti. Scire uero expedit, siue caro, siue neruus sit, id quod excidet, quod hoc modo multo minus ultra depasci

deparcitur, & multo citius excidet, & multo graciliores circūsitæ partes erūt, q̄ si quis exolutis linteis, aliquid medicamētōrū purgatoriorū super ulcus imponat. Quin et si exciderit id quod suppurasset, et citius carne repletur, et citius ad cicatricē peruenit, q̄ si illo aut alio modo curetur. Omnia sanè in hoc sita sunt, ut quis hæc recte & moderate deligare sciat. Cōferūt insuper & figuræ quales esse oportet, & reliqua uictus ratio, & linteorū aptitudo. Si uero in recēs uulneratis decipiaris, osiū discessum nō fore putans, quū tamen expectatio sit illa emerſura esse, modū curationis timere nō oportet. Nihil enim magni mali contigerit, si modo bonas ac innoxias deligationes manu facere noueris. Signum aut̄ hoc est, si osiū discessus in hoc curationis modo futurus est. Pus enim multū fluit ex ulcere, & gliscere ac turgere affecta pars uidetur. Frequentius igitur deligare oportet, ob nimia humiditatē, et quod aliās etiā febres fiūt. Et si quidē ualde premanetur à deligatione, & ulcus, & circūsitæ partes graciles fiunt. Quicūq; itaq; ualde tenuiū osium discessus fiunt, hi nulla magna mutatione opus habēt, nisi ut laxius deligatio fiat, ut ne pus intercipiatur, sed facile effluere possit. Sed & frequentius deligare oportet, donec os discesserit, & ferulas nō apponere. Quibus uero maioris ossis discessus expectatur, siue hoc à principio prenoueris, siue etiā postea cognoueris, nō amplius eadē curatione opus habet. Sed extētionēs & directiones ita facere oportet, uelut dictū est: splenia uero duplicata, latitudine quidē dimidio palmo nō minora: quale tamen fuerit uulnus, iuxta hoc cōiectura faciendā est: lōgitudine uero paulo quidē breuiora, q̄ ut bis circū faiciatū corpus circūduci possint, multo uero lōgiora q̄ ut semel. Copia uero tot sint, quot facere cōducit. Hæc in uino nigro austero madefacta, ex medio initio factō circūuoluere oportet, quemadmodū fasciā ex duobus initijs deligatur: & deinde alficiatim alternatione ipsorū facta, initia dimittere. Hæc & super ipsum ulcus adhibēda sunt, & ab utraq; ulceris parte, & ne cōprimantur, sed saltē fulciendū ulceris gratia incumbant. Supra ipsum uero ulcus, ceratū picatum imponere oportet, aut aliquod ex emplastris cruētis uulneribus destinatis, aut aliud quoddā medicamētū, quod familiare ac idoneū sit humectationi adhibēndæ. & si quidē æstatis tēpus fuerit, uino madefacere splenia frequēter oportet. Si uero hyems, lanas succidas multas uino & oleo imbutas adhibeto. Oportet autē capræ pellē substernere, & defluxiones obseruare, ut facile effluere possint, ita ut meminerimus q̄ hi loci in iisdē figuris multo tēpore permanētēs, intertriginēs curatu difficiles faciūt. Qui uero deligatione sanari per aliquē ex relatis, aut referēdis modis nō possunt, eos magnā huc curā adhibere cōuenit, ut fractam corporis partē commode positā habeant secundū rectitudinem, animaduersione ad hoc habita, ut sursum magis q̄ deorsum uergat. Si uero quis bene ac facile opus perficere uelit, operæ precii est etiā machinamēta facere, quo iustam & nō uiolentā extensionē, pars corporis fracta habeat. Maxime uero in tibiā machinamēta adhibere expedit. Sunt igitur aliqui qui in omnibus tibiæ fracturis, & quæ deligantur, & quæ nō deligantur, pedē summum ad lectū alligant, aut ad aliud quoddā lignū iuxta lectū defossum. Hi itaq; omnia mala faciunt, nihil autem boni. Neq; enim ullā opem affert extensioni, hæc pedis alligatio. Nihil enim minus ad pedē concedet reliquum corpus, atq; sic nō amplius extenditur: neq; rursus ad rectitudinē quicquā prodest, sed etiā obest. Dum enim uertitur:

reliquū corpus aut hac, aut illac, nihil prohibebit uinculum illud, quo minus & pes, & ossa pedi annexa, reliquū corpus sequatur. Imò si pes alligatus non fuisset, minus distorqueretur. Si uero quis pilas duas ex corio Aegyptio cōsuat, tales quales gestant hi qui multo tēpore in magnis cōpedibus uincti sunt: habeāt autē pilā hinc atq; illinc tunicas, ad uulneris quidē partes, profundiores: ad articulorū uero partes, breuiores: Sint item tumidæ ac molles, & congruentes ad hoc, ut altera supra malleolos, altera infra genu coaptetur. Habeat insuper utraq; duas utrinq; appēdices à latere, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breuiorē uelut ansas, ita ut alteræ sint ab utraq; malleoli, alteræ ab utraq; genu parte: & superna pila alteras tales habeat secundū eandem rectitudinē. Postea uirgis corneis acceptis, æqualē inter se magnitudinē habētibus, crassitudine quidem digitali, longitudine uero ut flexæ appēdicibus cōgruant, huc diligentia adhibeas, ut extremæ uirgarū partes nō ad corpus, sed ad summas pilarū eminētias innitātur. Oportet aut tria esse uirgarū paria, aut etiā plura, & alias alijs aliquanto longiores, & aliquāto breuiores ac minores, ut si uelis magis distendere possis. Locētur aut uirgæ utraq; hinc atq; illinc à malleorū utraq; parte. Hæc itaq; si bene machinatus fueris, & extensionē iustam exhibuerint, & secundū rectitudinē æqualem, & uulneri nullus dolor accesserit. Nam quæ expressa fuerint, si quid tamen exprimeretur, partim ad pedē abducētur, partim ad femur: & uirgæ hinc atq; illinc à malleolis accommodatiores erūt, ut tibiē positio nō impediatur, & uulnus probe impingat ac sustētetur. Neq; enim impedimēto est, si quis uelit duas uirgas superiores, ipsas inter se cōiūgere, & si quis leuiter quid superimponere uelit, ut id quod superimponitur à uulnere eleuātū sit. Si quidē igitur & pilæ lenes, & molles, & bonæ, & recētē cōsutæ fuerint: & uirgarū intentio probe intēta fuerit, uelut iam dictū est, cōmodum erit machinamentū. Si uero quid horū non rectē habuerit, læserit magis q̄ profuerit. Cōuenit aut & alias machinas, aut bene machinari, aut non machinari. Turpe enim est et minime artificiosum, in machinis struēdis à machinis aberrare. Pleriq; porro medici fracturas, & cū ulceribus, & sine ulceribus, primis diebus lanis succidis curāt, & nihil ab arte alienū ipsis hoc esse uidetur. & qui quidem à recens uulneratis cogūtur, ex linteorum inopia lanis uti, his plurimus ueniæ locus patet. Nō enim habuerit quis in linteorū penuria, aliud quid multo melius ad tales deligādas q̄ est lana. Verū omnino multæ lanæ esse debent, & ualde bene carminatæ, & nō asperæ. Nam paucarū & malarū uires etiā modicæ sunt. Qui uero ad unū aut duos dies, lanis deligare iustū esse cēsent, tertia uero ac quarta linteis deligātes premūt, ac extendūt tunc uel maxime, hi in re multi adeo ac magni in medicina momenti, se imprudēter gerunt. Minime enim tertia ac quarta die omnia uulnera mouere oportet, & ut in summa dicam, etiā omnes specillorum admotiones uitare cōuenit in his diebus, & alia quoq; quibus uulnera irritātur. In totū enim tertia ac quarta dies in plerisq; uulneribus recrudescētias pariūt, & quæ ad inflammationē ac immunditiā procedūt, & quæ ad febres deueniūt. Et hæc res multi momenti est ut discatur, ut si qua alia. Cū qua enim ex utilissimis in medicina rebus, nō solum circa uulnera, uerum etiam circa alios multos morbos, cōmunionem nō habet: nisi quis etiā alios morbos ulcera esse dixerit. Habet enim & hic sermo aliquā uerisimilitudinē. Multis enim modis alijs alijs cognati sunt. Qui

cunq;

cunq̄ tamen iustū esse putant lanis uti, donec septem præterierint dies, deinde uero extēdere ac dirigere & linteis deligare, hi non similiter imprudētes uideri poterint. Nam & maximū in flāmationis periculū præterij, et ossa laxa ac apta post hos dies sunt. Longe tamē & hæc curatio superatur, ab ea deligatione que ab initio linteis fit. Ille enim modus preparat ac efficit ut septima die ferulis perfecte deligari possint. Hic autē modus multo tardior est. Sed & alia quædam detrimēta habet. Verū longum esset omnia scribere. Quibus uero ossa fracta & extra eminētia in suam sedē collocari non possunt, his hæc restitutio debetur. Ferramēta facere oportet ad eum modū quē uectes habent illi quibus lapicidæ utūtur, alia latiora, alia angustiora. Esse uero conuenit tria, aut plura etiam, quo quis maxime cōgruis utatur. Postea cū his unā cū extensione motionē aggredi oportet, ita ut ad inferiorē oīsis partē subijcias, ad superiorē uero partē oīsis, sū periorē ferramenti partem innitēdo firmes. In summa, quemadmodū si quis lapidem aut lignū uehementer uectē cōmoueat. Sint autē ualida ferramenta quantum eius fieri potest, ut ne flectantur. Hoc magnū auxiliū est, si & ferramēta idonea fuerint, & si quis uelut conuenit cōmotionem faciat. Nam ex omnibus instrumentis quæ homines machinati sunt, fortissima hæc tria existunt, aelli circumductio, per uectes cōmotio, & cuneorū usus. At sine horū uno aliquo, aut sine omnibus, nullum uehementissimū opus homines perficiūt. Nō igitur spernēda est hæc per ferros illos uectes cōmotio, aut enim hoc modo, aut nullo alio, in sedem suā collabentur. Si uero superna oīsis pars immutata fuerit ac con fracta, ut uecti adhibendo locus nō sit cōmodus, sed acutū quid prominet, tūc osse scalpendo deraso, securam uecti sedem facere oportet. Hanc autē per uectes cōmotionem et extensionē, eadem die aut secūda facere oportet. Nō autē tertiā. Minime uero quarta aut quinta. Nam etiā si nō reponas, sed aliās molestiā exhibeas in his diebus, inflammationē induxeris: quāto magis si reponas. Conuulsionē tamē multo magis induxeris si reponas, q̄ si reponere omittas. Atq̄ hæc probe nosse cōuenit. Si enim reponēti cōuulso accesserit, nō multa salutis spes est. Cōmodum autē est rursus eijcere os à sua sede, si hoc fieri citra molestiā possit. Non in laxioribus q̄ oportunū est, cōuulsionēs ac distentionēs accēdūt, sed in his quæ magis extēta sunt. Cæterū de qua re nunc nobis sermo est, in prædictis illis diebus molestiā exhibere non oportet, & curā adhibere ut ulcus minus inflāmetur, & maxime suppuretur. Postquā uero septē præterierint dies, aut paulo plures, si sine febre fuerit, & ulcus nō inflammatū sit, tūc minus uetat ut reponere tentes, si spes obtenturum te esse: Sin minus, nō oportet frustra molestiā suscipere & inferre. Si igitur ossa repositis in suam sedem, iam scripti sunt modi quomodo curare oportet, siue ossa discessura esse, siue non, expectatio sit, & si quidem oīsiū discessus expectatio sit, eo quē dixi modo cū linteis, in omnibus talibus deligationē facere oportet, ex medio linteo initio factō ut plurimū, uelut ex duobus initijs fascia deligatur. Coniecturā autē facere oportet iuxta ulceris formā, quo sit q̄ minimum hians ac labijs protuberās & expassum. Alijs enim ad dextrā deligare cōmodum est, alijs ad sinistrā, alijs ex duobus initijs. Quæcūq̄ uero ossa repositionē effugerūt, ea discessura esse nosse oportet: itemq̄ ea quæ carnibus penitus nudata sunt. Nudatur autē quorundā superna pars, quorūdam uero carnes circūcirca mortificantur. Et quibusdā quidem ex ueteri uulnere aliqua ossa emarcuerūt: quibusdā uero non, & aliquibus magis,

aliquibus minus, et partim parua, partim magna. Propter hæc igitur relata, uno uerbo dici non potest, quâdo ossa sint discessura. Aliqua enim ob paruitatē, aliqua ex eo quod in summa parte existūt, citius discedūt: aliqua eo quod non discedūt, resiccata & marcida sientia desquamātur. Præterea differt curatio à curatione. In totū igitur ossa citissime his discedūt, quibus citissimæ sūt suppurationes, & citissimæ ac optimæ carnis productiones. Subnascētes enim iuxta læsam partem carnes, plerūq; ossa ipsa eleuāt. Totus tamē ossis circulus, si in quadraginta diebus discesserit, bene discedet. Quædā enim ad sexaginta dies perueniūt. Nā & rariora ossa citius discedūt, solidiora uero tardius. Alia aut̄ minora: multo minore tēporis spacio, alia aliter. Cæterū os extra eminēs his de causis præsecare oportet, si reponi non possit, & parū absit ut reponi posse uideatur, & fieri poterit ut auferatur, & si noxiū fuerit, & de carnibus quid rūpat, & sensus molestiam exhibeat. Sed & si nudū fuerit, tale auferre oportet. Reliqua siue præseces, siue non præseces, non multū refert. Hoc enim certo scire expedit, q̄ ossa quæ carnibus perfecte priuātur, ac exarescūt, omnia penitus discedent. A quibus uero squamæ discessuræ sunt, ea præsecare non oportet. Coniecturā uero eorū quæ discedēt, ex cōstitutis signis facere oportet. Curare aut̄ tales splenis & uinosa curatione, uelut etiā prius de discessuris ossibus, scriptū est. Sed cauere decet ne primo tēpore frigidis madefiant. Rigorū enim febriliū periculū est. Periculū item cōuulsionū. Frigida enim semper conuulsionē prouocant. quâdoq; uero etiā uiscera. Nōsse quoq; id cōuenit, necesse esse ibi corpora breuiora fieri, ubi ossa fracta ac immutata curātur, & quibus totus ossis circulus discessit. At uero quibus femoris aut brachij os extra eminet, hi non ualde superstitēs euadūt. Nā & ossa magna sunt, & multum medullæ habēt: & quæ simul uulnerātur, multa sunt & magni momētū, & nerui, & musculi & uenæ. Et si quidē reposueris, conuulsionēs accedere solēt. Si uero non reposita fuerint, febres acutæ, & biliosæ, & singultuosæ oboriūtur, et denigrātur. Non minus aut̄ superstitēs euadūt hi, quibus reposita non sunt, neq; tentatū est ut reponerentur. Adhuc uero magis euadūt, quibus inferna ossis pars eminet extra, q̄ quibus superna. Euadūt etiā qui bus reposita fuerint, attamē raro. Nā & curationes à curationibus multū differunt, & naturæ corporū à naturis, ad facile tolerandū. Multū etiam differt an in interna brachij ac femoris parte ossa extra promineant. Multæ enim & periculoſæ uenarū extēSIONES in interna parte sunt, quarū aliqua si uulnerēt, lethales sunt. Sūr aut̄ & in externa parte, uerū minus. In talibus igitur uulneribus, quælia pericula imminēat, ignorare non oportet, & ad temporū occasiones prædicere. Si uero reponere hæc ossa cogaris, & reponēdi aliqua tibi spes sit, & non multa ossis immutatio fuerit, & musculi non cōcurrerint: solēt enim cōcurrere: uicētis molitio etiā his cū extēSIONE, opē bene ferre poterit. Vbi uero reponis, uerarū molle bibendū dare oportet eadem die, si eadē die reposita fuerint. Sin minus, ne aggredi quidē oportet. Verū ulcus curare oportet uelut in capitis ossibus fractis, & frigidi nihil adhibere, & cibos penitus auferre. & si quidē amara bile præditus natura fuerit, fauorū cremorē odoratum coctū, aut acerū mulfum dulce, in aquā infillaro; eoq; pro uictū utatur. Si uero amara bile præditus non sit, aquæ potionē utatur. Et si quidē continua febre laborarit, ad quatuordecim dies ut minimū hoc uictū degat. Si uero sine febre sit, septē dieb. Postea sensim progredi sū fietē secundū rationē ad uulgarē uictū adducatur. Et quibus ossa non reposita fuerint, eandē itidē medicamētū purgationē facere oportet, et ulcerū curationem

rationē, eundē itē exhibere uictū: & dependentē de corpore partē nō extēdere, sed magis adducere, quo laxior sit pars circa ulcus. At olsium difcessus diuturnus est, uelut etiā prius dictū est. maxime uero talia fugere oportet, si modo quis honestā fugā habeat. Nā & spes paucae sunt, & pericula multa. & si quis nō reponat, artus expers esse uideri poterit: & si reponat, propinquius ad mortē q̄ ad salutē perduxerit. Cæterū luxationes & emotiones olsiū circa genua, multo mitiores sunt emotionib. ac luxationibus circa cubiti flexurā. Nā femoris articulus pro magnitudine expeditior est q̄ brachij, et iustā naturā solū habet, eāq̄ rotundā. Brachij uero articulus & magnus est, & sinus plures habet. Ad hæc uero, tibiae ossa lōgitudine inter se similia sunt, & externū os paululū, ne memorabili quidē modo excedit, nullū magnū impedimentū afferēs, à quo externus tēdo circa poplitē enascitur. At cubiti ossa inæqualia sunt, & quod breuius est, multo crassius est: quod uero tenuius est, multū superat & excedit articulū. De pēdet tamē & hoc ex neruis, iuxta cōmunē olsiū cōnexionē. Maiorē autē partē cōnexionis neruorū in brachio os tenue habet, q̄ crassum. Horū itaq̄ articulo rū & olsiū flexuræ cubiti natura huiusmodi est. & propter naturæ modū, ossa circa genu sepe quidē luxātur, facile autē rursus incidūt ac reponūtur. Inflammatio uero nō magna accedit, neq̄ uinculū articuli. Luxātur autē plerūq̄ in internam partē, aliquādo etiā ad extremā, quādoq̄ etiā ad poplitē. Horū omnīū repositiones nō sunt difficiles. Verū si quidē foras aut intro luxētur, hominē in humili aliquo sedili sedere oportet, ita ut crus altius, nō tamē multo habeat. Extēfio autē plerūq̄ moderata sufficit, ita ut ab altera parte tibia, ab altera femur in diuersum extē datur. At ossa circa cubiti flexurā molestiora sunt, q̄ quæ circa genu sunt, et difficilius reponi possunt, etiā ob inflammationē, si quis nō itatim reponat. Luxātur quidē minus q̄ illa, uerū difficultius reponūtur ac coaptātur. Insuperq̄ inflāmantur, ac collū acquirūt. Sūt autē & horū plerūq̄ paruæ inclinatioēs, aliquādo ad partē ad costas, aliquādo ad externā, nō ut totus articulus sit emotus, sed manet quid iuxta olsis brachij cavitatē, qua parte cubiti os excedēs habet. Talia igitur siue hæc, siue illæ luxētur, facile est reponere: & sufficit extēfio in directū siens, secundū brachij rēctitudinē, ita ut alter iuxta manus inuicturā extēdat, alter locū sub alis amplectatur: Medicus uero altera manu ad emorū articulū admosta, uolis impellat, altera prope ad articulū iniecta retrudat. Obediūt autē tales luxatioēs, et nō tarde reponūtur, si quis antea q̄ inflāmētur reponat. Luxātur autē plerūq̄ magis ad internā partē, luxātur etiā ad externā. Innotescit id ex figura: & talia sepe etiā absq̄ uehemētī tēfione rursus incidūt. Oportet autē in his quæ intro luxātur, articulū quidē ad naturā suā repellere, cubitū uero magis in pronam partē uergentē circūducere. Et plerūq̄ sanē cubiti luxationes huiusmodi sunt. Si uero trāsgressus fuerit articulus, aut hæc, aut illæ, supra cubiti os, quod ad brachij cavitatē excedit: fit quidē raro hoc, si uero fiat, non amplius similiter extēfio in directū fiet, talibus luxationibus idonea est. In tali enim extēfione, os à cubito excedēs, brachij trāsgressionē prohibet. Oportet itaq̄ sic emotis extēfionem tali facere, qualis prius descripta est, ubi quis ossa brachij fracta deligat, ut ab alia quidē in supernā partē tēfio fiat, ab ipsa uero cubiti flexura, ad infernam cogatur. Sic enim brachiū supra suū sinū maxime eleuabitur. Si uero eleuatū fuerit, facilis est restitutio cum uolis manuū, ita ut emoram quidē brachij partem apprehēdentes impellamus, os uero cubiti iuxta articulū retrudamus, utraq̄ eodē modo, minus tamē. Atq̄ talis extēfio huiusmodi luxatiois iustis

ma est. Poterit etiã reponi per extensionẽ in directũ, uerũ minus q̃ hoc modo. At si in anteriorẽ partem brachiũ luxetur: rarissime aut hoc cõtingit. Sed quid repẽtina eluctatio non eiecerit: Multa enim etiã præter naturã suam excidunt, etiã si magnũ quid sit quod prohibeat. Huic aut eluctationi magnũ quoddã obstaculũ est, & os crassius quod superexcedit, & multa neruorũ extensio: attamẽ quidam sanẽ eluctantur. Signũ aut his qui ita eluctati sunt. Nihil enim de cubito flectere possunt. Manifestus est etiã articulus ad contactũ. Si quidẽ igitur nõ statim repositus fuerit, uehemẽtes ac uiolentẽ inflammationes, itemq̃ febriles fiunt. Si uero statim quis occurrat, facile reponi potest. Oportet aut linteũ durũ conuolutũ (suffecerit nõ magnũ) imponere obliquũ in cubiti flexuram, & de repente cubitũ inflectere, & manũ q̃ maxime ad humerũ adducere. Sufficiẽs igitur fuerit hæc repositio his qui ita eluctati sunt. Sed & extẽsio in directũ, hunc repositionis modũ coaptare potest: uolis tamẽ manus in eminentẽ brachij partem iniectis, iuxta flexurã retro impellere oportet, ita ut aliquis inferne ipsẽ in cubiti gibbũ iniectis, ad cubiti rectitudinẽ retrudat. Efficax est etiã in hoc luxationis modo illa extẽsio quã prius scripta est, quomodo ossa brachij fracta extẽdere oportet, ubi sunt deligãda. Postq̃ uero extẽta fuerint, sic cũ manuũ uolis iniectis coaptationes facere, uelut etiã prius scriptũ est. Cãterũ si in posteriorẽ partem brachiũ exciderit, raro autẽ hoc cõtingit, hæc luxatio omnĩ maxime dolorosa existit, & febres cõtinuas meracẽ bilis paucorũ dierũ ac maxime lethales inducit. & tales extendere brachium nõ possunt. Si igitur statim affueris, extẽto cubiti gibbo cogere oportet, & spõte incidit. Si uero febris præuenerit, nõ amplius reponere oportet. dolor enim in cogendo augetur. Ut aut in summa dicã, neq̃ aliũ articulum febrĩti reponere oportet, minime uero cubiti gibbũ. Sunt aut & aliã læsiones ac molestiã circa cubiti gibbũ. Hoc enim os crassius, si quando ab altero emotum est, neq̃ flecti, neq̃ extẽdi similiter potest. Manifestũ aut sit ex cõtractu, iuxta cubiti flexurã, circa uenã divisionẽ supra musculũ tendentẽ. Quibus aut tale accidit, his non amplius facile est ad suã naturã reducere. Neq̃ enim aliã ullam cõmunem duorũ ossiũ cõnexionẽ emotam, ad pristinã naturã collocare facile est: sed necesse est tumorẽ habere ipsam disparationẽ. Quomodo uero deligare oportet in articulo, dictum est in deligatione circa malleolũ. Quibusdã aut os cubiti brachio subiectũ frangitur, quandoq̃ quidẽ cartilaginosa ipsius pars, ex qua tendo retro brachiũ nascitur, & ubi hæc emota fuerit, febrile est ac malignũ. Articulus tamen manet in suo loco. equaliter enim basis ipsius hac parte excedit. Quũ autem abductus fuerit ea parte qua caput brachij excidit, uagabũdus magis fit articulus, q̃ si penitus sit abruptus. Nã ut in summa dicam, omnia ossa quã fragũtur, minus noxia sunt, q̃ si ossa quidẽ non frãgantur, uenã aut & nerui alicuius momenti in his locis cõrundantur. Vicinius enim ad mortẽ accedũt hæc q̃ illa, si febris cõtinua accesserit. Pauca tamen tales fracturã fiunt: quandoq̃ uero hoc brachij caput iuxta appendicem frangitur, atq̃ hoc quum uideatur multo magis noxium esse, longe mitius noxis circa cubiti gibbum cõtingentibus existit. Quomodo igitur singulas luxationes reponere, & præsertim curare oportet, scriptum est: & quod statim reponere articulũ maxime confert, propter celeritatem inflammationis neruorũ. Nam etiã si elapsa statim reposita fuerint, similiter tamen nerui distentionẽ facere solent, & ad tempus aliquod tum extensionem, quam

facere

facere solent, tum influxionē impedire. Cōfert aut̄ omnia hæc similiter curare, & quæ franguntur, & quæ disparantur, & quæ luxantur. Omnia enim multis linteis, & splenijs, & cerato curare oportet, uelut etiā alias fracturas. At figurā cubiti gibbi in his etiā omnino talem facere oportet, qualē in his quibus brachiū fractum, & cubitus deligabatur. Cōmunissima enim omnibus luxationibus, & emotionibus, & fracturis, hæc figura est. Cōmunissima itē ad distentionē postea faciendā, & ad singula extendenda, ac inflectēda. Hinc enim uie sunt ad utraq; partes cōsimiles. Cōmodissima est etiā hæc figura ipsi ægroto, ut ipsum & gestet, & appēssum excipiat. His adde si à callo apprehēsus fuerit, si quidē extant manus apprehēdatur, melius fuerit si non adsit, multis enim impedimēto erit, paucis adiumēto. Si uero inflexa, magis quidē cōmoda fuerit, Verū longe cōmodior, si mediā figurā obtinens callo apprehēdatur, & hæc quidē de figura. Deligare uero oportet, primū lintei initio super ipsam læsam partē iniectō, siue fracta fuerit, siue emota, siue disparata, primas etiā obuolutiones super ipsam facere, ita ut maxime hac parte innitatur, minus uero hinc atq; illinc. Deligationem autem cōmunem facere oportet, & cubiti, & brachij, utriusq; multo plus q̄ pleriq; faciunt, quo q̄ remotissime à læsa parte tumor hinc atq; illinc exprimat. Circūdetur in super etiā acuta cubiti pars, siue læsio in hac fuerit, siue nō, ut ne tumor ibi circa ipsam colligatur, Fugiendū uero est in deligatione, quantum eius fieri potest, ut ne circa flexurā multa lintea coaceruata sint. Cōpressio autē q̄ maxime circa læsam partē faciendā est. Sed & reliqua cōpressio ac laxatio eadem adhibeatur, & ipsdem temporibus singula, quemadmodū in ossium fractorū curatione antea scriptū est. Et religationes postea per diem tertiu fiant, Videatur aut̄ laxa esse deligatio tertia die uelut etiā tunc. Et ferulæ cōueniente tempore adhibeantur. Neq; enim alienū hoc est, & in his quibus ossa fracta, & quibus nō fracta sunt, si non febriant. Sint autē q̄ laxissimæ partim à brachio, extantæ, partim ad cubitū positæ: & non sint crassæ. Necessē est etiā inæquales ipsas esse inter se, ut uicissim permutētur qua parte cōducit, cōiectura iuxta in flexionē fiēte. Quin & spleniorū appositionē eiusmodi facere oportet, uelut de ferulis dictū est, ita tamē ut paulo tumidiora super læsam partē apponantur. Tempora uero ab inflāmatione, & ab his quæ prius scripta sunt cōiectare oportet.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE ARTICVLIS, IANO CORNARIO

rio Medico Physico interprete.



HUMERI uero articulū uno modo luxari noui, ad locū sub alis Sursum aut̄ nunq; neq; ad externā partē. Non tamē affirmauerim an luxetur, aut nō, etiā si habēa quod dicā de ipso. Sed neq; in anteriore partē unquā uidi, neq; uidetur mihi unquā excidisse. Medicistamē uidetur ualde in anteriore partē luxari, et maxime decipiuntur in his, quorū carnes tabes circa articulū & brachiū occupauit. Apparet em̄ in talib. caput brachij omnino in anteriore partē eminēs. Atq; ego tale aliquādo nō excidisse asserēs, ob hāc rē apud medicos et uulgus male audiui. Solus em̄ ipsis ignorare uidebar.

alij

alij uero omnes cognoscere. Nec potui ipsis persuadere, nisi admodum difficulter, rē ita se habere. Si quis in brachio supernā humeri partē carnibus denudarit, denudarit autē qua parte musculus sursum tendit. Nudarit item tendinē, qui sub alis, & iuxta clauiculam ad pectus est: apparuerit utiq; caput brachij in anteriorē partem uehemēter eminens, etiā si non sit elapsum. A natura enim primum est brachij caput in anteriorē partem, reliquum autē brachij os, ad externā partē incuruū. Conuerfatur autē brachium cū scapulæ cavitare obliquū, quum iuxta costas fuerit porrectū. Quum uero ad anteriorē partem extēta fuerit tota manus, tunc brachij caput ē directo est in scapulæ cavitare, & nō amplius in anteriorē partem eminere conspicitur. Verū de quo nunc est sermo, nunquā uidi in anteriorē partem elapsum: nō tamen affirmarim ne de hoc quidē, an ita excidat, nec ne. Quū igitur exciderit brachiū ad locū sub alis, multi reponere nouerunt, utpote q; multis elabatur. Eruditi autē est omnes modos nosse, quibus medici id reponunt, & quo modo quis his modis q; optime utatur. Optimo uero horū modorum uti oportet, si fortissimā necessitatem uideris. Optimus autē est qui postremus describetur. Quibuscūq; igitur frequenter humerus excidit, hi plerūq; ipsi sibi ipsis ad reponendū sufficientes sunt. Immissis enim alterius manus digitis ac nodis in locū subalarem, articulū sursum cogunt, cubiti uero gibbum ad pectus adducūt. Eodem etiā modo medicus reponet, si ipse quidē sub alam, articulo magis intro elapso, subtentis digitis à costis diducat, ita ut capite suo in summū humerū iniecto, renitēdi gratia, genibus uero iuxta cubiti gibbū ad brachiū admotis, ad costas retrudat. Cōducit autē eum qui reponit fortes manus habere: aut ipse quidem manibus et capite ita faciat, alius uero quidā cubiti gibbū ad pectus adducat. Est autē & humeri repositio, ut cubitus retrorsum ad spinā subducatur, deinde altera manu in summā gibbi cubiti partem iniecta reortio fiat, altera uero iuxta articulum retro innitatur. Hæc repositio, & ea quæ prius dicta est, quū non sint secundū naturam, tamen articulū circumagitantes incidere cogūt. Qui uero calcaneo reponere conātur, propinquū quid ei quod est secundum naturam cogūt. Oportet autem hominē humi supinū reclinare, eum uero qui reponit humi sedere qua parte articulus excidit. Deinde apprehensam manū læsam, cū suis manibus extēdere, calcaneo uero in subalarem locū iniecto, dextro in dextrū, sinistro in sinistrū, retrudere. Oportet autē in cavitatem sub ala rotundū quid cōgruens indere. cōmodissimæ uero fuerint pilæ ualde parux ac duræ, quales multæ ex corijs cōsuuntur. Si enim nō eiusmodi quid inditū fuerit, calcaneū ad brachij caput peruenire nō potest. Dum enim manus extēditur, locus sub ala cauatur. Tendines enim qui hinc atq; illinc locū sub ala cōstringunt, cōtrarij sunt. Oportet autē aliquē ab altera parte eius qui extēditur confidentē, sanum humerū continere, ut ne corpus circūtrahatur, dum læsa manus in alterā partem extēditur. Postea ubi pila sub alā subdita fuerit, molle lorū sufficienti latitudine præditū, circū pilam circūdare oportet, ita ut quidē eo loco ex utrisq; initijs apprehēso sursum retrahat, à capite eius qui extenditur confidēs, & pede ad summi humeri os innitēs. Pila uero q; penitissimè & maxime intus ad costas sita sit, et nō ad brachij caput. Est et alia repositio, quū humerū alter subdit. Maiorē tamē esse oportet eū qui humerū supponit, ita ut apprehēsa manu, humerū suū acuminatū sub illius luxati alā supponat, & deinde aliquantū

tum uerſet, ut uelut ſedi inſideat, ea coniectura facta, ut homo ille circa humerū ſuum ex ala pendeat, ipſe uero ſeipſum in hunc humerū altiorē faciat q̄ in alterum, brachiū aut pendentis ad pectus ſuū q̄ citiſſime cogendo adducat. In hac uero figura inſuper cōcutiat ubi hominē ſuſtulerit, quo reliquū corpus in aduerſam partē brachio quod continetur uergat. Si uero ualde leuis fuerit homo, puer aliquis leuis inſuper ex ipſo retrorſum pendeat. Atq; hæ omnes repositiones in paleſtra uſitate ſunt, eo quod nō opus habet aliorū instrumentorū im portatione. Poterit tamen quis etiā alibi his uti. Sed & qui circū piſtillum cogunt, propemodū ſecundū naturam reponunt. Oportet aut piſtillum molli quadā ſalcia eſſe inuolutū: minus enim ita labarit: & inter coſtas ac brachij caput ſubter intruſum. & ſi quidē breue fuerit piſtillum, collocare hominē in ſedi ſi aliquo oportet, quo uix brachiū circū piſtillū circūdare poſſit. Sit aut potius longū piſtillum, quo homo ſtans fermē circū piſtillum depēdeat. Poſtea brachiū, quidē et cubitus circa piſtillū porrigātur, ab altera uero corporis parte, quis manibus circa ceruicē ad clauiculā circumiectis deorſum cogat. Hæc repositio moderate ſecundū naturam eſt, & repositionē facere poteſt, ſi probe ipſam tra cteat. Quin & per ſcalam alia quædā huiuſmodi repositio fieri poteſt, & adhuc melior, eo quod corpus hinc atq; illinc eleuatū, ſecurius librādo adæquari po teſt. Nam circū piſtillum etiā ſi humerus fixus maneat, periculū tamen eſt ne corpus hac aut illac circūagatur. Oportet tamen & ſuper ſcalam ſuperne rotun dum quid deligatū eſſe, quod ad loci ſub ala cavitatē congruum ſit, & quod brachij caput ad naturā redire inſuper cogat. Optima uero ex omnibus repositio nibus talis eſt. Lignū eſſe oportet latitudine quidē quinque aut quatuor in totū digitorū, craſſitudine uero duorū digitorum, aut etiā tenuius, lōgitudine aut bicubitali, aut paulo breuius. Sit autē altera parte ſumma rotundū, & anguſtiſ ſimū ac tenuiſſimū hac parte, habeatq; crepidinē paululum ſupereminētem, in extrema rotunditatis parte, ſed nō ea quæ ad coſtas, uerū ea quæ ad brachij ca put exiſtit, quo ſub alam cōgrua ſit, iuxta coſtas ſub brachij caput ſubdita. Lin teo aut uel ſalcia molli, lignū ſumma parte obuoluatur, quo leuius reddatur. De inde ſubdito ligni capite q̄ penitiſſime ſub alā, inter coſtas ac brachij caput, to tam manū ad lignum porrectā alligare oportet, iuxta brachiū, iuxta cubitū, & iuxta manus iuncturā, quo q̄ maxime ſit quieta. præ omnibus autē curandum eſt, ut ſumma ligni pars, q̄ penitiſſime intra ſubalarē locum recipiatur, brachij caput tranſgreſſa. Poſtea inter duas columnas trabem trāſuerſam probe alliga re oportet, & deinde manū cum ligno ſupra trabem trāſmittere, quo manus ab altera parte ſit, corpus ab altera, trabs uero ſub ala. & poſtea ad alteram partem manū deorſum cogere unā cum ligno, circum trabem: ad alteram uero reli quum corpus. Trabs autē ea altitudine alligetur, ut reliquum corpus eleuatum ſummis pedum digitis innitatur. Hic modus repositionis humeri longe opti mus eſt, luſtiſſime enim commotionem facit, ſi ſolum penitiſſime intus ad brachij caput lignum fuerit. luſtiſſimæ item ſunt in utranq; partem adæquationem fa cientes librationes, & ad hæc oſi brachij ſecuræ. Recentes itaq; luxationes citi us incidunt, q̄ quis putare poſſit, & priuſquā extenſæ eſſe uideantur. Sed & ueteres ſolā hæc repositio reponere poteſt, ſi non iam ob uetuſtatem, caro qui dem in acetabulū deuenit, caput aut brachij in loco ad quē declinauit, ſemitam ſibi pſi

sibi ipsi iam fecit. Verū tamen etiam ita inueteratū brachij elapsū, mihi posse reponere uidetur. Quid enim iusta molitio non nouerit: manere tamen in loco posse, nō ita mihi uidetur, sed prout cōsueuit rursus luxabitur. Idē facit etiam si circū scalam, eodē modo uelut dixi præparatā, coactio trāsmisi brachij fiat. Abunde itē sufficit circū magnam sedem Theffalicā coactionē facere, si recēs fuerit luxatio. Præparatū autē esse oportet lignum, uelut dictū est. hominē uero, locare oportet in sede obliquū, deinde brachiū unā cū ligno supra sedis reclinatorium transmittere, & ad alterā partem corpus deorsum cogere, ad alterā brachium cum ligno. Idem quoq; facit coactio supra biforem ianuam. His autem quæ forte præsentia fuerint utendū est. Nosse igitur expedit, quod naturæ à naturis multū differūt, ad hoc ut elabētia facile rursus incidāt: differt etiā acetabulum ab acetabulo, quū aliud facile transcēdi possit, aliud minus. Plurimum item differt neruorū ligamentū, quum in quibusdā remissum sit, in quibusdam intentū. Nam humiditas hominibus fit ex articulis, propter neruorū cōnexionem, si laxa fuerit, & intēiones facile ferat. Multos enim uideas qui adeo humidi sunt, ut quādo uelint, articuli ipsis citra dolorē excidant, & abiq; dolore restituantur. Differt etiā habitus quidā corporis. Nā his quibus bene se habet mēbrum, & carnosus, & minus excidit, & difficiliter incidit. Vbi uero ipsi seipsis tenuiores & magis excarnes fuerunt, tunc & magis excidit, & facilius incidit. Argumentū autē quod hæc ita se habeant, hoc est. Bobus enim tunc magis femora excidūt ex acetabulo, quū tenuissimi existunt. Fiunt autē tenuissimi boues ad finem hyemis. Tunc igitur etiā maxime luxantur: si tamen & huiusmodi quidādam in medicina scribere conuenit. Verū conuenit utiq; Bene enim Homerus didicit, q̄ ex omnibus pecudibus boues q̄ maxime laborēt hoc tempore. & ex bobus potissimū aratores, eo quod hyeme operētur. His itaq; maxime excidūt articuli. Hi enim maxime attenuātur. Nam reliqua quidē pecora breuē herbam depasci possunt, Bos autē non ita ualde priusquā alta fiat. Reliquis enim tenuis est labri prominētia, tenuis item superna maxilla. Boui uero crassa est labij prominentia, crassa item & obtusa superna maxilla. Quapropter in breues herbas subijcere nō potest. Rursus solipeda animalia utpote utrinq; dentata, & dentes inter se cōmittere possunt, & sub breuē herbam dentes subijcere queunt, delectanturq; tali herba magis q̄ alta. Breuis enim herba in totū melior ac solidior est q̄ alta, adde quod alta etiam prius fructum effert. Ob hoc igitur ita cecinit,

Haud secus ac bobus nigris gratissima ueris

Tempora proueniunt.

quia gratissima apparet ipsis alta herba. Sed & aliās bos laxum habet hūc articulum, magis q̄ alia animalia. & ob id etiam magis q̄ alia pedē trahit, & maxime quum macilentus est, et iam senex. Propter omnia hæc etiam maxime boui excidit. Plura autē de ipso à me scripta sunt, eo quod omnium antea relatorū testimonia hæc sunt. Verū de quo nunc sermo est, excarnibus magis excidit, sicut etiā citius incidit, q̄ probe carnosus: & humidis ac excarnibus minus inflāmat, q̄ siccis ac carnosis: & in posterū tempus quoq; minus uincitur: sed & mucosus amplior moderato subest, si non adsit inflammatio, & sic sanè lubricus fuerit. Mucosiores enim omnino sunt articuli excarnibus q̄ carnosis. Nā & ipsæ carnes eorū qui non recte ex arte fame macerati sunt, in macilentis mucosiores sunt

sunt, q̄ in crasis. Quibus tamen cū inflammatione mucus subest, his inflāmatiō uincolo facto articulū continet: & ob id hi qui submucosi sunt articuli non ualde excidunt, & exciderent utiq; si nō plus aut minus inflāmatiōnis accessisset. Quibus igitur quū articulus excidit, circumsitæ partes nō inflāmantur, & statim citra dolorē humero uti possunt, hi putāt quidē nihil opus esse ut suū psorum curā gerant, medici tamē est ut contra tales uaticinetur: talibus excidit rursus magis q̄ his quibus nerui sunt inflāmati. Atq; hæc res in omnibus in homine ita habet, & maxime circa humerū & genu. Maxime igitur etiā hæc excidunt. Quibus autē nerui inflāmati sunt, hi humero uti nō possunt. Prohibet enim dolor & inflāmatiōis distētio. Tales igitur curare oportet cerato, & sple n̄ijs, & linteis multis deligando. Sub alam uero lanā mollem purā conuolutana subijcere oportet, ad cauitatē explendam, quo fulcimentū quidem sit deligatiō ni, articulū uero sustentet. At brachiū plerunq; sursum uergēs tenere oportet. Sic enim procul fuerit humeri caput à loco, in quē excidit. Oportet autē postq; humerum deligaueris, brachiū ad costas adalligare, fascia quadam in orbē circum corpus obducta. Fricare quoq; humerū oportet placide & accurate. Multarum aut rerum peritum medicū esse expedit, & nō minus frictiōnis. Ex eodē enim nomine, nō idē euentus subsequitur. Nam et uincire potest frictiō articulū iusto laxiorē, & soluere articulū iusto duriorē. Verū de frictiōne in alio opere à nobis tractabitur. Talē igitur humerū mollibus manibus fricare cōuenit, cōfert enim, & aliās leniter. Articulum aut cōmouere non uiolenter, sed intantū ut citra dolorē commoueat. Restituūtur uero omnes articuli partim lōgiore, partim breuiore tēpore. An aut brachium exciderit, his signis cognoscere oportet. Nam ubi iustū corpus habent homines, manus item ac crura, sano in exemplū uti oportet, ad nō sanum: & nō sano ad sanū, nō alienos articulos inspiciēdo, (alij enim alijs magis extātibus sunt articulis) sed ipsos eius qui affectus est, an dissimilis sit sanus ægroto. & hoc recte quidē dictum est, multam tamē erroream intelligentiā talia habet: & non satis est solū sermonis doctrina artē hanc nosse, sed conuersione etiā uersare oportet. Multa enim præ dolore, aut ex alia causa, quū non exciderint ipsi articuli, tamen nō possunt in similes figuras restitui, in quales sanū corpus figuratur. Proinde & talem figurā insuper intelligere ac cōsiderare oportet. Sed & in loco sub ala, caput brachij multo magis incumbere uidetur, in luxato q̄ in sano. Quin & superne iuxta supernā humeri partem, cauus apparet locus: & summi humeri os extās conspicitur, utpote articulo ad infernū locū digresso, & est etiā aliqua erronea in hoc intelligētia, sed postea de ipso scribetur. Est enim dignū de quo scribatur. Præterea in luxato cubiti gibbus magis à costis distare uidetur, q̄ in altero. Si tamen quis uim affrens cogat, adducitur quidē, sed cū dolore. Sed & sursum ad aurē manū attollere cubiti gibbo extēto, non ualde potest, uelut sanam: neq; hæc & illac similiter diducere. Hæc igitur signa sunt humeri luxati, repositiones itē præscriptæ et curationes hæc sunt. Operæ precii uero est discere, quomodo frequēter excidētes humeros curare oporteat. Multi enim à certaminibus iam prohibiti sunt, ob hanc calamitatē, quū aliās penitus fuerint inculpabiles. Multi etiā ad res bellicas inutiles fuerūt, & ob hanc calamitatē perierunt. Sed & propterea res digna est quæ discatur, q̄ nullū nouerim qui recte medeatur, sed alios ne aggredi quidē

dem sciam, alios contra quæ conducit & sentire, & facere. Multi enim medici humeros luxatos uulnerunt, & iuxta supernam humeri partem, & iuxta anteriorem, qua parte caput brachij extuberat, & iuxta posteriorem paululum retro supernam partem. Hæ igitur uulnera, si quidem sursum brachium excidisset, aut in anteriorem aut posteriorem partem, recte iniuste essent. Nunc uero quum deorsum excidit, eriscent magis hæ uulnera quæ impediunt. A superna enim spatij amplitudine caput brachij excludunt. Verum hæc ita urere oportet. Cutem sub ala digitis apprehensam attrahere oportet, secundum ipsam maxime rectitudinem, secundum quam brachij caput excidit. Deinde ita attractam cutem in ulteriorem partem perurere. Ferramentis autem talia urere oportet non crassis, neque ualde caluis, sed oblongis. Citius enim penetrant, & manu firmata transigi possunt, pellucidis item his urere oportet, quo quæ celerrime pro uiribus penetrant. Nam crassa tarde penetrant, latiores crustarum elapsiones faciunt, & periculum est ne cicatrices rumpantur, & nihilo quidem deterius hoc esset, uerum turpius & ab arte alienius. Postquam autem in ulteriorem partem perusseris, in plurimis satis est ut infernæ parti soli has crustas inuras. Quod si periculum esse non uideatur ne cicatrices rumpantur, sed multum spatij interpositum sit, tenue quoddam specillum per iniusta foramina trahere oportet, cute adhuc attracta. Neque enim aliam trahere possis. Vbi uero traieceris, cutem dimittere. Postea inter crustas aliam crustam tenui ferramento infligere ac inurere, donec specillum contingas. Quantum uero de cute sub ala apprehendere oportet, hinc coniectare licet. Glandulæ sub ala sunt, sicut etiam in alijs corporis partibus. Verum in alio libro de tota glandularum natura scribetur, quod sint, & qualia in qualibus significat ac possunt: glandulas igitur simul apprehendere non oportet, neque ea quæ glandulis sunt interiora. Magnam enim afferunt periculum. Sunt enim neruis maximi momenti uicina. Quantum uero extra glandulas est, eius quæ plurimam partem apprehendere oportet. Nihil enim periculi est. Nosse tamen hoc expedit, quod si fortiter brachium extenderis, nihil cutis sub ala apprehendere poteris, quod sane attractu memorabile sit. Distrahitur enim in extensione. Nec uero neruos ulla machina uulnerare oportet. Hi enim propius expositi sunt ac extenti in hac figura. Si uero partem brachium eleuaris, multum quidem cutis apprehendes: Nerui uero quorum curam gerere oportet, intus ultra apprehensionem consistunt. Nonne igitur in omni arte præ omnibus curandum est, ut in singulis figuræ iniuste inueniantur. Atque hæc quidem de loco sub ala. & sufficiunt hæc apprehensiones, si crustæ recte fuerint iniuste. Extra uero alæ duo solum loci sunt, ubi quis crustas inurere queat huic affectioni auxiliantes. Vnam in anteriore parte, inter brachij caput, & tendinem iuxta alam. Et hac quidem parte cutem penitus perurere oportet, sed non altius. Vena enim crassa propinqua est, et nerui, quorum neutra igne calcificanda sunt. Retrorsum autem alteram crustam inurere licet, multum supra tendinem, qui est iuxta alam, et paululum infra brachij caput. Et cutem quidem penitus perurere oportet. Verum neque hic ualde altam crustam facere. Inimicus enim est ignis neruis. Curare igitur ulcera per omnem curationem oportet, ita ut brachium nunquam uehementer extendas, sed moderate, ulcerum saltem curandorum gratia. Minus enim ita perfrigerantur. Conducit enim omnes uulnera tegere, ut etiam leniter curentur, & minus disparentur, minusque sanguinis erumpat, & minus conuulsio accedat. Vbi uero pura facta fuerint ulcera, & ad cicatrices deuenierint

nerint, tūc sanè penitus brachium semper die ac nocte costis alligatū esse oportet. Sed & quū sana facta fuerint ulcera, similiter ad multum tempus, brachium ad costas alligandū est. Sic enim maxime cicatrix induci poterit, & spatij amplitudo intercipietur, in quā maxime luxatur brachiū. Quibuscunq; uero humerus repositione fuerit destitutus, si quidem homines adhuc crescant, os brachij non similiter ut sanum coaugescit, sed augetur quidem, uerū altero breuius alio quanto efficitur. Et qui mustellæ cubito præditi sunt, paruumq; ac macilentum brachiū ex natiuitate habent, galeancones uocati, ob duplices has calamitates sūt tales, tum si talis aliqua luxatio ipsos dum in utero sunt corripuerit, tum ob aliam calamitatē, de qua postea aliquādo scribetur. Quin & hi quibus dum adhuc infantes sunt, profundæ ac submersæ suppurationes circa brachij caput fiunt, omnes galeancones efficiuntur. & siue secti fuerint, siue uisti, siue sua sponte ipsis eruperint, hæc ita se habere nosse oportet. Qui tamen ex natiuitate galeancones sunt, etiam si manu potentissime uti possint, tamen nec ipsi extento cubiti gibbo, brachiū ad aurem extendere ac eleuare possunt. Sed multo minus hanc q̄ sanam manum. Quibus uero iam uiris exciderit humerus, & repositus non fuerit, his superna humeri pars magis excarnis efficitur, et habitus hac parte tenuis fit. Quū tamē dolor cessauerit, nō omnia ea similiter operari possunt, quæ eleuato cubiti gibbo à costis in obliquū operari oportet. Quæ uero transmoto brachio iuxta costas, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem operari oportet, ea operari possunt. Nam & scobinam, & ferram trahere poterint, securi item findere, & fodere, si non ualde sursum cubiti gibbū attollant, sed & alia iuxta tales figuras operantur. At uero quibus summus humerus fuerit auulsus, his os auulsum extra eminens apparet. Est autē hoc uelut uinculū clauiculæ & scapulæ. Alia enim est hominis natura hac parte q̄ aliorū animalium. Medici igitur in hoc uulnere maxime falluntur. Nam quū os auulsum emineat, superna humeri pars humilis & caua apparet, ut etiam uelut humeri elapsi curam adhibeant. Multos igitur noui medicos aliās nō malos, qui grauius affligerūt, tales humeros reponere conātes, ita excidisse rati, & nō prius desistunt ipsi existimare se humerū reponere, q̄ uel desperarint, uel frustrati fuerint. His curatio quidē eadem quæ etiā alijs huiusmodi, ceratū, splenia, & lintea, & deligatio eiusmodi. deorsum tamen cogere os supereminēs oportet, & splenia super hoc ponere plurima, & hac parte maxime premere: & brachium ad costas adalligatum ad supernā partem tenere. Sic enim os auulsum maxime appropinquaret. Hæc tamen probe nosse expedit, & uelut certa prædicere, si alioqui uoles, quod nullum detrimentū, neq; parū, neq; magnū, humero contingit ex hoc uulnere. Sed locus turpior euadit. Neq; enim hoc os in pristinā sedem similiter firmari poterit, uelut natura exigit, sed necesse est plus aut minus tumidum esse ad supernam partem. Neq; enim aliud ullum os in eundē locū restituitur, quod cum alio osse cōmunionem habet, & adhærēs à ueteri naturali sede auulsum fuerit. Paucis autē diebus summus humerus doloris exors fit, si probe deligetur. Clauicula porro fracta, si quidē penitus caulatim hoc contigerit, curatu facilius est. Si uero oblonge, difficilius sanatur: & contraria in his contingūt, aliter q̄ quis putauerit. Nam quæ penitus caulatim fracta est, cogi magis poterit ut ad naturam redeat. Et si diligens cura adhibeatur, partem quæ superior est, inferiorem

fecerit figuris idoneis, & deligatione conueniente. Si uero perfecte non firmata fuerit, attamen supereminens ossis pars non ualde acuta fit. At quorum os in longitudinem fractum fuerit, his similis ossibus auulsis calamitas contingit, de quibus antea scriptum est. Neque enim ipsum ad seipsum ualde firmari solet, & summa ossis eminentis, ualde acuta fit. In uniuersum igiturnon esse expedit, quod nullum detrimentum neque humero, neque reliquo corpori, ob clauiculae fracturam accedit, si non insuper corruptio aliqua contingat. Raro autem hoc fit. Deformitas tamen circa clauiculae fracturam accedit, primum turpissima, deinde uero minor fit. Coalescit autem clauicula cito, itemque alia ossa laxa. Celerem enim calli obductionem talia faciunt. Quum igitur recens fracta fuerit, uulnerati ad curationem festinant, maius malum esse putantes quam est, & medici quoque prompti sunt ad recte curandum. Progressu uero temporis & uulnerati, utpote qui neque dolent, neque iter facere, neque cibum capere prohibentur, negligunt: & medici, utpote qui suis sedibus restituere non possunt, aufugiunt, neque uulneratorum negligentiam aegre ferunt. In hoc autem calli obductio acceleratur. Deligationis uero modus plerisque consimilis est, ut cerato & splenijs, & mollibus linteis curatio fiat. Insuper autem & haec curatio, & haec animaduersio habenda est, & praesertim in hac aggressione: quod plurima splenia iuxta eminentem partem imponere oportet, & plurimis deligationibus maxime circa hanc partem premere. Sunt autem aliqui quibus conplacuit plumbum graue insuper adalligare, ut super eminentem partem deorsum cogat. Fortassis autem neque intelligunt qui simpliciter deligant. Sed neque hic modus ad clauiculam fractam pertinet. Neque enim fieri potest ut id quod eminent memorabili modo deprimatur. Alij uero quidam sunt, qui quum cognouerint quod haec deligationes erroneae sunt, & non secundum naturam supereminetia deorsum cogunt: deligant quidem ipsos splenijs & linteis utetes, uelut etiam alij. Verum cincto homine fascia quadam qua parte maxime cingi solet, postquam splenia supra eminentes fracturas imposuerunt, ita ut isthic magna mole extuberet, tunc initium lintei ad cincturam ex anteriore parte alligant, atque ita deligant in directum clauiculae extendentes ac retrorsum ducetes, & isthic cincturae circumdatum in anteriorem partem reducant, & rursus in posteriorem. Aliqui uero non cincturae lintei circumdant, sed circum interfoemineum iuxta sedem, & per spinam lintei circumdantes, hoc modo fracturam comprimunt. Haec itaque si quis inexpertus audit, prope secundum naturam esse uidentur, uerum si quis utatur inutilia existunt. Neque enim stabilia sunt, etiam si decubat quis, quamuis ita uel maxime stabilitas contingat: attamen si decubens aut crus inflexerit, aut ipse se inclinaret, omnia deligamenta mouebuntur, & alioqui noxia est haec deligatio. Nam & sedes intercluditur, & lintea in hac angustia acruata fiunt, & quae rursus cingulo circumdantur, non ita ualida facta cinctura circumdari possunt, ut non cingulum sursum ascendere cogant, neque ita necesse est omnia deligamenta laxari. Quam proxime uero quis rem conficere uideri possit, etiam si non magna faciat, si quibusdam linteis cingulum circumdet, plurimis autem linteis priorum deligationem perficiat. Sic enim maxime stabiles fuerint deligationes, & mutuam inter se operam tulerint. Plurima igitur ex his quae contingunt his quibus clauicula fracta est relata sunt. Insuper autem & hoc ad intelligere oportet, quod clauicula plerumque frangitur ita ut os quod a pectore est, ad supernam partem emineat: quod uero a summo

mo humero est, in infernam partē subsidat. Causæ uero horū hæ sunt, quæ pectus neque multo inferius neque superius procedere potest. Nam articuli in pectore motus paruus est. Ipsum enim sibi ipsi, & spinæ, ex cōtinuitate cōmissum est. Proxime quidē clauicula ad humeri articulū fluctuat. Cogitur enim frequentē motū habere, propter summi humeri connexionē. & alioqui ubi uulnerata est, ad supernā partem defugit ea pars quæ pectori adhæret, & nō ualde ad infernā partem cogi potest. Nam & à natura leuis est, & loci amplitudo ipsi superne maior est quæ inferne. At humerus & brachiū, & quæ his annexa sunt, à costis ac pectore facile exolui possunt: & propterea multo superius ac inferius abduci queūt. Quum igitur fracta fuerit clauicula, os quod ad humerū est magis deorsum respicit. Huc enim ipsum unā cū humero & brachio defluere procliuus est quæ sursum ferri. Quum igitur hæc ita se habeant, imprudenter se gerunt qui supereminentē ossis partē deorsum cogere oportere putāt. Nam infernā ad supernā adducendā esse manifestū est. Hæc enim motū habet. Hæc est quæ à natura discessit. Clarū itaque est aliter nullo modo ipsam cogi posse. deligationes enim nihilo magis appellantur quæ repellunt. Si uero quis brachiū quæ maxime ad costas admotū sursum cogat, ut quæ acutissimus esse humerus uideatur, perspicuū est quæ sic adaptari poterit ad os quod à pectore est, unde est diuulsa. Si quis igitur legitima deligatione utatur, celeris curationis gratia: & reliqua omnia frustra fieri putet, præter figurā relatam, is & recte intellexerit, & celerrime ac optime curauerit. Decubere tamen hominē multū refert, & sufficiūt dies xiiii. si quieuerit, aut ad summū uiginti. Si tamen cōtrario modo clauicula fracta fuerit, quod nō ualde cōtingit, ut os quod à pectore est subsidat, quod uero à uero à summo humero est superemineat, alteriusque superftet: nulla magna curatiōe in his opus fuerit. Ipse enim humerus & brachiū si demittatur, ossa inter se committere ac firmare potest. & uilis quæpiā deligatio suffecerit, & pauci dies satis erūt ad callum obducendū. Quod si hoc modo fracta nō fuerit, sed in obliquum hæc uel illac luxata, ad naturā reducere oportebit, humero cū brachio sursum adducto, uelut etiā ante dictū est. Quū aut ad pristinam naturā refederit, reliqua curatio uelox erit. Pleraque igitur immutationes ac luxationes, brachiū si sursum cogatur corrigunt. Quæcūque uero luxationes ex supernis oblique ad latus fiūt, aut deorsum, his correctio præparatur, si homo supinus decubuerit, iuxta medias aut scapulas aliquid altius suppositū fuerit, quo pectus maxime in utranque partē inflexū sit: & brachiū adducat quis ad costas porrectū. Medicus aut altera manus uola in brachij caput iniecta retrudat, altera ossa fracta cōponat. Sic enim quæ maxime ad naturā reduxerit. Verū quod iam dictū est, supernū os facile ad partē subsideere solet. Plerisque igitur ubi deligati fuerint, figura ipsa opitulatur, ita ut ad ipsas costas cubiti gibbū habentes, hoc modo humerū ad supernā partem cogāt. Quibusdā uero humerū quidem sursum uelut dictū est, cogere oportet: cubiti aut gibbū ad pectus adducere: summā uero manū ad summū sanū humerū adhibere. Siquidē igitur decubere sustinet, fulcimentū aliquod quod obfirmet apponere oportet, quo humerus quæ maxime superne maneat. Si uero obambulare uolet, fundā ex fascia factā, & acutæ gibbi cubiti parti circumdatā, de collo appensam gestare oportet. Cubiti porro gibbi articulus ubi emotus aut luxatus est, ad costas, aut foras, acuta ipsius parte in brachij cauitate manēte, extensione

in directū facta, id quod eminent retrorsum & in obliquū repellere oportet. Vbi uero perfecte excidit, aut hęc, aut illęc, extensio in qua brachiū fractum deligatur requiritur. Ita enim incurua gibbi pars nō impedit. Excidit autē maxime ad partē uersus costas. Correctiones uero facere oportet quę plurimū abducendo, & ut ne brachij caput cornicem contingat, sublimē circūducere ac inflectere, & nō in directū cogere, simul autē cōtraria in utraq; partē detrudere, & in sedē cōpellere. Cōtulerit etiam in his gibbi cubiti inuersio, modo in supinam, modo in pronam partē. Curatio uero ex figura est, ut summā manum paulo altiorē cubiti gibbo habeāt, brachium uero ad costas. Sic etiā appensi exceptio, & positio, & gestādī facilitas, & natura, & usus, in cōmuni sunt, si modo non male callus obducatur. Obducitur autē cito. Curatio fit linteis iuxta legē articulem, ita ut acuta eius pars insuper deligetur. Recrudescit autē maxime cubiti gibbus febribus, doloribus, nausea & uomitu meracę bilis, præsertim si retrorsum luxatus fuerit, ob torporē: deinde, si in anteriorē partem. Verū curatio eadē est. Repositio uero retrorsum luxati, ut extētum distēdamus: Signū autē est, quod extēdere ipsum nō possunt, sicut in anteriorē partē luxati, quod inflectere nequeūt. Verū tūc durū quiddā inuolutū indere oportet, & circū hoc ab extēsiōne derepente inflectere. Disparationis autē osiū signū est manifestū ex cōtactu, iuxta uenā quę in brachio finditur. At uero callus cito his obducitur. Ex natiuitate autē breuiora sunt ossa infra noxā, plurimū quę proxima sunt, cubiti, deinde manus, postea digitorū. Verū brachiū & humerus robustiora sūt, propter inuersionē. At altera manus propter opera adhuc fortior est. Imminutio uero carniū fit, si foras excidit, intrinsicus: Sin minus, in contrariū prout excidit. Cubiti uero gibbus si intrō, aut extra exciderit, extēsiō fit in cōmuni figura cubiti ad brachiū, fascia em̄ sub alam data, ipsam exceptā suspendere oportet: ad summū uero cubiti gibbū iuxta articulū pōdus appēdere, aut manibus deorsum cogere. Vbi uero articulus ultra eleuatus est, coaptationes manuū uolis sūt, uelut etiā in manib. Deligatio quoq; in hac figura, & exceptio appēsi, & positio. At si in posteriorē excidit partē, statim extētū palmis dirigere ac coaptare oportet. Simul autē in directio ne etiā alijs opus est. Si in anteriorē, circū linteū conuolutū iustę molis inflectēdo simul directionē facere oportet. Si uero in alterā partē inclinari, in directioe simul utraq; facere oportet. Verū curatiōi cōmunis est figura & deligatio. Posunt autē et ex distēsiōne omnia in cōmuni cōtingere. At uero repositiones alię ex supereleuatione reponūtur, alię ex extēsiōne, alię ex circūuolutione. Hęc uero ex figurarū excessibus, aut hęc aut illęc celeriter sūt. Manus articulus aut intrō, aut extra luxatur, plerūq; uero intrō. Signa autē facilia cognita sunt. Si em̄ intrō luxatus est, digitos inflectere nō possunt. Si extra, extēdere nequeūt. Repositio fit, digitis supra mēsam positis, ut ab alijs atq; alijs in diuersum extēsiō fiat, et id quod eminent aut uola, aut calcaneo retrudatur, et in anteriorē partē deorsum protrudatur. Inferne uero iuxta alterū os moles aliqua cōuoluta mollis supponatur, si supra eminent, manu prona locata: si infra, supina. Curatio uero linteis fit. Tota porrō manus, aut intrō, aut extra, aut hęc aut illęc luxatur. Maxime uero intrō. Quādoq; autē & appēdix emota est. Quādoq; uero alterum os disparatū distat. His extēsiō fortis faciēda est, et quod quidē eminent retrudatur, alterū uero contrā trudatur, duabus speciebus simul cōtingentibus, & retrorsum

sum, & in obliquū, aut manibus supra mēsam, aut calcaneo. Quæ uero recrudescunt ac deformia sunt, tēpore ad usum corroborātur. Curatio fit linteis cū manu & cubito. & ferulæ usq; ad digitos ponūtur. At ferulis hæc deligata frequētius q̄ fracturas soluere oportet, & perfusionē ampliōrē adhibere. Ex natiuitate aut manus breuior fit, & carnes imminuūtur maxime in contraria parte ei in qua luxatio facta est. At adulto iam ossa manent. Digni uero articulus luxatus facilis cognitu est. Repositio fit extendens in directū, ita ut quod eminent os protrudatur, contrariū uero cōtra trudatur. Curatio fit fascijs ac linteis. Si uero nō reponantur, forinfecus callo obducitur. At si ex natiuitate, aut dum adhuc crescit homo, luxata fuerint ossa, breuiora fiunt infra luxationē, & carnes imminuuntur cōtraria maxime parte ei in qua luxatio facta est. In adulto uero ossa manent. Maxilla uero paucis iam perfecte luxata est. Os enim quod à superiore maxilla prodit, cum eo ossē subiugatū est, quod sub aurem annexū est, quodq; capita infernæ maxillæ cōcludit, ac dirimit, quū altero capite superius sit, altero inferius: & extremæ infernæ genæ partes ita se habēt, ut altera ob longitudinē non facile accessum admittat: altera uero cornix est, & supra iugale os excedit: Simul aut & ambarū harum extremitatū neruosi tendines existunt, ex quibus muscoli dependent, qui temporales ac manducatorij appellantur. Propterea autē appellantur, & propterea mouētur, eo quod hinc dependent. Nam in edendo, & in loquēdo: & in reliquo oris usu, superna quidē maxilla quiescit. Est enim capiti cōnexa, & non coarticulata. Inferna aut maxilla mouetur. Coarticulata enim est à superna maxilla, & à capite. Cur igitur in cōuulsionibus ac distentionibus hic articulus distentus primus de se significationē præbeat: & cur plagæ tēporales periculosa sint, ac soporē inducant, alio libro referetur. Quod uero nō ualde luxetur, causæ hæc sunt. Sed & hæc quoq; causa est, quod nō ualde tales ciborū necessitates hominē apprehēdunt, ut magis q̄ potest hiet. Excidit aut à nulla alia figura, q̄ si quis ualde hians maxillā in alterā partem diducat. Cōfert tamē ad hoc ut excidat, hoc ipsum. Quicūq; enim nerui, & quicūq; muscoli circa articulos sunt, aut ab articulis, ex quibus colligantur, horum quicūq; in usu sæpe mouentur, hi etiā maxime ad extēnsiones remittunt, quemadmodum etiam pelles mollissimæ multum remittunt. De quo igitur sermo est, luxatur quidē & excedit maxilla raro: laxatur tamē sæpe in hiatibus, uel etiam aliarū musculorum ac neruorū immutationes hoc faciunt. Manifestum uero ex his maxime fit, ubi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriorē partem, & in cōtrariam luxationi partem abducitur: & ossis cornix circa supernā maxillam tumidior fit: & infernas maxillas difficulter cōmittunt. Quæ uero repositio his cōueniat, manifestū est. Oportet enim aliquē uulnerati caput detinere, & alterū infernā maxillam intrinsecus ac extrinsecus ad mentū digitis apprehēdere, et primū maxillam aliquādiu hæc atq; illac manu abducere, et ipsum hominē iubere, ut maxillam laxā habeat, & simul adducat, ac q̄ maxime remittat. Deinde repēte tribus figuris simul laxare oportet, diligenti in hoc animaduersione habita. Nam & ex distortionē ad naturā deducere oportet, & infernā maxillā retrorsum protrudere, ita ut eger hæc sequatur, & maxillas cōmitrat, ac non hiet. Atq; hæc quidē repositio est, & necq; alijs figuris fieri poterit. Curatio uero breuis sufficit. Spleniū em̄ inceratū apponitur, ac laxo deligamēto deligatur.

tur. Securius autē hęc aggressio perficitur, homine supino reclinato, et coriaceo puluinari plenissime facto capiti supposito, ut in ipsum innitens quę minimum cedat. Insuper autē & caput uulnerati aliquis detinere debet. Si uero ambę maxillę luxatę fuerint, curatio quidē eadem est, uerū hi os minus cōmittere possunt. Nam his genę prominentiores sunt, sed indistortę. Quod uero distortę nō sint, maxime cognoueris ex dentium tum supernorum, tum inferiorum terminis ē directo inter se correspondentibus. His cōfert ut quę citissime reponatur. Repositionis autē modus prius dictus est. Si uero nō reponatur, animę periculum imminet, prę febris cōtinuis, et torpido sopore. Soporiferi em̄ hi musculi sunt, & dum alteratur, & dum intenduntur præter naturā. Solet etiam aluus his biliofa, meraca, pauca egerere. Et si uomuerint, meraca uomūt. Hi igitur etiā moriuntur decima maxime die. At si fracta fuerit inferna maxilla, si quidē non omnino caulatim hoc cōtigerit, sed cohæret adhuc os, contractum tamē fuerit, dirigere quidē os oportet digitis circa linguā obliquam subiectis, forinsecus uero cōtrahenti, prout cōtulerit. Et si distorti fuerint dentes iuxta uulnus cōmoti, postquę os directum fuerit, dentes inter se cōiugare oportet, nō duos solū, sed etiā plures, atque hoc maxime auro, sin minus, lineo filo, donec os corroboretur. Postea cerato, et splenis paucis, & linteis modicis deligare, nō nimium firmis, sed laxis. Nam hoc probe nosse expedit, quę deligatio per lintea, maxillę fractę parū quidē contulerit, si recte fiat: magnopere uero leserit, si prauē deligetur. Frequēter autē circa linguā explorare oportet, & multo tempore reniti ac digitis dirigere os cōtractum, optimumque esset si hoc semper fieri posset, sed fieri nequit. Si uero os penitus caulatim diffractum fuerit, raro autē hoc cōtingit: dirigere quidē os oportet uelut dictum est. Vbi uero direxeris, dentes cōiugare, quemadmodum antea dictum est. Magnopere enim cōtulerit ad quietē, & adhuc magis si quis recte coniungat, & uelut oportet futuras cōsuat. At enim nō facile est omnē chirurgiā scripto exquirere prode, sed ex his quę scripta sunt, formā & imaginem concipere oportet. Postea corio opus est Carthaginensi, et si quidē iunior fuerit uulneratus, satis est squama inde detracta uti. Si uero adultior, ipso corio: ita ut defecta inde particula trium digitorum latitudine, aut prout cōgrua fuerit, sublita prius ē gummi maxilla, ita enim mitius fuerit, glutine agglutinetur summa sui parte, ad diffractā maxillę partē, digiti aut paulo ampliore distātia à uulnere. Et hęc quidē particula ad infernā partē agglutināda est, & habeat fissuram ē directo mēti, quo acutam eius partē circūcirca cōplectatur. Alterum autē eiusmodi lorū, aut paulo latius, ad supernā maxillę partē agglutinare oportet, tāta à uulnere distātia, quāta illa altera lori particula abfuit. Sit autē & hoc fissum, ut circūcirca aurē ambiat. Sint autē hęc lora acuta, qua parte cōmittuntur, & ubi ipsorum extremitates cōnectere ac colligare oportet. In agglutinatione uero, caro corij ad cutē uergat. Sic em̄ magis agglutinatum adhærescit. Postea extēto hoc loro, magis autē eo quod circummentum est quę maxime, ne maxilla exacuatur, lora ipsa circa uerticē cōnectere oportet, & deinde linteo frontē deligare. & superiniectum quid esse oportet, uelut moris est, quo uincula quieta sint ac firma. Decubitum autē faciat in sanā maxillā, nō maxillā, sed capiti innitens. Attenuandū uero est corpus usque ad dies decē, deinde renutriendum nō tarde. Si em̄ primis diebus inflāmatio nō accesserit, in uiginti diebus maxilla corroboratur. perfecte enim callo obducitur, quemadmodum

modum etiam alia ossa rara, si non corruptio infestari. Verum de corruptionibus omnium ossium alia longa tractatio restat. Hæc extensio per agglutinamentum fiens, mitis est, & propterea ad moderationem faciendam, & ad multas ac multis locis faciendas directiones accommodata. At medici non intelligentia æque ac manibus prompti, tum in alijs uulneribus, tum in maxillarum fracturis tales existunt. Varijs enim modis, & bene & male, maxillam fractam deligant. Omnis enim deligatio maxillæ sic fractæ, ossa ad fracturam magis uergentia inclinatur, quam ad naturam ducit. Si uero inferna maxilla connectionem ad mentum diuisa fuerit. Sola autem hæc connectio in inferna maxilla est, Verum in superna multæ. Sed non uolo sermone longius aberrare. In alijs enim morborum speciebus de his dicendum est. Si igitur connectio ad mentum disparata fuerit, ipsam coaptare cuiuslibet uiri est. Os enim quod eminet, ad internam partem digitis admotis detrudere oportet. Quod uero intro uergit, ad externam partem digitis immixtis reducere. Hæc tamen extensione distendendo facere oportet. Facilius enim sic ad naturam redibunt, quam si quis ossa inter se complicans cogere conetur. Vbi uero coaptata fuerint, coniugare oportet dentes inter se hinc atque illinc, uelut prius dictum est. Curare uero cerato, & splenijs paucis ac linteis. Deligationem autem breuem potius quam uariam hic locus maxime admittit. Nam ut æquilibris non est, prope tamen ad æquilibrum accedit. At linteum obuolutionem facere oportet, si quidem dextra maxilla eminet, in dexteram. In dexteram enim fieri putatur, si dextra manus deligationi prærit. Si uero altera maxilla eminerit, aliter deligationem ducere oportet. et si quidem recte quis coaptationem adeptus fuerit, & uelut conuenit quieuerit, cito curatio continget, & dentes illæsi manebunt. Sin minus, diuturnior fiet curatio, & distorsionem habebit. dentes autem læsi & inutiles fiunt. Porro si nasus fractus fuerit, fracturæ modus non unus est. Verum qui pulchris deligationibus gaudent citra intelligentiam, tum in alijs multis damnum incurrunt, tum in fracturis circa nasum uel maxime. Ex deligationibus enim hæc maxime uaria est, & quæ plurimas ascias habeat, & interruptiones ac interceptiones cutis maxime uarias rhombiformes. Sicut igitur dictum est, qui nulla intelligentia præditi aggressioni studio tenentur, ultro se offerunt ad nasum fractum deligandum. Vna itaque alteraque die lætatur medicus, gaudet quoque is qui deligatur. Deinde cito quidem is qui deligatur fatiatur. Noxia enim & molesta est gestatio: satis autem est medico ostentasse, quod nasum uarie deligare non uult. facit autem talis deligatio omnia contra quam conuenit. Partim enim qui propter fracturam simi fiunt, si superne quis magis premat, simiores nimirum fiunt. partim uero quibus nasus hæc aut illac distorquetur, aut circa cartilaginem, aut superius, palam est quod neque ipsis superne deligatio proderit, sed etiam magis lædet. Non enim ita congruit splenijs altera nasi pars, quanquam neque hoc faciunt deligantes. Proximè uero deligatio resistere mihi uidetur, si iuxta medium nasum circa curam partem, contusa caro ad os fuerit, aut etiam os parum, & non multum contusum sit. Talibus enim nasus callo obducitur, & aliquanto asperior euadit. Sed tamen neque his deligatio multo negotio opus habet, si modo etiam deligare oportet. Sufficit autem super contusionem splenium inceratum extendere. Postea uelut ex duobus inijs deligatio fit, ita semel linteum circumdandum est. Optima tamen curatio est, per farinam triticeam hornam, lotam, uiscosam, subactam, modicam, ita ut talia ex illa uelut cataplasmate integantur. Si igitur triticea farina bona

bona fuerit, & tractu facilis, ea ad omnia huiusmodi uti oportet. Si uero non facilis tractu sit, modicam mannā leuissime tritam, & aqua dilutam, cum farina subigere oportet, aut gummi parum, similiter ammiscere. Quibuscunq; igitur nasus fractus est, ut deorsum & in sinū uergat, si quidem ex anteriore parte iuxta cartilaginem subsidat, fieri potest ut aliquid quod ipsum dirigat in nares indatur. Sin minus, omnia talia digitis in nares iniectis dirigere oportet, si id fieri datur. Sin minus, crassum specillum nō in anteriorem narium partē digitis indere oportet, sed qua parte nasus subsidit: extrinsecus autē ab utraq; parte nasum apprehendere, simulq; cogere ac sursum ducere. Et si quidē ualde in anteriore parte fuerit fractura, fieri poterit ut aliquid intra nares indatur, uelut iam dictum est, nimirū lintei rasura, aut aliud quid huiusmodi, linteo inuolutū, aut potius in corio Carthaginensi confutum, ea figura quæ cōgruat loco cui incūbet. Si uero ulterius facta fuerit fractura, fieri nō potest ut aliquid indatur. Si enim in anteriore parte molesta est gestatio, quomodo nō sit in interiore? Primū igitur & intrinsecus cōformando, & forinsecus nō parcendo, ad pristinā naturam reducere ac dirigere oportet. Valde enim cōformatur nasus fractus, maxime quidem eadē die: sin minus, paulo postea. Verū segniter agūt medici, & leuius q̄ cōuenit primū contingūt. Injicere enim manus hinc atq; illinc iuxta naturā nasi q̄ infime oportet, ex infernis sursum cogēdo, et sic q̄ maxime erigere, unā cū interna directione etiā extrinsecus dirigendo. Postea ad hęc nullus talis medicus est, si studiū adhibere ac tolerare uult, uelut ipsius digiti indices. Hi em̄ maxime secūdam naturā sunt. Vtrūq; enim digitū injicere, eoq; totū nasum firmare oportet, atq; ita in quiete habere, si quidē fieri possit, semper donec corroboretur: sin minus, plurimo tēpore uelut dictum est. Quod si fieri nequeat, aut puer aut aliqua mulier hoc faciāt, Molles enim manus esse oportet. Sic enim q̄ optime nasus curari poterit, ubi nō in obliquū, sed ad infernā partem æqualiter subsidat. Ego igitur nullū unq; nasum uidi, qui sic fractus dirigi nō potuisset, si statim ita cogeretur priusq; callus obduceretur, si modo quis recte curare uelit. Verū homines ut ne deformes fiant, multo quidē precio coemerint, studiū autē adhibere nō sciunt, simulq; nō tolerāt, si non dolore uexerunt, aut mortē timeāt: quanq; breui tēpore nasus callo obducatur. decē enim diebus corroboratur, si nō corruptio insuper accedat. Quibuscūq; uero os in obliquū frāgitur, curatio quidē eadē est. Verū directionē non equalē utrinq; facere oportet, sed quod inclinātū est, extrinsecus cogēdo, ad naturā cōpellere, & in nares facta cōrectatio ne, ea quæ intrō repūt impigre dirigere, donec correctā fuerint: ita ut eius probe memineris, q̄ si nō statim corrigatur, fieri nō possit ut nasus nō distortus fiat. Postq; autē ad naturā reduxeris, digitos plures aut unū digitū ad locū admouere oportet, qua parte eminebat, atq; ita aut ipsum, aut aliū quendā sustetare, donec uulnus corroboratū fuerit. Sed & in narē paruū digitū immittere oportet, & aliās atq; aliās impellādo ea quæ inclinata sunt dirigere. At si quid inflāmationis his accedat, farina subacta uti oportet: & tamē incubente etiā farina digitos similiter admouere opus est. Si uero iuxta cartilaginē in obliquū fractus sit, necesse est summū nasum distorqueri. Talibus igitur in summā narē aliquid quod dirigat ex relatis, aut quod his simile sit, indere oportet. Poterit autē quis multa idonea inuenire, quæ neq; odorē habeāt, neq; aliās lenia sint. Ego uero quādoq; pulmo

pulmonis ouilli frustum defectū indidi. Hoc enim forte obtingebat. Nam spōgiæ inditæ humiditates suscipiūt. Postea Carthaginēsis corij squamam magni digiti latitudine, aut prout contulerit resectam, extrinsecus ad nasum inclinatū agglutinare oportet, & deinde hoc corij lorū prout contulerit extēdere. Paulo tamen amplius extendere conuenit, quo erectus & absolute directus sit nasus. Lōgum aut sit hoc lorū, ut postea infra aurē abductū circum caput obducatur, & licet quidem lori extremitatē ad frontem agglutinare, licet etiā longius ducere, & deinde capiti obductum deligare. Hic modus simul iustam directionē habet, & simul ad moderationē faciendam promptus est, ut si quis magis aut minus nasi inclinationē ad contrariū facere uelit. Nam quibus in obliquum nasus frangitur, eos in reliquis uelut relatū est curare oportet. Plurimis tamē insuper opus est, ut inclinationis in contrariū gratia, lorum ad summū nasum agglutinetur. Quibuscūq; uero cū fractura etiam ulcera adsunt, eos ea propter turbari nō oportet. Verum super ulcera ceratū picatum imponere, aut ex emplastris aliquid cruentis uulneribus idoneū. Facilia enim curatu talia sunt. Similiter etiam, si ossa discessura sunt. Primā directionē impigre facere oportet nihil omitendo, & directionē per digitos etiā postero tempore, ita ut laxius quidē admoueas, admoueas tamē. Ex omnibus enim corporis partibus nasus facillime conformari potest. Cæterū lororū agglutinatione ac in cōtrarium inclinatione uti omnino nihil prohibet, siue ulcera affuerint, siue inflāmatio. Nullam enim molestiam exhibent. At uero si auris fracta fuerit, deligationes omnes inimicę sunt. Neq; em̄ ita laxā quis circū dare poterit. Si uero magis premat, maius malum operabitur. Nam & sana auris deligatione pressa, dolore, & pulsatione, & febre afficitur. Sed & cataplasmata pessima quidem omnino sunt quæ grauissima sunt. Verū & alia pleraq; omnia mala sunt, & abscessus inducūt, & mucum ampliorē suggerunt, & deinde suppurationes noxias. His aut fracta auris minime opus habet. Proximū tamen locū habet, si quid imponi debet, farina uiscofa, quā neq; ipsam grauem esse oportet. Cōtingere uero q̄ minime cōducit. Bonum enim aliquādo medicamentū est, etiā nullū adhibere medicamētum, & ad aures, et ad multa alia. Vellicationē insuper ac scalpturā uitare oportet. Corpus aut attenuare, et magis in quo periculū est ne auris suppuretur, melius est quoq; aluū mollire. Si uero quis facile uomat, ex moderata aliqua purgatiōe uomitū faciat. At si ad suppurationē deueniat, cito quidē aperire nō oportet. multa em̄ ex his quę suppurari uidentur, quādoq; resorbētur, etiā si nondū quis ullū cataplasma imposuit. Si uero quis aperire cogatur, celerrime quidē sana fit, si in ulteriores partem perurat. Illud tamē certo scire expedit, q̄ mutila fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit. Si uero nō in ulteriores partē peruratur, tumidā partē nō ualde parua sectione incidere oportet. Sub crassiore em̄ cute pus reperitur q̄ quis putauerit. Verū ut in summa dicā, alia quoq; omnia mucosa, & mucos faciētia, utpote quæ sunt uiscofa, ad contactū sub digitis hac atq; illac cito dilabūtur: & propterea sub crassiore cute medici talia inueniūt, q̄ putarint. Nā et aliquas neruorū cōtortiones, ganglia appellatas, quæ sanè laxę ac fluidæ sunt, mucosamq; carnē habēt, multi aperiūt, humorē in talib. se inuēturos esse putātes. Medicus quidē igitur sentētia sua fallitur, uerū rei huiusmodi nullū ex apertione accedit detrimentū. Qui uero aquosū loci sint, aut mucos pleni: et in qualib. locis singula

si ape

si aperiantur mortē afferant, aut etiā alia detrimenta inducāt, de his in alio opere scribetur. Quum igitur inciderit quis aurem, ab omnibus quidē cataplasmatibus, et ab omni linamentorū usu abstinere oportet. Curare autē uel emplastro aliquo cruentis uulneribus idoneo, uel aliquo alio, quod necq̄ grauitatem, necq̄ dolorē inducat. Si enim cartilago denudari inceperit, & subsidentia purulenta aut mucosa habuerit, molestum est. Fit autē & hoc propter illas curationes. Cæterum omnium eorū quæ recruduerūt, perustio in ulteriorē partem sufficientissima medela est. Verticula uero spinæ quibuscūq̄ in gibbū trahuntur ex morbis, pleraq̄ ut soluantur fieri nō potest. Insuperq̄ & quæ supra septū transuersi iuncturam ac connexionē gibba fiunt. Quæ uero infra, eorū aliqua soluunt uarices in cruribus fientes. Magis autē hæ uarices quæ in uena iuxta poplitē fiunt, quibuscūq̄ gibbositas cōtigerit, eam soluunt. Fiunt autē & in uena circa inguina. Iam uero quibusdam etiā dysenteria diuturna soluit. Et quibusquidē gibba fit spina dum pueri sunt, priusquam corpus ad augmentū plenum perfectū fuerit, his corpus iuxta spinā coaugeri nō solet. Sed crura quidē ac manus perficiuntur, illæ uero partes defectuosiores fiunt, & quibus supra septū transuersum gibbositas est, his & costæ in amplitudinē augeri non solent, sed in anteriorem partē, & pectus acutū fit, sed nō latum: ipsiq̄ & difficulter spirant, & stridulam faucium asperitatē habent. Nam uentriculi qui spiritū suscipiūt ac emittūt, minorem amplitudinē habent. Sed & iuxta magnū uerticulū ceruicem repādā habere cogūtur, ut ne caput ipsis pronū sit. Multā igitur angustiam faucibus exhibet etiā hoc os intro uergens. Nā & his qui natura recti sunt, spirandi difficultatem hoc os inducit, si intro uergat, donec repressum fuerit. Ob talem igitur figurā eiusmodi homines eminentis gutturis, magis q̄ sani apparēt: & tuberculis circa pulmonem duris ac crudis plerūq̄ tales affecti sunt. Nam & gibbositatis occasio, & distentio plerūq̄ propter tales collectiones fit, cū quibus uicini nervi cōmunionem habent. Quibus uero infra septū transuersum gibbositas est, horū quibusdam morbi rhenū ac uesicæ accedunt. Sed & abscessus ad suppurationem, & circa laterum mollitudines, & in guina diuturni ac ægre curabiles, & neutri horū gibbositates soluūt. Coxæ uero his magis excarnes fiūt, q̄ his quibus superne gibbositas cōtigit. Vniuersa tamē spina his longior est q̄ superne gibbosis. Pubes uero & barba tardior ac imperfectior. Sed & infecundiores hi sunt q̄ superne gibbosi. At uero quibus iam aucto corpore gibbositas facta fuerit, his palam præsentis tūc morbi iudicationē gibbositas facit. per tēpus tamē, aliquid ex ipsdem significationē de se plus aut minus præbet, quemadmodū etiā in pueris. Minus autē maligne in totū talia se habēt. & multi sanè iam facile ac sano modo gibbositate sustinuerūt, usq̄ ad senectutē: et maxime hi quibus ad carnositatē ac pinguitudinē promotū fuerit corpus, pauci tamē talium sexaginta annos trāsgressi sunt, pleriq̄ uero breuioris uitæ sunt. Quibusdā etiā in latus, aut hæc aut illac, uerticula obliqua fiunt. Et omnia aut pleraq̄ talia, propter collectiones in tra spinā fiunt. Quibusdam unā cū morbo etiam figuræ insuper cōferunt, ad quas reclinari cōsueuerunt. Verū de his in diuturnis pulmonis morbis dicitur. Illic enim de his quæ futura sunt, pulcherrimæ prænotiones habentur. Porro quibus ex casu spina gibba fit, horū sanè pauca superātur, ita ut dirigi possint. Nam quæ in scala fiunt extensiones, nihil direxerunt quod ego sciam

sciam. Vtūtur enim ipsa maxime hi medici, qui multitudinis famam aucupantur. Apud tales enim hæc in admiratione sunt, si aut pendentes, aut profici aliquem aut quæ his similia sunt uideant, & hæc celebrāt semper, neq; ipsis curæ est quale quid eueniat ex hac aggressione, siue bonū id sit, siue malū. Medici tamen qui talia studio habent, quos sanè ego noui, imperiti sunt. Inuentū equidē uetus est, & laudo sanè uehementer eum qui primus excogitauit & hoc machinamentū, & quoduis aliud secundum naturam inuentū. Nihil enim despero, si quis recte cōstructum concutiat, fieri posse ut quædā dirigantur. Ipse tamē omnia huiusmodi hoc modo curare erubui, propterea quòd impostorum magis tales sunt modi. Quibus igitur prope ceruicē gibbositas fuerit, his uerisimile est has in caput extēSIONES minus prodesse. paruum enim pondus habet caput, & summi humeri deorsum uergētes. Verū tales uerisimile est magis dirigi posse, si in pedes cōcutiantur. Ita enim maior propensio ad huiusmodi fiet. Quibus autē magis inferius gibbositas est, hos par est ut magis in caput concutiantur. Si quis igitur concutere uolet, recte sanè hoc modo præparare poterit. Scalam coriaceis aut laneis puluinaribus insternere oportet probe alligatis, paulo amplius & in longitudinē, & in utranq; partem, q̄ quantū corpus hominis occupat. Deinde hominē supinum supra scalam reclinare, et postea pedes quidem alligare iuxta malleolos ad scalam nō disparatos, uinculo quidē satis ualidō, uerum molli, alligare uero etiā oportet infra & supra utrūq; genu, itēq; circa coxas. Circa laterum autē mollitudinē, & circa pectus, laxas fascias circūdare, ita ut ne impediāt cōcussionem. Manus uero ad costas extētas, ad corpus applicare, & non ad scalam. Vbi uero hæc præparaueris, scalam ita ad turrim aliquā altam, aut ad domus lacunar attrahere oportet. Locus autē in quo concussionē facis, renitens sit. Eos uero qui extendūt probe doctos esse cōuenit, quo æqualiter, & probe, & ex æquilibrio, ac derepēte demittant, ut neq; scala in alterā partem repens ad terram deueniat, neq; ipsi pronui sint. Quòd si tamen à turri, aut malo defixo carchesiū habēte, quis demittat, adhuc melius præparabit, ita ut ex trochlea aut asello laxatis instrumentis ac funibus demissio fiat. Verū iniucundum est de his longius uerba facere: attamen ex his structuris maxime quis cōcuti poterit. Si uero ualde superne fuerit gibbositas, & cōcutere sit opus, omnino in pedes id faciendū est, uelut dictum est. Ita enim maior propensio ad hæc cōtingit. Et firmare quidē oportet iuxta pectus ad scalam fortiter deligādo, iuxta ceruicem uero fascia q̄ laxissima, directionis saltē gratia. Sed & ipsum caput iuxta frontē ad scalam alligare oportet, manus autē porrectas ad corpus alligare, nō ad scalam. Reliquū uero corpus indeligaū esse oportet, nisi quantū satis est directionis gratia, alia atq; alia laxa fascia circūdatum esse. Verū considerādum est ne concussionē impediāt hæc uincula. Crura uero ad scalam quidem ne deligentur, sed inter se, ita ut secundū spinam in directū uergant. Atq; hæc quidē hoc modo faciendā sunt, si omnino opus fuerit in scala concussionē fieri. Turpetamen est & in omni arte, & nō minime in medicina, multā turbam, & multam ostentationem, & multū rumorem cōcitare, & deinde nullam utilitatē asferre. Oportet autē primum spinæ naturam qualis est cognoscere. ad multos enim morbos ea opus fuerit. Nam qua parte ad uentrem uergit, uerticula intus inter se paria sunt, & inter se ligata uinculo mucoso ac neruoso de cartilaginib.

exorto usq; ad medullā. Alij uero nerui neruosi perpetui annexi, hinc atq; illinc iuxta ipsa porriguntur. Verū uenarum & arteriarū cōmunitates, in alio sermone declarabūtur, quot & quales sint, & unde proficiſcātur, & in qualibus qualia possint. Itemq; quibus in uolucris ipsa medulla intecta sit, & unde profectis, & ubi desinētibus, & quibus cū communionē habentibus, & qualia potentib. At in ulteriore parte in articulis uerticula inter se cardinis in modum cōserta sunt. Nerui uero cōmunes iuxta omnia, & in externis, & in internis partibus porriguntur. Et processus ossis ad externā partem, ab omnibus uerticulis unus de unoquoq; tum à maioribus, tū à minoribus. In his aut processibus cartilaginum appēdices, et ex illis neruorū progerminatio, cognata ac cōsimilis extremis neruis. Costæ uero annexæ sunt, ad internā partem magis q̄ ad externā capitibus uergentes: ad unūquodq; aut uerticulū ad articulatæ sunt. Curuisime aut sunt hominis costæ obtorto modo. Intermediā uero partē costarum & ossiū de uerticulis procedentiū, explent utrinq; muscoli, à ceruice initio sumpto, usq; ad septi trāsuerſi annexionē. Ipsa aut spina secundū longitudinem rectobliqua est, à sacro quidē osse usq; ad magnū uerticulū, iuxta quod crurū annexio depēdet, gibbosa est. Nam & uesica, & genituræ, & intestini recti laxa pars, in hac partē cōstituta sunt. Inde uero usq; ad septi annexionē, in directū repanda est, & musculos ad nates habet solus hic locus, ex internis partibus, quos lūbarios uocāt. Ab hac aut parte usq; ad magnū uerticulū, quod supra supernas humeri partes est, è directo gibbosa est, imo magis esse uidetur q̄ est. Nam spina media sui parte, altissimas ossium propagines habet, hinc autem atq; illinc, minores. Ipse uero ceruicis articulus repādus est. Quibuscūq; igitur gibbositates iuxta uerticula fiunt, his expulsio magna à cōnexionē abrupta, unius aut pluriū uerticulorū, non ita multis, sed paucis cōtingit. Neq; enim talia uulnera fieri facile est, neq; ad externam partem expelli facile est, si nō ex anteriore parte, forti aliqua re per uentrē quis uulneratus fuerit: Sic aut utiq; perierit: aut nisi quis ex alto loco de lapsus, coxis aut humeris impegerit. Sed & hic utiq; morietur, etiā si statim nō intereat. At ex posteriore parte ad internam, huiusmodi expulsionē fieri nō est procliue, si nō in immēsum graue aliquod onus irruat. Nam ex ossibus quæ foras enata sunt, unūquodq; eiusmodi est, ut prius ipsum frangatur, q̄ magnam intro inclinationē faciat, ita ut & ligamēta, & articulos inter se alternatos ac articulatos uiolet. Præterea & spinalis medulla affligeretur, si ex modico loco inflexionē haberet, ubi uerticulū tali expulsionē exiluisset: & uerticulū quod exiluisset, spinalem medullā utiq; premeret, si non etiam abrūperet: At ea pressa ac intercepta, multarū & magnarū & nobiliū partiū torporē induceret. Quare neq; curæ foret medico, quomodo uerticulū dirigat ac coaptet, quū multa & uiolenta alia mala adsint. Itaq; si tale cōtingat, palām est q; neq; concutiendo, neq; alio quodā modo, reponi possit, nisi quis dissecto homine, & manu in uentrē iniecta inquisitionē faciat, & ex interna parte ad externā manu retrudat. atq; hæc in mortuo quidē fieri possent, in uiuo aut nō ita. Cur igitur hæc scribo? Quia sunt quidā qui putāt se curasse homines, quibus intro exciderint uerticula articulos penitus trāsgressa: & sanē facilimā hāc distortionē esse, ut quis inde cōualescat, aliqui cēsent, eāq; nulla repositione opus habere, sed sua sponte talia sanescere. Ignari aut multi sunt, & lucro hoc habēt quod ignorāt. Perſuadent enim alios.

Verum

Verum falluntur hi hac de causa. Spinā quæ in spina ipsa eminet, uerticula ipsa esse putant, quia unūquodq; ex his ossibus ad contactū rotundū apparet, igno-
rātes q̄ hæc ossa sunt ea quæ à uerticulis enata sunt, de quibus paulo ante dixi.
At uerticula lōge magis in anteriorē partē absunt. Angustissimū enim uētre
ex omnibus animalibus homo habet, quantū ad magnitudinē attinet, à poste-
riore ad anteriorē partē, in superq; etiā iuxta pectus. Quū igitur horū superemi-
nentiū ossium aliquod uehemēter fractū fuerit, siue unū, siue plura, ea parte hu-
milior locus redditur, q̄ hinc atq; illinc: et propterea decipiuntur putantes uerti-
cula intro abiisse. Decipiunt aut in super ipsos etiā figuræ uulneratorū. Si enim
inclinare se conātur, dolent: quū ea parte qua uulnerati sunt, cutis sit circūtenta:
& simul ossa fracta ita magis corpus affligūt. Si uero in repandū recuruantur,
melius habent. Nā & cutis iuxta uulnus laxior fit, et ossa minus affligūt. Sed &
si quis ipsos contingat, ea parte repādi cedūt, & locus uacuus ac mollis hac par-
te ad cōtactum apparet. Hæc omnia relata in super medicos decipiūt. Verum ta-
les cito sani & illæsi sua sponte fiunt. Cito enim omnia eiusmodi ossa quæ laxa
sunt, callo obducūtur. Obliquatur igitur spina etiam sanis iuxta multos mo-
dos. Nam & in natura, & in usu ita se habet. Sed & præ senectute, ac dolorib.
Nam hæc colligādi uim habēt. At gibbositates ex casibus cōtingentes plerūq;
fiūt, si aut in costas innitatur ac impingat, aut in humeros cadat. Necessē est em̄
foris apparere in gibbositate unū aliquod altissimū uerticulum, minus uero ea
quæ sunt hinc atq; illinc. Non igitur prosilit multū ab alijs, sed parū, quū singu-
la aceruatim cōcedant. Propter hoc igitur etiā spinalis medulla eiusmodi distor-
tiones facile fert, eo q̄ circularis ipsi distortio cōtingit, nō angularis. Opor-
tet autem fabricā instrumēti coactorij huiusmodi cōstruere. Licet equidē lignū
robustū & latum, incisurā oblōgam habēs, defodere. Licet etiā pro ligno, in pa-
riete incisuram oblōgam facere, quæ aut cubiti altitudine, aut prout cōgruum
fuerit, à pauimento extet. Postea colūnam querneā, quadrangulārē, obliquā ad
parietē adijcere oportet, tāto spacio in medio relicto, ut aliquis pertransire possit,
si forte opus sit. Et super colūnam quidem, aut tunicas, aut aliud quid molle,
quod tamē non multū cedat, in sternere oportet, homini uero fomētum adhibe-
re, Si uero admittat, ipsum etiā lauare. Deinde pronū extentum reclinare. & ma-
nus ipsius secūdam naturā extentas ad corpus alligare. Postea uero loro molli
fatis lato ac longo, ex duobus perpetuis inter se aduersarijs loris constante, ex
media ipsius parte, iuxta mediū pectus q̄ proxime sub alas, bis circūdare opor-
tet: & quod superest de loris utrisq; iuxta alā circū humeros obuoluatur, & ini-
tia ipsorū ad lignum quoddā pistilloforme alligētur, ita ut cōgruant secundum
lōgitudinē subiectæ colūnæ, ad quā lignū illud pistilloforme apponere, & reni-
tēdo extensionē facere oportet. Tali uero quodā alio uinculo & supra genua, &
supra calcanea alligato, initia itē ad eiusmodi lignū alligare oportet. Postea aut
alio loro lato ac molli & robusto fasciæ formā habente, longitudinēq; ac latitu-
dinem sufficientē, partem inter coxas & lūbos, q̄ proxime ad coxas, circū circa
fortiter deligare, atq; ita tum huius lori, tum aliorū duorū capita, ad lignū à pe-
dibus extās alligare. & postea in hac figura hinc atq; illinc, æqua simul inclina-
tione, simulq; in directū extensionē facere. Nullū enim magnū malum talis ex-
tensio induxerit, si cōmode præparata fuerit, nisi quis de industria se extēden-

dum exhibeat. At medicus, siue alius quisquā fortis & nō imperitus, imposita manus uola supra gibbū, & altera manu insuper alteri superimposita, deorsum cogat, animaduersione habita an in directum deorsum cogere oporteat, siue ad caput, siue ad coxas. Atq; hæc coactio maxime innoxia est. Sed & si quis insideat super gibbū, & attollendo se dum ille distenditur incutiat, innoxium est. Neq; quicquā prohibet pede inscendere ac gestari supra gibbū, atq; ita sensim incutere. Ad hoc autē moderate faciendū idoneus quis fuerit ex his qui in palestra adfuerunt. Efficacissima tamē coactio est, si aut paries incisurā habeat, aut lignū defossū infra spinæ altitudinē incisum sit, quantū moderate habere uideatur, ita ut tabula tiliacea, aut cuiusdam alterius ligni, nō tenuis, incisurā indatur, & postea linteū quoddā multiplex, aut paruū quoddam coriaceū puluinar, super gibbū imponatur. Quā paucissima tamē imposita esse cōducit, cauendi saltē gratia, ut ne tabula præ duricie dolorē aliquem importune inducat. Sit autē gibbositas è directo maxime incisurā in pariete, quo qua parte maxime extat, ea q̄ maxime tabula imposita premat. Vbi uero imposita fuerit, aliquis extremā tabulæ partē deprimat, aut duo hoc faciant, si unus nō suffecerit. alij uero corpus secundū longitudinē uelut dictum est extēdant, partim hinc, partim illinc cōstituti. Potest etiam a fellis extensio fieri, aut iuxta lignū defossis, aut in ipso ligno a fellorū postibus cōstructis, siue erectos uelis utrinq; paululū supereminentes, siue hinc atq; illinc iuxta ligni uerticē. Hæ coactiones moderationē admittunt, ut & uehementissime, & moderate fieri possint. Talem autē uim habēt, ut si quis etiam ad perniciem tales necessitates adhibere uelit, & nō ad curationem, tunc quoq; multū possint. Nam si quis secundū longitudinē hinc atq; illinc saltē sic extendat, & nullā aliam necessitatē addat, tamen sic etiā extensionem facere poterit. Sed & si nō extendat, & tabula solum ita quis utatur, etiam sic sufficienter deorsum cogere poterit. Bonæ autē sunt huiusmodi uolentia, quibus & uehementioribus & debilioribus uti licet, usu ipsorū prout quisq; uult moderato. Et sanè etiam secundū naturam coactionē faciunt. Nam ea quæ extant, ad locum suū redire cogit depressio. Quæ uero præter naturā coierunt, ea extendūt extensiones secundum naturā. Proinde neq; meliores his necessitates ego habeo, neq; iustiores. Rectitudo enim extētionis iuxta ipsam spinam, inferne & iuxta os sacrū appellatum, nullā ansam habet: superne uero iuxta ceruicē & caput, habet quidē ansam, sed in speciē indecora est: & si hac parte extētio fiat redūdans, etiā alias læsiones inducere poterit. Experimentū autē aliquando feci, ut homine supino extēto, utrem nō inflatum sub gibbū subderem, & postea folle ex officina fabri in subiectū utrem immisso inflarem. Verū res mihi nō successit. Quū enim bene extēderem hominē, uincebatur uter, & non poterat flatus aliqua coactionē facere. Sed & aliās hæc res præopta erat ad dilapsionē, nimirū quū in idem & hominis gibbositas, & utris pleni incurua turgiditas cogatur. Quū autē rursus nō ualde extēderem hominē, uter quidem præ flatu incuruus turgēbat, homo uero omnino magis q̄ conducebat repandus fiebat. Scripsi autē hoc de industria. Pulchrū enim est etiā ea discere quæ in experimentū assumpta successu caruerūt, & cur successum nō habuerūt. Quibuscunq; porò uerticula intro obliquatur, aut ex casu, aut graui aliqua re illapsa, his nullū quidem uerticulū extat plerūq; ita multū ab alijs. Si uero extiterit multū, aut unū aut plura;

mortem

mortē inducūt, uelut etiā antea dictū est. Circularis etiā hæc, & nō angularis ea motio existit. Urinæ igitur talibus magis supprimūtur, itēq; alui egestio, q̄ his qui extra gibbosi sūt; & pedes ac tota crura magis perfrigerātur, et lethalia sunt hæc magis q̄ illa quæ dixi. Sed & si superfites euadūt hi, magis profluam urinam habent, & cruribus impotēiores ac torpidiores fiunt. Si uero etiam in supra perna parte magis repandi fiant, totius corporis impotentia ac torpor accedit. Atq; ego sanè nullam machinā habeo, per quam talia in idem restitui possint, si nō alicui concussio per scalam opē tulerit, aut etiā alia quædam eiusmodi curatio aut extētio, qualis est ea quæ paulo antea relata est. At coactionem unā cum extēsiōne nullā habeo, quæ sanè fieri ita possēt, uelut in gibbo tabula coactionē faciebat. Quomodo enim quis ab anteriore parte per uentrem coactionē facere possit? Neq; enim fieri hoc potest. Sed neq; tusses, neq; sternutationes ullā uim habent, ut extēsiōni auxiliari possint. Nec uero flatus immisio in uentrē quicquā efficere poterit. Quin & si magnæ cucurbitæ affigātur, attractionis nimirū gratia uerticulorū intro repentiū, magno hoc mētis errore cōtingit. Propellūt enim magis q̄ attrahūt, & neq; hoc animaduertūt hi qui ipsas affigūt. Quanto enim magis ipsas quis adigit, rāto magis repandi sūt hi quibus affigūtur, cute simul sursum coacta. Possem autē & alios cōcussionum modos, q̄ hi sunt quos antea retuli, exponere, quos sanè affectioni magis cōuenire quis putare possit, uerū non ualde ipsis fidem habeo, & propterea non scribo. In summa igitur de his quæ relata sunt, ita acuatim cōstituere oportet, q̄ ea quidem quæ in repandum emota sunt, lethalia sunt ac noxia: quæ uero in gibbū, innoxia in totum, quantum ad mortē, & urinæ suppressionē ac torporē attinet. Nō enim riuos qui sunt in uentrē gibbositas ad externā partem intēdit, neq; fluidos esse prohibet. Repanditas uero ambo hæc facit, et ad alia multa hæc accedūt. Nam multo plures & cruribus & manibus impotētes fiunt, & corpore torpescūt, & urinæ his supprimūtur, quibus gibbositas quidē neq; extra neq; intrō extiterit, uerū in re cōtitudinem spinæ uehēmētē cōcussi fuerint. Quibus uero gibbositas extat, hi minus talia perpetiūtur. Multa uero etiā alia in medicina quis uidere poterit, ex quibus ea quidē quæ fortia sunt, innoxia sunt per se totā morbi iudicationē inducētia: quæ uero debiliora, noxia, ita ut & diuturnos morbos progengerēt, & cum reliquo corpore ampliorem cōmunionem habeant. Nam et costarū fractura eiusmodi quid perpetitur. Quibus em fracta fuerit costa una, aut plures, uelut plurimis frāgitur, ita ut ossa ad internā partem non uergant, neq; denudata sint, ex his pauci iam febricitarūt. Sed neq; sanguinē multi iam expuerūt, neq; suppurati multi fiunt, neq; curatione medicamentorū ex illitis linamētis opus habent, neq; ossiū corruptiones accedūt, & uicūs uulgaris sufficit. Si enim febris cōtinua ipsos nō corripuerit, etiam uasa per inediā his uacua fieri deterius est, q̄ si nō uacua fiant. Maiorē item dolorē ac febrem & tussim inducit. Moderata enim uentris repletio, costarū fit directio. Verū uacuatio pendentes costas facit, & hæc dependentia dolorē inducit. Extrinsecus autē uulgaris deligatio talibus sufficit, ita ut cerato, et splenijs, et linteis, plana deligatio placide firmetur, aut etiam lanēū quiddā in super imponatur. Corroboratur autē costa diebus uiginti. Celeriter enim his ossibus calli obducūtur. At cōtusa circa costas carne, aut ex plaga, aut ex casu, aut renifu, aut alio quopiā eiusmodi, multi iam multū

sanguinem spuerunt. Riui enim in molli ad unamquãq; costam extenta parte, & nerui, à principalissimis in corpore partibus progressus habent. Multi itaq; iam tulsiculosi, & tuberculosi, ac suppurati facti sunt, & linamētis opus habuerunt, & costa ipsis corruptionem sensit. Sed & quibus nihil tale accessit, carne circa costas contusa: tardius tamē dolor in ipsis sedatur, quàm in his quibus costa fracta fuerit; & in talibus uulneribus locus dolorum recidiuas magis habet. Proinde aliqui tales noxas magis contemnunt, si costa ipsis fracta fuerit. Quin & curatione exactiore tales indigent, si modo sapiant. Victum enim contrarium esse cōducit, & corpore quàm maxime quiescere, et à uenere abstinere, edulijscq; pinguibus, & fauces exasperātibus, ac fortibus omnibus: Venamq; incubiti flexura secare, & quàm maxime silere. Deligare uero locum contusum conducit splenij nō multiplicibus, sed multis & multo latioribus tota contusione, & cerato sublinere, & linteis latis cum fascijs latis ac mollibus deligare, & moderate firmare, ut deligatus nō ualde se compressum esse dicat, neq; rursus laxum. Initiū autem sumere debet qui deligat in ipsa contusione, atque isthic maxime firmare. faciēda uero est deligatio uelut à duobus initijs, deligandumq; ut ne circumflua sit cutis circa costas, sed æquilibris. Deligādum autem aut singulis aut alternis diebus. Præstat autem & aluum mollire leui aliquo medicamento, cibi saltem euacuandi gratia: & ad decem quidem dies attenuare. Postea uero corpus renutrire ac tenerum facere. Quādiu uero attenuas, deligatione magis firmata utendū est. Quum autem ad teneritudinem deducis, laxiore. Et si quidem sanguinem ab initio expuerit, quadraginta dierum curationem ac deligationē facere oportet. Si uero sanguinem non spuat, sufficit uiginti diebus ut plurimum curatio. Verum ex robore uulneris tempora coniectare oportet. Qui porro tales contusiones neglexerint, etiamsi aliud nihil maioris mali ipsis contingat, tamen locus contusus mucosiores carnem habet, quàm artea habebat. Vbi uero tale quippiam relinquitur, & curatione non probe exprimitur, deterius quidem est si iuxta ipsum os mucositas relicta fuerit. Neq; enim caro amplius similiter os contingit, & os ipsum morbosius redditur, & corruptiones ipsis diuturnæ, multis iam ex huiusmodi occasiōibus factæ sunt. Sed & si iuxta os non fuerit, uerum ipsa caro mucosa sit: atq; tamen etiam sic recidiuæ, ac dolores, aliàs atq; aliàs fiunt, si quis forte corpore ægrotauerit. Quā propter deligatione uti oportet bona, simulq; multum conueniente, quo ad ea humoris effusio, quæ in cōtusione facta est, resiccetur ac resorbeatur, locus autem carne sana augeatur, & ossis quoq; caro augeat. At quibus ex neglectu uetustatem contraxerit, ita ut locus sit dolorosus, & caro submucosa, his uisio medela optima est. Et si quidem ipsa caro mucosa fuerit, usq; ad os urere oportet, non tamē ut os percalescat. Si uero inter costas mucositas fuerit, ne sic quidem in superficie urere oportet, cauere tamen ne in ulteriorem partem perueras. Si uero ad os ipsum contusio esse uideatur, & sit adhuc recens, & nondum os corruptionem sentiat: si quidem parua admodū fuerit, sic urere oportet ueluti dictum est. Si uero oblonga fuerit iuxta os contusionis eleuatio, plures crustas incutere oportet. Cæterum de corruptione costæ, unā cum eorum qui linamentis opus habent curatione, dicetur. Si uero femoris articulus ex coxa exciderit, Excidit autem iuxta quatuor modos, intrō quidem sæpe, fo-

ras autem præ alijs sape. Verum in posteriorem ac anteriorem partem excidit quidem, sed raro. Quibus igitur intrò excesserit, his longius apparet crus, si ad alterum comparetur, atque hoc merito, propter duas causas. Nam os quod à coxa procedit, & sursum ad pectinem fertur, fundamentū fit capitis femoris, & articuli ceruix in acetabulo uehitur: & nates forinsecus cauæ apparent, ut pote quum intrò cesserit femoris caput. Et rursum summa femoris pars iuxta genu, extra reperi cogitur, Tibia item, & pes, eodem modo. Quum igitur foras repat pes, medici ob imperitiā, sanum pedem ad hunc adhibent, & non hunc ad sanum: & propterea multo longius læsum crus apparet quàm sanum. Multis autem etiam alijs locis talia sinistram intelligentiam habent. Nec uero flectere iuxta inguen similiter ut sanum possunt. Sed & si femoris caput in interfœmineo contingatur, palām extuberare cōperitur. Signa igitur hæc sunt, in his quibus femur intrò excidit. Quibus igitur articulus elapsus non fuerit repositus, sed aut frustra tētatus est, aut neglectus, his & ambulatio per cruris circumuolutionem, uelut in bobus fit, & plurima uexatio ipsis in sano crure contingit: & coguntur iuxta lateris mollitudinem, aut iuxta elapsum articulum, mutili ac obliqui esse. Iuxta sanum uero crus, nates ad externam partem rotundæ esse coguntur. Si quīs enim sani cruris pede extra ambularet, protruderet utique reliquum corpus, ut ad læsum crus ueheretur. Læsum autem uehere hoc non poterit. quomodo enim posset? Cogitur igitur sic sani cruris pede intro ambulare, & non extra. Ita enim maxime uehit sanum crus, & suam ipsius, & læsi cruris, partem corporis utrisque incumbentem. Quum autem iuxta lateris mollitudinem, ac iuxta articulum cauentur, parui apparent, & baculo inniti coguntur à latere iuxta sanum crus. Hac enim parte fulcimento opus habent. Ad hanc enim & nates repunt, & in hac corporis pondus uehitur. Coguntur item se inclinare. Manum enim quæ est à parte cruris læsi, ad obliquum femur firmare coguntur. Non enim potest læsum crus uehere corpus, in crurum permutatione, si non detineatur dum ad terram premitur. In his igitur figuris esse coguntur hi quibus intrò elapsus, non fuerit repositus articulus, homine non præmeditante ut quàm facillime sit figuratus. Sed ipsa hæc calamitas ex præsentibus ea quæ facilima sunt eligere docet. Nam & qui ulcus habent in pede aut tibia, non omnes crure ualde ingredi possunt. & infantes sic iter faciunt, extra enim ingrediuntur læso crure. Et duplex lucrum consequuntur. Dupli- ei enim opus habent. Nam & corpus non similiter uehitur in eo crure quod extra ingreditur, sicut in eo quod intrò. Non enim secundum rectitudinem ipsi incumbit pondus, sed multo magis ei quod subingreditur. Ipsi enim è directo incumbit pondus, tum in ipsa ambulatione, tum in crurum permutatione. In hac enim figura sanum crus celerrime supponere poterit, si eo quod læsum est, exterius: sano interiori ingrediatur. Verum de quo nunc sermo est, Bonum est ut corpus ipsum sibi ipsi facilimas figuras inueniat. Quibus igitur nō dum perfectis ad augmentū, elapsus articulus non fuerit repositus, his femur decurtatur, & tibia, & pes. Neque enim ossa similiter in longitudinem augetur, sed breuiora fiunt. Maxime autem femoris. Ex carne item & emusculatum, ac effœminatum & tenuius totum fit crus, simul quidem propter priuationem loci articuli, simul autem quod eo uti non possunt, eo quod secundum

naturā situs nō est. Vfus enim aliquis liberat ab effœminatione, liberat etiā ali-
quantū ab intercepto in longitudinē augmento. Maxime igitur lædūtur hi qui-
bus dū in uētre sunt, hic articulus fuerit luxatus. Secundo loco hi quibus ualde
in infantibus idem cōtingit. Minime uero hi qui perfecti sunt. Qualis igitur ambu-
latio perfectis cōtingat, dictum est. Quibus uero dum infantes sunt calamitas
hæc incidit, pleriq; ad corporis directionē tardi sunt, immo male ad sanū crus
deuoluūtur, manu quæ est ad sanū crus, ad terrā se fulciētes. Sed & ex perfectæ
ætatis hominibus quidā, quibus hæc calamitas cōtingit, ad ambulationē rectam
cūctantur. Quicūq; uero infantes hac calamitate presii, recte educati fuerint, sa-
no quidē crure in rectū utuntur, uerū sub alam secundū sanum & scipionem
ferūt, aliqui etiā sub utrāq; alam. Crus autē læsum eleuatū habent, & tanto meli-
us habent, quanto breuius ipsius læsum crus fuerit. Sanum autē crus nihilo mi-
nus ipsis robustum est, q̄ si ambo sana essent. Effœminantur tamē omnia
bus talibus carnes cruris, & plerūq; hoc magis perpetiūtur hæ quæ sunt ab ex-
terna parte, quàm quæ ab interna. Cæterū quidā fabulantur Amazonides ma-
sculam suā sobolem statim dum infantes sunt luxare, alias circa genua, alias cir-
ca coxas, quo nimirū claudi fiāt, & masculū genus fœmineo insidias nō struat.
Utuntur itaq; his pro opificibus, ad coriaria, aut fabrilia, aut alia sedētaria ope-
ra. An equidē uera hæc sint, ego nō noui: quod aut tales fiant, scio, si quis ipsos
statim dum infantes sunt luxet. Iuxta coxas igitur magna differentia est, an ex-
tra, aut intro fiat luxatio. Iuxta genua uero, differētia quidem aliqua est, sed mi-
nor. Modus autē utriusq; claudicationis proprius est. Decurtantur enim magis
hi quibus extra luxatio facta est. Recti autē minus stant, quibus intro luxatio cō-
tingit. Eodem modo etiā si iuxta malleolū luxatio fiat, si quidem ad externā par-
tem id cōtingat, mutili quidē fiunt, uerum stare possunt. Si uero ad internā, ual-
gi quidem fiunt, minus autē stare possunt. At uero coactio ossium talis fit.
Quibus quidē circa malleolum tibiæ os excessit, his pedis quidē ossa minime
coaugescūt. hæc enim proxime ad uulnus sunt. Verū tibiæ ossa augentur qui-
dem non multo defectuosius, carnes tamen minuūtur. Quibus uero iuxta mal-
leolum māserit articulus secundū naturam, iuxta genu autē excesserit, his tibiæ
os similiter coaugescere nō solet, sed breuius fit. Hoc enim proxime ad uulnus
est. Pedis autē ossa minuuntur quidem, sed nō similiter, uelut paulo ante dictum
est, quia articulus circa pedē saluus est. Si uero ipso etiā uti possent, uelut muti-
lo, minus adhuc pedis ossa his minuerentur. At quibus circa coxā luxatio con-
tingit, his femoris os nō similiter coaugescere solet. Hoc enim proxime ad uul-
nus est: sed breuius sano fit. Tibiæ tamē ossa nō similiter his augmēto destituū-
tur, necq; ossa pedis. atq; hoc ea de causa, q̄ femoris articulus qui ad tibiā est, &
tibiæ articulus qui ad pedē est, in sua natura manet. Carnes tamē minuūtur his
totius cruris. Si uero uti crure possent, adhuc magis ossa augerētur, uelut etiam
prius dictū est, excepto femore, & minus excarnes essent. Multo tamen minus
carnosi q̄ hi qui sunt essent. Argumēto autē q̄ talia ita se habēt, hoc est. Quicūq;
enim brachio elapso, mustellæ cubito præditi sunt, paruūq; ac macilentū bra-
chiū habent, aut ex natiuitate, aut etiā dū augescūt, priusq; perfecti euadāt, gale-
ancones appellati, hi os quidem brachij breue habent, cubitū autē & summam
manū paulo defectuosiorē q̄ sani, propter relatas causas, eo quod brachiū uul-
nerato

nerato articulo proximū est, ut ideo breuius factū sit. Rursus autē cubitus propterea nō similiter calamitatē percipit, quia brachij articulus qui est ad cubitū, in ueteri natura manet. Et rursus manus adhuc longius abest à calamitate quā cubitus. Propter has igitur causas cōtingit, ut & ossa quæ nō coaugētur, nō coaugescāt, & quæ coaugentur, coaugescāt. Cæterū ad carnositatē & manui & brachio multū profuerit, si quis manu laborādo se fatiget. Quæcūq; enim manū opera sunt, plurima ex ipsis Galeancones hac manu operari conātur, uelut altera possunt, & nihilo defectuosius quā cū illæsa efficiunt. Nō enim supra manus, uelut supra pedes, corpus uehī necesse est. Verū leuia sunt ipsis opera. Propter usum autē non minuūtur carnes galeanconibus, neq; circa manū, neq; circa cubitum. Sed & brachiū propterea aliquā opem sentit ad carnositatē. Quū autem coxa eluxata fuerit ad internā partē à natiuitate, aut adhuc infanti, carnes ideo magis minuūtur quā in manu, quā crure uti nō possint. Quod autē hæc hoc modo se habeant, testimoniū unum quoddā in paulo posterius referendis habebitur. At quibus in exteriorē partem femoris caput excesserit, his crus breuius apparet, si ad alterū extendatur, atq; id merito. Nō enim super os fundamentū fit capitis femoris, sicut quum intro excidebat, sed iuxta os quod inclinātā naturam habet, in carne humida ac cedente firmatur. & propterea quidem breuius apparet. Intrinsicus autē iuxta plechada, intermediā crurū ac inguinū partem, femur magis mutilū & excarne fit. Nates autē extrinsecus incuruiores, utpote quū extra femoris caput elapsū sit. Sed & superius apparēt nates, utpote quum carō quæ isthic est, femoris capiti cesserit. Sūma uero femoris pars circa genu, intro reperi uidetur, Tibia itē & pes. Sed neq; inflectere uelut sanū crus possunt. Et signa quidē femoris extra elapsi hæc sunt. Quibus igitur perfectis iam elapsus articulus nō fuerit repositus, his totū crus breuius apparet. In ambulatione autē calcaneo terrā pertingere nō possunt. Verū pectore pedis in terra cōsistunt ac progrediuntur, parū autē ad internam partem summis digitis uergunt. At crus læsum in his multo magis corpus uehere potest, quā quibus ad internā partē excidit, partim quod caput femoris, & ceruix articuli, quū natura obliqua sit, sub multam coxæ partē subsistit: partim quā summus pes nō ad externā partem inclinatū esse cogitur, sed prope est ad rectitudinē corporis, & tendit etiā interius. Quū igitur semitam ac callem acceperit articulus, in carne ad quā elapsus est, & caro uiscositatē contraxerit, doloris exors progressu tēporis fit. Quū autē doloris exors factus fuerit, possunt quidē absq; baculo iter facere, si aliās uoluerint, possunt autē & uehere corpus supra crus læsum. Itaq; propter usum, carnes talibus minus effœminātur, quā illis de quibus paulo ante dictū est. Effœminantur autē aut plus, aut minus. Magisq; adhuc effœminātur plerūq; iuxta internā partem quā iuxta externā. Pleriq; tamē ex his calceamentū sibi inducere nō possunt, propter cruris inflexibilitatē. Quidā uero etiā hoc possunt. At quibus dum adhuc in uētre sunt, hic articulus fuerit luxatus, aut dū adhuc augetur, uel elapsus, nō fuerit repositus, aut etiā præ morbo hic articulus excesserit ac luxatus fuerit: multa enim huiusmodi sūt: taliū quibusdā si corruptionē senserit femur, suppurationes diuturnæ & linamētis indigētes fiunt, & aliquibus ossiū denudationes. Similiter autē & quibus corruptionē femoris os sentit, & quibus nō sentit, multo breuius fit, & uelut sanū coaugescere nō solet. Tibiæ tamē ossa breuiora

quidem

quidē fiūt q̄ alterius tibiæ, sed paululū, ob causas antea relatas. Ambulare uero tales possunt, & quidā ex ipsis eo modo quo perfecti, quibus elapsus articulus repositus non est. aliqui uero etiā toto pede cōsistentes progrediūtur, declinat tamen inter ambulandū propter cruris breuitatē coacti. Hæc autē hoc modo fiunt, si diligēter educati fuerint in figuris, & recte in quibus oportet, priusq̄ ad iter faciendū corroborati fuerint. diligēter item & recte, postq̄ corroborati fuerint. Plurima autē diligētia opus habēt hi, quibus dū maxime infantes sunt, hæc calamitas cōtingerit. Si enim neglecti fuerint dū infantes sunt, inutile penitus, & omni augmento priuatū, totū crus euadit, & carnes totius cruris magis minuūtur q̄ sani. Multo tamē minus his minuūtur q̄ illis quibus intro excidit, propter usum & laborē, ita ut statim crure uti possint, uelut etiā paulo ante in galeæ anconibus dictū est. Sunt autē aliqui, quibus partim statim à natiuitate, partim præ morbo, amborū crurum articuli exciderūt ad externam partem. His igitur ossa quidē easdem affectiones habēt ac perpetiūtur. Carnes tamē minime effe minantur. Sed & satis carnosā crura fiūt, præterq̄ si quid sanē circa internā partem paululū deficiat. Propterea uero satis carnosā sunt, quia utriq̄ cruribus similiter utiūtur. Similiter enim fluctuant hæc atq̄ illac inter ambulandū: & uehementer eminentibus natibus hi uidentur, propter articularū excessum. Si uero ossa ipsis corruptionē non senserint, neq̄ gibbosi supra coxas fiant: nonnullos enim etiā talia corripit: Si igitur tale quid nō contigerit, satis sani de cetero durant. Totū tamen corpus hi minus augetur, capite excepto. At uero quibus in posteriorē partem femoris caput exciderit: paucis autē excidit: hi crus extendere non possunt, neq̄ iuxta articulū elapsū, neq̄ ita ualde circa poplitē, & multo minus q̄ hi quibus iam dudū id cōtingit. Hi em̄ magis & circa inguen, & circa poplitē, articulum extēdunt. Illud tamē insuper intelligere oportet: Est enim cōmodum, & magni faciendū, & plerisq̄ ignotū: Quod neq̄ sani articulum circa poplitē extendere possunt, si nō simul extēdant etiā articulū circa inguen, præterq̄ si pedē ualde sursum attollant. Sic enim poterint. Hi itaq̄ neq̄ inflectere articulū circa poplitē similiter possunt, sed multo difficilius, si nō etiā articulum circa inguen inflexerint. Multa uero etiā alia circa corpus, huiusmodi fraternitates ac cognationes habēt, & circa neruorū distētionē, et circa musculorū figuras, plurima, & pluris faciēda ut cognoscātur, q̄ quispiam putauerit. Item circa intestini naturā, & totius uētris, & circa uterorū errores ac distētionē. Verū de his alibi nobis sermo erit cognatus his quę nūc dicūtur. Sed de quo nūc sermo est, neq̄ extēdere possunt, uelut iā dictū est, et breuius crus apparet, atq̄ hoc ob duas causas, et quod nō extēditur, & q̄ ad natiū carnē elapsū est. Natura enim ossis coxæ ea parte est, qua & caput & ceruix femoris existit. Vbi uero luxatū fuerit, pronū ad externā partē natiū defertur. Inflectere tamē possunt, si dolor nō prohibeat, & tibia & pes moderate recta apparent, & neq̄ hæc, neq̄ illac multū inclinata. Iuxta inguen uero caro insuper aliquāto mollior esse uidetur, præsertim ad cōtactū, utpote articulo ad alterā partem elapsō. Ad ipsas autē nates si attrahatur femoris caput, aliquāto etiā magis extuberare uidetur. atq̄ hæc quidē signa sunt, si cui in posteriorē partē femur excidit. Cui igitur iā perfecto elapsū, nō fuerit repositū, hic ambulare quidē potest, ubi tēpus intercesserit, & dolor sedatus fuerit, & articulus in carnē uersari adfuerit. Cogi-
tur

tur tamē uehemēter se inflectere circa inguina, dum iter facit, atq; hoc ob duas causas: tum q̄ multo breuius crus fit, ob ea quæ antea dicta sunt: tum q̄ multū ualde abest ab eo ut calcaneo terrā contingat. Si enim conaretur uel paululū pede illo uehi, ita ut nihil aliud habeat quo se firmet, retro sane corruerit. Magna enim fuerit momenti inclinatio, & coxis multū in posteriorē partem superemi nētibus super pedis gressum, & spina infuper ad coxas uergēte. Vix autē pectore pedis terrā attingit, et ne sic quidē, nisi ipse seipsum circa inguina inflectat, & altero crure circa poplitē infuper se inflectat. Ob hæc autē cogitur, ut manū quæ est secūdum læsum crus, ad supernā femoris partē in singulis gressibus firmet. Cogit igitur aliquantū hoc ipsum, ut circa inguina inflectatur. Nam in permutatione crurū in ambulando, corpus supra læsum crus uehī nō potest, si non infuper firmetur crus per manum ad terram, nimirū quum nō sub corpore articulus subsistat, sed ad posteriorē partē iuxta coxā extet. Absq; tamen baculo tales iter facere possunt, si aliās adsueuerint, eo q̄ gressus pedis in uteri rectitudine manet, & nō ad extremam partē inclinatus est. Quapropter nihil opus habent baculi fulcimēto. Quicūq; tamen pro femoris per manū apprehensione, supposito sub alam, quæ ad sinistrū crus est, scipione inniti uolunt, hi siquidē longiorē scipionē supposuerint, erectiores quidē iter facient, pede autē ad terrā non innitūtur. Si uero pede inniti uolent, breuior ipsis baculus faciendus est, & ad inguina ut se inflectant necesse fuerit. Cæterū carniū imminutiones etiam his secūdū rationem sūt, uelut antea dictū est. Qui enim eleuatū habent crus, & nihil laborāt, his etiam maxime minuūtur. Si uero plurimo utūtur in gressu, his minime minuūtur. Sanum tamen crus nihil inde utilitatis consequitur, sed etiam deformius fit, si læso crure ad terrā innitentes utātur. Illi enim simul inferuens, & extra prominēte coxa esse cogitur, & circa poplitē se inflectere. Si uero quis læso crure non ad terrā utatur, sed eleuatū habeat, & scipioni innitatur, sic sanū crus robustū fiet. Nam & in naturali statu degit, & exercitatiōes ipsum corroborāt. Possit aliquis dicere, extra medicinā talia esse. Quid enim opus est de his quæ incurabilia iam facta sunt, ampliū tractare? At hoc facere multū refert. Eiusdem enim professionis est & hæc cognoscere. Nō enim fieri potest, ut inter se dirimātur. Oportet enim curabilia ita tractare, ut ne incurabilia fiant, ea intelligentia ut quā maxime prohibeamus, ne ad hoc deueniant ut incurabilia reddantur. Oportet autē & incurabilia cognoscere, ut ne maxime lædant. Prædictiones autē splendidæ sunt ac gloriosæ ex cognitione, quò, & qualiter, & quando, singula desinent, siue eò uertantur ut incurabilia fiant, siue curationis spem exhibeant. Quibuscūq; uero ex natiuitate, aut dum adhuc aliās auget, ita elapsus fuerit articulus, & non repositus, siue ex uiolentiā elapsus sit, siue præ morbo: Multæ enim huiusmodi luxationes fiunt in morbis: Qui uero sint hi morbi, in quibus articuli elabuntur, postea scribetur: Si itaq; elapsus non fuerit repositus, femoris quidem os breue fit, affligitur autem totum crus, & augmēto destituitur, & multo magis excarne fit, eo quòd ipso non utantur. Nam & articulus circa poplitem his affligitur. Nerui enim ob ea quæ antea dicta sunt intenduntur. Quare articulū circa poplitem extendere nō possunt hi quibus hoc modo coxa excidit. Vt enim in summa dicam, Omnia quæ in corpore ad usum facta sunt, si quis moderate ipsis utatur, & in his laboribus exercat

ceat, ad quos singula sunt adfuerunt, sic quidē sana sunt, & augetur, & probe con-
 fenescunt. Si uero quis non utatur, sed quiescat, morbosiora fiunt, & nō augetur
 fenescunt, & cito cōfenescunt. Inter hæc autē non minime perpetiuntur hoc & articu-
 li, & nerui, si quis non ipsis utatur. Propter has igitur causas, magis in hoc luxa-
 tionis modo quā in alijs affliguntur. Totū enim crus & in ossium, & in carniū
 natura, augmento destituitur. Tales igitur ubi iam in uiros euaserūt, eleuatum
 ac inclinatum crus hoc habent, altero uero uehūtur baculo innitentes, aliqui uo-
 no, aliqui duobus. Quibus porro in anteriorem partem femoris caput ela-
 psū fuerit: paucis autem hoc contingit: hi extēdere quidē crus perfecte pos-
 sunt, inflectere autē se minime hi possunt circa inguen. Affliguntur autem etiam,
 si circa poplitē se inflectere coguntur. Longitudo uero cruris cōsimilis apparet,
 & circa calcaneū quidem ualde. Verū summus pes aliquanto minus in antero-
 rem partem prominere solet. Totū autem crus rectitudinē habet secundū natu-
 ram, & neque hæc, neque illac uergit. Cæterū hi statim dolore corripiuntur maxi-
 me, & urina imprimis supprimitur, aliquāto magis quā in alijs luxationibus. Ca-
 put enim femoris proxime his incumbit ad præcipuos neruos, & circa inguen
 quidem extuberantes uidentur, & locus extensus apparet, Verū circa nates ru-
 gosior, & maxime excarnis. Atque hæc quidem quæ relata sunt, signa sunt eorū
 quibus ita femur excidit. Quibuscūque igitur uiris iam factis, hic articulus ela-
 psus, nō fuerit repositus, hi ubi dolor ipsis sedatus fuerit, & articulus in eo loco
 in quem excidit, uersari adfueuerit, statim ferē recti ambulare possunt, absque ba-
 culo, & ualde quidem recti, utpote quū ad læsum crus, neque circa inguen, neque
 circa poplitē, facile se flectere possint. Propter inguinis itaque inflexibilitatē,
 rectiore toto crure in ambulando utuntur, quā quum sani essent. Sed & aliquan-
 do ad terrā pedem trahunt, utpote quū supernos articulos nō facile inflectant,
 & toto pede ingrediantur. Nihilominus hi calcaneo ingrediuntur, quā an-
 teriore pedis parte. Si uero magnis gressibus progredi possent, etiam ualde cal-
 caneo insistentes progredierentur. Nam & sani quanto minoribus gressibus iter
 faciunt, tanto magis calcaneo ingrediuntur, alterum pedem deponentes, contra-
 rium eleuantes. Quibuscūque itaque hoc modo excidit, adhuc etiā magis calcaneo
 terram cōtingunt, quā anteriore pedis parte. Anterior enim pedis pars, ubi reli-
 quum crus extensū fuerit, non similiter in anteriore partem inflecti potest, sicut
 ubi crus fuerit inflexum: Neque rursus sinuari pes potest crure inflexo, sicut ubi
 crus fuerit extensū. Sana igitur natura hoc modo est, ueluti dictū est. Quum ue-
 ro elapsus articulus repositus non fuerit, sic iter faciunt, uelut dictum est, ob præ-
 dictas has causas. Magis tamē excarne crus sit quā alterū, & iuxta nates, & circa
 suram, et iuxta posteriorem rectitudinem. At uero quibus dum adhuc infantes
 sunt, articulus sic elapsus, nō fuerit repositus, aut etiā à natiuitate ita habuerint,
 & his femoris os aliquāto magis minuitur, quā tibiæ aut pedis ossa. Et minimum
 quidem in hoc luxationis modo femur minuitur. Carnes tamē undique minuuntur,
 maxime circa posteriorem rectitudinem, quemadmodū etiam prius dictum
 est. Quicūque igitur recte educati fuerint, hi ubi augetur, crure uti possunt, bre-
 uiore aliquantū existente quā altero, ita tamen ut baculo innitantur ea parte qua
 læsum crus est. Nō enim absque calcaneo, pedis pectore admodū uti possunt, ut
 in id innitantur, quemadmodū in alijs claudicationibus aliqui possunt. Causa
uero

uero cur non possint, ea est quæ paulo ante relata est. Ob id igitur baculo infusa per opus habent. Qui uero neglecti fuerint, & crure ad terram non utitur, sed eleuatum id habent, his minuuntur quidem ossa, ubi augetur, magis quam his qui eorum utuntur. Minuuntur autem & carnes magis multo quam his qui utuntur. Verum circa articulos in directum mutilatur his crus aliquanto magis, quam quibus alio modo luxatio facta est. Quo igitur in summa dicatur, Articuli excidetes ac qui luxantur, inæqualiter inter seipsum excidunt ac luxantur, aliquando multo plus, aliquando multo minus. Et quibus quidem multo plus luxati aut elapsi fuerint, his omnino difficilius reponuntur. Et si repositi non fuerint, maiores & manifestiores mutilationes ac afflictiones tales habent, & ossium, & carniū, & figurarū. Vbi uero minus exciderint & luxati fuerint, tales facilius quam alij reponi possunt. Si uero frustra retati, aut neglecti fuerint, minores ac minus noxiæ mutilationes his fiunt, quam illis de quibus paulo ante dictum est. Reliqui igitur articuli etiam ualde multum differunt ad hoc ut aliquando minor, aliquando maior luxatio fiat. Verum femoris & brachij capita, quam similime inter se utraq; excidunt. Nam capita prout rotunda sunt, simplicem & caluam rotunditatem habent. Orbiculatiores autem sinus sunt, qui capita excipiunt, capitibus tamen ipsis congruentes. Quapropter fieri non potest ut dimidium articuli ex ipsis elabatur. Nam ob rotunditatis circumferentiam, aut ad externam, aut ad internam partem luxari poterit. Sed de quo nunc sermo est, perfecte excidunt, nam alioqui non excidunt. Artamē & hi aliquando plus, aliquando minus, à naturali statu profluunt, & femur aliquanto magis quam brachium patitur. Nam aliqua etiam ex his luxationibus quæ à natiuitate fiunt, si parum elapsæ fuerint, ad naturalem statum reduci possunt, & maxime articuli circa pedem. Quicquid à natiuitate mutili fiunt, plerique ex his curabiles sunt, si non ualde magna emotio facta fuerit, aut etiam præuocis iam pueris contigerit. Optimum igitur est ut talia quam celerrime curentur, priusquam ualde magnus ossium defectus fiat, & priusquam admodum magnus carniū defectus circa tibiā contingat. Modus itaque mutilationis non unus est, sed plures. Plurima quidem eluxata non sunt penitus, sed per figuram consuetudinē, in quadam pedis interceptione mutilata. Animaduertendum autem in horum curatione est, ut tibiæ circa malleolum os, quod extrinsecus est, ad internam partem retrudatur ac dirigatur, & calcanei os quod è directo illi subiacet, ad externam partem retrudatur, quo ossa quæ eminent sibi ipsis occurrant iuxta medium ac obliquum pedem. Digni uero acruati unam cum magno digito ad internam partem indinētur, atque ita circūcirca cogantur. Probe autem deligare oportet cerato resinato, & splenis, & linteis mollibus non paucis, neque nimis compressis, atque ita deligationis circūductiones facere, uelut etiam manibus directio pedis fiebat, quo pes paulo magis ad ualguem uergere uideatur. Soleam etiam quandam facere oportet, aut ex pelle non nimis dura, aut è plūbo, eamque insuper alligare non ad corpus positam, sed ubi iam postremis linteis deligare uolet. Quum uero iam deligatus fuerit, unius alicuius lintei ex his quibus deligatur, in initium, ad deligamentam quæ infra pedem assuere oportet, è directo parui digiti, & postea sursum extendere, ita ut moderate habere uideatur, atque sic supra suram circū dare, quo sic extensum ac collocatum stabile maneat. In summa, quasi quis ceram fingat, ad naturam iustam adducere oportet, ita ut & inclinata, & directiō præter naturam, & manibus sic dirigamus, & similiter deligatione adduca-

camus aut non uiolenter, sed leniter. Assuere uero ita oportet lintea, ut cōducatur ad reparationes ac appēssiones faciendas. Aliæ enim claudicationes alia reparatione ac appēssione opus habēt. Calcem insuper plumbeū facere oportet, extra deligationē adalligatum, qualem modulū crepidæ chiæ habebūt. Verum nihil ipso opus est, si quis & manibus recte direxerit, & linteis recte deligauerit, & appēssiones ac reparationes per assuta lintea recte fecerit. Atq; hæc quidem est curatio, & neq; sectione, neq; uestione, neq; alia uarietate quicq; opus habet. Citius enim talia medicinæ obtēperant, q̄ quis putarit. Deuincere tamē tempore oportet, donec in iustis figuris corpus auctū fuerit. Vbi uero calcei ratio habenda est, Arbylæ lutigradæ, calceamētī ita appellati species, accommodatissimæ existūt. Hoc enim calceamentū minime à pede superatur, sed potius ipsum superat. Idoneus est etiā creticus calceamentorū modus. At uero quibus tibię ossibus luxatis, ac ulcere inducto, articuli circa pedē penitus eminet, siue introuergant, siue extra, tales reponere nō oportet, sed permittere ut quicunq; uelit medicus reponat. Illud enim clare scire oportet quod homo morietur, si repositi permāserint. Sed & uita paucorū dierū his cōtinget. Pauci enim ex ipsis septimum diē transgrediūtur. Cōuulsio enim est quæ ipsos occidit. Sed & cancerari cōtingit tibiam ac pedē. Hæc ita futura esse certo scire oportet. Et neq; ueratū mihi uidetur profuturū esse, & eadem die datū, & rursus epotū. proxime autē si quicquā huiusmodi facit, non tamē mihi hoc uidetur. Si uero repositi non fuerint, & ne tentati quidē ab initio, pleriq; ipsorū superstites euadunt. Sic autē & tibiam & pedē coaptari oportet, prout ipse uolet, modo non sint dependentia, aut commota. Curatio uero facienda est cerato picato, & splenis uino imbutis paucis non ualde frigidis. Frigiditas enim in talibus cōuulsionem accersit. Idonea etiā sunt folia betarū, aut tulsilaginīs, bechij appellata, aut alicuius alterius huiusmodi, in uino nigro austero semicocta ac imposta. Et faciendā est curatio super ulcus, et super partes adiacētes. Et cerato tepido ipsum ulcus illinendū. Si uero hyemis tēpus fuerit, etiā lanæ succidæ uino ac oleo tepidis imbutæ super ne ipsum madefaciāt. Deligatio uero nulla, neq; ullū cataplasma adhibēdū est. Probe enim nosse cōuenit, q̄ cōpressio ac omnis oneris gestatio, talibus omne malū affert. Accomodata aut sunt ad talia, & ex emplastris aliqua quæ cruentis uulneribus destinata sunt, quibus uidelicet ex ipsis cōfert, ut lanæ superimpositæ uino madefiāt, & multo tēpore sinātur. Quæ uero ex illis cruētis emplastris, paucissimis diebus incūbere debēt, & quæ resina cōprehendūtur forinsecus adiecta, nō similiter ut illa idonea sunt. diuturna enim sit horum ulcerū purgatio, quum multo tēpore madore abundant. Quosdam tamen ex his deligare, bonū est. Verū illud clare nosse oportet, q̄ necesse est hominē turpiter claudum fieri. Nam pes in talibus in supernā partem retractus est: et ossa luxata, extra eminentia apparent. Neq; enim ullum ex talibus ossibus plerūq; denuatur, nisi leuiter aliquantū: neq; abscedit, sed tenuibus ac debilibus cicatricibus circumducitur: atq; hoc si multo tēpore quieuerint. Sin minus, periculū est ne ulcusculum immedicabile relinquatur. Verū de quo sermo est, qui sic curatur, seruantur. Si uero repositus fuerit articulus ac permāserit, moriuntur. Eadē ratio est, si etiam cubiti ossa circa manus articulum ulcere facto emineant, siue ad internā manus partē, siue ad externā. Clare enim nosse id oportet, q̄ is morietur intra paucos dies

dies tali mortē, qualis antea dicta est, cui reposita ossa permanferint. Quibus uero reposita nō fuerint, neq; repositio tentata est, hi multo plures superstitēs manent. Curatio autē eiusmodi etiam talibus commoda est, qualis iam dicta est. Finguram uero claudicationis turpem esse necesse est, & digitos manus debiles ac inutiles. Si enim ad internam partē ossa luxata fuerint, digitos inflectere nō potest. Si uero ad externā, extendere nequit. Quibus uero tibiꝰ os factō ulcere, circa genu eminuerit foras, siue ad externā partem siue ad internā, his si quis reponat, adhuc promptior mors adest q̄ alijs, etiam si etiam illis prompta aderat. Si uero omīssa repositione medearis, spes quidē salutis hoc solo modo existit. Verū periculosa haec ossa sunt, quāto superiora ac robustiora sunt, & à forterioribus elapsa. At si os femoris quod ad genu est, ulcere factō elapsū fuerit & repositū permāserit, mortē adhuc uiolentiorem citius induxerit q̄ prius relata. Si uero repositū nō fuerit, longe magis periculosum est q̄ priora. Sola tamē haec salutis spes est. Eadem uero ratio est, & de articulis circa gibbū cubiti, & de cubito ac brachio. Quācūq; enim ex his luxata, ulcere factō eminuerint, ea omnia si reposita fuerint mortē inducunt: nō reposita, spem salutis: claudicationē uero superstitibus. Lethaliore autē sunt superiores articuli, si reponantur. Sed & si nō reponantur, periculosiores ijdem sunt. Si uero alicui superiores articuli luxati, factō ulcere emineant, hi & si reponantur celerimam mortē inducunt; & si nō reponantur, periculosiores sunt. Curatio uero iam relata est, quā mihi accōmodatissima esse uidetur. At uero quibus articuli digitorum aut pedis, aut manus luxati, factō ulcere eminuerint, osse nō fracto, sed circa ipsam cōnexionem auulso, his si repositi permāserint, adest quidē periculum cōuulsionis, si nō bene curati fuerint: attamē operā precū est ut repositio fiat, cū praedictione quod multa custodia ac cura opus habet. Reponere uero facillimū est, efficacissimūq; ac artificiosissimū per uecticulū, uelut enā antea dictum est in fractis ac eminentibus ossibus. Postea quiescere q̄ maxime cōuenit, & decūbere, ac pauco cibo uti. Melius est & pharmaco sursum purgāte leui aliquo uti. Vlcus uero curare oportet, aut cruentis emplastris quā madesunt, aut polyophthalmi siue buphthalmi solijs impositis, aut quibus ossa in capite fracta curantur. Nihil autē ualde frigidum adhibere. Minime igitur primi articuli periculosi sunt. Superiores autē periculosiores. Reponere uero oportet eadem die aut postridie: Tertio ac quarto minime. Quarto enim die maxime recrudescere solent. Quibus autē non statim repositi fuerint, in his dictos dies transgredi oportet. Quicquid enim intra decē dies repositū fuerit, omne id cōtinetur. Si uero reposito osse cōuulsio accedat, articulū statim eijcere oportet, & calida q̄ saepissime humectare, & torū corpus, et praesertim circa articulos, calide & leniter ac molliter tractare. Verū inclinatū magis q̄ extēnū totum corpus esse oportet. Expectandū tamen est articulos circa digitos qui reponuntur abscessuros esse. Plerūq; enim ita cōtingit, si uel quāuis inflamatio sub sit. Quare si nō propter uulgi imperitiam, medico uerenda esset accusatio, nullū penitus reponere oportebat. Atq; ad hunc modū periculosa sunt ossa, circa articulos eminentia foras, si reponantur, quemadmodū dictum est. Quācūq; uero circa articulos digitorū penitus resecantur, ea plerūq; innoxia sunt, si nō quis in ipsa uulnere ex animi deliquio laedatur. Et curatio uulgaris talibus ulceribus sufficit. Sed & quā non circa articulos, sed iuxta

aliam quandam ossium rectitudinem refecantur, & hæc innoxia sunt, & adhuc alijs curatu faciliora, Et quæ iuxta digitos ossa fracta extra eminent, non ad articulum, & hæc si reponantur innoxia sunt. At refectio ossium perfectæ circa articulos, & in pede, & in manu, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad iuncturam manus, plerisque quibus refecantur innoxia sunt, si non statim animi deliquium evertat, aut quarta die febris continua accedat. Corruptiones tamē carniū cōtingunt, & in uulneribus sanguifluis fientibus, & uehemētibus cōstrictionibus, & in ossiū fracturis magis quā oportet compressis: & alijs uinculis uolentis intercepta plerisque decidit. Et plerisque ex talibus superstites euadunt, & quibus femoris pars aliqua & carniū & ossis decidit, & quibus brachij pars (Minus autē si cubiti aut tibiæ pars deciderit) & amplius facile ferentes superstites euadūt. Quibus igitur fractis ossibus corruptiones statim fiunt, & denigrationes, his abruptiones corporis celeres circūcirca fiunt, & decidētia cito decidūt, ut quum ossa iam antea remiserint emollita, Quibus uero dum ossa sana sunt, denigrationes fiunt, carnes quidē etiam his cito moriuntur, ossa uero tarde abscedunt, qua parte termini sunt denigrationis, & ossis nudatio extat. Oportet autem partes corporis quæcūque infra terminos denigrationis sunt, quum iam penitus mortuæ fuerint & doloris exortes, iuxta articulū auferre, prouidendo ut ne uulneres. Si enim is cui refectio fit dolore affectus fuerit, et corpus nondū mortuum fuerit ea parte qua refecatur, magnū periculum est ne præ dolore animi deliquium incidat. Talia uero animi deliquia multos iam euestigio peremerunt. Femoris itaque os tali modo denudatū octogesimo die abscedere uidi. Tibia tamē huic homini circa genu uigesima die ablata fuerat, aut ut mihi uidebatur etiam citius. Non enim simul, sed ad maiore prouidentiam facere quid mihi uisum fuit. At tibiæ ossa ex eiusmodi denigratione circa mediam tibiā, sexagesimo die mihi deciderūt, quæcūque ex ipsis fuerunt denudata. Differt equidē & curatio à curatione, ad hoc ut ossa denudata citius aut tardius decidant. Differt etiā compressio à cōpressione, prout uehemētior aut debilior fit, ad hoc ut citius aut tardius nerui denigrati emoriantur, carnes item & arteriæ ac uenæ. Nam quæcūque non uehementer intercepta moriuntur, ex talibus quædā ad ossium denudationes non perueniunt, sed magis in superficie decidunt. Propter has igitur causas, non unum numeri nomen tempori poni potest, in quanto singula ex his iudicantur. Assumere uero ualde oportet tales curationes. Sūt enim magis horrendi aspectus quā curationis, & curatio lenis omnibus talibus sufficit. Ipsa enim seipsa solū iudicant: & circa uictum diligentiam adhibere oportet ut pro uiribus febris exors sit: & in iustis figuris corpus collocare. Iustæ autē hæc sunt, ut neque sublimius eleuatū sit, neque deorsum repat. Sed magis præterea sursum uergat, donec perfecte fuerit circūcirca abruptū. Nam in hoc tempore sanguinis eruptionū periculum imminet. Ob id igitur uulnera deorsum repentia facere non oportet, sed uice uersa. Alioqui ubi tempus amplius accesserit, & ulcera pura facta fuerint, non amplius hæc figuræ cōmodæ sunt, sed positio recta, & aliquando deorsum repentes. Tēporis enim progressu quibusdā horum ossis discessiones fiunt, & subligaminibus opus habent. Expectare tamē oportet, ut tales per tēpus à dysenteria corripiantur. Nam in plerisque denigrescentibus dysenteria accedit, & in sanguinis eruptionibus ex ulceribus. Accedit autem

tem iudicatis iam denigrationibus ac sanguinis eruptione, & procedit quidem large ac uehemēti impetu, sed non ad multos dies durat, neq̄ lethalis est. Neq̄ enim ualde cibū auerſantur tales, neq̄ aliās uasā uacua facere conducit. Femoris porrò luxationē circa coxā hoc modo reponere oportet, si ad internā partem elapsū fuerit. Bona quidē aciusta & secundū naturā hæc repositio est, & sanē etiā aliquid ostērationis habēs, si quis taliū rerū iactatione superbire uelit. Ex pedibus hominē ad trāuersam mediæ domus trabem suspendere oportet, uinculo forti, sed molli ac lato, ita ut pedes quatuor digitorū spatio, aut minus, inter se distantes habeat. Sed & supra genua latū ac molle lorū circūdatum esse oportet, quod itē ad trabem illam extēdat. Crus autē læsum duobus digitis amplius q̄ alterū extēntū esse oportet. A terra uero absit caput ad duorū cubitorū spatium, aut paulo plus, aut minus. Manus autē iuxta latera extēta, aliquo molli sint alligata. Omnia uero hæc supino iacētī ipsi præparentur, ut q̄ breuissimo tēpore pendeat. Post q̄ uero suspēsus fuerit, uirū peritū & nō debilem immisso inter femora cubito ita agere oportet, ut cubitū inter caput femoris elapsū, & interfemineū locūq̄ inter anū ac pudendū ponat, & postea altera manu ad illam interpositā cōiunctā, rectus astans ad suspēsi corpus, derepēte se appēdens sublimis q̄ æquabilissime depēdeat. Hęc repositio omnia quibus secundū naturā opus est exhibet, Nam & ipsum corpus suspēsum sua ipsius grauitate extensionē facit: & is qui appēdet, unā cum extensione, femoris caput super acetā bulū eleuari cogit, simulq̄ cū cubiti osse, uelut cum uectē molitur ac cogit, ut ad pristinā naturam relabatur. Oportet autē uinacula omnino bene constructa esse, & curare ut fortissimus sit is qui se appēdit. Quemadmodū igitur etiā antea dictum est, Magna est differentia naturarū in hominibus, ad hoc ut uel facile, uel difficulter repositio fiat. Et cur magna sit differentia dictū est antea, ubi de humero egimus. Quibusdam enim femur rursus incidit nullo adhibito apparatu, sed ex modica extēsiōne, quantū manibus directio fieri potest, & ex leui cōmotione. Multis autē qui crus iuxta articulū inflexerūt, iam facta circūagitatione rursus incidit. At multo plura uulgari cuilibet apparatu nō obtemperāt. Quapropter scire quidē oportet de singulis optima in omni arte, uti uero his quæ singulis uicibus idonea uisa fuerint. Relati igitur sunt extensionū modi etiā in superioribus partibus fieri extensionē uehementer, in alterā, cruris: in alterā, corporis. Si enim probe extensio facta fuerit, femoris caput supra pristinā sedem eleuabitur. Et si quidē ita super eleuatū fuerit, ne prohibere quidē facile sit, quo minus ipsum in suā sedem insideat. Quare omnis iam uectis molitio ac directio sufficit. Sed enim in extensione deficiūt, & ob id maiore turbationē exhibet repositio. Oportet igitur nō solū iuxta pedē uinacula alligata esse, sed etiā supra genu, quo nō magis circa articulū sit deligatio in extensione, q̄ circa coxæ articulū. Sic igitur extensionē ad pedis partē præparatā facere oportet. Sed et in alterā partē extensionē, non solū ex deligatione circa pectus & alas, in cōtrariū extēdere oportet, sed etiā loro longo, duplicato, robusto, leni, circa interfemineū inferto, & à posteriore parte ad ipinā porrecto, ab anteriore uero ad clauiculā tendēte, ibiq̄ ad alterū initium alligato, ita coactionē facere oportet, ut alij hinc, alij illinc extensionē faciant, ita tamen ut lorū circa interfemineū, nō super femoris caput

porrectū sit, sed inter caput & interfoemineū. Verum inter extendendū pugno ad femoris caput quis innixus, id ad exteriorē partem propellat. Si uero is qui trahitur eleuetur, iniecta manu, et cum altera manu cōiuncta, simul deorsum trahat, simulq; ad externam partem cogat. Alius uero quispiam partē femoris ad genu, placide ad internam partem dirigat. Dicitū autem est etiam antea, operæ precium esse ut si quis in urbe populosa medicinam exerceat, lignum possideat quadrangulare sex cubitorū, aut paulo minus: latitudine bicubitali: crassitudo aut sufficit dodrātalis. Id secundū longitudinē hinc atq; illinc sectionē incisam habere oportet, ut ne altior q̄ oportet machinatio fiat. deinde postes aselli breues, robustos, utrinq; inapriatos habere. Postea sufficit quidem in dimidia ligni parte, nihil tamē uetat etiā per totū, uelut fossas lōgas quinq; uel sex, quatuor digitorū spacio inter se distantes, incisas esse: & satis est ut sint hæ & latitudine & profunditate triū digitorū. Habere etiā in medio hoc lignū debet excauationē profundiorē quadrangulam triū digitorum, quo in hāc excauationē, ubi opus esse uisum fuerit, lignū cavitati congruū infigatur, quod superne sit rotundū. Infigendū aut hoc est, si quādo cōducere uisum fuerit, inter caput femoris & locū inter anum ac pudendū. Hoc lignū erectum stans prohibet ne cōcedat corpus, dum à pedibus extēditur. Quādoq; enim hoc ipsum lignū sufficit pro extensio ne in contrarium superne facienda. Aliquādo etiā dum hinc atq; illinc crus extēditur, hoc ipsum lignū hāc uel illac laxum incubens, cōmodum ad hoc fuerit, ut instar uectis, caput femoris ad externam partē extrudat. Ob hoc enim etiam fossæ incisæ sunt, quo in quibuscūq; ex ipsis congruū id facere fuerit, uectes ligneus immixtus molitionē faciat, aut circa articularū capita, aut ad ipsa penitus capita infixus, unā cū extēsiōne, siue ad externā partē, siue ad internā, molitionē facere expedierit: siue etiā rotundū uectem esse cōducat, siue latū. alius enim aliq; articulo conducit. Cōmoda aut est in omniū articularū cruris repositione, hæc per uectes molitio unā cū cōcussione. Verū de quo nūc sermo est, teretē ac rotū dum uectē esse cōuenit. Ex his machinis ac coactionibus, nō uidetur mihi fieri posse ut ullius articuli repositio frustra tentetur. Inuenire tamē quis possit etiā alios modos repositionis huius articuli. Si enim lignum hoc magnū, habeat in medio à lateribus duos postes pedales, eius altitudinis, quæ cōferre uidetur, alterum hinc, alterum illinc. Deinde lignū tranuersum, uelut scælæ gradus, postibus impositū sit: atq; ita sano crure inter postes trāsmisso, læsum crus supra gradum adaptatū habeat. Verū ad altitudinem, & ad articulū qua parte excidit facile quiddā adaptare oportet. Gradū enim moderato altiore facere oportet, & stragulū multiplex prout cōgruum fuerit, sub corpus subextendere. Deinde lignum moderatā latitudinē ac longitudinē habens, sub crus ad malleolum usq; extentū esse oportet, quod ultra femoris caput, quantū eius fieri potest porrigatur, & ad crus alligetur quoriscūq; opus fuerit, ut moderate habeat. Postea dū extēditur crus, siue ligno pistilloformi, siue aliqua alia ex his extēsiōnibus, crus simul circū gradū unā cū alligato ligno, deorsum cogere oportet, ita ut aliquis supra articulū iuxta coxam hominē detineat. Hoc em̄ modo simul & extēsiō femoris caput super acetabulū attollet, simulq; molitio femoris caput in pristinā naturā detruet. Hæ omnes relatæ necessitates ac coactiones fortes sunt, & omnes calamitate superiores, si quis recte ac bene præparet. Quemadmodū autē etiam

etiã antea dictũ est, à lōge debilioribus extēfionibus, & uiliore apparatu ple-
 risq; rursus incidit. At uero si ad externã partem femoris caput luxatũ fuerit,
 extēfiones quidẽ hinc atq; illinc facere oportet, eodẽ modo uelut dictũ est. Ve-
 rum molitionẽ cum uectẽ lato, unã cũ extēfione facere cõuenit, ab externa par-
 te ad internã cogendo, ita ut ad ipsas nates, & paulo superius uectẽm adhibeas.
 Ad sanã uero coxã iuxta nates aliquis manibus renitatur, ut ne cedat corpus:
 aut alio quopiã huiusmodi uectẽ submisso, & ex fossa cõueniente fulcito cõtra
 obnitatur. Partẽ autẽ femoris luxati quã ad genu est, ab interna parte foras pla-
 cide abducatur. Cæterũ suspensio in hoc modo luxationis articuli non conuenit.
 Cubitus enim eius qui se appõdit, caput femoris ab acetabulo propellit. Moli-
 tionẽ tamen cũ ligno subiecto, ita quis adaptare possit, ut huic luxatiõis modo
 cõueniat, si forinsecus adhibeat. Sed quid opus est plura dicere: Si em̃ recte ex-
 tensio fiat, & recte per uectẽs molitio cõtingat, qui articulus hoc modo elapsus
 nõ reponi possit. At si in posteriõrẽ partẽ femur exciderit, extēfiones & diuer-
 sum tēfiones ita facere oportet, uelut dictũ est, ita tamẽ ut super lignũ multiplex
 fragulũ infernatur, quo mollissimũ sit, et homo pronus reclinetur ac sic exten-
 datur. Verũ unã cũ extēfione, etiã tabula deorsum cogere oportet eodẽ modo
 ueluti gibbositates, è directo natiũ tabula collocata, aut magis ad infernam q̃ ad
 supernã coxarum partẽ, & incitura in pariete ad tabulã excipiendã nõ recta sit,
 sed paululũ decliuis ad pedũ partem. Hęc repositio maxime secundũ naturã est
 huic luxationis modo, et simul fortissima. Suffecerit autẽ fortassis pro tabula, ut
 aliquis infideat, aut manibus innitatur, aut inscẽdat derepẽte, simulq; cũ exten-
 sione incubat. Nulla uero alia ex relatis repositionibus secundũ naturã est huic
 luxationis modo. Si uero in anteriõrẽ partem elapsus fuerit, idem quidem mo-
 dus extēfionũ faciẽdus est. Verũ uirũ & manibus ualidissimũ, et aliàs peritiss-
 simũ, uola manus alterius circa inguina firmata, & altera manu insuper iniecta,
 simul luxationẽ deorsum propellere, simulq; femoris partẽ quã ad genu est ad
 anteriõrẽ partem cõpellere oportet. Hic em̃ modus repositionis, huic luxationi
 maxime secundũ naturã est. Sed & suspensio finitimũ quid secundũ naturã habet.
 Oportet tamẽ eum qui se appõdit peritũ esse, ut ne cubito articulũ excutiat, sed
 circa mediũ inter anũ ac pudẽdum locũ, & iuxta os sacrũ se appõdat. Laudatur
 etiã is qui per utrũ hunc articulũ reponere conatus est. Et iam sanẽ aliquos uidĩ,
 qui præ imperitiã, etiã extra & retro luxatos, per utrũ reponere conabãtur, nõ
 animaduertẽtes q̃ magis ipsum eijcerẽt q̃ reponerẽt articulũ. Nã qui primus
 excogitauit, haud dubie ad intrũ elapsos articulos, per utrũ repositionẽ tenta-
 uit. Nõse igitur oportet q̃ alia multa utre sunt potiora. Oportet autẽ utrũ nõ in
 flatu intra femora ponere, quantum fieri potest supreme ad locũ inter anũ ac pu-
 dendũ adductũ: et factõ à patellis genu initio, femora per fasciã usq; ad mediã se-
 morũ partẽ deligare, deinde in partẽ utris solutã folle ex officina fabri immisso
 inflare, & utrũ cogere ut distẽdatur. Hominẽ uero in latas decubere oportet, &
 læsum crus superne habere. Atq; hic quidẽ est apparatus: sed pleriq; peius præ-
 parant q̃ ego nũc dixi. Nõ enim deligãt femora ad multã partẽ sed solũ genua,
 & nõ insuper extẽdũt. est autẽ insuper extēfio quoq; faciẽda. Attamẽ aliqui iã re-
 posuerãt, facile rẽ assequuti. Nõ autã ita facile est coactionẽ hoc modo perficere.
 Nã & uter dũ inflatur, tumidissimas partes suas ad articuli caput nõ habet, qd̃

maxime emoliri oportet: sed inferius ipso, medius ipse locatus est circa media femora, aut adhuc inferius: & rursus femora ipsa natura sunt curua. Superne enim carnosa sunt, & inter se sociata. Inferne uero sicca, ut etiã natura femorũ utrem ab opportunissimo loco repellat. Si uero quis paruũ utrem imponat, fieri nõ potest ut paruũ robur articulum cogat. Si itaq; utre uti uelis, femora inter se ad multã partem colliganda sunt: & unã cũ corporis extensione uter inflandus est. Crura uero ambo deliganda sunt usq; ad finẽ in hoc repositionis modo. At uero in uniuersa arte hoc plurimi facere præ omnibus oportet, ut id quod egrotat sanũ facias. Si uero multis modis fieri possit sanatio, ut eũ qui minime molestus est eligas. Nam & uirũ bonum, & artis peritũ, hoc declarat, qui populo imponere non studeat. Verũ de quo nunc sermo est. Tales quædã sunt familiares extensões corporis, ut ex his quæ adsunt expedita ac facili reperiri possit. Nã si uincula ex loris mollia ac lenia nõ affuerint, sed aut ferrea, aut funes nautici aut domestici, fascijs aut pãniculis lancis ea maxime parte amplius obuoluere oportet, qua uincula detentionẽ factura sunt, atq; ita uinculis deligare. Deinde in læcto robustissimo & ex præsentibus maximo, hominẽ bene extendere oportet, hoc modo. Lecti pedes qui ad caput sunt, aut à pedibus, ad limen ianux, intus aut foris prout cõmodum fuerit firmetur. Ad alteros aut lecti pedes lignũ quadrangulare trãsuersum obijciatur, ita ut à pede ad pedẽ pertingat. Et si quidẽ tenuerit lignũ, ad pedes lecti deligetur. Si uero crassum, nõ est opus. Deinde initia uinculorũ, & eorũ quæ à capite sunt, & eorum quæ à pedibus, utraq; alligetur ad pistillũ, aut ad aliud huiusmodi lignũ: ita ut è directo corporis sint, aut paulo superius. Moderate uero extendatur ad pistilla erecta cõsistentia, quorũ alterũ ad limen, alterũ ad lignũ obiectũ firmetur, atq; sic refractis pistillis extensio fiat. Sufficit aut scala quæ robustos gradus habet, sub lectũ extenta, pro limine ac ligno obiecto, quo pistillis ad conuenientes gradus hinc atq; illinc firmatis, ita uinculorũ extensio fiat. Porro reponitur femoris articulus etiam hoc modo, si ad internã, & ad anteriorẽ partem luxatus fuerit. Supra scalam in terrã defixam hominẽ collocare oportet. deinde sanũ crus placide extentũ deligare, ubi cõmodum fuerit: ex sinistro uero uas testaceũ aqua plenũ, aut sportulam lapidibus refertã appẽdere. Alius repositionis modus, si ad internã partem luxatus fuerit. Inter duas colũnas trabẽ moderata altitudine deligare oportet. Præmineat aut una pars trabis pro magnitudine natũ. & ubi stragula circũ pectus hominis deligaueris, ipsum hominẽ supra præminentẽ trabis partẽ collocato, & deinde pectus ad columnã lato aliquo uinculo alligato. Postea sanũ quidem crus detineat aliquis, ut ne circũagatur. Ex læso uero appẽdatur pondus quantum cõgruit, uelut etiã prius dictũ est. Primũ igitur scire expedit, quod omnũ ossium cõmissuræ plerunq; sunt caput & acetabulum. In quibusdam uero & locus acetabuli formam refert, & oblõgus est. Quidam uero loci leuiter sinuosi sunt. Semper aut reponere oportet omnes articulos elapsos, maxime quidẽ statim dum adhuc calidi sunt. Sin minus, q̄ celerrime. Nã & ei qui reponit, facilius ac citius reponere cõtingit, & ægroto multo minus doloris affert repositio priusq; intumuerit. Omnes etiã articulos ubi reponere uoles, præmollire ac cõmouere oportet. Sic em̄ facilius reponi solẽt. Circa omnes aut articulorũ repositiones hominẽ attenuare oportet, maxime circa maximos articulos et repositu dif-

facilimos

ficillimos: minimū circa minimos & faciles. At uero si digitorū articulus, siue primus, siue secundus, siue tertius in manu exciderit, idem ac æqualis repositio nis modus est. difficilius tamen semper maximi articuli reponitur. Excidit autem quatuor modis, aut sursum, aut deorsum, aut in obliquū utrinq;: maxime quidem superne, minime autē in obliquū, in uehementi motu. Vtrinq; aut in ea parte in quā exciderunt, uelut crepido est. Si quidē igitur ad supernam aut infernam partem exciderit articulus, eo quod leuior est hic locus q̄ à lateribus, & simul parua facta est transgressio, facile est reponere. Modus aut repositionis sic habet. Digitū summum aut deligamēto aliquo, aut alia quapiam huiusmodi re obuoluito, ut ne ubi summū digitum apprehēsum extendis elabatur. Quū autem obuolueris, alter quispiam manū supra iuncturā apprehēdat, alter digitum obuolutū, atq; ita uterq; ad seipsum probe extēdat, simulq; elapsum articulū ad sedem suam detrudat. Si uero in obliquū excidit, extēnsionis quidē idem modus est. Vbi uero iam uisus fuerit tibi articulus lineam trāsgressus esse, simul cū extēnsione statim ad locū suū detrudere oportet, ita ut alius quidam ex altera digiti parte obseruet ac repellat, ut ne rursus illic elabatur. Moderate quoq; repositionem faciunt uimineæ texturæ, sicut id est lacertæ appellatæ, ex palmis contextæ: ita ut dum digitum hinc atq; illinc distendis, altera manu lacertam, altera manus iuncturam apprehendas. Postquam aut reposeris, deligare oportet lineam quā citissime tenuissimis inceratis, cera neq; ualde molli, neq; ualde dura. Dura enim de digito abscedit. Mollis aut & liquefcens eliquatur, & digito calefiente deperit. Soluendus autem est digiti articulus tertia aut quarta die. In summa, si inflāmatu fuerit, frequētius soluendus est: sin minus, rarius. De omnibus articulis hæc dico. Restituitur digiti articulus decima quarta die. Idem uero est curationis modus digitorū manus ac pedis. Circa omnes aut articularū repositiones attenuare oportet ac fame macerare usq; ad septimū diem: & si inflāmati sint, frequētius soluere: sin minus, rarius. Quiētē uero semper habere oportet afflictu articulū, & q̄ optime figuratum positū esse. Genu porro propter expeditā ac facilem naturam, mitius est q̄ cubiti gibbus. Quare etiā facile excidit. Excidit autem saepe intrō. Sed & extra, & in posteriōrē partem. Repositiones aut fiunt ex repentina cōflexione aut ex calcitatione: aut conuolutā fasciæ molem in poplitem posito, & circū illam corpus ita ad flectendū genua in terram dimitto. Potest etiam ubi in posteriōrē partem excidit, moderata extēnsione reponi, ueluti cubiti gibbus. Si uero hæc aut illā excessit, ex cōflexione aut ex calcitatione reponitur. Cæterum directio ex moderata extēnsione omnibus cōmunis est. Si uero nō incidit, hi quibus in posteriōrē partem excidit, flectere nō possunt. Sed neq; alij ita ualde minuitur autem femoris & tibiæ anterior pars. Si uero intrō, ualgiores fiūt. Minuūtur autē externæ partes. Si uero extra, magis uari ac detorti, minus claudi fiunt. crasiore aut osse uehūt, & internæ partes minuuntur. At si ex natiuitate, aut in augmēto hæc fiant, iuxta priorē rationem res se habet. Cæterū articuli circa malleolos luxati extēnsione uehementi opus habēt, aut manibus, aut alijs huiusmodi: & simul directione utrinq; præstante. Commune autē hoc est omnibus. At uero luxationes articularum in pede, uelut eas quæ in manu fiunt sanabis. Qui uero cū tibia cōmunionem habent, & ex natiuitate elapsi sunt, aut etiā in augmento luxati, eandē cum manu

repositi

repositionē expetunt. Quicūq; uero facto saltu ex supernis, calcaneo innitentes se firmarunt, sic ut ossa disparata sint, & uenæ humores effuderint, & nerui cōtusi sint: si grauius hæc acciderint, periculū est ne corruptione accedente per omnē uitam affligātur. obtorta enim fiūt ossa, nerui autē inter se cōmunionē habent. Quin & quibus fractis, aut ex uulnere, uel in tibia, uel in femore: aut neruis exolutis qui his cōmunicant: aut ex negligenti decubitu, calcaneū fuerit denigratū, etiā his maximæ recrudescētix ex talibus fiūt. Quādoq; etiā ad corruptionē accedūt febres acutæ, singultuosæ, mentē percellētes, citā mortē inducentes, & insuper uenarū sanguisuarū liuores. Signa recrudescētū sunt, si effuso sanguine sugillata, & denigrata, & uicina his, subdura ac subrubra fuerint. Si enim cū duricia liuescāt, periculū est ne denigrescāt. Si uero subliuida sint, aut etiam liuida mollia et diffusa: aut cū uiore subpallida ac mollia: hæc in omnibus talibus bona sunt. Curatio si febris absit, ueratro in potu dato fit: minus, nō. sed potu si opus sit, fauorū cremor decoctus, aut acetū mullum dulce detur. Deligatio cōuenit qualis in articulis. Ad cōtusiones autē magis q̄ ad omnia, linteis pluribus ac mollioribus utendū est, & minus cōprimendū, & plurima insuper calcaneo obuoluēda. Figura sit uelut deligatio postulat, ut ne ad calcaneū exprimat. Ferulis utendū non est. Quibus uero aut ipse pes solus excesserit, aut cū appēdice, excidit quidē magis ad internā partē: his si nō rursus incidat, attenuatur progressū tēporis & coxa, & femur, & tibiæ pars luxatiōi opposita. Repositio est uelut iūcturæ ad manū. Extēsiō autē uehemens. Curatio pro lege articularum. Recrudescit, sed minus q̄ manus articulus siue iūctura, si quieuerint. Vicitus parciōr quiescentibus expedit. Quæ uero ex natiuitate, aut in augmento fiunt, iuxta priorem rationem.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE VLCERIBVS, IANO CORNARIO
Medico Physico interprete.



ULCERA uniuersa, nisi uino, humectare nō oportet, si non in articulo fuerit ulcus. Nam siccū sano propius est, & humidū non sano. Est enim ulcus, humidū: quod uero sanū est, siccū. Præstat autē absq; deligatione sinere, præterq̄ q̄ cataplasma imponitur: quanq̄ aliqua ulcera neq; cataplasma ferre possunt, magis aut recētia q̄ uetustiora, & quæ sunt in articulis. Modicus cibus, & aqua, q̄ maxime omnibus ulceribus conducunt, & magis recētioribus q̄ uetustioribus, & si quod aliud ulcus inflammatum est, aut inflammationē minatur, & si periculū est corruptiōis: & ulceribus ac inflammationibus in articulis: & ubi conuulsionē fieri periculū est: & uulneribus in uētre. Maxime uero omnium, fracturis in capite ac femore, & si cui alij parti fractura cōtigerit. Stare autē ulceri minime cōducit, præsertim si quis in crure ulcus habeat: imō neq; sedere, neq; ambulare. Verū ocium & quies maxime cōferunt. At uero recētia ulcera omnia, tum ipsa, tum circūsitæ partes, minime inflammationem incurrunt, si quis q̄ citissime suppūret, & pus ab osculo ulceris nō interceptum supprimatur: aut si quis auertat, ut omnino non suppurentur, præterq̄

præterquam necessario, eorū paucissimo pure, & sicca sint quæ maxime ex medicamento non molesto. Igneū enim feruorē hoc inducit, ubi horror & pulsatio accesserit. Inflammantur enim ulcera tunc quū ad suppurationē tendūt. Suppurantur autē alterato sanguine ac calefacto, donec putrefactus talium ulcerum pus fiat. Quum uero cataplasmate opus esse uisum fuerit, non ipsū ulcus cataplasmate integere oportet, sed circumfatas partes, quo pus decedat, & quæ indurata sunt mollescant. Cæterū ex ulceribus si quod acuto specillo incisum aut dissectū fuerit, cruentis uulneribus aptū medicamentū suscipit, & reficatoriū quoddā, quod prohibet suppurationē. Si qua caro ex telo cōtusa & dissecta est, eam curare oportet, quo quæ celerrime suppuretur. Nam & minus inflammatur, & necesse est carnes cōtusas ac dissectas, putrescere ac pus fieri, & eliquari ac confusim: & postea nouas carnes nasci. Omni recenti ulcere, præterquā in uentre, conducit frequenter sanguinē defluere facere, prout oportuū esse uisum fuerit, & ab ipsis partibus ulcus cōplectentibus, tum aliās, tum si in tibia ulcus fuerit, aut in digito pedis aut manus, magis quæ si alicubi in alia corporis parte. Sanguine enim defluente gracilescētia, sicciora fiunt ac minora. Prohibet enim hoc maxime talia ulcera humectari. Deinde uero in omnibus, putredo sanguinis ex sanguinis transmutatione fit. Cōfert autē post sanguinis defluxionē in talibus ulceribus, etiam spongiam deligare densam, mollem, cōcisam, sicciorem quæ humidiorum: aut super spongiam superne folia multa ponere. At oleū, & quæcumque molliā, aut oleosa sunt medicamēta, talibus ulceribus non conducūt, si non ualde iam ad sanitatē tendant. Neque ulceribus ex recēti uulnere oleum cōducit, neque molliētia, neque adiposa medicamenta, tum aliās, tum quod ulcus ampliore purgatione opus habet. Ut autē in summa dicam, oleo illitio faciēda est, & in æstate, & hyeme, in his ad quæ talibus medicamētis opus habemus. Depurgatio uentris deorsum plurimis ulceribus cōfert, & in uulneribus quæ sunt in capite, & in uentre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculū est, et in his quæ cōfuta sunt, & in exedētibus ac serpētibus, & aliās in ueteratis ulceribus. At ubi deligare uoles, pharmaca non prius imponere oportet, quæ ubi ualde siccū feceris ulcus. Tunc uero apponere oportet, ulcus autē sæpe spōgia detergere: & rursus hntē siccum ac purum sæpe adhibere, atque sic imposto medicamēto quod con ferre uidentur, deligare, aut non deligare. Plerūque ulceribus tepus calidius cōmodius est hyeme, exceptis his quæ in capite sunt ac uentre: magis uero æquinoctij tempus. Ulcera quæcumque probe & prout oportet purgata sunt, semper ad sicciōrē modū germinationē faciunt. Hæc autē plerūque carne non superexcreta sūt. Si undecumque tandē os discesserit, aut uisum, aut sectū, aut alio modo, horū ulcerū cicatrices cauiōres fiunt. Ulcera non purgata, non committi solent etiāsi adducantur, neque sua sponte coeunt. Vbi circumfatae ulceris partes in inflammatione sunt, quandiu durat inflammatio, ulcera coire non solent. Sed & ubi circumfatae partes denigratae fuerint, & sanguinis putredine, aut etiam urice, inflexionem sanguinis exhibente, neque hæc coire solent, si non circumfatas ulceris partes sanas feceris. Ex ulceribus rotunda si subcaua fuerint, excidere oportet undiquaque in orbē ea quæ discesserunt, aut omnia, aut ex dimidio circuli, secundum longitudinem naturæ hominis. In omni ulcere igne sacro accedente, corpus purgationem facere oportet, in utram partem ulceri contulerit

siue sursum, siue deorsum. Cui tumor obortus fuerit circa ulcus, ulcere non inflammato, huic postea temporis progressu tumor puris subsidentiam habet.

Quodcūq; ulcus ex inflammatione tumidū non sedatur, dum alia quæ simul inflammari ac tumescere coeperunt sedantur, etiā hoc non coalescere periculum est. Quæcūq; uero ex casu, aut alio quopiam modo diffecantur, & contunduntur, & intumescunt, ita ut uicinæ circūcirca partes suppuratæ, pus de tumoribus per ulcus egerāt: in talibus quicquid cataplasmate opus habere uisum fuerit, nō super ipsum ulcus cataplasma ponere oportet, sed super circūsitās partes, quo pus decedat, & indurata molliantur. Postquā autē mollita fuerint, & inflammatio sedata, spōgijs super ea quæ abscesserunt deligatis compescito, initio à sana parte factō, atq; ita procedēdo. Superne uero super spōgiam folia sint multa. Quum uero cōpesci nō poterit caro, quæ humida existit, in causa est ut hanc eiicias. Si sub profunda carne ulcus fuerit, ex utriusq; & ex deligatione, & ex eo quod insuper cōpresit, hoc sanè incuruum subattollitur, & si quis id fecerit specillo, si fieri poterit, ad fluxionem accommodatū ab ore ulcus sefcare oportet, ubi cōmodum tēpus esse uisum fuerit, atq; ita curationē adhibere, quæ licūq; tandē indigere uidebitur. Plerūq; uero in omni ulcere quod uentrē habet, in directum ad uisum cōspicua sunt omnia, tumore nō presente. Et si quidem in ipso fuerit putredo, aut caro suberit humida ac purida, hoc ulcus & cōpescitentes ulcus partes, aspectu nigra subliuida erunt. Et in excedentibus ulceribus, qua parte phagedæna affuerit, uehemētissimeq; depascitur ac edit, ea parte circūsitā ulceris pars colorē habebit nigrū, subliuidum. Cataplasmata tumorum & inflammationis in circūsitis partibus sunt, uerbascum coctū, & trisfolij folia cruda, & ligustri folia cocta, & poliū. Si uero etiā purgari opus haberit ulcus, omnia quidē etiā hæc purgant: Sed & fici & oleæ folia, & marrubium. Coquere autē oportet hæc omnia, & maxime uiticem, & fici ac oleæ folia. & mali punicæ folia similiter coquere oportet. Crudis uero his utendum est. Maluæ folia terito cū uino, & rutæ folia, & origani uiridis. Omnibus his lini semen torrefactum ac tusum q̄ leuissime, ammiscere oportet. Vbi uero periculum est ignem sacrum in ulceribus oboriturū esse, isatidis folia trita cruda cū lini semine imponito, aut lini semen solani aut isatidis succo subactū imponito. Quū autem ulcus purum quidem fuerit, uerū inflammatū est & ulcus, & circūsitæ itidem inflāmatae partes, lentem uino coctam, ac leuiter tritam, oleo modico subactam imponito, ac deligato, & rubi canini folia in aqua cocta, leuiter trita imponito, linteo tenui subextento, puro, uinoq; ac oleo madefacto. Et ubi cōmittere ac coalescere ulcus uoles, rubi canini folia uelut lentē præparato. Nasturtiū item sauridion à lacerti similitudine appellatū, uinum, & lini semen tenuiter tritum cōmiscetur. Et hæc, lini semen, & uitex crudus, & alumen meliū: hæc acceto subacta. Vuam albam immaturā per colum in uas aeris rubri expressam, per dies ad solem exponito, noctu autē tollito, ut ne irroretur. Per dies uero indefinenter terito, ut æqualiter siccetur, & de æneo uase q̄ plurimum assumat. Tanto autem tempore ad solem exponere oportet, donec ad mellis crassitudinē uenerit. Postea & hunc succū, & mel q̄ optimum, & uinum dulce, in æneam ollam infundito, ita tamen ut prius resinam terebinthinā in uino coquas, donec dura fiat instar mellis cocti, & postea resinam eximas, & uinū affundas. Sit aut plurimus

plurimū uuæ immaturæ succus. Secūdo loco uinū. Tertio mel. Myrrhā etiā tactē q̄ optimam leuiter tritam, eodē uino paulatim affuso diluio, & postea ipsam per se ipsam cū uino saepe agitando coquito, & ubi ad bonā crassitudinē deuenisse uidebitur, ad uuæ immaturæ succū affundito, & nitrū optimū torrefactum sensim ad pharmacum ammisceto, & floris æris minus q̄ niri. Hæc postquā miscueris, coquito nō minus tribus diebus, lignis ficulis nō multis succensis, aut prunis, ut ne torreatur, & ubi hoc pharmacū illinitur, omnia quæ imponūtur sicca sint, & ulcera non humectentur. Vtendū autē est hoc pharmaco ad ulcerata inueterata ac recētia, & ad pudendi, & capitis ac aurium ulcera.

Aliud ad eadem ulcera. Fel bubulum siccū, mel q̄ optimū, uinum albū in quo cocta sint loti ramēta, thus, myrrhā æqualis, crocus æqualis, flos æris simi liter. Ex liquidis autē uinū sit plurimū, deinde mel, paucissimū uero fel. Aliud.

Vinū, mel, oleum cedrinū: Sicca uero sint, flos æris, myrrhā, malicoriū siccū. Aliud. Flos æris tostus dimidia parte, myrrhæ duæ partes dimidiæ, croci partes tres, mel modicū, cum uino hæc torrentur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres. Hæc singula sicca q̄ leuissime terito, deinde mixta ad solem calidissimum, affuso uuæ immaturæ succo, donec uiscosa fiant, per tres dies terito, postea uino, austero, nigro odorato, paulatim affuso diluio. Aliud. In uino dulci albo ilicis radices coquito, & ubi probe habere uisum fuerit, de uino defuso duas partes fumito, & amurcæ olei q̄ siccissimæ partē unam. Postea agitando coquito, ut ne torrefiant, lento igne donec ad bonā crassitudinem deueniāt.

Aliud. Reliqua quidē eadem sint. Verū pro uino, acetum sit album acerrimum, in quo tinctæ sint succidæ lanæ. Postea ammixta amurca coquito, & succum caprifici affundito, & alumen meliū, & nitrū ac æris florem, utraq; tostā ammisceto. Hoc magis priore ulcera purgat. Verum prius non minus resiccat.

Aliud. Lanæ succidas paucissima aqua tingito, deinde uini tertiam partem ad aquā misceto, ac coquito donec bona prouenerit crassitudo. Ex his recentia uulnera q̄ citissime suppurari possunt. Aliud. Aron siccum inspergito ac adaptato. Aliud. Fici dum succulenta est corticem uiridē, in uino tritū immitto: & sine uino, ipsum etiā cum melle. Aliud. Ad acerū in quo cocta sunt loti ramenta: sit autē acetum album: amurcam oliuarū, & picis serū crudum ammisceto, & illinito, & infillato, & deligato sicca. Hoc recētia uulnera auertit ne suppurētur: aut aceto abluito, & uino imbuta spōgia extergito. Aliud.

Plumbū tritum cū spodio cyprio leuigatū inspergito. Et loti ramenta inspergito. & squamā æris, & chalcidē cū ære, & solam per se, & cum loti ramentis. Et aliās ubi siccis opus fuerit, talibus utendū est, & spodio llyrico trito cum ramentis, & ipsis folijs ramētis, & flore argēti solo quam leuissime trito, & aristolochiam rasam ac tritā leuiter, inspergito. Aliud ad cruenta uulnera. Myrrhā, thus, galla, ærugo, flos æris tostus, alumē Aegyptiū tostum, cenanthē, lanarum fordes, plūbago, Horū singulorū æquale pondus diluitur cū uino uelut superius, & reliqua præparatio sit eodē modo. Aliud. Acerū q̄ acerrimum album, mel, alumē Aegyptium, nitrū optimū leuiter tostū, fellis parum, simul coquito. Hoc carnem superexcrecentem consumit, & cauat, & non mordet.

Aliud. Herba est paruis folijs prædita, cui nomē est Parthenium microphyllum. Hæc uerrucas de pudendo auertit: & chalcidē ex insula Melo crudā

& elaterium tenue siccū adstringit. & malicorium tenue siccū eodem modo. Maxime autē replet caua, pura, herba Lagopyrus nomine: est autē tritico similis ubi arefcit, folio paruo uelut olea, sed longiore: & marrubij folium cum oleæ folijs.

Aliud. Caricæ siccissimæ internā partem pinguem, mellis speciē referentē duabus portionibus, cū seminis lini tosti nō admodū, ac triti q̄ tenuissime parte una. Aliud. Caricę partem internā, & florē æris tenuem modicum, & fici succum. Aliud. Caricæ partē internam, chamæleonē nigrū, bubulū fel siccū.

Aliud. Reliqua quidē eadem sint. Verū sicca, nasturtiū tenue crudū, irio, utrūq̄ pari pōdere: caricæ uero partes duæ sint, & seminis lini partes duæ, cum fici succo. Quū autē aliquo horū pharmacorū uteris, splenia aceto imbuta super ne imponito, & spongia super splenia imposita deligato, & paulo magis apprimito. Si uero circūsitæ partes inflāmatæ fuerint, quicquid cōferre uisum fuerit circūponito: Si liquido uti uoles, etiā caricum pharmacū illinito, & uelut supra scriptum est deligato eodē modo. Est autē ex his pharmacū factum, ueratro nigro, sandaracha, squama æris, plumbo usto, cū multo sulphure, auripigmento, cantharide. Ex his prout uisum fuerit cōponito, ac utitor. Diluuntur oleo cedri no. Postquā uero fatis fuerit illitū, pharmacū eijcito, & aron coctum, tritū imponito: aut siccū, tritū, oleo subactum. Et si sicco Carico uti uoles, liquida remouere oportet, & pharmacū inspergere. Facit autē siccum ex ueratro solo cōstans ac sandaracha. Aliud liquidū. Herba est cuius foliū simile est aro natura, uerū album, lanuginosum, ad hederæ folij magnitudinē. Hæc herba cū uino imponitur. Aut ilicis partem eam quæ est circum truncum, cū uino tritam imponito.

Aliud. Vuæ immaturæ succus, acetum acerrimū, flos æris, nitrū, succus caprifici. Ad uuæ immaturæ succū alumen injcito tenuissime tritū, & in uas æris rubri immissum ad solem exponito ac agitato, & ubi ad bonam spissitudinem deuenit tollito. Sicca ad cruenta uulnera hæc faciunt. Veratrū nigrū tenuissime tritū inspergitur, quādiu aliquid humoris inerit ac depascētis. Deligatio uero eadē est quæ in emplastris. Aliud. Salis grana siccissima in æneam ollam, aut fictilem nouā immittito, magnitudine maxime æqualia, non magna: & mel optimū dupla salis mensura, pro cōiectura facta, ad salem affundito, deinde ollam prunis imponito, & dum totū combustū fuerit finito. Postea exterso ac expurgato per spōgiam ulcere inspergito, & uelut prius deligato, & paulo magis cōprimito. Post die uero qua parte nō adhæserit pharmacū inspergito, cōprimito ac deligato. Vbi uero pharmacū discedere uoles, acetū calidū affundito, donec discedat, & rursus eadē facito, si opus fuerit extersione per spongiam facta. Aliud siccū mordax. Misy q̄ leuissime tritū inspergito in ea que humida sunt ac putrida: & florē æris tenuem nō penitus leuiter tritū. Aliud siccū similiter mordax. Vbi spōgia extersisti, lanas q̄ maxime succidas in testa exurito, face admota donec totas cōbufferis. hoc pharmacū leuiter tritū inspergito, & eandem deligationē adhibeto. Aliud siccū ad eadē ulcera. Chamæleo niger, alumē fici succo subactū, subigito autē tostum, & anchusam misceto.

Aliud. Anagallis & alumē Aegyptium tostū. Aliud. Puluillū inspergitum Orchomeniū inspergito. Cæterū ad nomas proserpēdo depascētes, alumē Aegyptiū tostum, itēq̄ Meliū facit. Verū nitro tosto insperso prius præparare ac spōgia extergere oportet. Facit & chalcitis tosta. Torrere autē oportet, donec flammæ

flammæ speciem induat. Ad uetera ulcera in tibijs sientia. sunt autē sanguis nolenta et nigra, meliloti florem tritum, melle subactū, cataplasmatibus modo utere. At uero supra neruos dissectos, myrti syluestris radices contusas ac cribratas, & oleo subactas deligato. Et herbam quinquefoliū: est autē alba & lanuginosa, & altior à terra, quā nigrū quinquefolium: in oleo tritū deligato, & tertia die excoluto. His autem medicamentis in hyeme potius quā æstate utendum est.

Medicamenta mollientia, quæ etiā cicatrices pulchras faciunt. Scillæ internā partem mucosam terito, & resinam de picea, cum recenti adipe suillo, & oleo modico, resinæque ac cerusæ modica. Et adipem anserinū, ac suillum recentem purum, & oleū modicum, & scillam, & ceram albisimā. Aut scillam, oleum album, resinæ parū, ceram, adipem suillum ueterem ac recentem. Facit & oleū, & arugo, & scilla, & resina. Sint autē duæ partes ueteris adipis ad recentem. De reliquis autē quantū oportunitate esse usum fuerit. Adipem recentem liquefactū in aliam ollam defundito, & plūbaginem leuissime tritam ac cribratam cōmisceto ac coquito, & primū agitato. Coquito autē donec destillatū in terram cōgeletur. deinde tollito, ac reliquū diffundito, præter lapidem subfidentem: & resinam injcito ac agitato, & modicū oleum cedrinū, & quod prius diffusum ac ablatū fuit ammisceto. Porro in omnibus mollibus in quibus resinam ammisces, ubi pharmacū ab igne abstuleris, in calidum adhuc resinam immittito ac agitato. Aliud. Adeps suillus uetus & nouus, & cera, & oleum: Sicca uero, loti ramenta, thus, plumbago: thuris uidelicet pars una, plumbaginis una, & ramentorū loti una. Sint autē adipis ueteris partes duæ, ceræ una, & noui adipis una. Aut adipē solum ueterem suillū, & cum ipso adipem caprinum recentē, quā minime cum membrana, sed purgatū, parum terito aut cōrundito, & oleum affundito, & plumbū cum spodio inspergito, & ramentorū loti dimidium. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis cærulea, oleum.

De Ambustis. Illicis radices coquere oportet teneras. Quarum si cortex crassissimus est ac uiridissimus, cōfectum in tenues partes, uino albo affuso, lento igne coquito, donec ad bonam crassitudinē deueniat, ut illini possit. Potest & in aqua coqui eodē modo. Aliud non mordax. Suillum adipem solum ueterē liquefactum illinito. Superne uero scillæ radicem dissectam imponito ac deligato. Postridie uero foueto ac perfundito, & adipem suillum ueterē liquato, & ceram ac oleum ammisceto, thus item, & loti ramenta, ac minū, hoc ubi illeueris, ari folia in uino ac oleo cocta apponito ac deligato. Aliud. Post quā suillo adipe illeueris uetusto, hastulæ regie radices in uino coctas ac tritas superillinito. Aliud. Adipem suillum ueterē liquato, & resinā ac bitumen ammisceto, & hæc linteo illita, ad ignē calefacta, imponito ac deligato. Quum in dorso ex plagis, aut aliās ulcus factum fuerit, scilla cocta, trita, ac linteo illita deligato. Postea uero adipē caprinum, & recentem suillum, & spodiū, & oleum, & thus illinito. Tumores in pedibus sientes, & sponte, & non sua sponte, in quibus neque tumores, neque inflammatio, à cataplasmatibus sedatur: & si quis spogias deliget, aut lanas, aut aliud quid super sanam partem, postea intumescunt sua sponte, ac inflammantur: in fluxio sanguinis per uenas in causa est, si cui non cōtuso causa est. Et si alicubi alia in corporis parte tale quid fiat eadem ratio est. Verum sanguinē detrahare oportet, de uenis præsertim influentibus, si cōspici-

cua fuerint. Sin minus, pertūdere tumores oportet, profundioribus ac frequē-
 tioribus uulnusculis impactis: Sed & in alijs omnibus quae pertūdis, sic facere
 oportet, atq; hoc acutissimis ac tenuissimis ferramētis. Quū uero sanguinē de-
 trahis, specillo ne ualde premas, ut ne contusio accedat. Aceto autē perluo, &
 grumū sanguinis in hiatibus ne relinquito; & illito cruētis uulneribus destina-
 to medicamēto, lanas succidas, carminatas, molles deligato, uino & oleo resper-
 sas. Et pertusam partē æger ita habeat, ut refluxus sit sanguinis, nō defluxus: &
 omnino nō humectet: et parū cibi capiat, & aquā bibat. Si uero ubi solueris, fis-
 suras repereris inflāmatas, cataplasma ex uitice ac lini semine imposito. Si uero
 ulceratae fuerint fissuræ ac eruperint, ad rem respiciēs, & quod opus fuerit adhi-
 bens, de cætero curato. At ubi uarix inest in tibia, aut conspicuus, aut in car-
 ne, & tibia est nigra, & uidetur opus habere sanguine ab ipsa defluēte: talia ne-
 quaquā pertundere oportet. Plerūq; enim magna ulcera ex fissuris fiūt, propter
 uaricis influxū. Verū uaricē ipsum aliās atq; aliās cōpungere oportet, ubi opor-
 tunum esse uisum fuerit. Cæterū quum uenā secueris, postq; sanguinem dī-
 miseris, & fasciam solueris, & nō sistatur, in contrariū, partem habeat, quō refli-
 xus sanguinis fiat, siue manus fuerit, siue crus, utpote sanguine retro fluēte, atq;
 ita tēpūs longius aut breuius decūbens expectet. Postea ipsum sic habentē deli-
 gato, nullo grumo existēte in fissura. Deinde spleniū duplum uino imbutū ap-
 ponito, & super ipsum lanā puram oleo imbutā. Nam etiam si influxus sangui-
 nis fuerit uolentus, suppressio fit influentis. Et si grumo in fissura manente sic
 inflāmetur, suppuratur. Pransum autē & potū plus aut minus uenā secare sinere
 oportet, & aliquantū calefactū: & die calidiore q̄ frigidiore. Si uero influat san-
 guis cucurbitā affigere oportet, & si ablata cucurbita, multū sanguinis, aut fero-
 gis sanguis fluat, cito priusquā repleatur rursus affigere, & quod restat extrahe-
 re. Sin minus, grumi in fissuris inhærēt, & deinde ex ipsis inflāmata ulcera fiūt.
 Aceto autē omnia talia perluere oportet, et postea nō humectare, neq; in fissuras
 decūbere. Verum aliquo medicamēto cruētis uulneribus destinato fissuras illi-
 nere. Et quū infra genu, aut ad genu affigere cucurbitas oportuerit, stanti ere-
 cto, si stare potuerit, affigantur.

HIPPOCRATIS COI LIBER

DE FISTVLIS, IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.



FISTVLAE fiunt quidem ex cōtusionibus et tuberculis, fiunt
 autē & ex remigatione ac equitatione, quū in natibus cōgre-
 gatus fuerit sanguis prope sedem. Putrescens enim, distribu-
 tur ad molles partes, nimirū quum & intestinū rectum sit hu-
 midum, & caro mollis, in quā distribuitur, donec tuberculū
 eruperit, & deorsum ad rectum intestinū cōputruerit. Postq;
 autem hoc factū fuerit, in fistulam abit, ac sanie manat, & ster-
 cus per ipsam fluit, & flatus, & abominatio multa. Ex cōtusionibus itaq; fit fi-
 stula, ubi aliquis circa rectū intestinum locus cōtusus fuerit ex plaga, aut ex ca-
 su, aut uulnere, aut equitatione, aut remigatione, aut quaecūq; talia sunt. Cōgre-
 gatur

gatur enim sanguis. Putrescens aut suppuratur. à suppurato uero ea quæ de tuberculis dicta sunt patitur. Primū igitur quū tale quoddam tuberculum nascēs senserit, crudū q̄ citissime secare oportet, priusquā suppuretur ad rectū intestinum. Si uero iam ægrotantē ex fistula assumpseris, alij caulem rectem accipe, & homine supino reclinato, diductis cruribus altero huc, altero illuc, caule immitte donec offendas ac impingas, & fistulæ profunditatē per caulem metire. & felis radicē tenuissime tritam, aqua affusa ad dies quatuor macerato, eamq̄ aquam trium cyathorū mensura, melle ammixto æger bibat ieiunus. Cum hac etiā ascaridas purgato. Quicūq̄ uero relicti fuerint nō curati, moriūtur. Postea linteum bysinū thymalli magni succo imbutū, flore gr̄is tosto trito inperfo, in penicilli figurā intorque longitudine fistulæ æqualem, filo per summū penicillum trāmissio, & rursus per summū caulem: & homine supino reclinato, adhibito catoptere instrumēto sedem expandente, corosam recti intestini partē inspicito, & sic caulem immittito: & ubi in intestinū incidit, apprehensum retrahito, donec penicillus fuerit intrusus, & superiori ac inferiori parti adæquat. Postquā uero fuerit intrusus, glandem corneā in intestinū indito, & podice ex terra cimolia oblioto finito. Vbi uero uentrē exonerat, eximito, ac rursus indito, donec ad quintū peruenerit diem. Sexta aut eximito, extrahens penicillum ex carne, & alumen terito, eoq̄ glandem expleto, & in intestinū indito ac finito, donec alumen liquidū fiat. Podicem uero myrrha illinito, donec coaluissē uisus fuerit. Alia curatio. Crudum linum tenuissimum accipito, & ad palmi longitudinē quincuplicato, & pilum equinū circumdato. Deinde factio specillo stāneo in summa parte perforato, & initio lini cōplicati in specillum immisso, specillum in fistulam demittito, & simul sinistra manus digitū indicem in sedem indito: ubi uero specillum cōtigerit digitū, inflexa summa specilli parte, initium lini quod est in specillo per digitū adducito: & specillum quidem rursus extrahito, lini uero initia bis aut ter cōnectito, & reliquam lini partem intortam ad nexum deligato. Postea uero dimissum negocia sua obire iubeto. Cæterum quantum putrescente fistula de lino laxatur, tantū augere oportet, ac intortare semper singulis diebus. Si uero linū crudum cōputrescat, priusquā fistula corrodat, aliud linum ad pilum innecte, immitte ac cōnecte. Pilus enim ea de causa ad crudum linum additur, q̄ non putrescit. Postquā uero fistula cōputruerit, spongiam mollem in tenuissima frustra cōcisam apponere oportet. dein de in fistulam quidē, florem æris tostum multū per specillū immittere. Spongiam uero melle illinere, & subiecto digito indice sinistrae manus, ultra protrudere: & apposita alteram spōgiam deligare, eodem modo uelut in hæmorrhoidibus. Post die uero exoluere, & aqua calida abluere, & cū spongia per sinistrae manus digitū fistulā purgare conari: & rursus gr̄is florē immittere, ac spōgiam deligare. Atq̄ hæc facere oportet per dies septenos. In his enim maxime tunica fistulæ cōputrescit. de cætero uero donec sanata fuerit spōgiam deligare. Nam dum per hunc modum fistula à spongia cogitur ac explicatur, neq̄ rursus concidere poterit, neq̄ alia ipsius pars sanabitur, alia uero rursus complebitur, sed in seipsa tota sana erit. Verū in hac curatione multa aqua calida proluere oportet, & fame macerare. Si uero non corrosa fuerit fistula, specillo immisso secato

donec diduxeris, & æris florem inspergito, & ad dies quinque finito. Deinde aquam calidam affundito, et polentam aqua subactâ superimponito, et betarum folia deligato. Vbi uero exciderit æris flos, & fistulæ ulcus purum fuerit, uelut priorem curato. Si uero in loco sit ubi fieri id nõ possit, & profunda etiã sit fistula, flore æris, & myrrha, & nitro in urina dilutis colluito: & in fistulæ osculum plumbeam glandem indito, ut ne coalescat. Collutio uero faciẽda est, pennæ fistula ad uesicam alligata, & fistula intrò immissa, atq; sic collutione infusa. Vesurum sanus non fit, si non secetur. Si intestinũ rectum inflammatũ fuerit, & dolor habeat & febris, & frequẽter ad exonerandũ aluum desideat, & nihil egerat, & præ inflammatione sedes exiisse uideatur, & aliquãdo urinæ stillicidium corripiat: hic morbus fit, quum pituita ex corpore ad intestinum rectum decubuerit. Cõferunt autem calida. Quum enim hæc adhibetũr, pituitam attenuare ac consumere possunt, & simul acrimonia sua falsam pituitam aquosam reddere, ut nõ sit ardor, neq; morsus aliquis in intestino. Curare itaq; oportet hoc modo. Aegrum in calidam aquã collocato, & trita grani cnidij grana sexaginta, in uini hemina, & olei hemina dimidia diluito, tepefacito, & infundito. Hæc & pituitam educunt & stercus. Si uero in aqua non sedet, oua cocta in uino nigro odorato, ad sedem apponito, calido quoque inferne substrato, aut uesica aqua calida plena. Aut lini femen tostum, molitum, tritũ, pari farina, in uino nigro odorato, & oleo ammixta, cataplasmatibus modo calidissime imponito. Aut ordeum & alumen Aegyptium tritum misceto, & glandem oblongam efformato, & ad ignem tepefaciens digitis effingito, deinde summe tepidam effectam in sedem indito. Forinsecus autem cerato oblinito, & allium in uino nigro diluto coctum pro cataplasmate imponito. Postquam uero exemeris, in aquam calidam collocato: & solani succum, & anserinũ ac suillum adipem, & chryfocolam, & resinam, & ceram albam cõmisceto, simulq; liquefacito, & cum his illinito, & quãdiu inflammatio durauerit, allium coctum cataplasma adhibeto. Et si quidem ad hæc à dolore liberetur, satis fit. Sin minus, bibat peplum, meconium album appellatum, aut aliud quoddam quod pituitam purgat. Et quam diu durat inflammatio, eduljjs leuibus nutriatur. Urinæ stillicidium ex his incidit. Vesica ex intestino recto calefscens, caliditate pituitam adducit: à pituita uero urinæ stillicidium fit. Si quidem igitur unã cũ morbo sedetur, solet enim plerunq; ita fieri, satis est. Sin minus, medicamenta ad urinæ stillicidium destinata exhibeto. Si uero sedes elabatur, fomento per mollem spõgiã adhibito, & cochleæ mucò illito, è manibus deligatũ suspẽdito ad modicũ tempus, & redibit. Si uero amplius excidat, & non maneat intus, laterum mollitudines præcingito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittito, & ubi sedem intrò protrusisti, spongiã mollem aqua calida, in qua loti ramenta cocta sunt, imbutam imponito. Sed & de aqua ipsa ad sedem affundito, spongiã uero exprimito, deinde fasciam per media crura subextentam, circa umbilicum deligato. Vbi uero aluum exonerare uolet, inter tabulas angustissimas insidens id faciat. Si uero puer fuerit, intra mulieris pedes ad genua acclinatus. Dum autem uentrẽ exonerat, crura extendat. Sic enim minime sedes exciderit. At si intestinum rectum humidũ fiat, & sanies defluat, fece uini uista & aqua ex myrti decocto abluo

luito, et adiantū siccū, tusum, cribratū inspergito. Si uero sanguis profluat, ablutione ex ipsē facta chalcidē, & cupresī, aut cedri, aut pini, aut terebinti ramēta, inspergito, pari mēsurā de his ad chalcidē ammixta. Forinsecus autem ceratum crassum oblinito. Quū sedes siue rectum intestinū exciderit, & in loco suo manere noluerit, silphium optimum ac densissimū derafum tenue inspergito: & sternutatoriū medicamentū ad nares apponito, & hominem ad iram exacerbaro. Aut ubi aqua calida abluisti, malicorium, & alumē, in uino albo trita, ad sedem affundito, deinde panniculos apponito, & femora per dies tres colligato, & ieiunet. Vinū autē bibat dulce. Si uero neq; sic retro cedat, miniū mixtū cum melle illinat. Intestinū rectum si procidat, & sanguis profluat, de aridice detractum corticem in aqua coquito, deinde tritū farina ammixta calidum imponito. Aliud. Vitis syluestris, quā aliqui psilothrion uocant, radices terrimas derasas in uino nigro meraco austero coquito, deinde tritas tepide imponito. Sed & farinā ammixceto, & in uino albo ac oleo subigito, & tepide imponito. Aliud. Cicutā semē uino albo odorato infillato terito, deinde tepide imponito. Si uero inflammatū fuerit, hederæ radicē in aqua coctā, leuiter trita, ammixta farina optima, in uino albo subactā imponito, & oleū ad hęc ammixceto. Aliud. Mandragoræ radicē maxime uiridē, sin minus, siccā: uiridē itaq; lotā ac cōcisam, in uino diluto coquito, ac imponito: siccā uero tritā similiter imponito. Aliud. Cucumeris peponis internam partem leuiter tritam imponito. Si uero dolor fiat, & inflammatū nō sit, nitrum rubrum assato, ac leuiter terito, & alumē ac salem torreto ac leuiter terito, et pari mēsurā singula misceto, deinde ad picem optimam ammixceto, & linteo illita apponito ac deligato. Aliud. Capparis folia uiridia trita, in marsupii cōiecta adalligato: & ubi urere uideberis aufero, ac rursus apponito. Si uero folia non affuerint, corticē radicis capparis cōrusum, uino nigro subactū, eodē modo alligato. Hoc etiam ad splenis dolorē bonum est. Ex his cataplasmatibus quæ quidē frige faciūt, fluere prohibent: quæ uero molliunt ac calefaciūt, diffundunt: quæ in sese trahunt, siccant & attenuant. Porro hic morbus fit, quū bilis & pituita ad hos locos decubuerit. At recto intestino inflāmato medicamēto in quod resina, & oleū, & cera, & plūbago, & adeps calidissimus cōmiscentur, illinere oportet.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE HAEMORRHOIDIBVS, IANOCOR
nario Medico Physico interprete.



HAEMORRHOIDVM morbus hoc modo fit. Quū bilis aut pituita ad uenas recti intestini decubuerit, sanguinē qui in uenis est calefacit. Calefactes autē uenę ex uicinis uenulis sanguinē attrahunt: et ubi replētur, interna sedis pars intumescit, & capita uenarū supereminēt: & partim dū à stercore exeunte cōprimūtur, partim dū à coaceruato sanguine coguntur, sanguinē eiaciuntur: atq; hoc maxime quidē unā cū stercore, aliquādo uero etiam sine stercore. Curare autē oportet hoc modo. Primū equidē nosse

oportet in quo loco sint hæmorrhoides. Rectum enim intestinum & secans, & refecans, & confuens, & urens, & putrefaciens, etiam si grauissima hæc esse uideantur, nihil læseris. lubeo autē præparari ferramenta septē aut octo, magnitudine palmi, crassitudine specilli crassi, ex summa parte reflexa ac lata, uelut in obolo paruo. Et ubi priore die purgatorio medicamēto purgasti, ea qua rem aggrederis urito, & homine supino reclinato, & puluinari sub lumbos subiecto, sedem quæ maxime per digitos foras extrahito: ferramentaque candentia facito, ac urito, donec reficaueris, & hoc ita ut ne contingas. Vrere enim oportet, & nullam hæmorrhoidem sine ustione sinere, sed omnes exurere. Cognosces autē hæmorrhoidas non difficulter. Supereminet enim in internā recti intestini partē, uelut uuæ acini, liuidæ, & simul ut sedes extrahitur, sanguinē eiaculantur. Detineant autē aliqui ipsius caput & manus, dum uritur, ut ne moueatur: & dum uritur uociferetur, sedes enim magis inde eminet. Postquam uero ufferis, lentes ac eruum coquito, & ex aqua trita imponito, ad quinque aut sex dies. Septima uero die spongiam mollem in tenuissima frustra cōcidito. Si autem latitudo spongiæ undiquaque sex digitorū, deinde super spongiam lintēū tenue, ac leue, spongiam æquale, melle illitū imponito, & postea subiecto digito indice sinistrae manus, mediā spongiam in sedem quæ penitissime protrudito, deinde supra spongiam lanam apponito, quo in sede quieta permaneat. Et laterū mollitudines præcingito, & retrorsum fasciā ex cingulo submittito, quā per media crura receptam, ad cingulum circa umbilicū deligato. At pharmacū de quo dixi, ad densam acrobultam carnē faciendam ac producendā deligatur, & non minus quæ uiginti diebus hæc deligare oportet. Sorbenda autē est semel in die farina, aut miliū, aut furfurum decoctū: & aqua bibēda. Si uero ad aluū exonerandā desideat, aqua calida proluito, & tertio quoque die lauet. *Alia curatio.* Extractā quæ maxime sedem, aqua calida perfundito, deinde summas hæmorrhoidū partes præsecato. Pharmacū autem ad sectionē præparatum sit hoc. In erēū uas mingito, & in urinā, aris florē tostum, tritū, leuem inspergito, deinde diluito, ac uas agitato, & in sole siccato. Vbi uero siccātū fuerit, eradito, terito, & leuigātū ad anū apponito, & splenia oleo imbuta addito, ac spongiam supra deligato. *Alius modus.*

Adnascitur ad uenā sanguifluam extuberantē, uelut mori fructus, & si quis dem ualde extra fuerit extuberantia, carnis tectoriū circum ipsam nascitur. Hos minem igitur flexis genibus in duo mortaria siue excisos lapides locato, ac uisudo. Cōperies enim inflatas partes inter nates circa sedem, sanguinē uero intrinsecus procedere. Si itaque mollis sit, & sub tectorio cedat extuberantia, digito ipsam auferre oportet. Nihil enim plus difficultatis hæc res habet, quam si quis dū ouicula excoriatur, digitū inter cutem ac carnem adigat. Atque hæc interim dum loqueris, ægro non animaduertēte facito. Postquā autem extuberantiam abstuleris, necesse est sanguinis cursus ex tota detractiōe promanare. Itaque uino austero in quo gallæ maceratæ sunt, cito abluere oportet: & uena sanguiflua unā cum extuberantia peribit, & tectorium sedabitur, & quanto uetustior affectio fuerit, tanto facilius sanatio erit. Si uero penitius intus delituerit extuberantia, per catoptere inspicio, & ne à catoptere decipiaris uidero. Dum enim aperitur, extuberantiam explanat: dum uero rursus cōtrahitur, recte ostendit

ostendit. Auferre autē oportet, ueratro nigro in anum sublito. deinde tertia die auferre, ac uino aufero infuso colluere. Cæterum quod sanguis non fluit, quum abstuleris extuberantiā, mirari nō oportet. Neq̄ enim si in articulis diste feces manus aut crura, sanguis profluet. Si uero supra aut infra articulos secueris, cauas ac sanguifluas uenas comperies: & difficile fuerit ut expedite sistas. Sic etiam hæmorrhoidem in sede, si supra aut infra extuberantiæ detractionem feces, sanguis profluet. Si uero ipsam extuberantiā in connexu abstuleris, nō profluet. Si quidem igitur ita sedatur, bene habet: Sin minus, urito, cauendo ut ne contingas ferro, sed prope admotis ferramentis resiccato, & florem aeris ex urina apponito. Alius modus curationis hæmorrhoidum. Clysterem facere oportet, uelut arundinem sepiariā, phragmiten appellatam, & in ipsum ferramentum probe congruū adaptare. Deinde indita in sedem clysteris fistula, ferramentum candens immittere, ac frequenter eximere, quo magis calefieri sustineat, & neq̄ ulcus ex calore habeat, & uenæ resiccatae sanæ fiant. At uero si neq̄ urere, neq̄ resicare uoles, ubi multa calida aqua proluisi, & sedē euerfam extraxisti, myrrham tritam, leuigatam, & gallam, & alumē Aegyptium ustum, una & dimidia ad reliqua parte, & melanteriæ tantundem accipe, atq̄ siccis his urere. Hæmorrhoids enim ab his medicamentis decedet, uelut corium combustum. Hac facio donec omnes exstirpaueris. Et dimidia chalcitidis ustræ pars idem efficit. Si uero glandulis sanare uoles, sepiæ testam, plumbaginis tertiam partem, bitumen, alumen, florē eris modicum, gallam, æruginē modicam, commisceto & mei coctū affundito, & formatam ex his glandē oblongiorem apponito, donec exstirpaueris. Muliebrē hæmorrhoidē hoc modo curato. Multa calida aqua proluito. In aqua uero odorata, uelut est myrica trita coquito. Deinde spumam argenti tostam, & gallam misceto, & uinum album, & oleū, & anseris adipem affundito, omniaq̄ simul trita, post factam proolutionem illinenda dato. Proluere uero oportet sedē quāmaxime extractā.

HIPPOCRATIS COILIBER

DE VISV, IANO CORNARIO ME

dico Phisico interprete.



Cæli corrupti sponte quidem cærulei sientes, derepente tales fiunt. & ubi facta fuerint, nō est talium sanatio. Qui uero maris speciem referunt, paulatim per multum tempus procedendo corruptuntur. & saepe alter oculus in multo tempore postea corruptus est. Huius caput purgare oportet, & uenas urere. Et si quis ab initio curatus fuerit hoc modo, malū sedatur, & in deterius nō procedit. At qui colorē inter cæruleum ac marinum mediū referunt, si quidē puero tales fiant, ubi senior sit, sedantur. Si uero seniori septimum annum egresso fiant, melius uidet magna ualde & splendida: & uidet quidem procul, sed nō clare: & si quid ualde ad oculū ad mouerit, etiam hoc uidet, aliud autem nihil. Confert autem huic capitis purgatio, & capitis uestio. Sanguinem uero his detrahare nō conducit, neq̄ cæruleo, neq̄ maris speciem referenti. Et uisum oculorū, oculo sano existente, in iunioribus hominibus

hominibus, tum foemellis, tum masculis, quicquā faciendo nihil iuueris, quam diu adhuc augetur corpus. Quū autē non amplius augetur, ipsius oculi palpebras intuitus radendo attenuato, & si opus esse uisum fuerit, etiam ferramentis nō admodum candentibus intrinsecus inurito. Quū uero palpebras oculi raseris, lana mellea, crispa, pura, circū fufum obuoluta, radito, ipsam oculi coronam uitando, ut ne ad chartilaginē usq; peruras. Signum autē sufficientis rasuræ est, si non amplius splendidus sanguis exit, sed sanies cruenta aut aquosa. Tunc uero liquido aliquo medicamēto, in quo flos æris est, defricare oportet. Postea autem ubi & rasionis, & uisionis crustæ exciderint, & ulcera purgata fuerint ac germinauerint, fissuram per sinciput secare oportet, & quū sanguis defluerit, medicamēto cruentis uulneribus idoneo illinere. Deinde uero & huius, & omnium caput purgare operæ precium est. Palpebræ si crassiores q̄ pro natura fuerint, ex inferna parte carne quantum potes q̄ expeditissime resecta, postea palpebram inurito, non candentibus ferramentis, uitando naturam pilorum: aut flore æris tosto tenui adstringito. Quum autē crusta exciderit, uelut reliqua curato. Quum palpebræ scabie laborant, & pruritus habet, floris æris glebulam ad cotem terito, & ex ipso palpebrā defricato. Et tunc squamam æris q̄ tenuissime terito, deinde uuæ immaturæ succū excolatum affundito, ac leuiter simul terito, & postea reliquū succum in uase æris rubri affundens, paulatim terito, donec crassitudo fiat uelut allij intritum, & ubi resiccātū fuerit medicamentum, leuiter trito utere. Nyctalops medicamentū bibat deorsum purgans, & caput purgetur, & ceruicem eius q̄ maxime scarificato, & fame ad multum tempus premito. Vbi uero remiserit, unū aut duo frustra, prout maxima deuorare potest, de hepate bubulo crudo in melle tincto exhibeto. Si cui oculi dum sani sunt uisum corrūpant, huic sectione & insuper excoriatione, in sinciput facta, os excindere, & aquam auferre oportet, sicq; curare: & ita sani fiunt. Ad lippitudinē annuam ac popularem conducit purgatio capitis, & uentris inferni. Et si corpus habeat, sanguinis detractio ad quosdam eiusmodi dolores confert. Cōferunt & cucurbitæ circa uenas affixæ. Cibus modicus panis, & aquæ porus. Decumbat autē æger in tenebris, procul à fumo, & igne, & alijs splendidis, atq; hoc in obliquū, modo in dextrā, modo in sinistram partem. Caput uero ne humectet, neq; enim conducit. Cataplasma si dolor nō adest, uerum uelut ad fluxionem cohibendam, non confert, quum tumores sint doloris exortes. Verum post acria medicamenta, quæ ad dolorem illinūtur, postq; dolor sedatus fuerit ac separatus, post medicamenti illitionem, tūc cataplasmata imponere conducit, si quod cōmodum fore uisum fuerit. Nec uero ad multum tempus contente intueri confert. Lachryma enim prouocatur, quum nō possit oculus ad splendida officio suo fungi. Sed neq; ad multū tempus claudere oculos conducit, maxime si fluxionem calidam habeat. Lachryma enim superpressa, calefacit. Si uero fluxio non sit, cū puluillo sicco sublitionem facere conducit.

HIPPOCRATIS COI EPI

STOLAE, IANO CORNARIO ME

dico Physico interprete.

Rex regum magnus Artaxerxes, Pæto gaudium.

MORBVS pestilens appellatus, inuasit exercitus nostros: & quum nos sæpe multa fecerimus, nihil adhuc remisit. Quare magnopere, & per omnia tibi à me data dona, te rogo, ut aut aliquid ex natura tua excogitatum, aut aliquam ex arte actio nem, aut aliquid alterius uiri mederi potentis consiliū, celeratime ad nos mittas. Propulsa oro hoc malū. Multa enim anxietas populum corripuit, quæ spiritū magnum ac densum habet. Non belligerantes debellamur: quū hostem habeamus bestia illam ouilia deuasstantem. Sauciauit multos: ægre curabiles fecit: amara spicula immittit. Consilij inops sum. Nō amplius habeo quod cū uiris natura prudentibus consulem. Solue hæc omnia, neq; nos bono tuo consilio destituas. Vale.

Pætus, Regi regum magno Artaxerxa gaudium.

Naturalia auxilia pestilentis morbi popularem grassationem nō soluunt. Qui enim ex natura sunt morbi: eos ipsa natura iudicās sanat. Qui uero ex populari grassatione: eos ars curat, artificiose iudicans corporū mutationē. Hippocrates autem medicus curat hoc malum. Et genere quidem est Doriensis: ex ciuitate uero Co, patre Heraclida, qui filius fuit Hippocratis, qui Gnosidici, qui Nebri, qui Sostrati, qui Theodori, qui Cleomittadæ, qui Chrisamidis. Hic diuina natura præditus est, & ex paruis ac uulgaribus, ad magna ac artificiosa, medicinā euexit. Est igitur diuinus Hippocrates nonus quidem à Crisamide rege: decimus autē et octauus ab Aesculapio: uigefimus uero à loue: ex matre uero Praxitheæ Phænaretis filia, ex familia Heraclidarum. Quare ex utroq; semine à dijs ortū habet diuinus Hippocrates: ut qui à patre quidem Asclepiades est, à matre uero Heraclides. Didicit autē artem, tum à patre Heraclida, tum ab auo Hippocrate. Verū ab his quidem primum, uelut ueris simile est, in re medica initiatus est, quantū sanè credibile est hos nouisse. Vniuersam uero artem ipse seipsum docuit, diuina natura usus, & in tantū animi industria progenitores transgressus, quantū etiam artis præstantia eosdē superauit. Tollit autē non bestiarum genus, sed ferorum ac agrestium morborum, per magnā terræ ac maris partem Aesculapij auxilia, quemadmodū Triptolemus Cereris semina dispersgens. Proinde iustissime in multis terræ locis diuinos honores etiā ipse consecutus est, & ipsdē donarijs cū Hercule & Aesculapio ab Atheniensibus dignus factus est. Hic ipsum accersit, & auri atq; argenti quantū uoluerit, ipsi dare iube. Hic enim non unū modū curationis huius morbi nouit. Hic est sanitatis pater: hic seruator: hic dolorū curator. In summa, hic diuinæ sciētiæ princeps est. Vale. hor de herphi li. 7. c. 37.

Rex regum magnus Artaxerxes, Hyllanidi Hellefponi prefecto.

Hippocratis medici Coi ab Aesculapio originem ducētis, gloria artis etiam ad me peruenit. Dato igitur ipsi auri quantum uoluerit, & reliqua abudē, quibus

quibus opus habet, & ipsum ad nos mittito. Nam optimatibus Persarum æqualis erit. Et si quis alius bonus uir est in Europa, eum domus regiæ amicum facito, nihil diuitijs parcens. Viros enim inuenire, qui consilio præstent, non est facile. Vale.

Hyslanis Hellepontis præfectus, Hippocrati ex Asclepiadis prognato gaudium.

Magnus rex Artaxerxes te opus habet, & misit ad nos præfectos, iubens tibi argentum & aurum, & reliqua quibus opus habes, & quæcuncq; uoles, dare, & breui ad se mittere. Fore enim te optimatibus Persarum æqualem. Tu itaq; cito adsis. Vale.

Hippocrates medicus, Hyslanidi Hellepontis præfecto gaudium.

Adepistolam quam misisti, à Rege uenisse adserens, remitte Regi quæ dico, cæq; celerrime scribens: Quod & uictu, & uestitu, & domo, & omni ad uitam sufficienti opulentia fruimur. Persarum aut diuitijs uti, fas mihi non est: neq; barbaros homines à morbis liberare, qui hostes sunt Græcorum. Vale.

Hippocrates Demetrio sanitatem.

Persarum rex nos accersiuit, ignarus quod apud me maior est sapientiæ ratio, quàm auri. Vale.

Regiregum meo magno domino Artaxerxæ, Hyslanis Hellepontis præfectus gaudium.

Quam misisti epistolam, iubens demittere ad Hippocratem Coum ab Aesculapio originem ducentem, demisi. Sed & ab ipso responsum tuli, quod scriptum tradidit, & ad domum tuam transmittere iussit. Itaq; eius latorem ac nunciium Gymnasben Dieurychen ad te misi. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes Cois hæc dicit.

Date meis nuncijs Hippocratem Medicum malignis moribus præditum, & in me, & in Persas petulanter se gerentem. Sin minus, cognoscetis, etiam primi peccati poenam uos daturos esse. Urbem enim uestram deuasatam, & insulam distractam, in pelagus conuertam, ut in posterum tempus nemo sciat, an in hoc loco fuerit insula, aut urbs Cos.

Coorum responsum.

Visum est populo, respondere nuncijs ab Artaxerxe missis. Coi nihil indignum facient, neq; Merope, neq; Hercule, neq; Aesculapio. Quapropter omnes ciues non dabunt Hippocratem, etiam si pessima morte sint interituri. Nam quum Darius & Xerxes epistolas scripserint, & terram ac aquam à patribus nostris petiuerint, populus non dedit: quum eos ipsos se impetentes, similiter uelut alios homines, mortales esse uideret. Et nunc idem responsum dat. A Cois discedite: quoniam Hippocratem in manus uestras non dant. Renunciare igitur ipsi uos nuncijs, quod neq; Dei ipsi, nostri negligentes erunt.

Senatus populusq; Abderitarum Hippocrati gaudium.

Nunc maxime urbi nostrae in periculo uersatur uir noster, o Hippocrates, qui & presenti tempore & futuro semper gloria urbi sperabatur. Neque nunc, o uos Dei omnes, nobis inuideatur, hic praemulta quae detinet ipsum sapientia aegrotat, ut timor non uulgaris sit, si Democritus mente motus fuerit, reuera urbem nostram Abderitarum pestum iterum esse. Etenim oblitus omnium, & primum suspensus, uigilans & noctu & interdiu, & singula parua ac magna deridens, & totam uitam nihil esse putans, uitam transigit. Ducit aliquis uxorem, alius mercaturam exercet, alius concionatur, alius imperat, alius legatum agit, eligitur, abrogatur, aegrotat, uulneratur, moritur. At hic ridet omnia, dum alios moestos ac tristes, alios gaudetes uidet. Quin et de his, quae apud inferos sunt, hic uir perscrutatur, & haec scribit. Et idolis aerem plenum esse dicit. Et uolucrum uoces intentis auribus explorat. Et saepe noctu exurgens, solus cantilenas sensim canenti simillis est. Et se aliquando in rerum immanentiam proficisci dicit, & Democritos esse similes sibi ipsi innumerabiles. Et corpus unam cum mente corruptens uiuit. haec tamen memos o Hippocrates, ob haec perturbati sumus. Quapropter nos serua, & patriam nostram conculturus cito adsis: neque nos contempseris. Nam neque ita uiles sumus: & in nobis testimonium situm est. Ob ipsum enim conseruatum, & gloriam, & pecunias, & doctrinae famam consequeris: quamquam doctrinae ratio multo potior apud te est, quam fortuna. At tamen & huius bona multa ac luculenta tibi a nobis obuenient. Etenim animae Democriti gratia, etiam si urbs aurum esset, non nostrae uoluntati responderet, aut quacumque tandem re illi carendum esset. Leges nostras putamus aegrotare o Hippocrates, leges praeruaricari. Adsis optime uir, curaturus uirum insignem. Non medicus, sed conditor, sacratione tota Ionia murum nobis circumdabis. Ciuitatem, non uirum curabis: & Senatum aegrotantem, & ne claudatur periclitantem, aperies. Ipse legislator, ipse iudex, ipse princeps, ipse feruuator, & horum artifex aduenies. Ob haec te expectamus o Hippocrates, atque haec etiam fiet ubi ueneris. Vna ciuitas non ignobilis, imo tota Graecia rogat te, serua corpus sapientiae. Quin potius ipsam apud te legationem agere puta doctrinam, ab hac praeruaricatione liberari supplicante. Cognata equidem res est omnibus, uelut apparet, sapientia. Verum his qui propius ipsam complexi sunt, uelut nobis, etiam longe amplius. Et, sicut probe nosti, gratificaberis etiam futuro saeculo, si non destitueris Democritum propter ueritatem, cuius primas se latitum esse sperat. Tu enim & genere, & arte coniunctus es Aesculapio. Hic uero Hercules est ex fratre nepos. A quo est & Abderus, quem admodum omnino audiisti, cuius cognomen urbs nostra refert. Quare etiam illi grata fuerit Democriti sanatio. Quum igitur uideas o Hippocrates, & populum, & uirum insignem, ad stupiditatem diffluentem: festina, rogamus, ad nos. Heu ut etiam bona redundantia morbi existunt. Quantum enim Democritus ad summam sapientiam generose peruenit, tantum nunc pariter periclitatur, ne mentis stupore & stoliditate affligatur. At reliquum uulgius Abderitarum, quod manet absque eruditione, communem sane sensum habet. Immo nunc prudentiores sunt ad sapientis morbum iudicandum, qui prius desperauerunt. Adsis igitur cum Aesculapio patre, Adsis cum Hercules filia Epione, Adsis cum Aesculapii filijs, qui ad Ilium militarunt. Adsis nunc Paoniae adferens morbi

medelas. Nūc terra radicibus, & herbis, & auxiliariis floribus, infaniaeque medicamentis foecunda est. Ferme igitur nunquam fertilius producent, neque terra, neque montium cacumina, quam nunc proferunt ea, quae pertinent ad Democriti sanitatem. Vale.

Hippocrates Senatui populoque Abderitarum gaudium.

Cuius uester Ameleffagoras uenit in Co, & erat tunc in illa die Virgae assumptionis, & annua festiuitas, ac publicus, uelut noctis, conuentus, & pompa sumptuosa fiebat, quam mos est eos, qui deo dicati sunt, ad Cyparissum deducere. Quandoquidem autem & ex uerbis, & ex aspectu, Ameleffagoras festinare uidebatur, credens, uelut erat, rem ipsam urgere: epistolam uestram legi, & admiratus sum quod ob unum hominem, uelut si unus homo esset ipsa ciuitas, turbati estis. Et beati profecto sunt populi, qui sciunt bonos uiros sua esse munimenta, & non turrets, neque muros, sed sapientium uiuorum sapientia consilia. Ego uero, qui credo artes quidem esse Deorum dona, homines autem naturae opera: (& ne aegre feratis uiri Abderitae) non uos puto, sed ipsam naturam me uocare, ad conseruandum ipsius opus, quod periclitatur, ne praemorbocollabatur. Quare praeuobis ego nunc, naturae ac Dijs obediens, festino aegrotantem Democritum sanare: si quidem sanus & hoc morbus est, & non potius error uobis tenebras offundit: id quod opto, atque utinam sit hoc uberius uestrae beneuolentiae signum, quod etiam ad suspicionem turbamini. Argentum autem mihi uenienti, neque natura, neque Deus promittere poterit. Quare neque uos uiri Abderitae cogatis: sed liberae artis etiam opera libera esse sinatis. Qui uero mercedem capiunt, hi scientias seruire cogunt, uelut captiuas facientes ipsas ex prior libertate. Deinde, uelut uerisimile est, metiri etiam poterint, uelut de magno morbo: & negarint, uelut de paruo: & pollicitum non uenerint, & rursus uenerint non uocati. Misera est profecto humana uita: quoniam per totam ipsam intolerabilis auaricia, uelut hybernus uentus, distributa est ac penetrauit. Ad quam utinam potius omnes medici conuenissent, quod grauiorem infania morbum curarent: quoniam quum morbus sit, & affligat, etiam laudatur. Ego uero arbitror etiam animae morbos omnes uehementes esse infanias, quae opiniones quaedam ac imaginationes rationi inducunt. A quibus qui per uirtutem depurgatus est, sanus euadit. Quod si ego omnino ditescere uoluisssem, uiri Abderitae, non utique decem talentorum gratia ad uos proficiscerer: sed ad Magnum accessissem Persarum regem, ubi totae ciuitates humanis opibus refertae mihi obtigissent. sanassem autem illic ipsorum pestem. Verum denegaui, inimicam Graeciae regionem a malo morbo me uelle liberare. Et ego, quantum in me fuisset, Barbaros expugnassem. Habuissem autem ignominiam ipsas a rege diuitias, & opulentiam patriae inimicam. Haec uero mihi adfuissent, uelut ei qui urbium Graeciae deuastator esset. Non sunt diuitiae, undiquaque lucrari. Magna enim sunt sacra uirtutis, quae a iusticia non occultantur, sed manifesta existunt. Aut non aequale peccatum esse putatis, hostes seruare, & amicos mercede sanare: At non hoc modo serues nostrae habent, o Abderitae. Non capio fructum ex morbis, neque liberer audiui Democritum mente motum esse. Qui siue sanus est, amicus est: siue aegrotat, curatus magis amicus erit. Audio autem ipsum grauibus ac solidis moribus praeditum esse, & urbis uestrae ornamentum. Valet.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

Legati, qui urbis epistolam mihi reddiderunt, etiam tuâ tradiderunt. Et ualde gauisus sum, & hospitium, & reliquum uictum te promittente. Veniemus autem bona fortuna, & meliore spe, uelut arbitramur, accedemus, prout in literis est declaratum: quum non insaniam, sed quandam excellentem mentis sanitatē uir ille declarat, dum neque liberorum, neque uxoris, neque cognatorum, neque rei familiaris, neque omnino alicuius curam gerit: sed & diu & noctu apud seipsum consistit, & priuatim uitam degit, plerumque in antris & solitudinibus, aut sub arborum umbris, aut in mollibus herbis, aut apud frequentia aquarum fluenta. Cōtingunt igitur talia plerumque atrabile percitis. Taciturni enim aliquando sunt, & solitarij, ac deserti amantes, & rerum familiarium cōspectum auersantur, alienum putantes. Nec uero dissimile uero est, etiam his qui circa disciplinas uersantur, ab una erga sapientiā adfectione, alias curas exclusas esse. Quemadmodum enim famuli ancillae in domibus tumultuantes, & seditionē agentes, ubi derepente ipsis hera comparuit, consternati cōquiescunt: sic etiam reliquae in anima cupiditates maiorum sunt hominibus ministræ. Postquam autem sapientiæ cōspectus seipsum ingesserit: reliquae affectiones uelut famulae discedunt. Non autem omnino insaniant in antra & quietem expetunt: sed etiā hi qui humana negocia contemnunt, ob tranquillitatis cupiditatē. Cum enim mens ab externis curis uexata, corpus reficere uoluerit, tunc cito ipsum quieti tradit. Deinde recta exurgens, circūcirca ueritatis regionē collustrat, in qua non est pater, non mater, non uxor, non liberi, non frater, non cognati, non famuli, non fortuna, non omnino quicquam ex his, quae tumultum inducunt. Omnia autem perturbantia, exclusa stant praeter timorem: & neque appropinquare audent praeter uerentiam eorum, quae isthuc habitant. Habitant autem illam regionē, & artes, & uirtutes omnis generis, & Dei, & daemones, & senatus, & consilia. Et magnus polus in illa regione, stellis multum mobilibus coronatus est: in quam fortassis etiam Democritus praeter sapientiā transmissus grauius. Deinde quum non uideat amplius eos, qui sunt in urbe, utpote procul profectus: insaniam morbo laborare putatur, propter solitudinis amorem. Student autem Abderitae argenti amorem & studium detegere, & in se manifestum facere, eo quod Democritum non intelligunt. At tu hospitium nobis à amico Philopœmeni praepara. Non enim uolo perturbatae urbi molestiam exhibere, quum uerterem te proprium hospitem, uelut nostri, habeam. Vale.

Hippocrates Dionysio gaudium.

Aut in Halicarnasso me expecta, aut ipse ad me uenire à amico festina. Per summam enim necessitatem abeundum est mihi in Abderam, Democriti causa, ad quem aegrotantē urbs me accessiuit. Caeterum admiranda est hominum, à Dionysio, per consensum adfectionio: uelut una anima cum ciue coaegrotant. Quare mihi uidentur etiā ipsi curatione opus habere. Ego uero neque morbum ipsum esse puto, sed immodicam doctrinam: quae uerua non est immodica, sed ab insipientibus putatur. Nam nunquam nocua est uirtus immodica. Excellentia uero, morbi opinio de se praebet, propter iudicantium imperitiam. Vnusquisque enim ex his, quae ipse non habet, iudicat id, quod in alio abundat, superfluum esse. Sicianē

etiam timidus fortitudinē immodestiā putat, & avarus magnanimitatē. Et omnis defectus, uirtutis moderationē excedere putatur. Illū igitur ubi uiderimus, cū prænotione hinc cōtingente, & ubi sermones eius audiuerimus; melius cognoscemus. Tu uero, ò Dionysi, studio habe ut ipse accedas. Volo enim te in patria mea cōmorari donec rediero: quo & rerū nostrarum, & imprimis urbis nostræ curam geras. Nam haud scio quomodo ex casu cōtingit, ut saluber sit animus, & pristinam naturā habeat. Quare neq; multi infestabunt morbi: attamen uenito. Inhabitabis autē meam domum nimis q̄p̄ opportunam, nimirū quum & uxor apud parentes maneat propter meam profectiōnē. Attamen & illius res inspecta, quo pudice degat, & nō ob uiri absentia, alios uiros approbet. Honeſta equidem ab initio fuit, & parentes bonos habuit. Patrem autē mirifice uirilē, & malos ualde odio habentē, egregie senem. Attamen semper opus habet mulier moderatore. Habet enim à natura in se lasciuiā: quæ, nisi quotidie refecetur, uelut arbores in materiæ multæ effusionem, exuberat. Ego uero amicum parentibus diligentiorē puto ad uxore custodiendam. Non enim, uelut illis, etiam huic cohabitāt beneuolentiæ adfectio, per quā sæpe umbra admonitioni obtenditur. In omnibus autem rebus prudentior est alienitas ab adfectione, ut quæ minime à beneuolentiā infringatur. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

CVm apud te Rhodi essem Damagete, uidi nauē illam, cui Solis inscriptio erat, penitus pulchrā, et in puppi probe instructam, et sufficientē carinam habentē. Habebat & transtra multa. Et tu laudabas etiā in ipsa nauigandi præstantiam, quòd uelox esset, & tuta, & ad inseruiendū artificiosa. Et insuper prædicabas probū in ipsa nauigationis cursum. Hæc mitte nobis: uerum, si fieri potest, nō remis, sed alis ad remigium instructam. Vrget enim res ipsa, ò amice, ut ualde cito in Abderam nauigem. Volo enim ægrotantē curare urbem, propter unū ægrotantē Democritū, si unquā uiri fama ad aures tuas peruenit. De hoc patria dicit, q̄p̄ infania adfectus sit. Ego autē cupio, immo magis opto, nō reuera ipsum insanire, sed illos ita putare. Ridet, inquit, semper, & ridere non cessat in omnib. negocijs. Et hoc ipsis infantiæ signū esse uidetur. Quare tuis in Rhodo amicis dicito, ut semper moderate se gerant, & nō multū rideant, neq; multum tristes sint: sed inter ambo hæc modū teneant: ut alijs comis esse uidearis, alijs sollicitus, de uirtute cogitans. Est profecto mali quiddam, dum ad singula ille ridet. Si enim immodestia malū est: ea sanè perpetua longe peior est. Et dicā sanè ad ipsum: Democrite, & si quis ægrotat, & occiditur, & mortuus est, & obſidetur, & quoduis malū ingruit: singula quæ fiūt, materiam risus tibi præbent. Non autē repugnas deo, si, quū duo sint in mūdo, Gaudiū & Tristitia, tu alterū ipſorū eiecisti? Beatus profecto fueris, (uerū impossibile est) si neq; mater tibi ægrotat, neq; pater, neq; postea liberi, aut uxor, aut amicus: sed propter tuū risum cōferuantur, penitus felix es. At si, dum ægrotāt, rides: dum moriūtur, gaudes: & si quid mali audieris, exhilararis: pessimus es ò Democrite, & procul sanè à sapientia. Si uero putas hæc ipsa neq; mala esse, certe atra bile percitus es Democrite, periclitans ne & ipse Abderita sis: prudentior autem sit ipsa ciuitas. Cæterum de his exactius illic dicemus Damagete. At uero nauis etiam hoc tempus, quo hæc tibi scribo, remoratur. Vale.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

Cogitās ac sollicitus de Democrito, illa ipsa nocte dormiens, sub ipsius auroræ initium, somniū mihi oblatū habui, ex quo puto nihil ualde periculosi fore. Mirabiliter enim expergefactus sum. Videbar mihi uidere Aesculapium ipsum coram, & iam ad ipsas Abderitarū portas aderamus. Aesculapius aut non ut imagines eū aliās ostendunt, mitis ac blandus apparebat: sed habitu concitato, & aspectu horrendo. Sequebantur autē ipsum dracones reptiliū generis immanes, longum tractum ducentes, & horribile quiddam uelut in desertis ac salubus subsibilantes. Sequebātur & focij, pyxides medicamētarias prope obsegnatas gestantes. Deinde porrexit mihi manū deus: quā ubi libētissime apprehēdissem, rogabam ut simul mecū pergeret, & ne me in medēdo destitue ret. Verum is: Nihil, inquit, in præsens me opus habes: sed hæc immortalū ac mortaliū cōmunis dea te peregrinum deducet. Et ego cōuersus uideo mulierem pulchram ac magnā, simpliciter ornata, splendidam, cuius oculorū circuli puro lumine micabant, ut stellarū fulgorem putares. Et deus quidem disparuit. Mulier uero illa apprehēsum me manu, lento gradu benigniter per urbē ducebat. Et ubi prope domū essemus, in qua hospitium mihi paratū esse putabam, uelut spectrū disparuit, hoc salte dicens: Cras te apud Democritū deprehendam. Cum uero iam se illa cōuerteret: Rogo, inquit, optima foemina, quæ nam es, & quo nomine uocari debes? Veritas, inquit illa. Cæterū quam accedentē uides (& derepēte altera quædam mihi apparuit) nec ipsa mala uidetur, audacior autem aspectu & cōcitator: Opinio, inquit, appellatur, & habitat apud Abderitas. Ego igitur ubi de somno surrexissē, mihi ipsi somniū interpretatus sum, quod non indigeret medico Democritus, quādo sanē ipse medendi deus discessisset, uelut qui medendi occasione & materiam non haberet. Sed ipsa quidē ueritas, quod Democritus sanus sit, apud Democritū manet. Opinio uero, quod Democritus ægrotet, reuera apud Abderitas habitat. Atque hæc uera esse, mi Philopœmeni, credo, & sunt sanē. Et nō contemno somnia, maxime ubi etiam ordinem cōseruant. Medicina autē & uaticinatio ualde cognatæ sunt: quandoquidem & pater ambarum artium unus est Apollo progenitor noster, & præsentis & futurorum morbos prædicens, & ægrotos & ægrotaturos sanans. Vale.

Hippocrates Crateuæ gaudium.

Scio te, o amice, optimū radicilecam esse, & propter tuam ipsius exercitatio-nem, & propter progenitorū gloriā, adeo ut in hac facultate, Crateuæ pro uo minime cedas. Proinde nunc, si unquā aliās, herbas collige, quot & quales poteris: urget enim necessitas: atque has mihi tranſmitte, ad uirum toti ciuitati cōparandum, Abderitam quidem, uerum Democritū. Aegrotare enim ipsum dicunt, & purgatione ualde opus habere, ut qui infania sit correptus. Non utemur fortassis medicamentis, quemadmodū etiam credo. Attamen undiquaque instructum esse oportet. At uero rem herbariam apud te sæpe admiratus sum, quemadmodū etiam uniuersorū naturam ac constitutionem, & facerrimū terræ fundamentū, ex qua animalia, & plantæ, & alimenta, & medicamēta, & fortuna, & ipsæ diuitiæ exoriuntur. Nec quē aliās haberet ubi cōsisteret Auaricia,

neque sanè Abderitæ nunc decem talentis inessent me, pro medico mercenarium declarantes. Si uero pocsis Cræteua amaram auaricię radicem excindere, ut nullæ ipsius reliquię restent: probe scito, quod hominũ unã cum corporibus etiam animas ægrotantes purgassemus. At hæc quidẽ uota sunt. Tu uero, quod fieri potest, nobis montanas maxime & in altis collibus nascẽtes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosioribus solidiores & acriores, propter terræ densitatem, & aeris tenuitatẽ. Nam quod attrahũt, frigidius est. Conare tamẽ ut etiam de his quæ circa stagna nascũtur, & de palustribus, & fluuiatilibus, aut fõranis, flores colligas: quas sanè debiles, & exsolutas, ac dulcis succi esse scio. Omnia autẽ medicamẽta, quę succi et liquores fluidi sunt, in uitreis uasis ferãtur: quæ uero folia, aut flores, aut radices sunt, in fictilibus nouis probe obturatis: ut ne uentis perflata, medicamẽti uigorẽ, uelut in animi deliquiũ collapsa, amittãt. Cæterum statim nobis hæc mittito. Nam & tempus anni cõgruum est, & necessitas dictæ insanis urget. Ab omni equidẽ arte aliena res est dilatio, uerũ maxime à Medicina, in qua dilatio est animæ periculũ. Curationũ uero animæ sunt tẽporum opportunitates, quarũ obseruatio finis est. Spero quidem sanũ esse Democritum, etiã citra medelam. Si uero aliquis error naturæ, aut tẽporis, aut alterius alicuius causæ cõtingat: multa enim nos, qui mortales sumus, latẽt, utpote non omnino per ueritatẽ corroboratos: ad id quod obscurũ est, omnem uim cõgregatam esse oportet. Non enim cõtentus est is, qui in periculo uersatur, his quæ possimus: sed cõcupiscit etiã ea, quæ nõ possimus. Et fermè semper ad duos fines militamus, alterũ hominis, alterũ artis. Quorũ alter obscurus est, alter sciẽtiæ determinatus. Opus est autẽ in utrisq; his etiam fortuna. Incerta enim est cõiectura eorũ, qui in purgationibus caute procedũt. Nam & stomachi afflictionem ueremur, & medicationis cõgruentiam, ad naturã ignotam coniectamus. Non enim una & eadẽ est omnium natura, & aliud semper sibi ipsi decernẽs admulat ac familiare facit. Aliquãdo uero totũ perdit. Sed & herbis multa reptilia uenenũ immittunt, & hiatus suo internæ ipsarũ teneritudini afflictionẽ pro auxilio inspirant. Et huius rei ignorãtia erit, nisi sanè nota aliqua, aut macula, aut odor ferus et grauis, rei factæ indicationem fecerit. Deinde ipsa ars, propter fortunæ casum, à recte faciendi proposito aberrat. Stabiliiores autem semper sunt purgationes per ueratrum, quibus etiam Melampus in Proeti filiabus, & Anticyreus in Hercule usi esse narrãtur. Minime uero utemur nos ullo aliquo ex his in Democrito: sed contigerit opto illi sapientia, efficacissimorum ac medicatissimorum pharmacorum finis. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

HOc erat illud Damagete, quod cõiectabamus: nõ insanit Democritus, sed super omnia sapit, & nos sapientiores effecit, et per nos omnes homines. Remisi autẽ tibi amice reuera Aesculapeam nauẽ: cui cũ solis signo etiã sanitatis insigne apponito. Nã reuera secũdo numine uela fecit: & illa die in Abderã nauigauit, qua scripserã ipsis, me peruenturũ esse. Omnes igitur ante portas congregatos inuenimus, nos, uelut uerissimile est, expectantes, nõ uiros solũ, sed etiam mulieres: insuperq; senes et pueros, per deos, tristes, iteq; infantes. Atq; hi quidẽ sic habebãt, uelut ob Democritũ insanientẽ. Ille uero syncere tunc in philosophando

Iosophado excellerebat. Postquam autem me uiderent, uisi sunt mihi paululum ad se ipsos rediisse, & bonas spes ostentabant. At Philocemen me ad hospitium ducere gestiebat, & hoc ab illis comprobabatur. Ego uero: O uiri Abderitae, inquam, nullum mihi maius opera precium est, quam Democritum uidere. Illi uero hoc audito, collaudauerunt, & gauisi sunt, & contumelia duxerunt me per forum, partim sequentes, partim praecurrētes, alij ab utraque parte: Serua, clamantes, auxiliare, medicare. Ego adhortabar ipsos ut considerent, tanquam fortassis nihil esset mali: aut, si quid esset, modicum id esset, & correctum facile, confusus horis anni Etefius. Et simul haec dicens ibam. Neque enim procul erant aedes: immo neque tota ciuitas. Aderamus igitur: propinqua enim muro erat, & me placide eodem deducunt. At retro turrim collis erat altus, laeuis ac densis populis nigris umbrosus, unde Democriti habitacula conspiciantur. Et ipse Democritus sub ampla ac humilima platano sedebat, in ueste crassa citra humeros desinente, solus, discalceatus, super lapidea sede, ualde pallidus ac macilentus, promissa barba, iuxta ipsum uero a dextra, tenuis aqua per decliuem collem decurrens leniter resonabat. Erat autem delubrum quoddam super illum collem, quantum equidem coniectura asequor, Nymphis dicatum, sponte enatis uitibus circumdatum. Ipse uero cum multo ornatu super genibus librum habebat. Sed & alij quidam ex utraque parte adiacebant. Accumulata erant etiam animalia multa per totum refecta. Et ipse aliquando contumelia incumbens scribebat, aliquando quiescebat, diu multumque se continens, & in seipso meditans. Deinde non longe post, his peractis, exurgens deambulabat, & uiscera animalium inspiciebat, & depositis ipsis digressus, rursus desidebat. At Abderitae circumstantes me tristes, & non procul a lachrymantibus oculos habentes: Vides, inquit, Hippocrates, Democriti uitam, quam insanit, & neque quod uult nouit, neque quod facit. Et quidam ex ipsis adhuc amplius ostendere uolens ipsius insaniam, alta uoce plorauit instar mulieris ob filij mortem lamentantis. Deinde rursus cum gemitu eius lauit, personam agens uiatoris, qui aliquid ex his, quae portabat, amisit. Verum Democritus cum haec audisset, partim ridebat, partim cachinnis explodebat, & nihil amplius scribebat. Caput autem frequenter conturiebat. Ego uero: Vos, inquam, o Abderitae, hic manete: ipse uero ubi & uerbis, & corpori uiri propior factus fuero, uidero: quam ac audiero, cognoscam adfectionis ueritatem. Et haec loquutus, placide descendebar. Erat autem locus ille asper ac decliuus. Itaque uix me suffulciens penetraui. Cum autem appropinquassem, incidi in ipsum nescio quid, quasi ex numeris adflatu & cum concitatione scribentem. Stabam igitur isthuc expectans tempus quietis ipsius. Ipse uero paulo post, intermisso scribendi impetu, & stilo scriptorio depolito, respexit ad me accedentem, & Salue, inquit, hospes. Et ego: Plurimum & tu, inquam, Democrite uir sapientissime. At ille, uerecundans arbitror, quam non nomine me contempserat: Te autem, inquit, quo nomine uocabimur? Ignorantia enim tui nominis, causa erat cur te hospitium appellarem. Hippocrates, inquam, Medicus est mihi nomen. Is uero: Asclepiadarum, inquit, nobilitas, & magna sapientia tuae in re medica gloria multum celebris, etiam ad nos peruenit. Quid autem negotij, o amice, te huc perduxit? Immo potius praeter omnibus confide. Vides autem quod haec sedes folijs instrata non est inuicunda, uiridis adhuc ac molis, & ad insidendum lenior inuidiosis fortunae sellis. Cum autem confedissem, rursus inquit. Priuatum ne, aut publicum negotium agēs huc peruenisti? Dic aperte.

nam nos, quantū poterimus, adiuuabimus. Et ego: Quæ uera causa est, inquā, tui gratia huc uenio, ut sapientē uirum conueniam. Habet autē causam patriā, cuius legatum ago. Ille uero: Hospitio itaq; inquit, primū utere nostro. Ego uero per omnia uirū pertentans, etiā si iam mihi manifestū esset, ipsum non insanire: Philopœmenem, inquā, nosti ciuem uestrū? Etiam, inquit, ualde: Damonis filium dicis, qui habitat apud Hermaidem fontē? Hunc ipsum, inquam, cuius ego sum ex patribus peculiaris amicus. At tu Democrite potiore me hospitio excipe, & primū sanē quid sit hoc, quod hic scribis, dicito. Ille uero ubi paululum se cōtinuisset: De insania, inquit. Et ego: O rex Iupiter, inq̄, opportune profecto scribis cōtra ciuitatē. At ille: Qualē, inquit, ciuitatē Hippocrates? Ego uero: Nil, inquā, ò Democrite, sed haud scio quomodo hoc uerbū mihi excidit. Verū quid de insania scribis? Quid em̄, inquit, aliud q̄ quid sit, & quomodo in hominibus generetur, & quomodo alleuetur. Nā animalia hæc, quæ uides, inquit, huius gratia refeco, nō q̄ odio habeam opera dei, sed bilis naturā ac sedē quærēs. Nosti enim q̄ hæc furoris hominū causa est, ubi nimīū redundarit. In omnibus, equidem à natura inest: sed in quibusdā minus, in quibusdā amplius. At immodestia ipsius morbi sunt, ipsa uelut materia, aliquādo bona, aliquando mala subiacente. Et ego, Per Iouem, inquā, ò Democrite, uere hæc & sapienter dicis. Quare beatū te iudico, qui tāta quiete frueris. Nobis autē huius participes esse nō permissum est. Interrogāte uero illo: Cur, ò Hippocrates, permissum nō est? Quoniā, inquā, aut agri, aut res domesticæ, aut liberi, aut usuræ, aut morbi, aut mortes, aut famuli, aut nuptiæ, aut eiusmodi quædā, opportunitatē nobis commodam eripiunt. Hic sanē uir ille ad solitā adfectionē delatus est, & ualde effuse risit, ac cachinnatus est. Et de cætero quiescebat. Et ego: Quid uero, inquā, Democrite rides? utrū bona quæ dixi, aut mala? Ille uero adhuc magis ridebat. Et Abderitæ de colle id uidētes, partim capita sua cædebāt, partim frontē. Alij uero capillos euellēbāt. Nam, uelut postea dixerūt, ampliōrē, q̄ aliās solitus esset, risum effuderat. At uero, inquā, sapientū optime Democrite, cupio causam huius tuæ adfectionis cognoscere: quo risu ego tibi dignus uisus sum, aut ea quæ dixi: quo hoc cognito, à causa desistam, aut tu reprehēsus, intēpestiuos risus coercēas. Ille uero: O Hercules, inquit, si me reprehēdere potes, curationē perficies, qualem nullam unquā, ò Hippocrates. Et quomodo nō reprehēdaris, ò optime? Aut nō absurdum te esse putas, dum rides hominis mortē, aut morbū, aut mētis emotionē, aut insaniam, aut atram bilem, aut cædē, aut aliud quid peius? Aut uice uersa nuptias, aut festiuitates, aut liberorū procreationē, aut mysteria, aut magistratus, aut honores, aut aliud quid omīno boni? Nā quorū misereri oportet, ea tu derides, & ob quæ lætari cōueniebat, ea itidē derides, adeò ut neq; bonū, neq; malū apud te sit discretū. At ille: Hęc quidē, inquit, recte dicis ò Hippocrates: sed nō nouisti risus nostri causam. Vbi uero cognoueris: fatis scio q̄ meum risum, meliōrē legatione medelā ac curationē, tuæ patriæ & tibi ipsi autē res, & alios prudētes facere poteris. Et pro hoc fortassis me uicissim medicinā docebis, ubi cognoueris quāto studio circa res nullo studio dignas uersantes, et ea quæ nullius precij sunt facere conātes, omnes homines uitā cōsumūt, risu digna tractātes. Ego uero, Dic, inq̄, per deos, nūquid uniuersus mūdus ægrotare se nō animaduertit? & nō habet quo legationē demittat ad sui curationē? Quid enim

enim extra ipsum esse poterit: Ille uero excipiens: Multae, inquit, sunt mundorum infinitates, & nequaquam, o amice, diuitem naturam maligne extenues. At haec quidem, inquam, Democrite suo tempore docebis. Vereor enim ne forte dum infinitatem recenseres, ridere incipias. Scias autem nunc, de tuo risu, rationem uitae te reddere debere. Ille autem torue me intuitus: Duas, inquit, risus mei causas esse putas, bona & mala. Ego autem unum hominem rideo, dementia quidem plenum, rectis autem actionibus uacuum, in omnibus consilijs pueriliter ac stulte se gerentem, & nullius utilitatis gratia labores nunquam absoluedos tolerantem, fines terrae & infinitos recessus ex immodicis cupiditatibus penetrantem, argentum & aurum quaerentem, & nunquam ab his adquirendis interquiescentem: sed semper circa plura adipiscenda tumultuantem, quo ipse inferior non sit, et neque pudeat, si non felix appelletur. Rideo item ipsum eo quod hiatus terrae effodit, manibus eorum perquirens, qui partim a laxa irruente terra oppressi sunt, partim diutissime in hac necessitate detenti, in supplicio uelut in patria permanent, argentum & aurum inquirentes, uestigia pulueris ac ramenta perscrutantes, arenam aliam aliunde eruentes, & terrae uenas excindentes, ad opulentiam semper glebas conflantes, ex matre terra hostilem terram, quum tamen eadem sit, facientes, & hanc admirantes pedibus calcant. Quam uero risu dignum est, quod aruinofam & occultam terram amant, manifestam contumelia afficietes? Alij uero canes emunt, alij equos: alij multam regionem circumscribentes, propriam sibi inscribunt: et multis imperare uolentes, neque sibi ipsis imperare possunt. Vxoribus ducunt, quas paulo post eiciunt. Amant, deinde odio habent. Cum magna cupiditate liberos generant: deinde adultos eiciunt. Quae est illa uana ac absurda diligentia, nihil ab infania differens? Bellum intestinum gerunt, quietem non amplectentes. Reges alios deponunt, alios surrogant: occidunt homines: terram fodientes, argentum quaerunt. Argento reperto, terram emere uolunt. Empta terra, fructus uedunt: fructibus diueditis, rursus argentum accipiunt. In quot mutationibus uersantur: in quam malicia: dum opes non habent, opes expetunt: dum habent, occultant, dissipant. Rideo, dum improbe agentes uideo. Intendo risum, dum infeliciter agentes cerno. Veritatis enim Leges transgrediantur: contentionis studio hostilem inter se litem habent, & cum fratribus, & parentibus, & ciuibus: atque ad haec, pro eiusmodi opibus, quarum nemo, ubi mortuus est, dominus est, se mutuo occidunt. Illicitam uitam degentes, amicorum ac patriam penuriam contemnunt. Res indignas & inanimatas diuitiarum loco habent: pro uniuersa opulentia statuas emunt, quoniam effigies ita expressa est, ut loqui uideatur. Eos uero qui uere loquuntur, odio habent. Res insuper non faciles expetunt. Nam continentem habitates, mare cupiunt. Et rursus, cum in insulis sunt, continentem desiderant, & omnia peruerunt ad propriam cupiditatem. Et in bello quidem fortitudinem laudare uidentur. Vincuntur autem quotidie a petulantia, ab avaricia. Ex omnibus adfectionibus aegrotant. Theristicae uero uitae omnes sunt. Cur uero meum risum reprehendisti o Hippocrates: Non enim quispiam suam ipsius demerentiam, sed alius alterius deridet: hi quidem ebrios, cum ipsi sibi sobrii esse uidentur: alij uero amates, qui ipsi grauiore morbo laborent: alij nauigantes: alij eos, qui circa agriculturam occupati sunt. Non enim concordant neque artibus, neque operibus. Ego uero: Haec quidem, inquam, uera sunt Democrite: neque alius aliquis conuenientior sermo esse poterit, ad mortaliu miseriam declarandam: uerum ipsae res sciuntur

ciunt necessitatē, & domesticæ dispensationis, & nauium fabricationis gratia, reliquæ item uitæ, in qua necesse est hominem esse. Non enim ad ocium natura ipsum genuit. Ex his aut rursus ambitio effusa, multorum recte sentientem animam deceptit, qui omnia quidē recte ac serio agere student, uelut re certa ac stabili futura. Non autē ita ualidi sunt, ut obscuritatē præuidere possint. Si enim quis à Democrite uxorē ducens, separationē aut mortem timeret: aut quispiā liberos educans, ipsorum interitum: imò necq; in agricultura, & nauigatione, & regno, & magistratu, et omnibus quæ sunt in uita, ullus unquā de errore præsumpsit, sed unusquisq; horū bona spe alitur, deteriorū uero ne meminit quidē: nūquid igitur risus tuus his minime cōuenit. At Democritus: Valde, inquit, tardo ingenio præditus es, & longe à sententia mea abes. Democrite, qui tranquillitatis & perturbationis modū non cōsideras, præ ignorantia. Si enim hæc ipsa prudenti mēte disponderēt: & ipsi facile liberarentur, & meū risum leuarent. Nunc aut, uelut rebus in uita firmis, demētes illi superbiunt, ob ratiocinationis expertem mentē, inordinatū impetū suum ægre discētes. Sufficiens enim admonitio ipsis esset, OMNIVM RERVM uicissitudo, quæ subitis mutationibus irruit, & derepente omnigenam circūrotationem inducit. At ipsi, uelut hæc firma sit ac stabilis, obliuiscunt adfectionū assidue incidentium, aliter aliàs ea, quæ tristitiam inferūt, cupientes, & quæ non cōferunt, quærētes, multis calamitatibus inuoluuntur. Si uero quis iuxta propriā facultatē omnia facere cogitaret: stabilē sanē uitā custodiret, seipsum cognoscēs, et sui ipsius cōparationem clare cōsiderans, & nō cupiditatis studiū in infinitum extēdens: sed opulentā naturam, & omnium nutriticē, per sufficientiā intuens. Quemadmodū aut in optimo corporis habitu, adfectionū periculum manifestū est: ita successuū fortunæ magnitudo periculosa est. Insignes aut palam in infelicitatibus conspiciuntur. Alij uero uelut proximorum facta nō uidentes, à proprijs malefactis pereūt, tam manifesta, q̄ obscura nō præuidentes, quū longam uitam exemplū habeant eorū, quæ fiunt, & quæ nō sunt, ex quibus etiam futurum cōsiderare oportebat. Hæc sunt quæ mihi risus materia præbent, o demētes homines, prauitatis poenas sententes, auariciæ, insatiabilitatis, inimicitiae, insidiarū, doli, inuidentiæ (difficile est enumerare multiplices malorū uersutias: sunt enim infinitæ) & in his dolosis uersutis uicissim cōuersantes, & maligne sentientes. At uirtutis apud ipsos modus est, id quod deterius est. Mēdaciū enim studiū exercēt, uoluptatē confectantur, legibus nō obediētes. Quidā uero ex ipsis præuidentiam in hominibus esse negat, ut qui necq; uisus, necq; auditus participes sunt. Solus aut sensus hominis recta intelligētia lucidus, & præsens & futurū præuidet. In omnibus displicentiā habēt, & rursus ad eadē accedūt. abnegata nauigatione, nauigāt. reiecta agricultura, rursus agrum colūt. eiecta uxore, aliam inducūt. genitos sibi liberos sepe hūc: & his sepultis, alios generāt, ac rursus educant. Senectam optant: ad ipsam aut perueniētes, gemunt, in nullo rerū statu cōstantem mentē habentes. Principes ac Reges priuatum prædicāt: priuatus autē regnum appetit. Qui reipub. magistratum gerit, artificem laudat, uelut extra periculum constitutum: artifex autem illum, uelut per omnia potentem. Rectam enim uirtutis uiam, puram & leuem ac inoffensam, nō uident, quam nemo ingredi audet. Ferūtur aut in contrariam, difficilem & tortuosam, per aspera incedentes, lapsantes ac offendentes

tes: plerique uero excidetes, anhelantes uelut si qui persequatur, litigantes, modo posteriores existentes, modo praecedentes. Et quidam ipso metu petulantia alieni cubilis corrumpendi amore ardēt, per impudentiam inducuntur. alios auariciae morbus infinitus consumit, alij mutuo insidias struunt, alij ab ambitionis studio in aerem sublati, per maliciae grauitatem in profundum perniciem praecipites deferuntur. Quidam destrunt, deinde rursus aedificant: largiuntur, deinde poenitentia ducti, amicitiae iura tollunt, malefici per inimicitiam cognationis iura bello imperetes. Et horum omnium causa est Auaricia. Qua in re hi a pueris ludibus differunt: apud quos consilium quidem iudicio caret: quod uero se forte fortuna obtulit, id iucundum est. At uero in desiderijs quid brutis animantibus reliqui faciunt, quae quae intra sufficientiam ferre ipsae se continent: Quis enim leo aurum in terram occultit? Quis taurus uberioris alimentum gratia depugnat: Quam pardalim unquam insatiabilitas coepit: Sicut quidem aper, sed usque ad aquae appetentiam. Lupus autem, deuorato necessario alimentum oblato, quiescit. Si dies ac noctes coniungat homo, non sentit comuiuandi fatietatem. Et annuorum quidem temporum ordo, terminus est brutis ad coitum: at homo perpetuo infano libidinis cerebro stimulat. Quae se Hippocrates, non ridere debeo plorantem propter amorem, eo, quod commodo suo exclusus est: maxime uero si quis periculorum contemptor sit, & per praecipitiam, aut pelagi profunditates feratur, risum non extendam: Non ridebo autem eum, qui nauem multae mercibus onustam demersit, deinde mari indignatur, quod ipsam plenam submersit: Ego quidem nequaquam mihi ridere uideor. Vellem autem potius aliquid molesti contra ipsos excogitare. At neque medicinam pro his esse oportebat, neque aliquid praenonia pharmaca praeparantem: atque huius rei documentum praebet tibi tuus ille progenitor Aesculapius, qui dum feruaret homines, fulminis ictus gratiam accepit. Non uides quod & ego maliciae pars sum, dum insaniam causam inquirens, animalia maesto ac refeco: Oportebat autem ex hominibus causam perscrutari. Non uides quod etiam ipse mundus odio in homines plenus est: Infinitas enim contra ipsum adfectiones accumulauit. Totus homo ex natiuitate morbus est. Dum educatur, inutilis est, & alienum auxilium implorat. Dum crescit, proteruus, insipiens, paedagogi opus habens. Dum in uigore est, audax est. Dum decreuit, miserabilis, ubi labores suos imprudenter recolit ac iactat. Ex matris enim uteri inquinamento talis prodijt. Et propterea alij indignatione ac immodica ira pleni, in calamitatibus ac pugnis uerfantur: alij semper in adulterijs & corruptendis puellis: alij in ebrietatibus: alij in rerum alienarum cupiditatibus: alij in suis prodigendis. Utinam facultas esset nobis, uniuersorum habitationes reuolare, & nullum rerum in ipsis uelamentum dimittere, atque ita ea, quae intus aguntur, uidere: uideremus utique alios edentes, alios uomentes, alios supplicij tormentos, alios pharmaca miscentes, alios insidias construentes, alios supputantes, alios gaudentes, alios plorantes, alios amicos accusantes, alios propter ambitionem amantes. Quanquam sint quaedam actiones profundiores, quae in animo occultantur. Et ex his quidam sunt iuuenes, quidam senes: petentes, negantes: pauperes, opulenti: fame pressi, luxu graui: sordidi, uincti, alij delicij diffluentibus, famulitium magnum alentes: alij trucidantes, alij sepelientes: alij ea quae habent contemnentibus, & speratis possessionibus inhiantes: alij impudentes: alij parci: alij inexplebiles: alij occidentes: alij uapulantes: alij superbientes

bientes: alij uana gloria elati. Et ex his aliqui apud equos spectatores consistunt: aliqui apud uiros, aut canes, aut lapides, aut ligna, aut aes, aut picturas. Et aliqui legationibus, aliqui militiae, aliqui sacerdotijs praesunt. Et alij coronas gestant, alij armati sunt, aliqui occiduntur. Singuli uero ex his feruntur, partim ad pugnam naualem, partim ad militiam, partim ad rusticationem: alij ad onerarias naues, alij ad forum, alij ad concionem, alij ad theatrum, alij ad fugam, alij alio. Et rursus, quidam ad uoluptatem deliciasque, ac intemperantiam: quidam ad ocium ac socordiam. Quum igitur tot indignas ac infelices animas uideamus: quomodo non uiam ipsarum eiusmodi intemperantia praeditam risu exhibilarimus? Quin & ualde timeo, neque medicinam tuam ipsis placere. Nam praeter intemperantiam omnia ipsis displicent, & insaniam sapientiam putant. profecto suspicor plerumque in scientia tua palam contumelia adfici, aut propter inuidiam, aut propter ingratitudinem. Aegrotantes enim simul ut seruantur, causam dijs aut fortunae attribuunt. Plerumque uero suae naturae hoc adscribentes, benefactorem odio habent, & parum abest ut indigne ferant, si debitores esse putentur. Sed & plerumque artis ignorantiam in seipsis habentes, & imperiti existentes, id quod melius est, purgant. Inter stupidos enim fiunt suffragia, & neque aegroti attestari uolunt, neque eiusdem artis artifices testimoniū praebere. Inuidia enim obstat. Non autem inexpertus es tu talium nugarum: imo probe scio, ob haec te saepe in memorabilibus afflictionibus accersitum fuisse, & neque causam, aut inuidiam libenter derisisse. Veritatis enim neque cognitio ulla est, neque ullum testimoniū. Haec autem cum diceret, subridebat, & mihi, o Damagete, diuina specie apparebat, & uelut qui priorē suam formam exuisset. Et ego: O magnifice Democrite, inquam, magna xenia & hospitalitatis tuae munera, in Co mecum auferam. Multa enim me sapientiae admiratione impleuisti. Discedo enim ueritatis tuae praeco, qui humanam naturam inuestigasti ac considerasti. Quum autem mentis meae medellam a te acceperim, ab eo nunc tempore hoc expetente, itaque corporis curatione. Cras uero, & deinceps, hoc loco rursus conueniemus. Atque haec loquutus, surrexi. Et ille paratus erat me sequi. Cum uero quidam accederet, haud scio unde, tradebat ipsi libros. Et ego concitatius festinaui, & ad Abderitas in specula me expectantes: Viri, inquam, pro legatione uestra ad me, magna sit uobis gratia. Vidi enim Democritum uirum sapientissimum qui solus potentissimus est homines prudentes facere. Haec habui Damagete, quae de Democrito ualde magna animi laetitia tibi recensere uolui. Vale.

Democritus Hippocrati felicitatem.

Accersisti ad nos uelut insanos, o Hippocrates, ueratrum nobis daturus, persuasus a uiris stolidis, apud quos labor uirtutis insania iudicatur. Tunc autem de mundi dispositione, & de polis ac astris coelestibus scribebamus. Cum uero horum naturam cognouisses, quod omnia ualde comode essent creata, & quod procul ab insania ac desipientia abessent: meam quidem naturam laudasti: desipientes autem & crudeles ac furiosos illos iudicasti. Nam quae simulachris per aerem uagantia nos decipiunt, quae sane mundus esse comprehenduntur, & uicissitudinem habentia creata sunt: ea mens mea, naturam perscrutata, uere in lucem produxit. Cuius rei testes sunt libri a me conscripti. Oportebat igitur te, o Hippocrates, cum uiris eiusmodi moribus praeditis minime congregari ac conuersari, quorum

mens

riens superficialia & inconstans est. Si enim ab illis persuasus, mihi, uelut in sano, ueratum bibendum dedisses, prudentia in sania facta fuisset: & artem tuam reprehendissent, uelut quae in sania fuisset causa. Veratrum enim sanis datum, menti tenebras offundit. Insanis autem ualde prodesse consuevit. Arbitror equidem, si non deprehendisses me scribentem, uerum recubentem, aut forte deambulantem, & mecum colloquentem, & nunc quidem indignantem, nunc uero ridentem, ob ea, quae mente reuoluam, & familiaribus me alloquentibus non attendentem, sed cogitatione instantem, & mirum in modum speculantem: putassem sane Democritum, iuxta oculorum iudicium, ex his, quae uidisses, insaniam imaginem praeseferre. Oportet igitur Medicum non solum uisus adfectiones iudicare, sed etiam ipsa: & rythmos ac consonantias ut plurimum indagare: & utrum incipiat morbus, aut medium teneat aut desinat, perscrutari: & differentia, ac anni tempore & aetate obseruata, adfectionem curare: itaque totius corporis naturam considerare. Ex his enim omnibus facile morbum inuenies. Porro remis ad te de insaniam tractationem a te conscriptam. Vale.

Hippocratis Coi, de insaniam scriptum.

Quemadmodum in libello de morbo sacro dixi, Insanienti necesse est praehumiditate cerebrum, in quo animae sunt opera, moueri: ubi uidelicet humidius quam pro natura fuerit. Eo uero commoto, neque uisum, neque auditum quiescere: sed alias alia & uidere, & audire: & lingua talia loqui, qualia singulis uicibus uiderit ac audierit. Quandiu uero cerebrum quieuerit, tamdiu etiam homo sapit. Fit autem corruptio cerebri a pituita & bile, Vtriusque uero cognitio sic contingit. Etenim qui a pituita insanunt, quieti sunt, & non uociferantur, neque tumultuantur. Qui uero a bile, percussores sunt, & malefici, ac non quieti. Et si quidem assidue insaniant, haec causa sunt. Si uero terrores & timores fuerint, a transmutatione sunt, cerebro a bile calefcente, quae ad ipsum per uenas sanguinarias proccedit. Cum autem bilis discesserit rursus in uenas, etiam corpus quiescit. Tristatur autem & angitur homo, & praeter temporis rationem obliuiosus fit, dum cerebrum a pituita perfrigeratur, & praeter solitum morem commingitur. Postquam uero cerebrum de repente a bile calefactum fuerit, sanguine in praedictis uenis effluente: in omnia uidentur horrenda, & facies uelut in uigilante flammescit, & oculi rubescunt, & mens aliquid mali operari cogitat. Atque hoc in somno homo patitur. Cum autem sanguis rursus ad uenas dispersus fuerit, quiescit. Porro in quinto popularium morborum libro quendam recensui, cui fiebat uocis interceptio, ignorantia, frequentes delirationes, & reuersiones. Lingua autem dura, & nisi collutione usus esset, loqui non poterat, & plerique etiam ualde amara. Venae sectio exsoluit, aquae potus, aqua multa, ueratrorum portiones. Hic ubi modicum tempus superuixisset, mortuus est. Errat et alius quidam, quae ubi noctu ad comitum progredere, timor tibique corripiebatur, ubi audiret ipsam tibia canentem. Interdium uero audiens, nihil patiebatur.

Hippocrates Democrito felicitatem.

Artis Medicae recta facta, o Democrite, plerique est uulgo hominum non omnino laudant, uerum Dijs saepe attribuit. Si uero natura reluctata perdidit eum, qui curatur: medicos reprehendunt, numen praeterentes. Et ego sane mihi uideor, maiorem reprehensionem quam honorem artis meae consequutum esse. Ego enim

ad finē Medicinæ nō perueni, etiāsi iam senex sim. Neq̄ enim ipsius inuētor Aesculapius, sed & ipse in multis à seipso dissensit, quemadmodū nobis scriptorū libri tradiderūt. Proinde epistola à te ad nos missa, ueratri medicinā reprehēdebat. Inductus equidē sum, o Democrite, uelut infantiēti ueratrū daturus, non perscrutatus qualisquis tandē esses. Vbi uero tecum congressus, cognoui non per louē desipiētiae opus, sed fermē omni laude ac cōmendatione dignum, ualde laudauī naturā tuam, optimūq̄ naturæ ac mundi interpretem te iudicauī. Eos uero qui me induxerūt ad te, uelut infantiētes reprehendi. Nam ipsi medicina mento opus habebant. Quandoquidem igitur casus nos in idem coniunxit, recte feceris si ad nos frequentius literas dederis, & libros à te conscriptos imperitueris. Misi autem etiam ipse tibi de ueratri usu libellum. Vale.

Hippocratis De ueratri usu libellus.

His qui non facile sursum purgantur, ante potionē corpora præhumeſtare oportet uberiore alimento & quiete. Vbi uero quis bibit ueratrū, ad motus corporū magis ducere, q̄ ad somnos. Declarat autē nauigatio, q̄ motus corpora turbat. Cum ueratrū magis ducere uoles, corpora moueto. Veratrū periculosum est sanas carnes habētibus. Quicumq̄ in pharmacorū potionibus nō situnt, dum purgātur, non cessant purgari prius q̄ sitierint. Cōuulſio ex ueratro, lethale. In nimia purgatione, cōuulſio aut singultus succedēs, malum. Inurbationibus uentris, & uomitibus spontaneis, si quidem qualia purgari oportet, purgētur, cōducit, & leuiter ferūt. Sin minus, uice uersa. Quemadmodū autē in prænotionibus dixi, purgatio sursum uersus cōmodat ei, in quo sine febre est cibi fastidiū, aut stomachi pūctura, aut uertigo, aut os amarū, & in summa doloribus supra septū trāuersum: at deorsum uersus, ubi sine febre est tormen, lūborū dolor, genuū grauitas, mēles ægre prodeūtes, dolores in partibus sub septo trāuerso. Vitare uero oportet in pharmacorū potionibus eos, qui bona habēt corpora, maxime autē nigros, et humida carne præditos, sed et subsecos, et balbos, ac blesos. Quicumq̄ uero inflammata in principio morbi, uelut in libello de pitiana dixi, statim medicamēto soluere aggrediūtur, hi de eo quidē quod distētū est ac inflammatū, nihil auferūt. neq̄ em remittit qui crudus est adfectus. Ea uero quæ morbo resistunt, & sana sunt, cōsumunt. Corpore uero debili sientē, morbus superat, & immedicabile malū habent. Cæterū ueratrū his dare oportet, quibus de capite fluxus fertur. Non autem dandum est pectore supparatis. Neq̄ medicamēta danda sunt decoloratis, raucosis, lienosis, exsanguibus, spirituosis & siccū tussientibus, siticulosos, flatuosos, & his qui præcordia, & latera, ac dorsum distenta habent, & torpētibus, & obscure uidētibus, & quibus aurium sonitus sunt, & urinæ meatus impotētibus: neq̄ itē morbo regio laborantibus, aut uentre debilibus, aut his qui sanguinis eruptiones aut tubercula habent. Si uero medicandum esse uidebitur, ueratro securus sursum purga, deorsum uero nō. Optimū autē his est uictus rationē constituere. Quemadmodū autē in prædictionibus dixi, nō sunt medicamēta danda his qui nigra euomūt, neq̄ cibū auersantibus, neq̄ deliris & parū dormiētibus, neq̄ dolore uexatis, neq̄ uisum temerariū inclinātū habentibus, neq̄ tumefactis, neq̄ uertiginosis, neq̄ decoloratis, neq̄ his qui in febre æstuosi sunt ac cōfracti. Sicut autē de pitiana dixi, Sesamoides sursum purgat. potio eius est drachma dimidia in aceto multo trita

trita. Commiscetur etiã uertris tertia potionis pars, & minus suffocat. Purgat item quartanas diurnas, & diurna febrî lipyria uexatos: & eos, in quibus non est sitis, neq; excretio. Hos uero non ante tres hebdomadas. Aliquãdo etiã am pleuriticos ac uoluuolos. Et sicut in muliebribus morbis dixi, purgandum est etiam si uteri purgatione opus habuerint.

Hippocrates ad Thessalum filium.

AD cognoscendam Geometriam & numerorũ scientiam, mi fili multũ stu-
dij adhibeto. Nõ enim solũ uitam tuam illustrem, & ad multa cõmodam, in humanarum rerũ statu efficiet: sed etiam animã acutiorem & clariorem reddent, ad omniũ, quorum usus in medicina expetitur, utilitatem cõsequendam. Etenim Geometriã cognitio, quã multiformis ac uaria est, & omnia cũ demõstratione transigit, utilis erit & ad osiũ sitis, & ad exarticulationes, & reliquũ membrorũ ordinem. Nam ad multiplicẽ horum adfectionẽ, & articularum luxatorũ repositione, & osium cõtritorum refectione, & perforatione, & cõpositione, & exẽptione, ac reliqua curatione, maiore industria utetur quisquis no uerit qualis est locus, & quale est os, quod ex eo eluxatũ est. At uero numerorũ ratio, & ad circuitus, & ad trãsmutationes febrîum præter rationẽ sientes, & ad iudicia ægrotantiũ, ac securitatis in morbis, sufficiẽs erit. Præclara enim res est, tale ministrerũ in medicina habere, quod tibi partes intensiõnis ac remissionis, cum ex parte in æquales fuerint, facile cognobiles exhibet, citra errorem. Quã propter ad huiusmodi experiẽtiã facultatẽ peruenire sedulo stude. Vale.

Democritus Hippocrati, De natura humana.

OMnes homines artẽ medicam nosse oportet, õ Hippocrates. Est enim res honesta simul ac utilis ad uitam: & ex his maxime eos, qui eruditionis ac eloquẽtiã cognitionem habẽt. Nam sapientiã cognitionẽ medicinã sororem ac cõubernalem esse puto. Sapientia enim animã ab adfectibus liberat: Medicina uero morbos à corporibus auferit. Augescit aut̃ intelligentia, præsentẽ sãnitatẽ: cuius prouidentia habere, honestum est, eos qui recte sentiũt. At ubi corporis habitus ægrotat: neq; mens ipsa alacritatem habet ad uirtutis meditationem. Morbus enim præsens animam uehemẽter obscurat, intelligentiã ad adfectionem per cõsensum ducẽs. Cæterũ naturã humanã descriptio, eiusmodi speculationem habet. Cerebrũ quidem supremam corporis partem custodit, & securitatis tutelam sibi cõmissam habet, intra mēbranas neruosas cohabitãas. Super quod duplicatorũ osium naturã necessariã firmat, dominum mentis custodem, ipsũ cerebrũ tegunt. Pilorũ decor est, cutem ornare. Oculorũ uero uis uisua in multiplici tunica latitans, ob humoris instantias, sub frontẽ in mēdelam collocata est, & est uidentis causa. Pupilla uero sincera, palpebrã marginem opportunitatẽ custodem sustinet. Duplices aut̃ nares olfactũ dinoscẽtes, oculorum uicinitatẽ dirimunt. Mollis uero labiorũ contactus os circũplicans, uerborũ sensum, exactãq; articulationẽ gubernans exhibet. Mentum aut̃ in extremitatẽ desinens, ac lyrã simile, dentiu claus coaptatum est. At sermonum receptacula aures, opifex aperuit: in quibus dum est sermo, non certus temeritat̃ minister existit. Loquelã mater lingua, animã nuncius, gustũ custodiẽs,

munitis dentium septis custodia est. Guttur autē & Gula inter se coniuncta, uicina sunt. Illud enim in uiam spiritus: hæc in profundū uentris, alimentū demittit, large id propellens. Regiū uero cor, cono ac pineæ nuci simile, iram nutriēs, aduersus omnes insidias thoracē induit. Frequenter autē flatuum cauernæ, aere per ipsas erumpente, uocis causam flatum pariunt. Quod uero sanguinem supeditat, & in alimētum transmutat, cum apicibus sæpe uena caua circūfluum, hepar est, concupiscentiæ causa. Viridis autē bilis iuxta hepar manens, ubi superbullit, humani corporis corruptio est, & nociuus ac inutilis corporis humani inquilinus. Veruntamen uice uersa dormit, nullum negocium exhibens. Inter hæc autē medius omnia suscipiens uēter chorum ducit, & accumbit, concoctionem gubernans. Obnoxia uero uentris cōpositioni, per opificium cōuoluta, circum uentrem euoluūtur intestina, adsumptionis & excretionis causæ. Gemini autē rhenes in coxis firmati, & pinguedine intecti, ab urinarum excretionem non sunt alieni. At dominus totius uentris, qui Omentū uocatur, totum uentrem complectitur, solo splene excepto. Cōsequenter, neruosa uesica in coxa osculum firmatū habens, uenis complicatis, urinarum excretionis causa est. Huic autē uicina mater puerorum, uehemens illud malum, infinitarū ærumnarum in muliere causa, uterus ipse latitat. Pylorus autē siue Ianitor, ex coxarum recessu emergens caro, neruis adstringitur. Verum de plenitudine naturæ uentris effundit, ex opificij prouidentia. Porro extra corpus pensiles domum incohlunt, ad generationē destinati, cōditores testiculi, multis tunicis præditi. Lucundum ex uenis ac neruis plicamentū est pubes, quæ urinarum effusionē facit, & ad coitus ministeriū à natura creata est, & pubertatis appetentiam tegit. Crura uero & brachia, & extremæ partes his annexæ, totum ministerij principiū conaceruatum habentes, tutum neruorū ministerium perficiunt. At uero in corporea in recessibus natura, omnifaria uiscerum genera fabricauit. Quæ sanè mors instans, celeriter à ministerio quieta reddit.

Hippocrates Cous, Demetrio regi gaudium.

NOs equidem etiam prius, ò rex, studio habētes naturæ humanæ partes in summa cōsiderare, has cōscriptas quemadmodū uoluisti demisimus. Nūc autē ea, quorū maxime studiosos esse oportet prudētes, partim à prioribus trāssumpta, partim nūc per nos ipsos cōperta, tibi cōscripsimus. Quæ si tu priorū morborū signis fientibus sequutus, & isdem sæpe usus fueris: per omne uitæ tempus morborū exfors esse poteris. Duo sunt morborū uniuersorum animalium genera: alterū secundum genus, alterum secundū adfectionē, inter se dissimilia. At uero concupiscentias iuxta alimentū, ex subcōtrarijs cognosces, dum ea quæ euacuātur, indicant ea quæ plena sunt: & quæ implent, cōiecturam præbent eorum quæ uacua sunt. Morbos autē omnes subcōtrarijs constitutos cognosces, & morbos à morbis fieri. In conuulsionibus febris succedens, sistit morbu: capitis autē dolores, sanguis ex auribus erumpens, aut ex naribus. Conuulsiones omnibus morbis atræ bilis succedentes, atrā bilem sedant. Et in summa, radix humanorū morborum est caput, & maximi morbi ex hoc accedunt. Quum enim ori uelut cucurbita medica incumbat: cōtingit, ut ipsum omnium eorū, quæ ingerūtur, superfluitates attrahat, & tenues humores. Oportet autē

animum

*caput de fluxu ex auribus
est capitis dolorem.*

animum aduenire, & peculiariter uiuere, ubi teipsum præparaueris in has partes, quo morbi accedentes nullū augmentū capiant, per curam diligentē & per bonum ordinē apud te fientem: ita ut neq; rei uenereā intemperantia, neq; diuerforū eduliorum in cōtinentia, neq; somnis immodicis, in exercitato corpore utaris: sed signa in corpore contingentiā sequaris, & uniuscuiusq; corporis occasionem conserues: quo morbum irruere parantem uites, et medelis, quas ego perscribo, utens, à morbis exfors perseueres. Vale.

Decretum Atheniensium.

Vlſum est ac decretū Senatui et populo Atheniensium. Quandoquidē Hippocrates Cous Medicus, & ab Aesculapio originem ducens, magnā beneuolentiam unā cum salute Græcis ostendit, quando etiam peste à Barbaris in Græciam proficiſcēte, discipulis suis ad locos dimiſſis, indicauit quibus medelis uti oporteat, & accedentē pestem ſecure effugere, quo medicina Græcis data, ipſorū ægrotos tuto ſeruaret. Sed & ſcripta ſua de arte medica exacta edidit, multos eſſe uolens Medicos qui ſeruare poſſent. Et Perſarū rege ipſum accerſente, & honores optimatibus Perſarū æquales promittente, & dona quæcumque tandem ipſe Hippocrates uellet offerente, Barbari promiſſiones contempſit, eo quod hoſtis & cōmunis inimicus Græcis eſſet. Quo igitur appareat, populum Athenienſium ſemper ea quæ utilia ſunt Græcis cōſultare: & ut gratiam cōdignam Hippocrati pro benefactis referat: uiſum eſt populo, ipſum publice magnis myſterijs initiare, quemadmodum Herculem filium Louiſ: & coronare ipſum corona aurea mille aureorū: & ipſam coronā Quinquatrijs magnis Mineruæ feſtis, in certamine gymnico per præconem proclamare. Et licere omnibus Coorum liberis, ut Athenis pubeſcant, quemadmodū liberi Athenienſiū: quandoquidē patria ipſorū huiusmodi uirum genuit. Eſſe uero Hippocrati, & uitam, & uictum prouiſum in Pritaneo per omnem uitam.

Oratio Hippocratis ad aram conſiſtentis.

OVos multi & multarū urbium habitatores, in magna dignitate conſtituti, cōmuni nomine Theſſali, omnibus hominibus amara neceſſitas incūbit, ut quæ à fatiſ ſtatuta ſunt ſerant. Quapropter ego nunc cedens cum mea ſole, oleæ ramulis coronatus, ad Mineruæ arā ſupplex cōſiſto. Quis ſim, ignoſcantibus dicere oportet. Hippocrates, o uiri, medicus Cous, nō per piā & honeſtam cauſam, meipſum & liberos meos uobis commendo. Cognofcitis me o plebs. Nam profecto uos eſtis uiri mihi familiares, inter quos, ut uerū dicam, inter pleroſq; ueſtrū & in multis urbibus ueſtris cognitus ſum, ut in ſumma dicam. At uero nomen meum longe ulterius, q̄ formæ meæ aſpectus, proceſſit. Atq; hæc cauſa ex arte mea ſanitatē ac uitā ortū habuiſſe uidetur, q̄ nō ſolum hominibus ueſtram regionē habitantibus, ſed etiā multis Græcis uobis uicinis cognitus ſum. Iam uero qua de cauſa tantū negocium opere peragendum adſumpſi, referam. Athenienſes male habebūt, o uiri Theſſali, qui Metropolim ac patriā noſtram Co deuaſtantes, in ſeruitutē redigunt ea, quæ libera ſunt ex progenitorū adquiſitiōe, priuatim ſibi parta faciētes: neq; cognitionē reueriti, quæ ipſis eſt ab Apolline & Hercule, quæ ſancē ad Aeniū & Sunium filios illorū per

uenit, necq; Herculis malorum domitoris beneficia mente recolunt, quæ ille cõmunis & uobis & nobis bene faciens deus, in illos cõtulit. At uos per louẽ supplicationibus colendum, & per cognatos deos, egredimini, uindicate, liberate, propriæ uirtutis memores, & nihil ad gloriam uestrã spectans intermittentes.

Oratio Legati Theſſali filij Hippocratis, ad Athenienſes.

Conuenire arbitror uiri Athenienſes, conſtitutum apud uos, qui nõ omni multitudini cognitus eſt, primũ indicare quis ſit, & unde ſit: poſtea uero reliquã orationẽ perſequi. Mihi equidẽ pater eſt Hippocrates: qui quantam in medicina facultatẽ habeat, uos nouiſtis. Nomẽ autẽ eſt Theſſalus. Cognitus uero & ego ſum nõ in poſtremis, necq; paucis ueſtrum. Patria uero mihi eſt Coſ: quẽ quomodo uobis cognata ſit ab antiquo, aliĩ dicũt, qui in recẽſenda hiſtoria ſunt præſtãtiores. Veni autẽ miſſus à patre, quatuor beneficia à nobis in uos collata prolaturus. **Primũ** quidẽ uetus quoddã, tẽpore progenitorũ noſtrorũ, cõmune in omnes Amphictyonas, quorũ uos nõ minima pars eſtis. Alterũ uero illo adhuc maius, & ad plurimos Græcorũ progreſſum. Atq; hæc quidẽ urbis & progenitorũ meorũ eſſe apparebũt. Tertium autẽ patris propriũ eſt, et tantũ, quantum nemo unus uir, & uobis & multis Græcis cõtulit. Poſtremum uero ex quatuor cõmune eſt patris & meũ, & quod nõ ad plures, ſed ad uos ipſos peruenit. Quod quidẽ priorũ beneficiorum cõparatione exiguũ uideri poterit: uerum ad aliorũ beneficia collatũ, magnum eſt. Et fanẽ huiusmodi beneficia ſic ſe habẽt, quemadmodũ eſſe dixi, ut ſummatim dicã. Oportet autẽ non ſolũ dicere, ſed etiã demonſtrare q̃ uera ſunt. Principiũ igitur ſermonis, ipſum miniſteriorum noſtrorũ principiũ faciam. Vetusſiſſima uero primũ referã: in quibus fortaiſis longiora ac altius repetita me dicere deprehẽderitis. At quiſq; uetus dici expetit. Erat enim tẽpus quãdo Criſæa gẽs erat, & habitabat quidẽ circa pythiũ templũ: terram uero habebat, quæ fanẽ nũc Apollini cõſecrata eſt. Appellatur autẽ Criſæus quidẽ campus, iuxta quẽ Locri habitãt, & cui Meſæna adſunt: Cirrhæus uero mons, cui Phocẽſes adiacent. Hi porrõ Criſæi cũ eſſent aliquando populofi, & fortes, & opulẽti, hiſ bonis ad malũ uſi ſunt. Per inſolentiã em̃ multa horrẽda ac iniqua facta perpetrarũt, in deum impietatem exercẽtes, Delphos in ſeruitutẽ redigentes, uicinos deprædãtes, agricolas ſpoliantes, uxores ac liberos abducẽtes, & corpora ipſorũ conſtuprantes. Qua de cauſa Amphictyones ira cõmoti, & exercitu in terrã ipſorũ inducto, & ipſis pugna deuictis, regionẽ deuaſtarũt, & urbes expugnarũt. Vbi fanẽ illi, qui multa & impia perpetrarũt, miſere accepti ſunt, nõ minores pœnas perſoluẽtes, q̃ ipſi alijs intulerãt. Feliciffimi uero ex ipſis fuerũt, qui intra manus hoſtiũ perierũt. Secũdo loco, qui manu capti ſunt, & qui ad aliã regionẽ ac urbes tranſiuerũt. Sua em̃ mala ob oculos non habuerũt. Qui uero ex captiuis iſthic manſerunt, infeliciffimi fuerũt, quicũq; in ſua ipſorũ regione torquebãtur. Nam cũ uxoribus & liberis, agros & urbes igni tradi uidebant. Hiſ uero adhuc peius degebant hi, qui intra mœnia perſeuerabant, quãdo relata mala partim uidebãt, partim percũctabantur, plura ueris audiẽtes. Sic enim fieri ſolet. Et fanẽ malã ſalutis ſpem habebãt. Erat autẽ ipſis urbs prope hunc locũ maxima, ubi nũc certamen equeſtre peragitur: cuius muros exſtruxerãt, & eos qui ex alijs urbibus tranſfugerant, exceperãt

rant. Inutilia uero eiecerāt, & necessaria importauerāt. Et cogitabant obsidionē sustinere, bona spe praediti, neq; manuū pugna, neq; lōgi tēporis obsidione, urbem capi posse. At uero Amphictyones, tū alia deuastrarūt, tum ad hanc urbem praesidio cōstructo, & ad expugnationē praeparato, reliquū exercitū per urbes dimiserūt. Temporis autē progressu, cū pestis in exercitū illa lapsa esset, & milites aegrotarēt: quidam uero etiā morentur: alij uero, propter morbū, praesidium reliquissent: Amphictyones turbabātur. Et alij alia cōsultabant. Solet autē in rebus cōmunibus sic ferē fieri. Tandē uero ad afflictionē moleste ferentes, & de bello desperātes, deo rem commiserunt: & quid facere oporteret, interrogarūt. Ille uero bellū gerere iussit, & uictores fore promittebat, si ad Co profectū, cerui filii in auxiliū adducerēt, cū auro: atq; hoc festinabūdi, ut ne Crisei prius in adyto tripodem depredarentur. Sin minus, urbē capi non posse. Ipsi uero, his auditis, & ad Co profecti, oraculū proposuerunt. Cum autē Coi dubitarent, & oraculum nō intelligerent: surrexit uir genere quidē Asclepiades, progenitor autē noster, Medicus uero Graecorū eius temporis omnium confelsione optimus: nomen autē ipsi erat Nebrus: qui oraculū dicere inquit, ut ad seipsum uenirent. Nam deus, inquit, admonuit uos, ut profectū ad Co, cerui filii in auxiliū adducatis. Cos equidē haec est. Ceruorum autē filij Nebri appellantur, hoc est hiniuli. Nebrus autē est mihi nomē. Quod uero aliud auxiliū potius cōtigerit exercitui aegrotanti, q̄ medicus? Et profecto nō uidetur mihi id cōsequens esse, q̄ in tantum diuitijs Graecos omnes superantes, deus ad Co proficisci iusserit, & aurū numisma petere. Verum hoc oraculū in meam domū progreditur. Chryfos enim, hoc est aurū, uocatur masculus meus filius natu minimus. Est autē omnino & corporis specie, & animi uirtute, quantū patri dicere licet, inter omnes ciues praecellens. Ego quidē igitur, nisi uobis aliud uideatur, & ipse proficiscar, & filium meū adducam, naue quā quinquaginta remis agatur instructa meis sumptibus & ministris medicis ac bellicis referta, quo in utraq; parte auxiliū feramus. Et hic quidem dixit: illi uero approbauerūt, qui missi fuerunt. At Nebrus hic etiā uirum Calydoniū apud se educatū, in nauē adsumpsit: de quo statim, ubi res tulerit, dicemus. Cū igitur peruenissent hi uiri ad castra, deus gaudebat. Nam & mortes militū cessabāt, & cū diuina fortuna equus Eurylochi (qui belli dux erat, Thesalus genere, & ex Heraclidis ortū ducēs) canale, per quem aqua in urbē ducebatur, ungula percussisset, ubi in puluere uolitari uoluisset: Nebrus aquā medicamētis infecit, unde uētres Crisaeorū corrupti sunt: & sanē multū contulit ad hoc ut ciuitas caperetur. Atq; hinc iam animi obsidentū elati sunt, uelut deo iā manifeste auxiliū ferētē. Cū autē impetus facerēt, & praemia proponerēt his qui primi muros cōscendissent: certamē erat fortissimū, et urbs capiebatur. Primus enī muros cōscendit Chrysus, & turrim occupauit. Sequēbatur autē ipsum euestigio uir ille Calydonius, sub cōmuni scuto auxiliū ferens, de quo antea dixi. Et Chrysus quidē hasta percussus cecidit ex summa turri: percussus est autē à Mermodē Lyci fratre, qui lapidib; obrutus mortuus est, cū in adyto irrupisset tripodē deprēdaturus. Hi igitur ciuitatē sic ceperunt: & Nebri auxiliū cū Chryso, & secundū medicā, & secundū bellicā facultatē recte successerunt: et deus uera dixit, & quā promiserat fecit. Qua de causa Amphictyones Apollini quidē templū cōsecrarūt, quod nūc est in Delphis: & certamē gymnicū

ac equestre prius nō peragētes, nūc peragūt: & Chriſæorū regionē uniuersam dicarunt deo cōtributori, reddentes ea quæ dedit in eo q̄poraculū dedit. Et Nebri filiū Chrysum in circo equestri sepelierūt: & Delphis publice ipsi parentare præceperūt. Asclepiadis uero in Co attributa est prudētia uaticinādi, quemadmodū his qui mittūtur ex urbibus ad sacrū Amphictyonū conciliū: atq; hoc Nebri gratia. Calydonijs autē ab illo uiro & illo ministerio, etiā nūc in Delphis primæ uaticinandi partes, & alimēta dantur. Verū redeo ad nostra. Nam quod uera dico, hinc clarū est. Cū em̄ pater & ego accessissemus, Amphictyones hæc renouarūt, & attribuerunt, & in colūna descripta in Delphis dedicauerūt. Atq; huius quidē sermonis finis clare ostendit, nostros progenitores esse uestros benefactores. Cæterū hoc relicto, aliū de iisdem, nō eundem sermonē, adsumam. Cū enim magnus ille rex cū Persis & alijs Barbaris bellū gereret contra Græcos, qui aquam & terram nō dedissent: patria nostra maluit in totū pessundari, ut ne contra uos, & eos qui uobiscum sentirent, hostilia arma fumeret, & in nauibus militare expeditionem mitteret. Sed abnuuit, honestū quid & dignum patribus meditata, qui Gigantes & Heraclidę esse dicūtur. Visum igitur est ipsis, cū quatuor essent muri in insula, omnes relinquere, & ad mōtes cōfugere, & salutē tutari. Vnde sanē quid nō mali obuenit: dū regio fuit deuastata, & corpora libera mācipata, & hostili lege occisa, & urbs & alia munimēta, ac templa, ad fauillā exusta. Insuper autē & filiæ Lygdamis Artemisæ, circa patrū uictoriā datum est, omnia quæ reliqua essent expiscari ac exportare. Atenim, uelut apparatus, à dijs nō sumus neglecti: uerū tēpestatibus ingētibus exortis, & naues Artemisæ omnes in periculo fuerūt, & multæ perierūt: et in exercitū ipsius multa fulmina inciderūt, quū insula nostra paucis fulminib; impeteretur. Dicitur etiā spectra Heroum mulieri cōspecta esse. Quorum sanē omniū timore perterrefacta, ab immedicabilibus coeptis destitit, amara confensione facta, quæ & relatu amara est. Quare omittatur. Attribuam autē & hic progenitorib; meis proprijs: si me minime falsa, q̄ neq; cōtra uos, neq; cōtra Lacedæmonios, aliosq; Græcorum socios, Coi uolūtaria arma sumpserint: & quidē quum multi tum insulas, tum Asiam habitātes, cum Barbaris in bello cōiuncti fuerint, nulla uiolentia coacti. Equidē præfecti urbis tūc fuerūt Cadmus & Hippolochus. Verū autē est, & Cadmum & Hippolochū meos progenitores esse. Nam Cadmus, qui & Senatum regebat, matris meæ progenitor est: Hippolochus uero ex Asclepiadis, quartus à Nembro, cuius auxilio Crisæi sunt deuastati. Nos autē ex uirili genere Asclepiadæ sumus. Quare & hoc bonū à progenitoribus nostris profectū amplectimini. Redeo ad Cadmū. Hic sanē uir adeo cōmodi Græcorum studiosus fuit, ut cū regio ab Artemisæ obsidione liberata esset, isthic relicta uxore ac sobole, abiuerit cū his qui eadē sentirent in Siciliā, quo Gelonē & fratres eius prohiberet, ne amicitia cū Barbaris cōtraherent cōtra Græcos. Perpetrauit & alia multa egregia facta, quæ lōgius producere nō est tempestiuū. Atq; hæc quidē & huiusmodi multa sunt publica progenitorū nostrorū in uos & alios Græcos beneficia. Nam deficit me dicēdi facultas. Venio autē iam ad hoc, ut beneficium Hippocratis patris mei apud eos, qui id sciunt, producam: quod hoc modo recensens, uera dicere cognoscar. Cū pestis ex Barbaria adflueret, quæ supra Illyrios ac Pæonas sita est, & cū malū in hanc regionē uenisset: harū gentiū Reges ad

ad famā medicā, quā uera erat, & undiquaq; processerat, & ad patrē meū, nunciōs miserunt in Thessaliā (illuc enim pater meus & prius, & nunc domū habet) uocantes ipsum ad auxilium ferendū. Et non solum argētum, & aurum, & alias opes se missuros esse receperūt: sed etiā reportaturū esse quācūq; ipse uellet, si auxiliū tulisset. Ipse uero cū interrogasset quales morus partiales fierēt, & ætus, ac uētos, et caligines percruatus, itēq; alia quā habitus ex præsentī statu cōmouere solent: cū sanē omnia didicisset, illos quidē retro dīcedere iussit, & nullā sibi facultatē esse ad illorum regionē proficiscendi, pronunciauit. Verū ipse q̄ citissime Thessaliā denūciare studuit, quibus modis malū accedens cauerent: & medelam conscriptā per urbes proponebar. Me uero in Macedoniā demisit. Cū regibus enim Heraclidarū, qui isthuc imperiū obtinēt, paterna nobis intercedit amicitia. Et ego quidē ibam à Thessaliā eo, quo me pater iussit, auxiliū his qui isthuc essent laturus. Iniunxit autē mihi ut etiā urbi uestræ opem ferrem. At fratrē meum Draconē ex Pagasis profectum, in Hellepontū nauigare iussit, cōsimili cōsilio instructū, quali etiā ipse utebatur. Nō enim omnes loci eadem auxilia ferūt, eo q̄ non omnis ambiens nos aer similis est. Polybium uero, qui filiam ipsius, meam autē sororē habet, & alios discipulos, ad alios aliorū cōuentus & uias profecturos emisit, quo q̄ plurimis opitularetur. Postquā autē ipse res in Thessaliā perfecit, ad uicinas gētes auxiliū laturus proficiscebatur, et ad pylas profectus, Doriensibus, & alijs, simulq; Phocensibus auxiliū tulit. Et cum sanē ad Delphos peruenisset, supplicationē deo pro Græcis fecit: & sacrificio factō, iter ad Boetos arripuit. Et cū ipsis opem tulisset, similiter ad uos profectus est, & sufficientia uobis ad salutē, quā sanē nūc ego produco, ex animo penitus dixit. Arbitror autem multos uestrū nosse, q̄ uera dico. Non enim ita diu est, sed nonus hic est annus, quando abui, & in Peloponēsum missus sum, isthuc habitātibus opem laturus. At uero undiquaq; nobis, & uerbis, & re ipsa, dignus honor cōtigat, ut minime pœniteat nos, q̄ nō hunc cū quæstu ex Illyricis ac Pæonijs oblato permutauimus. Verū præ reliquis ciuitatibus magna sunt quā à uobis data sunt. Nā & res pub. uestra alias excedit. Athenæ enim alitius quiddā sunt alijs urbibus, quātum ad gloriā attinet. Et corona illa antea in uestro theatro patri imposita, ad summā æmulationem ac felicitatē ipsum euexit. Sed & hoc beneficiū superastis, dum & patrē, & me publice Cereris & Proserpinæ mysterijs ac sacris initiastis. Atq; hæc quidē tria sunt beneficia, quantū ego uerbis cōsequi potui, et fracta uoce proferre, urbis, et progenitorū, et patris mei, in uos simulq; multos græcos. Quartū nūc dicere aggrediar, quod, uelut antea dixi, in uos ego et pater meus collocauimus. Cū em̄ Alcibiadē emitteretis in Siciliā, multa quidē porētia, nō aut ita multa, uelut admirāda: & sermo in cōcio ne incidisset de Medico, quē exercitū sequi oporteret: pater meus progressus, me ad curāda corpora uestra se daturū esse promisit, proprijs sumptibus instructū, & citra mercedis exactionē, q̄ diu classis abesset, parumpēdens suā utilitatē, ut qui sibi persuasisset, hoc in uestrū cōmodū cessurū esse. Ego em̄ non solū res meas in sumebā, id quod faciebā uobis inferuētis: sed etiā ad alia magna opera destinatus fui. Et hoc minimū est ex his, quā sum dicturus. Decreuit em̄ pater ob me filiū fortunæ fluctibus agitari, & in terra aliena, & in mari, & in periculis bellicis, & in ægritudinibus, quā his qui erroneā uitā degūt, magis accedere solēt, quam

perfecto me dies longius narrantem, si recensere uelim quot hominibus quāta bona obuenerint, qui nihil de uobis bene meriti fuerunt. Circumspicite uos ipsos, & me nullo dicente, considerate qualia perpetretis. Mala res est potestas, dicitur uiri Atheniensis. Non enim quæ sua sunt, mensura disponere nouit. Sed & urbes quasdam & gentes iam perdidit. Si uero ad alios uelut in speculū respexeritis, uideritis ipsi quæ facitis, & ego uera dico. Quin & lex noua est: Quicumque felici rerum successu confusus, non etiam ad rerum difficultates respicit: Non est hoc uestrum uiri Athenienses. Multū enim etiam sic Deū tentaretis. Nullam uobis iniuriam intulimus. Si uero etiā intulimus: nō armis, sed uerbis iudicemur. Deprecamur autē uos etiam hoc, ut ne faciatis nos alijs gratiā debere, qui nobis auxiliū ferēt. auxiliū enim nobis ferent, si recte fecerint, et qui intra Thessaliā, Argos, Lacedæmona, Macedoniā, sunt reges, & sicubi alij Heraclidæ, aut Heraclidarum cognati habitant. Præstat citra uiolentiā, quæ ui coactos facere quæ iusta sunt. Non dico de insolenti aduersum uos rebellionē: uerū hoc uobis manifestum facio, quōd multi nostri curam gerunt, aut certe curam habebunt, nisi undique quæ de terra perijt, benignos adhuc esse homines. Ego quidē igitur, exiguae enim mihi sunt ad dicendum uires, utpote qui aliarum rerū studio sim adiectus, hic desinam. Rogo autē uos per hospites nostros, & per eos qui nobis consiliarij esse cōsueuerunt, & per Deos, & Heroas, ac gratias, quæ hominibus ab hominibus contingunt, ut inimicitias quidem uestras aduersum nos deponatis: ad amicitiam uero uos conuertatis. Si enim non in uestra ciuitate hæc cōsequemur: haud scio quo progressi, eorum, quæ cupimus compotes siemus.

HIPPOCRATIS COI OPERVM QVAE AD
nos extant omnium finis, Iano Cornario
Medico Physico interprete.



I N D E X

Calidam facultatem in corpore im-	Caliditates corporis	8	Clauicale	90
tentissimum	16		Clauicula fracta duobus modis	627
Caliditatis corporum primis diebus ra-	Causa morbi quomodo cognoscenda	117	Clauicula luxatio	629
tio	Causa morborum eadem	118	Clauicularum natura	82
Calui cur non fiant Estruchi	Causae malorum ex permutatione ui-		Cnestran	346
Caluites unde	etius	14	Coacervata diffusilius curantur didua-	100
Calumitor suam prauam naturam pro-	ibidem		etis	100
dit	Causae morborum considerande	318	Coaditrices habet medicina reliquas	9
Cancro uno suffocati	Causae non spontaneae quoad nobis spon-		artes	644
Cancer non congenitus non ante pas-	tancum	161	Coactionis officium ratio	108
bertatem	Causae quae rite dicuntur	17	Coctura omnia dulcia facit	237
Cancer oculi	Causae Iudoris	191	Codium morbi principium	55
Cancrorum occulorum generatio	sine Causa nihil fit	7	Coditum aeris potentiae medico digno-	11
Cantus unde	Cedrus cretica	297	scende	95
Cantis ex hominis intestina similia	Cedrusum uinum quale	379	Coditum rerum scientia incerta	11
Cantharidum usus	Celeritate medicina morbo praeter	9	Coditum supparatorum	95
Cantharidum uentres	ter	79	in cognatione morborum haerere debet	9
Caprae comitales	Cerebrum in uacuo circulo conclusu-	8	Medicina	5
Caprae Syriae	tor	8	Cognoscibilia tantum que existunt	5
Caprinae carnes flauose	Cerebrum metropolis frigidi ex glia-		Cocendi proli causa quado	316, 318
Capillus defluus medentia	tinofi	56	Coctus multus Venerem excitus	49
Capillorum generatio	Cerebri effecti morbi	80	Coitus quibus commodus	461
Caput calcificientia pharmaca que	Cerebri consusio ex istu	582	Coitus ueluptas unde	40, 87
Caput macrocephalorum formatu quo-	Cor: h i corruptio	569	Coitus uiri magis quam mulieres dele-	41
modo	Cerebri membranae due	89	stantur	54
Caput morbosum	Cerebri repletio dolorosa	218	ex Coitu uno gemelli	68, 70
Caput pregnantis puuiofom	Cerebri utilitas	178	Collatio uetus aggrauat ac sanior	12
Capitis dolor	Cerebro ex aere spiritibus accedit	179	Collectio feminis ubi fiat	87
Capitis dolor ex affectio ex parte a-	Certitudo artis medicinae exacta diffi-		Collectiones tuberculorum impedit	22
toto	cius	14	Colli consideratio	572
Capitis doloris prentiones	Certitudo doctrine Hippocraticae	31	Colli glandulae	79
541	Chirurgiam rite quis aggrediat	23	Collationes fluxus uteri	377
in Capitis dolore urinae quales	Chirurgiam militare oportet	23	Collationum uteri mensura	383
Capitis fluxiones septem	Cholera sicca	508	Colocynthis silyuestris ex eius usus	69
Capitis iuxtae	Cholerae affectiones unde	482	Coloris corporum ratio	171
Capitis glandulae	Chordapsus non ante pubertatem	583	Coloris menstruorum ratio	103
ad Caput pharmacum nigrum	Cibus nutrimentum	118	Colores fluxionu obseruat medicus	100
Carcinoma curatum	Cibi inuicenditas unde	234	Colorum consideratio	560
Carnis bubulae possessus	Cibum eructantes quo curandi	39	Colorum mutatio ex corde	88
Carnis generatio	Cibum quidam tantum semel in die ac-		Colum intestinum	75
Carnis bubulae strabularia exacerbant	cipiant	13	Columella in pudendis	304
508	Cibo familiares praeter morem ingesti-	494	Commissura articularum ratio	656
Carnes porcinae praeae	noxij	494	Comites decet medicum	25
Carnion utilitas	Ciborum facultatum coniectura unde		Comitialis mutatio	520
Carnostitui prodest labor	fit	255	Comitales quibus mutetur	525
Carrhagenense corium	Ciborum iucanditas spectanda	519	Comitales consulesiones	478
Castrinatus	Ciborum mora in uentriculo nocua		Complui sibi uideri quid fit	159
18	234		Compositionis medicamentorum ratio	416, 656
Castris repletio dolorem adfert	Ciborum noxiarum appetentia in a-		Communicatio uenarum	90
ibidem	griis	7	Conceptus mole	336
Castrorum usus	Cibus eadem die non egeri	234	Conceptus falsa spes	559
Castris infertilitas	Cicerum alborum succus	276	Conceptus tempus	65
Casus infertilitas	183		Conceptus uisado que sint	303, 308
Casus non est spontaneus	Circuli rubicundi in tibis	574	Conceptum impedienda	306
ex Casu gibbositas	ex Circumfrentia astra uidere excide-		Conceptum que gestare nequeat	319
Cataplasmata ad uteri fluxus	re quid	158	Conceptio a mensibus purgatis	45
Cataplasmatum ratio	Ciuitatum septentrionalium situs ex		Conceptio quando potissimum fit	319
Catuli finentiam	accidentia	105		
Catullorum usus	Ciuitatum situs uel boni uel mali qui			
Causa uena	104			
Causarum partium generatio	Claritatem uocis obseruat medicus	10		
Causarum partium glandulae	Claudicationis ratio	91		

I N D E X

Digitorum articuli	91	Epigloſidis hederæ filio ſimilis officiu	Febris ardentis generatio	506
Digitorum articulariu repositio	657	Epigloſidis officium	75	(243)
Digitorum & manus offa	81	Equitationis incommoda	114. 115	
Dilatatio omni arti aliena res	678	Errores pariant ſimilitudines	466	
Difcapulis imperitis nihil committenda	26	Errata aſtra uideri in inſomnijs quid		
Difſententia ſoluenda	34	Eruce Tithymalidam	69	(158)
Difſententia ante & retro fietes	576	Erucentes cibum quomodo curadi	39	
Difſortio pedum & manuum inſanum ſcit	99	Eruptionis legrloris ac cutioris nota		
Difſortionum faciei conſideratio	561	Eryſipelas pulmonis	187. 211. 262	
Diana que appellentur	180	Eryſi ueni	399	
Docendi alios ratio	29	Euanthemus	348	
Doctrina dux medicinae	3	Euanthi cur non ſunt calid	48	
Doctrina inſuſ medicinae	24	Euanthi cur ſunt depiles	uident	
Doctrinae medicinae non eſt ſtata neq; certa	100	Euanthi quere non coeant	40	
Doctrinae exercitatio iungenda	625	Euanthi pluriſi ſcytharum	115	
ex doctrina ſapientia	24	Euanthiſimum auiuinus ſcythis no	de-	
Dolere unum nequit	30	cidere	115	
Dolori ex partu quo medendum	328	Europa ab Aſia quantum differat	111	
Dolori ſecundum commoda	272	Europe ac Aſie terminus	111	
Dolores imparib; diebus maximi	235	Europe populorum diuerſitas	111	
Dolores itinere contraſti	507	Excandefcentia utilitas	419	
Dolores noctu uexant	480	Excitationes eſ ſomno turbulente	546	
Dolorum cum febre nota	539	Exercitiorum ratio iuxta tempora	38	
Dolorum curatio	509	Exercitio doctrinae aduigenda	625	
Dolorum ratio	419	Executionum officium ratio	518	
Dolorum ſine febribus conſid.	560	Experimentum menſium	347	
Domus medici in ſita eſſe debeat	21	Experimentum temperamta mulieris		
Dorſum ruptum	214	307. 316. 319		
ad Dorſum pulmo uergit	8	Experimenta fecunditatis	306	
Dorſalis morbus	212	Expianentorum ratio	174	
Duo in mundo	676	Extenſio pernitioſa ad torturam	640	
Duo magni momenti in medicina	21	Extenſionum modi parabiles	656	
Dubij morbi qui ſunt	181	Extenuantia ſerpicus inuſ tumefa-		
Dulce ineſti homini	15	ciunt	102	
Dulce non dulce	162	Externi morbi maſſiſti	8	
Dulcia omnia facit coſtura	108	Externorij qualibus utendum	21	
Duriterum calloſarum concretio	86	Extremarj partiu frigidi. nota	535	
Dyſenteria ante partum ſalubris	486			
Dyſenteria ex denigrationibus	652	F		
Dyſenteria maxime eſtate & uerecine ſtat	33	Facies egroti in morbis acutis		
Dyſenteria conſideratio	553	533		
Dyſenteria inſidio	285	Facies flores habens	579	
Dyſenteriam ſcortatio ſanat	488	Facies diſtorta conſideratio	561	
Dyſenterici affeſio & curatio	468	Facies ornate que profunt	376	
		Facies ſymptomati ſignificatioes	570	
		Facilitas artis	194	
		Facilitas in medico contemnitur	20	
		Facilitas in homine quid	19	
		Facilitas in affeſtione oritur ſi		
		ex Facilitatibus affeſtione oritur ſi		
		Fames occidit aliquando, aliquando ſa-		
		natur	13	
		Fames ſyſtem diernm lethalis	60	
		Famis uis	13	
		Familiaria in ſomno uideri	160	
		Faſtidium ſalubris eſus in egro	7	
		Fauces exulcerate qd preſeſtnt	540	
		Fauciu ſanguine repletarj coſid.	556	
		Fauo ſimile eſt ſemen	82	
		Febris ardens	247	
		Febris ardentis conſtitutio	426	
		Febris ardentis generatio	506	
		Febre ardente laborantium mors	193	
		Febris ſingulians	214	
		Febris tertiana	205	
		Febris tertiana ante ardentem no cito cado		
		re liberantur	17	
		Febris quotidiana unde	36. 399	
		Febris aſtute	247	
		Febris aſtute	248	
		Febris bilioſe	204	
		Febris hyemales	247	
		Febris tertiana	399	
		Febrim affeſtioni modus	519	
		Febrim dies indicatorij	516	
		Febrim generatio & curatio	97	
		Febrim modus ſemiterianus	398	
		Febrim prenotiones	541	
		Febru ſymptomati conſideratio	566	
		Febricitium potiones xxij	227	
		Fel bilem recipit	232	
		Fel Babulum caſſici uterum	103	
		Fellis ſedes	87	
		Femur biſidam	91	
		Femur e coxæ clapium modis quatuor		
		Femoris ad coxæ articu	(642	
		lus intrò clapiu	643	
		Femoris ad coxam intrò luxati repon-		
		ſitio	653	
		Femoris caput extra clapium	645	
		Femoris in anteriorem partem clapi		
		repositio	655	
		Femoris in poſteriorem partem clapi		
		repositio	655	
		Femoris offa	81	
		Fere parua in ſcythis	114	
		Feritas in aſenſu Europæis	116	
		Ferrum quomodo fiat	242	
		Ferramenta uſoria	626	
		Fidem quando amitti medicus	29	
		Figure corporum uarie	19	
		Figure humorum trahentes	19	
		Figure iuſte in omni arte ſeruande		
			626	
		Figure poſitionis corporis iuſte	652	
		Figure uarie ad affeſtiones ſuſcipi-		
		das	20	
		ex Figuris affeſtione oriuntur	19	
		Finis artis ratio	184	
		Fines duo medico propoſiti	678	
		Fiſtula plumbee ſubdito ad uteros	36	
		Fiſtularum nota	583	
		Fiſtuſa ulcera in profundam uera-		
		gunt	22	
		Flatus nota	536	
		Flatuum indicia	582	
		Flauoſa alium ſiſtunt	102	
		Fluxus ex partu	303. 326	
		Fluxus in mulieribus albus	350	
		Fluxus ſanguinis ab articulis	35	
		Fluxus ſanguinis e naribus	568	
		Fluxus		

I N D E X

ixta Habitum corporis idiosyncrasi dieta	Humano viri studiorum unitas	681	Ignis facer uarius	426	
Habitudo medici	20	(37)	Ignis feri collectio	473	
Hemorrhoids nō ante pubertatem	583	Humane uitae fructus	76	Ignominia poena medicinae	3
Hemorrhoidum affectio	447	Humoris summus aulifus	627	Ignominia malum	544
Hemorrhoidum bonum	171. 459	Humoris frequenter excidentis curatio	625	Ignominia in pretio	638
Hemorrhoidum prenotio	547	Humoris repositio curatio	625	Imbres ueri superueniunt	33
Hepar adhaeret septo transuerso	418	Humoris dolentis consideratio	461	ab imbris sanguis augetur ibidem	
Hepar dolores patitur uehementissimos	20	Humerales uene	85.89	Impar numerus uis	420
Hepar pueris cor dicitur	230	Humor diutius in corpore permanens nocuus	234	Imparibus diebus morbi curi iudicantur	235
Hepatis extremitates quinque	82	Humoris plus prodiū accessit ibidem	19	Imperitios thesaurus malus	4
Hepatis structura	75	Humore q̄ figurae maxime trahit	19	Imperitios medicus uitare debet	25
Hepati septum transversum adnatū	85	Humores purgatur quatuor locis	233	Imperio nullius subest fortuna	102
ab Hepate morbus regius et hydrops	(412)	Humorum finis quatuor	228	Impetigines quid extrahat	376
Hepaticus morbus 272	273	Humorum in homine distinctae species et nomina	31	Impij dum neciunt	173
Hepaticus morbus secundus	273	Humorum mutatio	20	In cogniti morbi curatio	99
Hepaticus morbus tertius	274	Humorum species quatuor	40	Indicam medicamentum	375
Hepatici	580	Humidum ipsum quid in seipso non inuenitur	16	Indicam oculorum pharmacum piper	346
Hepatitis uena	84.192	Humidum est calidum	57	Indicum Persis piper	381
Hepatitis uena distributio	418	Humidi alimentis uis	103	Indocilius fortuatae affeque potest nihil	102
Herba in farina	468	ab Humido prouenit generata	39	Industria labore paratur	29
Herba montana	678	Humida alium subducunt	102	Industria medicinae dux	3
Herbarum loci commodi	ibidem	Humiditatem Scythae sibi excusationibus corporum detrahunt	114	Inedia aliquando iurat	6
Herculeus morbus	314	Humidarum partium glandulae	78	Inedia imperate transgressa signa	551
Heredicus morbus	459	Hydrops circa uentriculum solū	244	Infectus masculos Amazonides eluxit	644
Hilaritas nimis medicū onerosum red dit	21	Hydrops in utero	330	Infirmum uisus	38
Hippocrates quid	113.238	Hydrops testium	552	Inflati uteri	301.304
Hippocrates ignorantiam suam confite tur	418	Hydrops consideratio	92.107	Inflata ad uteros	297
Hippocratis praedictiones quales	549	Hydrops generatio	513	Infirmorum ratio	38
Hippocratis sententia de uarijs praedi cationibus	549	Hydrops liberatio	244	Inguinum glandulae	78
Hippocratis somnium	677	Hydropsis species tres	508	Inoculationis ratio	52
Hippocrati peplum quid	510	Hydropis natura et aetate	510	Insania megrum morbum soluit	512
Hippocratis doctrinae certitudo	31	Hyemis perpetua cytherarum	114	Insaniae causa	178
Holoconitis radix	342	Hyems sicca ac borealis uer quale si gnificat	109	Insanire facit Mandragora radix	99
Homo absq̄ congenitis uiscere neq̄t	33	Hyems pluuiosa et australis uer quale indicat	110	Insomnia diurnis aetionibus	157
Homo ad annum comparatur ibidem	32	Hyeme lotus frigida magis calefit in diuis	16	Insomnia sanitate significantia	159
Homo cor unum esse putatus	30	Hyeme pars terrae inferna cur calida	32	Insomniorum ac somniorum differen tia significationes	157 q̄ inde
Homo non est unum	18	Hyemalis morbus solui estis	203	Instituto egregia dux medicinae	3
Homo generatio par uolucris	111	Hyopoglossus	203	Instrumentum coelestium	654
Hominis natura secundū regionē	52	Idiotarum dieta iuxta tempora	37	Instrumenti coelestis fabrica	639
Hominis plantarumq̄ eade natura	52	Idonea in omni arte sequenda	653	Instrumento deficiente multae artes que sciunt	9
Horae legendi et retlegendi animaduer tendae	21	Ignis generatio	57	Instrumentum sua habet natura	7
Horror quid sit	191	Ignis extrema medicina	532	Instrumentum suffusum	316
Humanum corpus quot ossa habeat	82	Ignis in medicina quid	7.8	Instrumentorum peritoria medico detri mentosa	25
		Ignis facer	529	Instrumentorum sectionis ratio	211
		Ignis facer in uteris	373	Intemperantia mortis causa	7
				Intempertitas	182
				Interni morbi obsecrari	8
				Interpretationis somniorum certitudo	157
				Intestinum colium	75
				Intestina hominis uelut canis	82.460
				Intestinum	

I N D E X

Intestinorum glandule	79	Leuis quandoq; noxiis	641	Mandragoræ radix tristes sanat	99
Intestinorum leuitas	528, 581	Leuitas intestinorum	581	Manus articali	91
Intestinorum leuitatis consideratio	558	Leuitatis intestinorum consideratio	558	Manus ex digitorum ossa	81
Intestinorum humiditas	79	Lex omnia corroborat	39	Manus ex pedum tortura curatio	99
Inuenio ars	5	Lex species rerum non sanxit	5	Manuum lato	534
Inuidia à ratione aliena	28	Liber Medicamentarius	248	Manifesti morbi qui	8
Inuidatio ne terre uidere in somnis	159	Libri Democriti	684	Mare turbatum uidere	159
Inuile nihil neq; in arte medica neque in medicis	6	Lien durescit ex augeatur humore	19	Marinus mulcus	328
Intere effectiones	461	Lien figura spongiformis	19	Maritimus locus an salubris	30
Intere contracti dolores quomodo curantur	507	Lienis structura	75	Mesulini conceptus ratio	41
Indicium inest medicine	24	Lienosus prægnans	321	Mater decorum	173
Indicium de scriptis rectum magna artem pars	514	Lienteria	251	Materijs multis ex uarijs uarie artes constant	9
Indicatio morbi quid	30	Ligamenta articularum que	8	Maxillam superiorem non moueri	631
Indicatio sine signo mala est	416	Lingua peripneumoniarum qualis	470, 473	Maxille luxatio	631
à indicatione relicta	416	Lingue affectiones	571	Maxille repositio	631
Indicationes unde fiat	517	Lingue indicia in peripneumonia	571	Maxille uenas habent	58
Indicata non mouenda	518	Lingue notæ in picuritiide	577	Maxilla uim dulci non subacta qualis sit	273
Indicatoriorum dicitur ratio	519	Lingue obscuritas unde	29	Mæze inuentio	11
Inguilatis sanguis quomodo ex qualis profluit	32	Lingue signa	516	Mecus albus est preplus	299, 354
Insum esse decreti medicum	21	Lippitantis generatio	80	ex 510	
Inuenilis ætas quartanis obnoxia	36	Locus fluxus aptus dux medicine	3	Medicina à contrarijs	118
		Loci in libris Hippocratis declarati	685, 686	Medicina arti exercitadi corpora contraria	99
				Medicina artium præclarissima	3
L		Locorum mutatio	461	Medicina cum sapientia copulata	24
Laborum signa	534	Loci corporis consideranda	555	Medicina cur male audiat	6
Labor prodest carnostati	645	Lunorum effectiones	574	Medicina deo adscripta cur	15
Labor quid efficiat	237	Lunatici lati generatio	241	Medicina deo reuerenter habet	25
Labor sanat nonnumquam	6	Lunatici per os excentes	236, 335	Medic. diaceticæ cur non puerior ars	12
Laboris fortis studium subterfugendum	30	Lux egrotantibus insidit	21	Medicina est secundum naturam	118
Lac pueris calculum generat	109	Luxationes quibus faciles uel difficiles	624	Medicina fortia nihil moratur	102
Lac quibus conuenit, quibus non	527	Luxationum circa coxas ratio	644	Medicina morbo celeritate præuolat	9
Lactis ac mammæ ratio	81			Medicina necessario inuenta	11
Lactis generatio	48, 337	M		Medicina nec simplex nec facilis	13
Lactis usus	532	Macrocephali	112	Medicina nisi uentes nihil deuitant	12
Lactis extinctio quomodo medendum	305, 327	Macrocephalorum forma ibid.		Medicina propter quid	7
Lactis curæ Pythocles	482	Macule solares quomodo tollantur	376	Medicina quomodo inuenta ex cur	12
Lachrymæ in fibre quale signu	524	Mæotis palus	113	Medicina rationes habet auxiliares	10
Lacrime uides afficiuntur mutationibus	105	Magnanimi Europæi cur	116	Medicina uaticinationi cognata	677
Lactis affectiones	461	Malicorij decoctum	468	Medicine antiquitas	11
Lactis humectatum usus	106	Mali ex boni obseruatio artem consti- tuit	10	Medicine contemptus unde	3, 684
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583	Mala ad aliquid dici	162	Medicine definitio	5, 118
Lactis in atero	448	Mala ex mensuris retentis	45	Medicine doctrina neque stata neque certa	100
Lactis quid	67	Malorum signorum summa	538	Medicine eadiorum inuentu referenda cui	12
Lactis lauationem requirit	97	Malleoli articuli quomodo reponantur	657	Medicine ad uaticinatione similitudo	
Lactis dolor	545	circæ Malleoli luxationis ratio	644		
Lactis dolorem calefactoria	492	Malleolorum articali	91	Medicine insunt omnia que ad sapien- tiam requiruntur	24
Lactis uires	507	Mammæ figure spongiformes	19	Medicine exacta certitudo diffic.	14
Lactis uires in usu	ibidem	Mammæ glandule peccoris	81	Medicine pena unica ignominia	3
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583	Mammæ ac lactis ratio	ibidem	Medicine certitudo	11
Lactis in atero	448	Mammæ ac testium cõmonio	419	Medicine principium	25
Lactis quid	67	Mammis asperis quomodo medendum	375	Medicine studiu cur sit difficile	1000
Lactis lauationem requirit	97			Medicine uarietas	6
Lactis dolor	545	Mammis maximam partem prudentie in esse	421	Medicinam non constituunt qualitates primæ	14
Lactis dolorem calefactoria	492	Mancorum partus ratio	62		abij.
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. annu non fit	583				
Lactis in atero	448				
Lactis quid	67				
Lactis lauationem requirit	97				
Lactis dolor	545				
Lactis dolorem calefactoria	492				
Lactis uires	507				
Lactis uires in usu	ibidem				
Lactis iusticia post xl. ann					

I N D E X

abfq; Medicina nemine posse sanari	6	Medicamenta ad cieriã purgationẽ	71	Mensuram mensura iusta	319
Medicus ab obsecris morbis unicus laudat	9	Medicamenta caput purgantia	93	Mensibus cieriã que septa	303-304
Medicus amittit temporis rationẽ in primis habere debet	104	Medicamenta emollientia	71	ex Mensibus suppressis tabes	553
Medicus deo equalis	24	Medic. fortis quando non danda	101	Mensura iuniorum & seniorum differentia	103
Medicus est natura	461	Medicamenta noxia	503	Mensuram tempus	65
Medicus est Philoponus	24	Medicamenta purgantia dicitur imparia	236	Mensuram virginum ratio	40
Medicus gubernatori similis	13	Medicamenta purgantia quando non danda	500	Mens hominis ubi sedem habeat	77
Medicus in principio morbi accersendus	9	Medicamenta subtilitã ad purgandum uterum	71	Mentis motus	27
Medicus multum verum perius sit	625	Medicamenta transmutant	101	Mentis oculus superat que oculos coram	9
Medicus qui laudandus	73	Medicamentorum componendorum ratio	446	Mentis sedes in sinistro cordis ventriculo	77
Medicus quõs sit inculpabilis	247	Medicamen. exhibendorum ratio	101	Mentem quiescere non patitur tempestivam mutationes	112
Medici animus modestus sit	20	Medicamentorum purgantium ratio	32	Mente corporis; sanus esse debet mens dicitur	7
Medici habitudo	ibidem	Medicamentorum purgantium usus	522	Mercimonij alienitas in medicina	24
Medici iustitia	21	Medicamentorum purgantium usus	242	Meridionalium civitatum situs	105
Medici ratiocinatio alteri nunquam insidere potest	28	Medicamentorum purgantium usus	248	Mesocolon quid	82
Medici utilitas	20	Medicamentorum purgantium usus	462	Methodus artificialis	107
Medico cum imperitis non multum solumandum	25	Medicamentorum purgantium usus	6	Methodus naturalis	492
Medico fines duo propositi	678	Medicamentorum purgantium usus	498	Modestia decet medicum	20
Medico non imputandus si morbus tardius agnoscat	9	Medicamentorum purgantium usus	678	Mola que ex patella	91
Medico observanda que	167	Medicamentorum purgantium usus	337	Mole conceptus	336-394
Medico que circa egrum primam facienda	503	Medicamentorum purgantium usus	562	Molestie animi et corporis unde	169
Medico que cognoscenda	19-685	Medicamentorum purgantium usus	30	Montanae herbe aquosioribus pressat	678
Medico quid faciendum natura demonstrat	10	Medicamentorum purgantium usus	54	Montani maiora corpora gignit	116
Medico subtilitã in aere nosse quam necessarium	55	Medicamentorum purgantium usus	583	Monstruosus puer	445
Medicam aliquem sanari posse	6	Medicamentorum purgantium usus	498	Morbis factibus in utero accidit	175
Medicum que scire oporteat	34	Medicamentorum purgantium usus	678	Morbis Herculeus	314
Medico comitis insit	25	Medicamentorum purgantium usus	337	Morbis hereditarius sacer morbus	174
Medici boni quales sint	7	Medicamentorum purgantium usus	56	Morbis regius	221-518-582
Medici cur tardius & contatius morbos aggrediuntur	10	Medicamentorum purgantium usus	314	Morbis sacer puerorum	105
Medici differunt	10	Medicamentorum purgantium usus	103	Morbis antiqui recentioribus difficultas curantur	99
Medici finis multi, re pauci	3	Medicamentorum purgantium usus	337	Morbis causa quõ cognoscenda	118
Medici ignari	684	Medicamentorum purgantium usus	445	Morbis sacri consideratio	554
Medici personati	3	Medicamentorum purgantium usus	64	Morbis sacri multi	172
Medici potentes qui	8	Medicamentorum purgantium usus	315	Morbis sacri species varie iuxta varios decos	173
Medici veri qui	4	Medicamentorum purgantium usus	313	Morbis sacri superstitiosa curatio	172
Medici vulgo infamantes	637	Medicamentorum purgantium usus	396	Morbis celeritate medicina preæulet	173
Medicorum ignorantia	19-643	Medicamentorum purgantium usus	320	Morbis sacrum non diuinit esse	173
Medicorum opiniones falsæ de homine	30	Medicamentorum purgantium usus	102	Morbis conmatriti	461
Medicorum ratiocinatio	9	Medicamentorum purgantium usus	386	Morbis magno liberat quartana	462
Medica officina quõ instrueda	20-25	Medicamentorum purgantium usus	103	Morbis morbo succedere, letale	250
Medicine artis principium quod	89	Medicamentorum purgantium usus	310	Morbis tardius agnosceret non medicum	9
Medice professionis propria	25	Medicamentorum purgantium usus	387	Morbis a cerebro	39
Medicamentum ad mensis utrumque cieriã	72	Medicamentorum purgantium usus	315	Morbis acuti incerti	419
Medicamentum ex sale	321	Medicamentorum purgantium usus	68	Morbis acuti in quibus vari	105
Medicamentum indicum	375	Medicamentorum purgantium usus	347	Morbis affecti cerebri	80
Medicamentum nullum adhibere, medicamentum auri	635	Medicamentorum purgantium usus			
Medicamentum substitutionem	72	Medicamentorum purgantium usus			

I N D E X

Nouimeftris partus utalis	60	Opinionis habitus	677	Partium corporis note	582
Nubecularum consideratio	557	Opjibotonos	515	Partium extrinsecarum frigiditatis nota	
Numerus impar maximè utendus	503	Opjibotoni affectio	476	535	
Numerus ofiū humani corporis	82	Optimum quod fit	20	Partus nouimeftris utalis	60
Numerus uerticularum	90	Orientalium ciuitatū situs & accidentia	106	Partus octimeftris letalis	ibidem
Numeri imparis uis	420	Origanum capitatum	261	Partus pueri ex defectu alimentis	54
Nutritium est triplex	118	Origanum potius noxius	451	Partus septimeftris utalis	60
Nyctalopum consideratio	561	Os ueteri distortum	317	Partus deubilis ratio	478
O		Os ueteri conuulsum	301	Partus masculorum ratio	62
Oblitio malum	544	Os ueteri generatum non suscipiens	369	Partus purgantia non purgata	323
Oblitiosi unde fiant	179	369		324	
Obscuri morbi qui	8	Os ueteri ulceratum	303	Partus purgantia plura	325
Occasio mutationis aduersariorum	493	Oris uentriculi consideratio	472	Partus ratio	53
Occidentalium ciuitatum situs & accidentia	106	Osculum ueteri ad coxā iuglanis	359	Partus septimeftris ratio	61
Ocy defectio	23	Osculum ueteri complicatum	367	Partus auxillaria	66
Ocy ueni morbi labore sanantur	34	Osculum ueteri inflammatum	362	ante Partum dysenteria salubris	485
Ofimeftris partus mortalis	60	Osculo ueteri in uerana preposita	319	Partus que purgationes et cur sequuntur	46
Ofimeftris partus difficultas	62	Os caulium fractum	414	ex Partu que laborant maxime	54
Ofimeftris quere nō uiales	61, 64	Os coxæ	82	Partus difficultas	322
Ofimeftris afflicto	62	Os femoris	81	Partibus uiciorum custodia non committenda	676
Oculus à quibus ledatur	59	Ofis resura ad secundam usq; laminam	201	Patella que & mole	191
Oculi constitutio	ibidem	Ofsa auulsa integrè restitui non possunt	627	Pati & egere propinqua	165
Oculi quom̄ sint teneri	21	Ofsa digitorum & manus	81	Pauperes apud Scythas fecundiores diuitibus, cur	115
Oculorū oriento humore oppletorum curatio	94	Ofsa tibie duo	ibidem	Peccata in morbis non facilia cogniuntur	
Oculorum doloris curatio	529, 531	Ofsa uerticularum	82	Pecora asie	550
Oculorum fluxus unde fiat	43	Ofsium capitis ruptio	582	Pectoris dolor firmatus	574
Oculorum fluxionis causa & curatio	17, 93	Ofsium coactio	644	Pectoris glandule mammae	82
ad Oculorum lachrymas stillamentum	166	Ofsium generatio	56	Pectoris natura	82
Oculorū lippitudinis consideratio	556	Ofsium humani corporis numerus	82	Pectoris uibores	59
Oculorum medela	510	Ofsium morbi obscuri	8	Pedis luxati repositio	658
Oculorum mentis acies	9	Ofsium utilitas	85	Pedisum articuli	92
Oculorum signa	533	ex Oculi latero uolucres	54	Pedisum articuli quō reponendi	657
Oculorum tunice tres	89	Quorum que uicubantur similitudo ad puerum	52	Pedisum frigiditas quā significet	502
Oculorum ulceratorum consid.	557			Pelecani in frumento nascuntur	375
Ocularia medicamenta	384			Pellicula genituræ	44
Odores fluxionū obseruati medicis	10	P alati consideratio	571	Pellicula cordis	77
Officina medica quō instruda	20, 25	Palati inflammatio	203	Pellicularum generatio	58
Officinae medicæ situs	21	Palastres uibes mutationibus afflictiuntur	105	Pellicularū circa fetus diuersarum rationum	44
Oleum amblyum	323	Palpebrarum situs	427	Pellucida flumens cauis	208
Oleum Platensium	339	Palpebrarum signa	533	Peregrinis opitandam medico	28
Olistus ratio	59, 89	Palpitationes manuum	513	Perfrigeratio aque decoctæ	460
Omnia oportet esse medicata	462	Panis bis coctus	271	Peripneumonia	222, 516
Omnia que sunt propter aliquid fiunt	7	Panis boni note	256	Peripneumonia non ante pubertatem	
Opere medicum esse oportet non sermone	24	Panis differentia	15	583	
Operibus aliquando defectus imputandus	8	Panis inuentio	11	Peripneumonia consideratio	577
Opes infelices habent qui imperitiam possident	4	Papule uarie	166	Peripneumoniae curatio	95
Opificam discrimen	10	Partus dictus deorsum prodant que	168	Peripneumoniae generatio	94
Opificibus defectus nonnunquam imputandus	8	Partiendi modus	54	Peripneumonia cum lethargo coniunctio	219
Opinio uitio uertitur	24	Partes terre infernae, estate frigida	51	Peripneumoniae quidam	472
		Partes corporis quedam sunt que celesriter sanguinem emittunt	22	Peripneumonicorum lingua	470
		Partium affectiones iuxta ipsarum figuram	19	Permutati iustus mala	170
		Partium corporis mutus affectio	88	Peplus albus quid	354, 150
				Peplus bubulae carnis	308

I N D E X

Pefsi nigri	306	Pleuritis in libem ac suppurationem	Præoccupatio morbi unde	9
Pefsi felle forms	309	transito	Præfentia & præterita considerat me-	
Pefsi falditij	348	Pleuritis fpecies multæ	ditus	7
Pharifa Pythææ uxor facida, herba	467	Pleuriticus quidam	Præcipere citius parant	53
Phægentæ unde oriuntur	105	Pleuriticorum purgatio	Præcipio ex partu labori maxime	54
Pharmacum corrofiuam	384	Plumbi ad clauiculam fractam diliga-	Præcipium corporis nullum	85
Pharmacum familiariora trahit	32	tio	Præcipium medicine	25
Pharmacum nigrum	384	Pluuiæ aqua in ætrem tranfit	Præcipium morborum fedentium	92
Pharmacum nigrum ad caput	357	Pluue generatio	Præcipium menarum nullum	86
Pharmacum uis nimia perdit	446	Pluuiatum æquum ufus	Præcipia morborum confideranda	251
Pharmaca purgatiua calcifcunt capita	446	Podagræ non esse pubertatem	Præcipij artis ratio	184
Phar. que periculofa	253	Podagricorum confideratio	Præcipij morborum tria	237
Pharmacis fortib. ubi abftinendū	101	Podagricorum refutatio	Præcipij obftitendum	245
Pharmacorum fpecies ex terra uultæ	6	Polema	Præcipij uena arteria	86
Phafis fluius flagrantif.	112	Populus uino fuffocatus ad quid uelis	Profufui alui curatio	39
Philofophus efi medicus	24	303	Profufuorum alui confideratio	558
Philofophorum de natura hominis opi-		Populus nafi	Prolis caufa quando concumbenda	
niones falfe	30	Pomorium efus noxius	316 & 318	
Phrenes græcis unde	179	Porcine carnes præua	Promptitudo medici contemnitur	20
Phrenitides	220	Porci efus quid faciat	Prudentia natoræ quanta	9
Phrenitidis generatio	193	Potentia temporū anni medico fcien-	Prudentiam mammis inffe	420
Phreniticorum prænotiones	642	da	Prurigo corporis	445
Phreniticorum mors	194	ex Potentij affectione oriuntur	Prurigofofarū pufularū medela	477
Phyfici fluidum	393	Potestas res mala	Pufiana integra	214
Pica prægnantium	68	Potus nutrit	Pufiana fcitum à medicamento exibi-	
Pication ceratum ad quid	366.373	Potus humores generat	enda	493
Pili ex corpore quò exirpandi	385	Potus fanis & ægris diuerfus	Pufiane dande fcopus uires ægri funt	
Pili in glandulis	78	Potus uberior fanis aliquando	492	
Pilonum ratio & formatio	47	Potus appetentia	Pudenti notæ	536
Pinguis ut fas quid ægidum	38	Potus temperamentum unde	Pudentia ex ulcere obturata	366
Piper indicū oculoꝝ pharmacū	246	Potus accretum irruente uulsi excita-	ad Pudentia arctia medicamenta	367
Piper pefsi quid	351	tur	Pudentia ulcerata que iouent	303
Pifcium pinguedo que pefsi	261	Potuum tuendum fpectanda	Puer alimentum unde habeat	49
Pituita alba	216	Potuum ratio	Puer monftriofus	445
Pituita augetur byeme & cur	32.33	Potiones frigefactorie xxij. in febrib.	Puer procedit in caput	53
Pituitæ oculis in nobis calor	10	ardentibus	Pueri motus quando	48
Pituita ex capite liquefcens	194	Potiones paratas habere debet medi-	Pueri mortui in utero figna	67
Pituita frigidiſſima	32	cus	Pueri in utero periculi alii uertitur	64
Pituita humoris fpecies	40	Præcordij notæ	Pueri fitus in utero	57
Pituita in utero	375	Prædictiones ante morbi fcitum non	Pueri committales	176
Pituita plena acetabula	329	fuit tæ	Pueri cur non cocant	40
Pituita repleti uteri	329	Præminencia diuina in medicina	Pueris calculum genera lac	109
Pituita fimilis genitura	479	24	Pueris cur quod hepæ	230
Pituita uifcoſiſſima	32	Pregnans biliofa	Pueris mutatio periculofa	65
Pituita defloſcus caufa	177	Prædictiones uariæ	in Pueris que uirina pefsi	471
Pituitofa prægnans	321	32	Pueris mutatio periculofa	65
Pituitofæ mrefes	315	Prædictionibus prudentia adhiben-	da	550
Plante alæ quos gignat	117	da	Puerorum diete ratio	74
Plante ex terra familiariora trahit	33	Pregnantis caput quale	Puerorum exercitium primum	510
Plantarū generatio ex feminibus	49	Pregnantis affectio & curatio	Puerulorum infantium uictus ratio	38
Plantarū hominum; eadē natura	52	Pregnantis cognitio	Puerperæ recens enixa	72
Platemifium oleum	339	Pregnantis menfes	Puerperij purgationum menfura	327
Pliebas	645	Pregnantium affectiones	Pulmonis figura fpongioſis	19
Pleuritis	246	Pregnantium morbi	Pulmo natura frigidus	76
Pleuritis non ante pubertatem	583	Pregnantium note	Pulmo natura ficcus	97
Pleuritis fire pſto	192	67. 583	Pulmo repletus	212
Pleuritidis confideratio	576	Pregnantium figna mala	Pulmo tumens præ calore	220
Pleuritidis curatio	95.492	545	Pulmonis cortex	94.578
Pleuritidis generatio	94.191	Pregnantium pica	Pulmonis alimentum	162
		Pregnantis fuffocatio	Pulmonis Dryſipelas	187
		Pregnantis. menfes prodire malis	Pulmonis generatio	57
		Pregnantis. menfes cur non produca-		
		ant		
		Prenotio Anni falubris aut morboſi		
		109		

I N D E X

Pulmonis hydrops	213	Quartane fitres	399	Rigori ex partu que medentur	304
Pulmonis morbi unde generentur	86	Quatuor acuti morbi	246	Rigores in mulieribus	459
Pulmonis ruptio	210	Quatuor humores	228	Rigores quemodo fiunt	528
Pulmonis structura	75	Quatuor loci purgationis humoru	223	Riphei montes	114
Pulmonis tuberculum	187	Quatuor modi clapsi e coxa semoris	276	Risus Democriti fufiffimus	680
Pulmonis tubercula gibbositatis occa-	636	Quatuor morbi regij	276	Risus infante signum	676
sio	636	Quatuor species humorum	40	Risus medicum anerosum reddit	21
Pulsationes venarum	163	Quatuor uae ulcerum	22	Risus desipere	529
Pulsationes uene temporum	89	Quatuor uenarum paria	84	Robur ex temperamento coingii	15
Puncturaru capitis consideratio	560	Quies sanat aliquando	6	Rubor fluxus medierum	352
Pupillarum affectiones	557	Quies inest medicine	24	Rubores pefforis	579
Purgationi admittede inepi qui	509	Quing. extrimit. aeg. hepatis	82	Rubicundi circuli in tibijs	574
Purgationi uene sectio quando pra-	501	Quing. morbi splenis	274	Ructus acidus	529
mitenda	501			Ructus acidus bonus	413
Purgamenta partus ad laboratem & ca-	326	R Adix ita per se appellata inter		Ructus acidus unde	417
pui	326	simplicia	356	Ruptio pulmonis	210
Purgamenta partus non purgata	323	Radix nigra asphalti ad quid profit	376		
& 324		376		S Acer morbus cur	172
Purgamenta partus pauciora	325	Rafuran frigifacere	218	Sacri morbi presensio	177
Purgatoria mensium	308	Ramorum generatio in arboribus	50	Vide in uoce Morbus	
Purgantia medicamenta quando no-	500	Ranificatio corporis partium	45	ex Sale uomitorium	487
xia	500	Ratio actiones absolut	8	Salsan inest homini	15
Purgantium medicamentorum ratio	32	Ratio alimenti	58	Salsan aquarum qualitas	107
Purgantium medicamentorum usus	522	Ratio artificium producit	24	Salsamentum Gaditanum	271. 274
Purgantia pharmaca capus calfaciunt	58	Ratio exercitorum iuxta tempora	38	Salsue generatio in articularis	58
non Purgari morbi principium	237	Ratio recta semper sequenda	520	Salsuginea calida	102
Purgantium superne & inferne quan-	452. 480	Ratiocinatio in medicina quid	27	Salubris anni prenatio	109
do	187	Ratiocinatio morbi cognoscuntur	9	Saluberrimus annus qui fit	109
Pus diffusum quando	187	Recentes morbi facilius curantur anti-	99	Sanguis a partu qualis esse debet	406
Pus in tunica quando	ibidem	quis	99	Sanguis autumnu paucissimus in bo-	
Puris eruptio ex pulmone	226	Recidua ex no fuisse e iudicatis	435	mine	33
Puris natura	163	Recidua unde fiunt	519	Sanguis ex contrario erumpens ma-	
Puris nota	535	Recordamur que liberetur	11	lum	547
Pustule in utero oculis	382	Rectum & non rectum artem consilia	num	Sanguis humoris species	40
Pustule in fibris. per tota corpus	566	Rectum intestinum	75	Sanguis non est calidus natura	77
Pustularu puriginosaru medela	477	Recti & non recti ratio	132	Sanguis quando non congelatur	57
Putare. ignorantie signum	24	Regio mutat naturam	117	Sanguis redandens alimentum	162
Pytholes medicus	45	Regio pinguis squosa	ibidem	Sanguis sece augetur	33
Pyramidis figura cor	75	Regionum aridarum qualitas	ibidem	Sanguis e naribus fluxus	508
		Regium morbus	516. 522	Sanguinis eruptiois figura signa	47
		Regij morbi curatio	97	Sanguinis filij qui	80
Q Vadragenarij abortus	62	Regij morbi quatuor	276	Sanguinis fluxus ab articularis	352
Quadragenarij numerus	63	sub Regibus uacere homines faci imbel-		Sanguinis fluxum ex naribus soluit ue-	
Quatio anceps de uctu	15	les	113	ne sectio	548
Qualitas eorum que purgantur	517	Res. leio Cerebri dolorosa	218	Sanguinis fluxio e nare estate contin-	
Qualitatum facultates	56	Repositi. humeri curatio	625	git	33
Qualitates prime non constituunt me-	14	Repositio. quibus faciles uel difficie	624	Sanguinis generatio	231
dicinam	14	les	624	Sanguinis grami in utero	301
Qualitates prime no sunt scopus me-	10	Res preciosissima sanitas	39	Sanguinis spuro confrentia	579
dicine	10	Responso frox in moderato	57	Sanguinis sputum de hepate	580
Qualic. secundae primis fortiores	16	Resp. medicina prater ignominia nul-	3	Sanguinis stille male	564
Qualitatu omnia particeps annus	33	lan panam constituerunt	3	Sanguinis stillationes	575
Qualitatum secundarum excessus ho-	15	Reuerentia inest medicine	24	Sanguinis uomitus	559
mitem ledant	15	Rhenan generatio	83	Sanguinis uomitus de pulmone	580
Qualitatum secundarum facultates o-	17	Rhenan generatio	57	Sanguinis uomitus ex partu	327
mnium maioran homini causa	17	Rhenan glandule	79	Sanguinis uomitus sterilibus commo-	
Quartana annua	417. 463	Rhenan structura	75	dus	585
Quartana febris	249	Ricini ulceris	210	Sanguini sistendo	509
Quart. magno morbo liberat	462	Rigoris significaciones	563	Sanus homo temperamento facultat-	
Quartana quando non diuturna	36			tum	34

I N D E X

Sanam ac egrotum ledunt edulia fir- tiora	12	Sententia Hippocratis de varijs prædi- ctiombus	549	Sorborum aqua	568
Sanorum ac egrorū uictus collatio	13	Sermonis facultas unde	59	Sorbitiones non cōducentes morbo in- cremētum prebent	12
Sanitas res præciosissima	39	Serpentis semen	352	Sorbitiones non primis diebus danda 495	
Sanitas unde fit	233	Serpiginosa ulcera que	23	Sorbitionum inuentum	12
Sanitatis exercitium in duobus confi- sit	461	Septem costa uera	90	Sphagittides uena	84
Sanitatis morborum uitæ ac mortis ex dem ratio	63	Septem dierum humana uita	60	Spes conceptus falsa	559
Sapientia ex doctrina	24	Septem quadragenarijs decimestres pa- riuntur	65	Spine concussio	641
Sapientie dentes	58	Septimo anno completio dentium	61	Spine fluxus mala	95
Sapientie medicina copulanda	24	Septenario dierū morbi iudicatur	64	Spine medulle affectæ confid.	556
Sapientie utilitas	23	Septenario nature subiectæ	61	Spine natura	82. 637
Satyrismus	522	Septenarij ætatis humane	58	Spine obliquatio extra	639
Sauræ uiminea textura	657	Septimestris partus ex pelliculis fece- dens	61	Spine obliquatio intrò	640
Sauromatæ ac eorum foemina	113	Septimestris partus uitalis	60	Spinam uenæ omnes petant	86
Scalpro ad scarificadum quò utendum		Septum transuersum	75	Spiritus ad manum	473
Scapula	90	Septū transuersum hepatis adnatū	85	Spiritus delator	10
Scapule natura	82	Sesamoidis usus	509	Spiritus duplicatus	414
Scientia communis ars non est	12	Sex medicinæ duces	3	Spiritus nutrit	118
Scientia imperata facere cogitur	102	Siccum quid ipsam in seipso non inue- nitur	16	Spiritus offendens	311
Scille pesti forma	309	Sicci alimenti uis	163	Spiritus per uulnus	587
Scopus medicinæ qualitates nō sūt	14	Sicca ledunt magis quam humida	12	Spiritus qui retrahitur	545
Scortatio dysenteriam sanat	488	Siccissima maxime resonant	59	Spiritus simplex pro denso positus	94
Scribendi ratio & modus certus	100	Silphium in lonia & Peloponeso non nascitur	229	Spiritus consideratio	572
Scyria capra	327	Silphij uires	508	Spiritus notæ	534
Scythia in Europa	113	Simile ad terram	229	Spiritum habet genitura	43
Scythæ filii	114	Simile artificiosum	231	Spiritū habent calefcentia	43
Scythæ Nomades	113	Similia egregia	239. 310	Spiritus omnes ab aqua	52
Secretionum species superne	167	Similia semper accedunt similib.	46	Spirituosa præcordia	439
Sectio dextrarum partium periculo- sior	226	Similitudo uaticinatiois ad medicinam 490		Spirituosi	509
Sectio & uelocitate & tarditate uti- tur	21	Similitudinis formarum ratio	42	Spirationi umbilicus destimatus	44
Sectio uenæ nociua	582	Simplicium facultates memoria tenere debet medicus	25	Splen aquosus	330
Sectiones multæ tardam chirurgiã uo- lunt	21	Simplicium repositio	678	Splen cauus	232
Secandi ratio	ibidem	Singulus in febre ardente	513	Splen magnus	249
Secandi uenæ ratio	84	Sirium uinum	334	Splen uenosus	232
Secunda angina species	502	Sitis exemptæ mala	585	Splenis constitutio	57
Secunda quando appellatur	45	Sitis medela	39	Splenis magni consideratio	562
Secunda relicta in utero	327	Sitis sanat aliquando non Sitis que faciunt	6 459	Splenis morbi quinq;	274
Secundæ excuntis ratio	66	Smegma ad caput	197	Splenis uenæ	88
Secundæ extractio	67	Solem in somnis uidere quid pati	157	Splenem attenuantia	274
Secundæ hærentes	303	Solitudo scythica	113	Splenici affectio	487
Secundæ morantes quò trahenda	327	Solstitia periculosa	110	Splenes parui	435
Secundarum expulsio	527	Somnus sanat aliquando	6	Splendor quis fugiendus	21
Selle medicorum	21	Somni notæ	536	Spontaneum nobis cause non est spontaneum	161
Semen ex omni corporis parte proce- dere	112	Somni ratio	518	Spontanea que	183
Semen uelut fauus	82	Somnium Hippocratis	677	Spuma in strangulatis	520
Seminis collectio ubi fiat	87	Somnia diuina que	156	Sputi notæ	537
Semine plantarum generatio	49	Somnia uenera	40	Sputa rotunda	463
Semitertiana febris	485	Somniorum ac insomniorum differen- tiæ	157	Squatina pellis	72
Semitertianarum februm modus	398	Somniorū interpretat. certitudo ibid.		Scretatio frequens	571
Semiperfecta absoluere artis est	5	Sophistarum quorundam opinio de me- dico	18	Scripta aliena reprehendendi libido	5
Seniores comitales	176	Soporis consideratio	569	Stadij spatium mutat aerem	106
Seniorum affectiones mitiores	190			Stercus bubulum calfacit uterum	103
Senecta anguis quid	342			Stercoris bubuli forma ad suffitus	298
Sensu corporis uictus modus collig.	13			• & 348	

I N D E X

Sterilitas accidit venis quibusdam inis cibus 115	Suffensio ex scala ad trabem 653	Terriculenta iudere 160
Sterilitatem inducit equitatio 115	Suturae capitis 90	Tertiana fibris 205, 248
Stillationes sanguinis 575	Suturarum lesarum cognitio difficilis 448, 582	Tertiana exquisita 567
Stillamenti usus ad lachrymas oculos non 166	Sydus non paruum apparet in som- nis 437	Tertiana fibres 299
Stomachus usque 314	Syderati qui 219, 578, 581	Tessera leucitula usque 299
Stomachus uteri 66	Syderationum tempus 530	Tessium note 536
Strangulatio uteri 378	Symptomata cerebri 39	Tessium obligatio 70
Strangulatio seu violentiam curatio 99	Symptomatum faciei significationes 570	Tessudis marinae cerebrum 343
Stratum frigidum expositum habere ul- cerat 415	Symptomatum febrium consp. 566	Tessudis marinae hepar 340
Streptus apud egrotos vitandi 26	T	Tessus morbi 397
Strume ab anno quadragesimo non fis- unt 583	Tabes coxendicium 567	Tessitas omnes esse 681
Strumarum generatio 78, 79	Tabes quibus sit 525	Tessitas hepar continet 8
Studium medicinae cur difficile sit 100	Tabes rheumatica 266	Tessitas maxime sensu praeditus 88
Subditum ad purgationes 71	Tabis generatio 80, 94	Tessitas in thoracem fluxus mala 94
Subditum molliens 72	Tabidus morbus 563	Tessitas ossi duo 81
Subitae mutationes vitandae 494	Tabidorum note 580	Tessitas genibus 91
Sublimium locorum aquae optime 107	Tactuurnitas decet medicum 20	Tessitas tibie morbo 484
Subterraneorum rerum scientia ins- certa 11	Talenta decem Hippocrati promissa 678	Tessitas tonsillae 79
Succesus fortuitus 183	Tali subditum nigri qui ex pessi 348	Tessitas tonsillarum ulcera 74
Succesus memorabilem incertus affe- qui nequit 102	Tarditas in unctione laudabilis 21	Tessitas torminum ratio 167
Ultra Successum ratio sequenda 520	Telorum extractio 23	Tessitas torporum capitis consideratio 560
Sulfus pueri in utero 57	Templa diis cur erigantur 174	Tessitas tractio bilis ad folliculum i hepate 230
Sulfus in ventre 444	Temporum dolentium consp. 561	Tessitas tranquillitas in morbo longiudinem significat 30
Sudor humorum calidorum exhalat- io 10	Tempus articulationis 46	Translatio culpae inconsiderata 7
Sudoris cause 191	Tempus dux medicinae 3	Transmutationes uterorum variae 358
Sudoris note 534	Tempus in medicina quid 27	Tremores consiliorum 575
Sudores indicatorum 519	Tempus in medicina quid mine possit 33	Tremores oculorum tunicae 89
Sudores optimi qui 510	Temporis usus 24, 492	Tribus constituntur corpora 465
Sudores qui homines contra 523	Tempora eadem alijs mortis, alijs vitae 64	Troxicae quae sunt 274
Sudorum significationes 512	Tempora naturam mutant 117	Tubercula circa aurem 460
Suffragia ad uteros 70, 298, 377	Tempora vitae, mortis, sanitatis ac mor- borum eadem 63	Tubercula pulmonis 579
Suffragia instrumenta 316	Temporum anni constitutiones 521	Tubercula supra inguena 311
Suffragia uteri 70	Temporum anni ratio habenda me- dico 104	Tubercularum ratio 22
Suffragia ratio pregnantis 322	Temporum cognoscendorum difficul- tas 23	Tubercularum collectiones posse ima- pediri 22
Suffragia carnes quales 508	Temporum mutationes 520	Tumor à fluxu uteri fidato 352
Suffragia uterorum repentina 319	Temporum mutationes mentem inque- sant 112	Tumores vulnerum ac ulcerum 418
Summa repositio omnium 656	Temporum occasiones 182	Tumores uteri ex partu 323
Summa scruan fortissima 15	Temperata hominem non ledunt 15	Tumores inflammatorum note 535
Summa supparationum 538	Temperata omnia meliora in homine praeter frigidum et calidum 18	Tumorum mollium significationes ibidem
Superfationis ratio 66	Tempestatiu notiones ex morbis 171	Tumorum significatio 528
Superfationem rejicit medicina 24	Tenesmus 251	Tussis excitatur potu acerrimum irrita- ente 76
Superfatio morbi sacri curatio 172	Terra similis ventriculo 160	Tussis in resolutionem desinens 442
Supparati ex angina 201, 202	Terra pars infirma hyeme calida cur tem 582	Tussis permutatio 443
Supparati ex ulnere 579	Terra qualitas consideranda 104, 150	V
Supparati quo fiant 94	Terram combusam uidere in somnis sunt 159	Vacatio multa habet mala 13
Supparationum cognitio et note 95	Terram moueri sibi uidere 159	Vacuitas thoracis 8
535, 538	Terram respiciunt terra nascencia 117	Variae uteri affectiones 305
Supparationum curatio 510		Variae medicinae 6
Supparatorum interitiorum note 538		Varix circa tibiam non ante pubertate tem 582
Supparationum sectio ac uestio 529		Varices sanguinis fluxum non facile si- sunt 22
Supparationes ex peripneumonia 578		Vasa usitata ab initio morborum non sunt 495
Supparationum note 535, 538		
Surditatis significatio 543		

I N D E X

Vaticinationi medicina cognata	677	Ventorum morbi	170	Vini albi uinosi vires	497
Vechum ventorum usus	654	Ventorum mutationes	178	Vini fului austeri vires	497
Velocitas in usione laudabilis	21	Ventorum ratio medico cognoscenda	104	Vini odor egrotis grauis	26
Vena caua	89	Ver conceptui aptum	70	Vini ut castigentur	256
Vena ex finitibus	88	Ver post siccam aut pluuiofam hyemem quae	109:110	Vino uo uomitus non sedandus	99
Vena hepaticis	84:192	Veratrum quibus dandum	506	Viri quam mulieres coitu magis delectantur	41
Vena humeralis	85	Veratrum sanis noctuus	685	Viri calidior semina	310
Vena magna	75	Verecundia iuesti medicinae	24	Viro tenior mulier	ibidem
Vena neruus fit	86	Veritatis cultus	677	Viris mutatio periculosa	65
Vena principalis arteria	ibidem	Vermes caruim	339	Virtutum morborum ac mulierum cuius differt	331
Vena sanguifusa	83	Vermes sercorarij	69	Virge sianne ad firmam acus instrumentum	203
Vena secunde ratio quod modus	22:84	Verticis dolentis consideratio	561	Virgo calculosa	306
Vena sectio nociua	582	Verticis extra quod intro non facile expelluntur	638	Virginis menses quomodo ciendi	72
Vena sectio quam longissimum a loco dolenti	84	Verticorum numerus	90	Virginum menstruarum ratio	40
Vena sectio quando purgationi praemittenda	501	Verticorum ossa	82	Vires morborum considerandae	318
Vena sectio soluit naris fluxum	548	Vertiginum consideratio	560	Virium agnoscendarum difficultas	23
Vena usione ratio	99	Vesicae intercepta	546	Viscerum dolor ex labore praecurians quomodo curandus	39
Vena cauae duae	56	Vesicae fluxio morbos quomodo ostendat	10	Visus quam auditus fidem syncrionem facit	10
Vena crassa	84	Vesicae inflammatae nota	539	Visus nutrimentum	89
Vena infaccidus reddentes	90	Vesicae stomachus	314	Visus ratio	59:89
Vena multa in carne	8	Vesicae structura	75	Visum debilem infestat splendor	21
Vena omnes spiritum petunt	86	Vesicam fluxum implent	91	Vita humana septem dierum	60
Vena splenis	88	ad Vesperam exaccubari quid	437	Vita humanae fontes	76
Vena temporum pulsatiles	89	Vespera augeri mala	479	Vita, mortis, sanitatis ac morborum tempora eadem	63
Vena uentris	84	Vesicis medicinae ars non rejicienda	14	Vitiligo non ante pubertatem	583
Venerum communicatio	90	Via gentium in pudendo	40	Vleus aphtha dictum	584
Venerum declaratio	85	Via medicinae certa	11	Vleus callosi cura	99
Venerum distributio de capite	89	Vitius afficit et alterat corpus	14:15	Vleus fungis	209
Venerum generatio	56	Vitius aegris quod sanis ducitur	11	Vleus frimi curatio et generatio	98
Venerum morbiliter	90	Vitius modus ex sensu corporis colligitur	13	Vleus vicini	210
Venerum paria quatuor	34:84	Vitius egrotorum	12	Vleus calida gaudent	165
Venerum principium nullum	85	Vitius Nomadam	113	Vleus carnem superexcrefentia	23
Venerum pulmonis varices	185	Vitius agorum ac saniori collatio	12	Vleus in pudendis	304:383
Venerum pulsationes	163	Vitius consueti mutatio	507	Vleus in utero a partu purgamentis	324
Venerum ratio	47:83	Vitius permixti mala	14	Vleus pudendarum quomodo sananda	349
Ven. sectio iuxta aures infaccida	40	Vitius sanorum ratio	13	Vleus pueris comoda	175
Venerum superuomitus	195	Vitius ferino morbi	11	Vleus tonsillarum	74
Venerum utilitas	85	Vitius in Vitium consuetudo in morbis acutis	494	Vleus uteri collationes	344
Venas habent maxilla	ibidem	Vitius ex morbo signa	514	Vleus uteri cura pro ratione corporis	333
Veneris utilitas	481	Vigilia sanat aliquando	23	Vleus in inflammatio septenario finitur	61
Venerum magis excitat coitus multus	49	Vigilantia Laus	6	Vleus oculorum consid.	557
Veneres somnia unde	40	Vilva vulgo putata difficilima	117	Vleus tumores	418
Venter calidus est	102	Vinum cedrinum	379	Vleus uti quatuor	22
Venter cibum quod potum recondit	91	Vinum Coum	271	Vleus uteri illitio	332
Venter proximus in doloribus purgandus	462	Vinum meracum hominem debiliorem reddit	18	Vmblicus spirationis definitus	44
Ventris calidi colliquationes	508	Vinum medicum quae ferre possunt quae	107	Vmbilici dolor	479
Ventris fractura	75	Vinum Praxinum	328	Vmbilici puerum nutrir	65
Ventris fustus	444	Vinum tedacium	312		
Ventris uentis	84				
Ventriculi morbi obscuri	8				
Ventriculo in sinistiro cordis mentis sedes	77				
Ventriculo similis terra	169				
Ventriculi corporis plures	8				
Ventriculi duo cordis	76				
Ventus in utero	378:383				
Venti calidi qui	104				

I N D E X

Vndecimus mensis unde partu contin- gat 65	Vrine erui loturae similes 480	Vteri ad septum transversum seden- tes 379
Vndecimestrus partus 65	Vrine indicant curationem 503	Vteri ad stomachum 311
Vnguentum ceratum 367	Vrinarian consideratio 552	Vteri conclusi 370
Vnguis instrumentum 66	Vrinarian malicia 427	Vteri conuulsi 368
Vnguis pueris deficientes ibidem	Vrinarian significatio 530	Vteri cor petentes 357
Vngulum formatio 47	Vrenatio 21	Vteri extra naturam 366
Vngulum generatio 58	Vrta uena sanguine cur nō emittit 99	Vteri extra pudendam elapsi 366
Vnum esse hominem esse nō posse 30	Vrta carnis costarum mucose 642	
Vnum tūq; infinitum esse hominem di- xeri nihilius ibidem	Vrta humeri luxati 626	
ab Vno non fieri generationem 31	Vrta per buccos fusos 274	Vteri granulosi 371
Vosillanum sifus 22	Vrta curatio 626	Vteri hiantes 371
Volucris generatio uetus hominis 54	Vrtae causi mensura ibidem	Vteri hiantes conceptioni impedi- to 386
Voluptas colius unde 39-40-87	Vrtae ferramentum 626	Vteri inflati 301-322
Voluptaria gens Afriani 111	Vrtae ex partu ulceratus 328	Vteri inflammati 303-372
Volubilis 250	Vrtae suppuratus 69	Vteri in lombis 359
Volubilis non ante pubertatem 583	Vrtae aserius quō curandi 103	Vteri indurati 300
Volubili generatio 80-92	Vrtae aseris curatio ibidem	Vteri leuigati 302
Volubili 581	Vrtae defensus quō curandus ibidem	Vteri leues 386
Vomitus bis mense fiat 38	Vrtae bilium que purgent 345	Vteri nimis aperti 317
Vomitus in somento non fidendus 99	Vrtae dolor cum cibi sustinēdo 302	Vteri odorati 369
Vomitus lambricorum 560	Vrtae emitti locus 367	Vteri obliqui 301
Vomitus sanguinis 448-521-559	Vrtae morbi omne que boni 302	Vteri obstrati ibidem
Vomitus sanguinis de pulmone 580	Vrtae multatura 71-380	Vteri pituita repleti 329
Vomitus sanguinis ex partu 303-327	Vrtae multatū morborū cause 302	Vteri precordij succedentes 357
Vomitus sanguinis sterilib; utilis 585	Vrtae nutus ad uentrem ibidem	Vte qua causa externa mouentur 365
Vomitus fluxionibus ex capite cordau- cit 99	Vrtae os conuulsam 300	Vteri quomodo purgandi 303
Vomitus nota 585	Vrtae os distortum 317	Vteri quomō suffocantur 314
Vomitus praemotions 537	Vrtae os hians 302	Vteri suffocantes 305
Vomitus pituita reiecta similis genui- tae 479	Vrtae os ulceratum 303	Vteri transfuersim siti 365
Vomendi ratio 38	Vrtae oculum ad coxā inclinans 359	Vteri transfuoti 303
Vomitiorum ex aqua 487	Vrtae oculum complicatum 367	Vteri ulcerati 331
Vocis uariae affectiones 571	Vrtae purgationes 304	Vteri collutionum mensura 383
Vocis et testium societatis 419	Vrtae strangulatio 378	Vterorum loco motorum morbi uarij 364
Vocis interceptio 543	Vrtae strangulationis cognitio 510	
Vocem obseruata medicus 10	Vrtae suffimenta 70	Vterorum prolapsus 73
Vocis praesatio ex ebrietate 200	Vrtae transfusiones uariae 358	Vterum uehemens exulceratio 333
Vociferatio affligit 30	Vrtae tumores ex partu 323	ad Vteros simenta 361
Votis foras non conciliatur 102	Vrtae uariae affectiones 305	Vteri extra pudendam elapsi quomo- do medendum 397
Vrina ceterum refruens 474-476	Vrtae uicera collationes 344	Vrta instrumentum 640
Vrina iudicatoria 511	Vrtae ex partu inflammatō que con- ducunt 345	Vra morbus 541
Vrina que in pueris pessima 471	Vrtae si grami sanguinis infusi quom- modo faciedum 301	Vulgo uita potata difficillima 117
Vrina in fibribus indicia 524	Vrtae purgantia 309	Vulgi iudicium de medico aegrotō 20
Vrina mutatio in fibribus 503-512	Vrtae que uisunt 305	Vulnus quid 579
Vrina praenotions 536	Vrtae ad caput allapsi 302-357	Vulnere suffocati 579
Vrina silicidium 252	Vrtae ad cor progressi 304	Vulnere urbana à militibus diffu- runt 516
Vrina silicidium quō sanandum 304	Vrtae ad coxam decurrentes 364	Vulnerū in articulari cōsideratio 516
Vrina silicidium quō medendum 83	Vrtae ad crura 302	Vulnerum capitis consideratio 555
Vrinam vienes percolant 83	Vrtae ad hepar conuersi 357	Vulnerum tumores 418
ex Vrina uteri fomentum ad uteros 363	Vrtae ad inguina incumbentes 365	Vulnerati 581
Vrtae conturbate 487	Vrtae ad latera allabentes 309-358	Vulneratorum nota 583
Vrtae dense ibidem	Vrtae ad pedes conuersi 368	Vulnus Medici ut compositus esse de- beat 20
	Vrtae ad sedem cōuersi quomodo me- dendi 303-365	

F I N I S

E R R A T V M

Pagina 384. uer. 20. pro occulteriori, lege ocularis.

SERIES CHARTARVM.

*abcdefghijklmnopqrstu^z. ABCDEFG
HIKLMNOPQRSTVXYZ. Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo. Omnes terniones
præter Nn, qui est duernio.

BASILEAE PER HIERONYMVVM FROB. ET NIC. EPI-
SCOPIVM MENSE MARTIO M. D. XLVI